

- Topographic localization of neuropeptide Y mRNA in the monkey brainstem. *Regel Pept* 75-76: 145-53, 1998
- [8] 高橋 均、中島 茂、大浜栄作、他 ヒト胎児脳幹におけるカテコラミンニューロンの分布 一チロシン水酸化酵素を指標とした免疫組織化学的研究—
脳神経 38: 87-97, 1986
- [9] 高橋 均、中島 茂、武田茂樹、他 ヒト胎児脳幹におけるセロトニンニューロンの分布—免疫組織化学的研究—
脳神経 36: 697-708, 1984
- [10] Martignoni E, Blandini F, Petraglia F et al. Cerebrospinal fluid norepinephrine, 3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol and neuropeptide Y levels in Parkinsons disease, multiple system atrophy and dementia of the Alzheimer type. *J Neural Transm Park Dis Dement Sect* 4: 191-205, 1992
- [11] Fodor M, Palkovits M
Neuropeptide Y containing neuronal pathway from the spinal trigeminal nucleus to the pontine peribrachial region in the rat. *Neurosci Lett* 9: 195-198, 1991
- [12] Tzeng CJ, Lin HC, Wang SD, Tung CS. Immunohistochemical study of catecholamine enzymes and neuropeptide Y (NPY) in the rostral ventrolateral medulla and bulbospinal projection. *J Comp Neurol* 8: 294-303, 1993
- [13] Dassesse D, Hemmens B, Cuvelier L, Resibois A GTP-cyclohydrolase-I like immuno-reactivity in rat brain. *Brain Res* 28: 187-201, 1997
- [14] Nagatsu I, Takeuchi T, Sakai M et al. Transient appearance of GTP cyclohydrolase I-positive non-monoaminergic neurons in the ventral lateral geniculate nucleus of postnatal mice. *Neurosci Lett* 215: 79-82, 1996

研究発表

1 論文

S Ohara, M Tsukada, S Ikeda. On the occurrence of neuronal sprouting in the frontal cortex of a patient with Downs syndrome. *Acta Neuropathologica* 97: 85-90, 1999

2 学会発表

大原慎司、加藤正裕、高橋 均ら ヒト後索核における transganglionic response についての臨床病理学的検討 日本神経学会総会 1998年5月 (於京都) (演題III-P19-5)