

孫の有無

| | | 40歳～49歳 | | 50歳～59歳 | | 60歳～69歳 | | 70歳～80歳 | | 計 | |
|--------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-----|------|
| | | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| 記入なし | 男性 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | - | - | 2 | 2.5 | 4 | 1.2 |
| | 女性 | - | - | - | - | 2 | 2.4 | - | - | 2 | 0.6 |
| | 計 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 2 | 1.2 | 2 | 1.3 | 6 | 0.9 |
| 孫はいない、もしくは死別 | 男性 | 86 | 97.7 | 63 | 75.0 | 17 | 21.5 | 9 | 11.4 | 175 | 53.0 |
| | 女性 | 70 | 97.2 | 54 | 61.4 | 15 | 18.3 | 4 | 5.4 | 143 | 45.3 |
| | 計 | 156 | 97.5 | 117 | 68.0 | 32 | 19.9 | 13 | 8.5 | 318 | 49.2 |
| 孫がいる | 男性 | 1 | 1.1 | 20 | 23.8 | 62 | 78.5 | 68 | 86.1 | 151 | 45.8 |
| | 女性 | 2 | 2.8 | 34 | 38.6 | 65 | 79.3 | 70 | 94.6 | 171 | 54.1 |
| | 計 | 3 | 1.9 | 54 | 31.4 | 127 | 78.9 | 138 | 90.2 | 322 | 49.8 |

現在の孫の数(人)

| | 40歳～49歳 | | | 50歳～59歳 | | | 60歳～69歳 | | | 70歳～80歳 | | | 計 | | |
|----|---------|-----|----|---------|-----|----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 平均 | SD | 人数 | 平均 | SD | 人数 | 平均 | SD | 人数 | 平均 | SD | 人数 | 平均 | SD | 人数 |
| 男性 | 2.0 | . | 1 | 1.9 | 1.2 | 20 | 2.8 | 1.5 | 62 | 4.6 | 2.7 | 68 | 3.5 | 2.4 | 151 |
| 女性 | 1.0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 1.2 | 34 | 3.8 | 2.0 | 65 | 4.7 | 2.4 | 70 | 3.8 | 2.3 | 171 |
| 計 | 1.3 | 0.6 | 3 | 2.0 | 1.2 | 54 | 3.3 | 1.8 | 127 | 4.7 | 2.6 | 138 | 3.7 | 2.3 | 322 |

世帯構成

| | | 40歳～49歳 | | 50歳～59歳 | | 60歳～69歳 | | 70歳～80歳 | | 計 | |
|------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-----|------|
| | | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| ひとり暮らし | 男性 | 3 | 3.4 | 3 | 3.6 | - | - | 3 | 3.8 | 9 | 2.7 |
| | 女性 | 1 | 1.4 | 2 | 2.3 | 5 | 6.1 | 9 | 12.2 | 17 | 5.4 |
| | 計 | 4 | 2.5 | 5 | 2.9 | 5 | 3.1 | 12 | 7.8 | 26 | 4.0 |
| 夫婦のみの世帯 | 男性 | 5 | 5.7 | 8 | 9.5 | 28 | 35.4 | 31 | 39.2 | 72 | 21.8 |
| | 女性 | 5 | 6.9 | 23 | 26.1 | 25 | 30.5 | 22 | 29.7 | 75 | 23.7 |
| | 計 | 10 | 6.3 | 31 | 18.0 | 53 | 32.9 | 53 | 34.6 | 147 | 22.8 |
| 本人と未婚の子の世帯 | 男性 | 1 | 1.1 | 2 | 2.4 | 3 | 3.8 | 2 | 2.5 | 8 | 2.4 |
| | 女性 | 4 | 5.6 | 6 | 6.8 | 3 | 3.7 | 2 | 2.7 | 15 | 4.7 |
| | 計 | 5 | 3.1 | 8 | 4.7 | 6 | 3.7 | 4 | 2.6 | 23 | 3.6 |
| 夫婦と未婚の子の世帯 | 男性 | 48 | 54.5 | 55 | 65.5 | 20 | 25.3 | 10 | 12.7 | 133 | 40.3 |
| | 女性 | 43 | 59.7 | 35 | 39.8 | 13 | 15.9 | 8 | 10.8 | 99 | 31.3 |
| | 計 | 91 | 56.9 | 90 | 52.3 | 33 | 20.5 | 18 | 11.8 | 232 | 35.9 |
| 単身赴任を含む世帯 | 男性 | - | - | - | - | 1 | 1.3 | - | - | 1 | 0.3 |
| | 女性 | - | - | - | - | 1 | 1.2 | - | - | 1 | 0.3 |
| | 計 | - | - | - | - | 2 | 1.2 | - | - | 2 | 0.3 |
| 二世帯世帯 | 男性 | 17 | 19.3 | 8 | 9.5 | 22 | 27.8 | 14 | 17.7 | 61 | 18.5 |
| | 女性 | 9 | 12.5 | 8 | 9.1 | 16 | 19.5 | 11 | 14.9 | 44 | 13.9 |
| | 計 | 26 | 16.3 | 16 | 9.3 | 38 | 23.6 | 25 | 16.3 | 105 | 16.3 |
| 三世帯世帯 | 男性 | 11 | 12.5 | 6 | 7.1 | 4 | 5.1 | 18 | 22.8 | 39 | 11.8 |
| | 女性 | 10 | 13.9 | 11 | 12.5 | 18 | 22.0 | 21 | 28.4 | 60 | 19.0 |
| | 計 | 21 | 13.1 | 17 | 9.9 | 22 | 13.7 | 39 | 25.5 | 99 | 15.3 |
| 四世代世帯 | 男性 | 1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3 |
| | 女性 | - | - | - | - | 1 | 1.2 | - | - | 1 | 0.3 |
| | 計 | 1 | 0.6 | - | - | 1 | 0.6 | - | - | 2 | 0.3 |
| その他 | 男性 | 2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 6 | 1.8 |
| | 女性 | - | - | 3 | 3.4 | - | - | 1 | 1.4 | 4 | 1.3 |
| | 計 | 2 | 1.3 | 5 | 2.9 | 1 | 0.6 | 2 | 1.3 | 10 | 1.5 |

家庭内で介助を必要としている人の有無

| | | 40歳～49歳 | | 50歳～59歳 | | 60歳～69歳 | | 70歳～80歳 | | 計 | |
|------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-----|------|
| | | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| 記入なし | 男性 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5.1 | 4 | 1.2 |
| | 女性 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.4 | 1 | 0.3 |
| | 計 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3.3 | 5 | 0.8 |
| いない | 男性 | 86 | 97.7 | 79 | 94.0 | 78 | 98.7 | 73 | 92.4 | 316 | 95.8 |
| | 女性 | 67 | 93.1 | 78 | 88.6 | 73 | 89.0 | 67 | 90.5 | 285 | 90.2 |
| | 計 | 153 | 95.6 | 157 | 91.3 | 151 | 93.8 | 140 | 91.5 | 601 | 93.0 |
| いる | 男性 | 2 | 2.3 | 5 | 6.0 | 1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 10 | 3.0 |
| | 女性 | 5 | 6.9 | 10 | 11.4 | 9 | 11.0 | 6 | 8.1 | 30 | 9.5 |
| | 計 | 7 | 4.4 | 15 | 8.7 | 10 | 6.2 | 8 | 5.2 | 40 | 6.2 |

家庭内で介助を必要としている人

| | | 40歳～49歳 | | 50歳～59歳 | | 60歳～69歳 | | 70歳～80歳 | | 計 | |
|-----|----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|----|-------|
| | | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| 父 | 男性 | 1 | 50.0 | 1 | 20.0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 20.0 |
| | 女性 | 0 | - | 1 | 10.0 | 1 | 11.1 | 0 | - | 2 | 6.7 |
| | 計 | 1 | 14.3 | 2 | 13.3 | 1 | 10.0 | 0 | - | 4 | 10.0 |
| 母 | 男性 | 0 | - | 3 | 60.0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 30.0 |
| | 女性 | 1 | 20.0 | 1 | 10.0 | 1 | 11.1 | 0 | - | 3 | 10.0 |
| | 計 | 1 | 14.3 | 4 | 26.7 | 1 | 10.0 | 0 | - | 6 | 15.0 |
| 義父 | 男性 | 1 | 50.0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 10.0 |
| | 女性 | 0 | - | 3 | 30.0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 10.0 |
| | 計 | 1 | 14.3 | 3 | 20.0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 10.0 |
| 義母 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 3 | 60.0 | 4 | 40.0 | 2 | 22.2 | 1 | 16.7 | 10 | 33.3 |
| | 計 | 3 | 42.9 | 4 | 26.7 | 2 | 20.0 | 1 | 12.5 | 10 | 25.0 |
| 祖父 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 祖母 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 義祖父 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 義祖母 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 1 | 20.0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 3.3 |
| | 計 | 1 | 14.3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 2.5 |
| 配偶者 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 50.0 | 1 | 10.0 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 5 | 55.6 | 5 | 83.3 | 10 | 33.3 |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 5 | 50.0 | 6 | 75.0 | 11 | 27.5 |
| 子ども | 男性 | 0 | - | 0 | - | 1 | 100.0 | 1 | 50.0 | 2 | 20.0 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 1 | 11.1 | 0 | - | 1 | 3.3 |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 2 | 20.0 | 1 | 12.5 | 3 | 7.5 |
| その他 | 男性 | 0 | - | 1 | 20.0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 10.0 |
| | 女性 | 0 | - | 1 | 10.0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 3.3 |
| | 計 | 0 | - | 2 | 13.3 | 0 | - | 0 | - | 2 | 5.0 |
| 合計 | 男性 | 2 | 100.0 | 5 | 100.0 | 1 | 100.0 | 2 | 100.0 | 10 | 100.0 |

(CONTINUED)

家庭内で介助を必要としている人

| | | 40歳～49歳 | | 50歳～59歳 | | 60歳～69歳 | | 70歳～80歳 | | 計 | |
|----|----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|----|-------|
| | | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| 合計 | 女性 | 5 | 100.0 | 10 | 100.0 | 9 | 100.0 | 6 | 100.0 | 30 | 100.0 |
| | 計 | 7 | 100.0 | 15 | 100.0 | 10 | 100.0 | 8 | 100.0 | 40 | 100.0 |

世話をしている人

| | | 40歳～49歳 | | 50歳～59歳 | | 60歳～69歳 | | 70歳～80歳 | | 計 | |
|------------|----|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|------|----|------|
| | | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| 本人 | 男性 | 0 | - | 1 | 20.0 | 0 | - | 1 | 50.0 | 2 | 20.0 |
| | 女性 | 4 | 80.0 | 7 | 70.0 | 6 | 66.7 | 4 | 66.7 | 21 | 70.0 |
| | 計 | 4 | 57.1 | 8 | 53.3 | 6 | 60.0 | 5 | 62.5 | 23 | 57.5 |
| 父 | 男性 | 0 | - | 1 | 20.0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 2 | 20.0 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 1 | 6.7 | 1 | 10.0 | 0 | - | 2 | 5.0 |
| 母 | 男性 | 0 | - | 1 | 20.0 | 1 | 100.0 | 0 | - | 2 | 20.0 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 1 | 6.7 | 1 | 10.0 | 0 | - | 2 | 5.0 |
| 義父 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 義母 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 1 | 10.0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 3.3 |
| | 計 | 0 | - | 1 | 6.7 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2.5 |
| 祖父 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 祖母 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 義祖父 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 義祖母 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 16.7 | 1 | 3.3 |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 12.5 | 1 | 2.5 |
| 配偶者 | 男性 | 1 | 50.0 | 1 | 20.0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 20.0 |
| | 女性 | 2 | 40.0 | 2 | 20.0 | 2 | 22.2 | 1 | 16.7 | 7 | 23.3 |
| | 計 | 3 | 42.9 | 3 | 20.0 | 2 | 20.0 | 1 | 12.5 | 9 | 22.5 |
| 子ども | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 50.0 | 1 | 10.0 |
| | 女性 | 0 | - | 2 | 20.0 | 2 | 22.2 | 0 | - | 4 | 13.3 |
| | 計 | 0 | - | 2 | 13.3 | 2 | 20.0 | 1 | 12.5 | 5 | 12.5 |
| 子どもの配偶-男性者 | | 0 | - | 1 | 20.0 | 0 | - | 1 | 50.0 | 2 | 20.0 |

(CONTINUED)

世話をしている人

| | 40歳～49歳 | | 50歳～59歳 | | 60歳～69歳 | | 70歳～80歳 | | 計 | | |
|---------|---------|---|---------|----|---------|----|---------|---|-------|----|-------|
| | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |
| 子どもの配偶者 | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 1 | 6.7 | 0 | - | 1 | 12.5 | 2 | 5.0 |
| 孫 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 1 | 11.1 | 0 | - | 1 | 3.3 |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 1 | 10.0 | 0 | - | 1 | 2.5 |
| 孫の配偶者 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| その他 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 1 | 10.0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 3.3 |
| | 計 | 0 | - | 1 | 6.7 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2.5 |
| 合計 | 男性 | 2 | 100.0 | 5 | 100.0 | 1 | 100.0 | 2 | 100.0 | 10 | 100.0 |
| | 女性 | 5 | 100.0 | 10 | 100.0 | 9 | 100.0 | 6 | 100.0 | 30 | 100.0 |
| | 計 | 7 | 100.0 | 15 | 100.0 | 10 | 100.0 | 8 | 100.0 | 40 | 100.0 |

別居の子どもと会う頻度

| | | 40歳～49歳 | | 50歳～59歳 | | 60歳～69歳 | | 70歳～80歳 | | 計 | |
|------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-----|------|
| | | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| 週に数回 | 男性 | 3 | 25.0 | 11 | 23.9 | 17 | 25.4 | 13 | 20.0 | 44 | 23.2 |
| | 女性 | 3 | 15.0 | 18 | 29.0 | 21 | 30.4 | 24 | 35.3 | 66 | 30.1 |
| | 計 | 6 | 18.8 | 29 | 26.9 | 38 | 27.9 | 37 | 27.8 | 110 | 26.9 |
| 1ヶ月に数回 | 男性 | - | - | 12 | 26.1 | 21 | 31.3 | 21 | 32.3 | 54 | 28.4 |
| | 女性 | 3 | 15.0 | 17 | 27.4 | 22 | 31.9 | 15 | 22.1 | 57 | 26.0 |
| | 計 | 3 | 9.4 | 29 | 26.9 | 43 | 31.6 | 36 | 27.1 | 111 | 27.1 |
| 1ヶ月に1回 | 男性 | - | - | 10 | 21.7 | 15 | 22.4 | 9 | 13.8 | 34 | 17.9 |
| | 女性 | 4 | 20.0 | 4 | 6.5 | 9 | 13.0 | 10 | 14.7 | 27 | 12.3 |
| | 計 | 4 | 12.5 | 14 | 13.0 | 24 | 17.6 | 19 | 14.3 | 61 | 14.9 |
| 年に数回 | 男性 | 8 | 66.7 | 7 | 15.2 | 8 | 11.9 | 19 | 29.2 | 42 | 22.1 |
| | 女性 | 8 | 40.0 | 16 | 25.8 | 12 | 17.4 | 16 | 23.5 | 52 | 23.7 |
| | 計 | 16 | 50.0 | 23 | 21.3 | 20 | 14.7 | 35 | 26.3 | 94 | 23.0 |
| 年に1回 | 男性 | 1 | 8.3 | 5 | 10.9 | 5 | 7.5 | 2 | 3.1 | 13 | 6.8 |
| | 女性 | 1 | 5.0 | 7 | 11.3 | 4 | 5.8 | 2 | 2.9 | 14 | 6.4 |
| | 計 | 2 | 6.3 | 12 | 11.1 | 9 | 6.6 | 4 | 3.0 | 27 | 6.6 |
| 1年以上会っていない | 男性 | - | - | 1 | 2.2 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 1.6 |
| | 女性 | 1 | 5.0 | - | - | 1 | 1.4 | - | - | 2 | 0.9 |
| | 計 | 1 | 3.1 | 1 | 0.9 | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 5 | 1.2 |
| 5年以上会っていない | 男性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女性 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| | 計 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 |

別居の子どもとの電話、手紙の頻度

| | | 40歳～49歳 | | 50歳～59歳 | | 60歳～69歳 | | 70歳～80歳 | | 計 | |
|----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-----|------|
| | | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| 毎日 | 男性 | 3 | 25.0 | 1 | 2.2 | 4 | 6.0 | 3 | 4.6 | 11 | 5.8 |
| | 女性 | 3 | 14.3 | 4 | 6.6 | 7 | 10.1 | 9 | 13.2 | 23 | 10.5 |
| | 計 | 6 | 18.2 | 5 | 4.7 | 11 | 8.1 | 12 | 9.0 | 34 | 8.3 |
| 週に数回 | 男性 | 2 | 16.7 | 15 | 33.3 | 23 | 34.3 | 21 | 32.3 | 61 | 32.3 |
| | 女性 | 6 | 28.6 | 22 | 36.1 | 23 | 33.3 | 18 | 26.5 | 69 | 31.5 |
| | 計 | 8 | 24.2 | 37 | 34.9 | 46 | 33.8 | 39 | 29.3 | 130 | 31.9 |
| 1ヶ月に数回 | 男性 | 3 | 25.0 | 20 | 44.4 | 25 | 37.3 | 21 | 32.3 | 69 | 36.5 |
| | 女性 | 9 | 42.9 | 18 | 29.5 | 22 | 31.9 | 21 | 30.9 | 70 | 32.0 |
| | 計 | 12 | 36.4 | 38 | 35.8 | 47 | 34.6 | 42 | 31.6 | 139 | 34.1 |
| 1ヶ月に1回 | 男性 | 2 | 16.7 | 6 | 13.3 | 9 | 13.4 | 13 | 20.0 | 30 | 15.9 |
| | 女性 | 2 | 9.5 | 13 | 21.3 | 14 | 20.3 | 8 | 11.8 | 37 | 16.9 |
| | 計 | 4 | 12.1 | 19 | 17.9 | 23 | 16.9 | 21 | 15.8 | 67 | 16.4 |
| 年に数回 | 男性 | 2 | 16.7 | 2 | 4.4 | 3 | 4.5 | 7 | 10.8 | 14 | 7.4 |
| | 女性 | 1 | 4.8 | 4 | 6.6 | 3 | 4.3 | 9 | 13.2 | 17 | 7.8 |
| | 計 | 3 | 9.1 | 6 | 5.7 | 6 | 4.4 | 16 | 12.0 | 31 | 7.6 |
| 年に1回 | 男性 | - | - | - | - | 2 | 3.0 | - | - | 2 | 1.1 |
| | 女性 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| | 計 | - | - | - | - | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 3 | 0.7 |
| 1年以上連絡ない | 男性 | - | - | 1 | 2.2 | 1 | 1.5 | - | - | 2 | 1.1 |
| | 女性 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.9 | 2 | 0.9 |
| | 計 | - | - | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 2 | 1.5 | 4 | 1.0 |

III 服用薬物調査

服薬調査（過去2週間の使用薬物）

| | | 40歳～49歳 | | 50歳～59歳 | | 60歳～69歳 | | 70歳～80歳 | | 計 | |
|-------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|----|------|
| | | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| 全身麻酔薬 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 男性 | 1 | 1.1 | 4 | 4.8 | 1 | 1.3 | 5 | 6.3 | 11 | 3.3 |
| | 女性 | 3 | 4.2 | 3 | 3.5 | 6 | 7.3 | 13 | 17.6 | 25 | 8.0 |
| | 計 | 4 | 2.5 | 7 | 4.1 | 7 | 4.3 | 18 | 11.8 | 36 | 5.6 |
| 抗てんかん剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.3 | 0 | - | 1 | 0.3 |
| | 女性 | 2 | 2.8 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.4 | 3 | 1.0 |
| | 計 | 2 | 1.3 | 0 | - | 1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 4 | 0.6 |
| 解熱鎮痛消炎剤 | 男性 | 4 | 4.6 | 9 | 10.7 | 3 | 3.8 | 7 | 8.9 | 23 | 7.0 |
| | 女性 | 8 | 11.1 | 8 | 9.3 | 13 | 15.9 | 18 | 24.3 | 47 | 15.0 |
| | 計 | 12 | 7.5 | 17 | 10.0 | 16 | 9.9 | 25 | 16.3 | 70 | 10.9 |
| 興奮剤、覚せい剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 抗パーキンソン剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.3 | 1 | 0.3 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.7 | 1 | 0.2 |
| 精神神経用剤 | 男性 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 3 | 3.8 | 4 | 5.1 | 9 | 2.7 |
| | 女性 | 0 | - | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 5 | 6.8 | 7 | 2.2 |
| | 計 | 1 | 0.6 | 2 | 1.2 | 4 | 2.5 | 9 | 5.9 | 16 | 2.5 |
| 総合感冒剤 | 男性 | 3 | 3.4 | 1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 7 | 2.1 |
| | 女性 | 0 | - | 6 | 7.0 | 4 | 4.9 | 2 | 2.7 | 12 | 3.8 |
| | 計 | 3 | 1.9 | 7 | 4.1 | 5 | 3.1 | 4 | 2.6 | 19 | 3.0 |
| その他の中枢神経系用薬 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 0.9 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 2 | 0.6 |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 2 | 1.2 | 3 | 2.0 | 5 | 0.8 |
| 局所麻酔薬 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 骨格筋弛緩剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.2 | 0 | - | 1 | 0.3 |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.6 | 0 | - | 1 | 0.2 |
| 自律神経剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

(CONTINUED)

服薬調査（過去2週間の使用薬物）

| | | 40歳～49歳 | | 50歳～59歳 | | 60歳～69歳 | | 70歳～80歳 | | 計 | |
|----------------------|----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|------|----|------|
| | | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| 自律神経剤 | 女性 | 1 | 1.4 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.4 | 2 | 0.6 |
| | 計 | 1 | 0.6 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.7 | 2 | 0.3 |
| 鎮けい剤 | 男性 | 1 | 1.1 | 4 | 4.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | 10 | 3.0 |
| | 女性 | 1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0 | - | 1 | 1.4 | 3 | 1.0 |
| | 計 | 2 | 1.3 | 5 | 2.9 | 2 | 1.2 | 4 | 2.6 | 13 | 2.0 |
| 発汗剤、止汗剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| その他の末梢神経系用薬 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 眼科用剤（その他） | 男性 | 4 | 4.6 | 4 | 4.8 | 3 | 3.8 | 11 | 13.9 | 22 | 6.7 |
| | 女性 | 7 | 9.7 | 8 | 9.3 | 8 | 9.8 | 15 | 20.3 | 38 | 12.1 |
| | 計 | 11 | 6.9 | 12 | 7.1 | 11 | 6.8 | 26 | 17.0 | 60 | 9.3 |
| 眼科用剤（白内障） | 男性 | 0 | - | 0 | - | 3 | 3.8 | 7 | 8.9 | 10 | 3.0 |
| | 女性 | 0 | - | 1 | 1.2 | 7 | 8.5 | 14 | 18.9 | 22 | 7.0 |
| | 計 | 0 | - | 1 | 0.6 | 10 | 6.2 | 21 | 13.7 | 32 | 5.0 |
| 眼科用剤（ピロカルピン） | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.3 | 1 | 0.3 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.7 | 1 | 0.2 |
| 眼科用剤（βブロッカー） | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 2.5 | 2 | 0.6 |
| | 女性 | 1 | 1.4 | 2 | 2.3 | 0 | - | 2 | 2.7 | 5 | 1.6 |
| | 計 | 1 | 0.6 | 2 | 1.2 | 0 | - | 4 | 2.6 | 7 | 1.1 |
| 眼科用剤（エピネフリン） | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.4 | 1 | 0.3 |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.7 | 1 | 0.2 |
| 眼科用剤（その他の緑内障- 用薬） | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 1 | 1.2 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.3 |
| | 計 | 0 | - | 1 | 0.6 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.2 |
| 眼科用剤（ステロイド） | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 2.5 | 2 | 0.6 |
| | 女性 | 1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 2 | 2.4 | 7 | 9.5 | 11 | 3.5 |
| | 計 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 2 | 1.2 | 9 | 5.9 | 13 | 2.0 |
| 不明の眼科用剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 2 | 0.6 |
| | 女性 | 2 | 2.8 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.4 | 3 | 1.0 |

(CONTINUED)

服薬調査（過去2週間の使用薬物）

| | | 40歳～49歳 | | 50歳～59歳 | | 60歳～69歳 | | 70歳～80歳 | | 計 | |
|------------|----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|----|-----|
| | | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| 不明の眼科用剤 | 計 | 2 | 1.3 | 0 | - | 1 | 0.6 | 2 | 1.3 | 5 | 0.8 |
| 耳鼻科用剤 | 男性 | 1 | 1.1 | 2 | 2.4 | 0 | - | 1 | 1.3 | 4 | 1.2 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 1 | 0.6 | 2 | 1.2 | 0 | - | 1 | 0.7 | 4 | 0.6 |
| 鎮うん剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.3 | 1 | 0.3 |
| | 女性 | 2 | 2.8 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | - | 4 | 1.3 |
| | 計 | 2 | 1.3 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 5 | 0.8 |
| その他の感覚器官用薬 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| ジギタリス製剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.3 | 1 | 0.3 |
| | 女性 | 1 | 1.4 | 0 | - | 0 | - | 2 | 2.7 | 3 | 1.0 |
| | 計 | 1 | 0.6 | 0 | - | 0 | - | 3 | 2.0 | 4 | 0.6 |
| キサラン製剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| その他の強心剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 2 | 2.5 | 1 | 1.3 | 3 | 0.9 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 4.1 | 3 | 1.0 |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 2 | 1.2 | 4 | 2.6 | 6 | 0.9 |
| βブロッカー | 男性 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 4 | 5.1 | 4 | 5.1 | 10 | 3.0 |
| | 女性 | 1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 2 | 2.4 | 3 | 4.1 | 7 | 2.2 |
| | 計 | 2 | 1.3 | 2 | 1.2 | 6 | 3.7 | 7 | 4.6 | 17 | 2.6 |
| 膜安定化薬 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.3 | 1 | 0.3 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.2 | 3 | 4.1 | 4 | 1.3 |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.6 | 4 | 2.6 | 5 | 0.8 |
| その他の抗不整脈薬 | 男性 | 0 | - | 1 | 1.2 | 0 | - | 1 | 1.3 | 2 | 0.6 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 1 | 0.6 | 0 | - | 1 | 0.7 | 2 | 0.3 |
| サイアザイド利尿薬 | 男性 | 0 | - | 1 | 1.2 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.3 |
| | 女性 | 0 | - | 1 | 1.2 | 0 | - | 1 | 1.4 | 2 | 0.6 |
| | 計 | 0 | - | 2 | 1.2 | 0 | - | 1 | 0.7 | 3 | 0.5 |
| ループ利尿薬 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 0.9 |
| | 女性 | 1 | 1.4 | 0 | - | 1 | 1.2 | 0 | - | 2 | 0.6 |
| | 計 | 1 | 0.6 | 0 | - | 2 | 1.2 | 2 | 1.3 | 5 | 0.8 |

(CONTINUED)

服薬調査（過去2週間の使用薬物）

| | | 40歳～49歳 | | 50歳～59歳 | | 60歳～69歳 | | 70歳～80歳 | | 計 | |
|------------|----|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|------|----|------|
| | | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| K保持性利尿薬 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 2 | 0.6 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 2 | 0.3 |
| CA抑制薬 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| その他の利尿薬 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| ACE阻害薬 | 男性 | 2 | 2.3 | 1 | 1.2 | 5 | 6.3 | 7 | 8.9 | 15 | 4.6 |
| | 女性 | 1 | 1.4 | 0 | - | 3 | 3.7 | 4 | 5.4 | 8 | 2.5 |
| | 計 | 3 | 1.9 | 1 | 0.6 | 8 | 5.0 | 11 | 7.2 | 23 | 3.6 |
| Ca拮抗薬 | 男性 | 4 | 4.6 | 3 | 3.6 | 11 | 13.9 | 19 | 24.1 | 37 | 11.2 |
| | 女性 | 1 | 1.4 | 3 | 3.5 | 17 | 20.7 | 21 | 28.4 | 42 | 13.4 |
| | 計 | 5 | 3.1 | 6 | 3.5 | 28 | 17.4 | 40 | 26.1 | 79 | 12.3 |
| その他の降圧薬 | 男性 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 2 | 2.5 | 5 | 6.3 | 9 | 2.7 |
| | 女性 | 0 | - | 3 | 3.5 | 2 | 2.4 | 2 | 2.7 | 7 | 2.2 |
| | 計 | 1 | 0.6 | 4 | 2.4 | 4 | 2.5 | 7 | 4.6 | 16 | 2.5 |
| 血管補強剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 血管収縮剤 | 男性 | 0 | - | 1 | 1.2 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.3 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 1 | 0.6 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.2 |
| 血管拡張剤 | 男性 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 4 | 5.1 | 5 | 6.3 | 11 | 3.3 |
| | 女性 | 1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 12 | 16.2 | 15 | 4.8 |
| | 計 | 2 | 1.3 | 2 | 1.2 | 5 | 3.1 | 17 | 11.1 | 26 | 4.0 |
| 高脂血症用剤 | 男性 | 2 | 2.3 | 3 | 3.6 | 5 | 6.3 | 6 | 7.6 | 16 | 4.9 |
| | 女性 | 2 | 2.8 | 4 | 4.7 | 7 | 8.5 | 14 | 18.9 | 27 | 8.6 |
| | 計 | 4 | 2.5 | 7 | 4.1 | 12 | 7.5 | 20 | 13.1 | 43 | 6.7 |
| その他の循環器官用薬 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 3 | 3.8 | 4 | 5.1 | 7 | 2.1 |
| | 女性 | 0 | - | 1 | 1.2 | 3 | 3.7 | 7 | 9.5 | 11 | 3.5 |
| | 計 | 0 | - | 1 | 0.6 | 6 | 3.7 | 11 | 7.2 | 18 | 2.8 |
| 呼吸促進剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

(CONTINUED)

服薬調査（過去2週間の使用薬物）

| | | 40歳～49歳 | | 50歳～59歳 | | 60歳～69歳 | | 70歳～80歳 | | 計 | |
|------------|----|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|----|------|
| | | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| 呼吸促進剤 | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 鎮咳剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 2 | 2.3 | 1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 4 | 1.3 |
| | 計 | 0 | - | 2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 4 | 0.6 |
| 去たん剤 | 男性 | 1 | 1.1 | 0 | - | 2 | 2.5 | 0 | - | 3 | 0.9 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.4 | 1 | 0.3 |
| | 計 | 1 | 0.6 | 0 | - | 2 | 1.2 | 1 | 0.7 | 4 | 0.6 |
| 鎮咳去たん剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 気管支拡張剤 | 男性 | 3 | 3.4 | 1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 7 | 2.1 |
| | 女性 | 0 | - | 1 | 1.2 | 0 | - | 1 | 1.4 | 2 | 0.6 |
| | 計 | 3 | 1.9 | 2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 3 | 2.0 | 9 | 1.4 |
| 含そう剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.2 | 0 | - | 1 | 0.3 |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.6 | 0 | - | 1 | 0.2 |
| その他の呼吸器官用薬 | 男性 | 1 | 1.1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.3 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 1 | 0.6 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.2 |
| 止しゃ剤、整腸剤 | 男性 | 0 | - | 1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 3 | 3.8 | 5 | 1.5 |
| | 女性 | 0 | - | 3 | 3.5 | 0 | - | 4 | 5.4 | 7 | 2.2 |
| | 計 | 0 | - | 4 | 2.4 | 1 | 0.6 | 7 | 4.6 | 12 | 1.9 |
| 消化性潰瘍用剤 | 男性 | 2 | 2.3 | 9 | 10.7 | 15 | 19.0 | 15 | 19.0 | 41 | 12.5 |
| | 女性 | 5 | 6.9 | 10 | 11.6 | 8 | 9.8 | 17 | 23.0 | 40 | 12.7 |
| | 計 | 7 | 4.4 | 19 | 11.2 | 23 | 14.3 | 32 | 20.9 | 81 | 12.6 |
| 健胃消化剤 | 男性 | 0 | - | 2 | 2.4 | 5 | 6.3 | 5 | 6.3 | 12 | 3.6 |
| | 女性 | 1 | 1.4 | 7 | 8.1 | 0 | - | 6 | 8.1 | 14 | 4.5 |
| | 計 | 1 | 0.6 | 9 | 5.3 | 5 | 3.1 | 11 | 7.2 | 26 | 4.0 |
| 制酸剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 4 | 5.1 | 1 | 1.3 | 5 | 1.5 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.2 | 3 | 4.1 | 4 | 1.3 |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 5 | 3.1 | 4 | 2.6 | 9 | 1.4 |
| 下剤、浣腸剤 | 男性 | 0 | - | 2 | 2.4 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 4 | 1.2 |
| | 女性 | 2 | 2.8 | 3 | 3.5 | 8 | 9.8 | 8 | 10.8 | 21 | 6.7 |

(CONTINUED)

服薬調査（過去2週間の使用薬物）

| | | 40歳～49歳 | | 50歳～59歳 | | 60歳～69歳 | | 70歳～80歳 | | 計 | |
|-----------------|----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|----|-----|
| | | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| 下剤、浣腸剤 | 計 | 2 | 1.3 | 5 | 2.9 | 9 | 5.6 | 9 | 5.9 | 25 | 3.9 |
| 利胆剤 | 男性 | 0 | - | 1 | 1.2 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.3 |
| | 女性 | 0 | - | 1 | 1.2 | 0 | - | 1 | 1.4 | 2 | 0.6 |
| | 計 | 0 | - | 2 | 1.2 | 0 | - | 1 | 0.7 | 3 | 0.5 |
| 複合胃腸剤 | 男性 | 3 | 3.4 | 1 | 1.2 | 0 | - | 2 | 2.5 | 6 | 1.8 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 2 | 2.4 | 1 | 1.4 | 3 | 1.0 |
| | 計 | 3 | 1.9 | 1 | 0.6 | 2 | 1.2 | 3 | 2.0 | 9 | 1.4 |
| その他の消化器官用薬 | 男性 | 2 | 2.3 | 5 | 6.0 | 5 | 6.3 | 6 | 7.6 | 18 | 5.5 |
| | 女性 | 2 | 2.8 | 4 | 4.7 | 8 | 9.8 | 7 | 9.5 | 21 | 6.7 |
| | 計 | 4 | 2.5 | 9 | 5.3 | 13 | 8.1 | 13 | 8.5 | 39 | 6.1 |
| 脳下垂体ホルモン剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 唾液腺ホルモン剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.2 | 0 | - | 1 | 0.3 |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.6 | 0 | - | 1 | 0.2 |
| 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 | 男性 | 0 | - | 1 | 1.2 | 0 | - | 1 | 1.3 | 2 | 0.6 |
| | 女性 | 0 | - | 1 | 1.2 | 2 | 2.4 | 1 | 1.4 | 4 | 1.3 |
| | 計 | 0 | - | 2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 2 | 1.3 | 6 | 0.9 |
| タンパク同化ステロイド剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 副腎ホルモン剤 | 男性 | 2 | 2.3 | 0 | - | 1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 5 | 1.5 |
| | 女性 | 1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0.6 |
| | 計 | 3 | 1.9 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 2 | 1.3 | 7 | 1.1 |
| 男性ホルモン剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.3 | 0 | - | 1 | 0.3 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.6 | 0 | - | 1 | 0.2 |
| 混合ホルモン剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 1 | 1.4 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.3 |
| | 計 | 1 | 0.6 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.2 |

(CONTINUED)

服薬調査（過去2週間の使用薬物）

| | | 40歳～49歳 | | 50歳～59歳 | | 60歳～69歳 | | 70歳～80歳 | | 計 | |
|------------------|----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|------|----|-----|
| | | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| その他のホルモン剤 | 男性 | 0 | - | 1 | 1.2 | 3 | 3.8 | 3 | 3.8 | 7 | 2.1 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 2.7 | 2 | 0.6 |
| | 計 | 0 | - | 1 | 0.6 | 3 | 1.9 | 5 | 3.3 | 9 | 1.4 |
| 泌尿器官用剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 生殖器官用剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 子宮収縮剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 避妊剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 痔疾用剤 | 男性 | 3 | 3.4 | 0 | - | 0 | - | 3 | 3.8 | 6 | 1.8 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 3 | 1.9 | 0 | - | 0 | - | 3 | 2.0 | 6 | 0.9 |
| その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | 男性 | 1 | 1.1 | 0 | - | 3 | 3.8 | 2 | 2.5 | 6 | 1.8 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 1 | 0.6 | 0 | - | 3 | 1.9 | 2 | 1.3 | 6 | 0.9 |
| 外皮用殺菌消毒剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 1 | 1.2 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.3 |
| | 計 | 0 | - | 1 | 0.6 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.2 |
| 創傷保護剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 化膿性疾患用剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤 | 男性 | 3 | 3.4 | 3 | 3.6 | 4 | 5.1 | 7 | 8.9 | 17 | 5.2 |
| | 女性 | 1 | 1.4 | 2 | 2.3 | 7 | 8.5 | 12 | 16.2 | 22 | 7.0 |
| | 計 | 4 | 2.5 | 5 | 2.9 | 11 | 6.8 | 19 | 12.4 | 39 | 6.1 |
| 寄生性皮膚疾患用剤 | 男性 | 2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 6 | 1.8 |

(CONTINUED)

服薬調査（過去2週間の使用薬物）

| | | 40歳～49歳 | | 50歳～59歳 | | 60歳～69歳 | | 70歳～80歳 | | 計 | |
|------------|----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|----|-----|
| | | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| 寄生性皮膚疾患用剤 | 女性 | 1 | 1.4 | 0 | - | 1 | 1.2 | 0 | - | 2 | 0.6 |
| | 計 | 3 | 1.9 | 2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1 | 0.7 | 8 | 1.2 |
| 皮膚軟化剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.2 | 0 | - | 1 | 0.3 |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.6 | 0 | - | 1 | 0.2 |
| 毛髪用剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 浴剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| その他の外皮用剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.3 | 1 | 0.3 |
| | 女性 | 2 | 2.8 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0.6 |
| | 計 | 2 | 1.3 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.7 | 3 | 0.5 |
| 歯科用局所麻酔剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 歯髄失活剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 歯科用鎮痛鎮静剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 歯髄乾死剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 歯髄覆たく剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 歯科用抗生物質製剤 | 男性 | 1 | 1.1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.3 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 1 | 0.6 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.2 |
| その他の歯科口腔用薬 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

(CONTINUED)

服薬調査（過去2週間の使用薬物）

| | | 40歳～49歳 | | 50歳～59歳 | | 60歳～69歳 | | 70歳～80歳 | | 計 | |
|--------------|----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|------|----|-----|
| | | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| その他の歯科口腔用薬 | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| ビタミンA及びD剤 | 男性 | 1 | 1.1 | 0 | - | 1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 4 | 1.2 |
| | 女性 | 0 | - | 3 | 3.5 | 4 | 4.9 | 6 | 8.1 | 13 | 4.1 |
| | 計 | 1 | 0.6 | 3 | 1.8 | 5 | 3.1 | 8 | 5.2 | 17 | 2.6 |
| ビタミンB1剤 | 男性 | 1 | 1.1 | 3 | 3.6 | 0 | - | 2 | 2.5 | 6 | 1.8 |
| | 女性 | 1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 4 | 1.3 |
| | 計 | 2 | 1.3 | 4 | 2.4 | 1 | 0.6 | 3 | 2.0 | 10 | 1.6 |
| ビタミンB剤（B1除く） | 男性 | 0 | - | 3 | 3.6 | 5 | 6.3 | 10 | 12.7 | 18 | 5.5 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 5 | 6.1 | 5 | 6.8 | 10 | 3.2 |
| | 計 | 0 | - | 3 | 1.8 | 10 | 6.2 | 15 | 9.8 | 28 | 4.4 |
| ビタミンC剤 | 男性 | 0 | - | 3 | 3.6 | 1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 6 | 1.8 |
| | 女性 | 0 | - | 4 | 4.7 | 3 | 3.7 | 2 | 2.7 | 9 | 2.9 |
| | 計 | 0 | - | 7 | 4.1 | 4 | 2.5 | 4 | 2.6 | 15 | 2.3 |
| ビタミンE剤 | 男性 | 0 | - | 2 | 2.4 | 0 | - | 3 | 3.8 | 5 | 1.5 |
| | 女性 | 1 | 1.4 | 2 | 2.3 | 4 | 4.9 | 5 | 6.8 | 12 | 3.8 |
| | 計 | 1 | 0.6 | 4 | 2.4 | 4 | 2.5 | 8 | 5.2 | 17 | 2.6 |
| ビタミンK剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 混合ビタミン剤 | 男性 | 0 | - | 3 | 3.6 | 4 | 5.1 | 3 | 3.8 | 10 | 3.0 |
| | 女性 | 1 | 1.4 | 3 | 3.5 | 3 | 3.7 | 6 | 8.1 | 13 | 4.1 |
| | 計 | 1 | 0.6 | 6 | 3.5 | 7 | 4.3 | 9 | 5.9 | 23 | 3.6 |
| その他のビタミン剤 | 男性 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 3 | 3.8 | 3 | 3.8 | 8 | 2.4 |
| | 女性 | 2 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3 | 3.7 | 3 | 4.1 | 11 | 3.5 |
| | 計 | 3 | 1.9 | 4 | 2.4 | 6 | 3.7 | 6 | 3.9 | 19 | 3.0 |
| カルシウム剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 2 | 0.6 |
| | 女性 | 1 | 1.4 | 5 | 5.8 | 3 | 3.7 | 0 | - | 9 | 2.9 |
| | 計 | 1 | 0.6 | 5 | 2.9 | 4 | 2.5 | 1 | 0.7 | 11 | 1.7 |
| 無機質製剤 | 男性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1.3 | 1 | 0.3 |
| | 女性 | 1 | 1.4 | 2 | 2.3 | 0 | - | 2 | 2.7 | 5 | 1.6 |
| | 計 | 1 | 0.6 | 2 | 1.2 | 0 | - | 3 | 2.0 | 6 | 0.9 |
| 糖類剤 | 男性 | 0 | - | 1 | 1.2 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.3 |
| | 女性 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 0 | - | 1 | 0.6 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.2 |

(CONTINUED)