

標準純音聴力検査
左気導4000Hz (dB)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	17.6	13.7	88	30.4	19.6	83	40.3	21.7	79	52.5	19.1	77	34.5	22.6	327
女性	9.5	13.5	72	17.2	12.3	88	24.8	17.7	81	41.5	59.9	74	23.1	33.6	315
計	13.9	14.2	160	23.6	17.5	171	32.5	21.2	160	47.1	44.3	151	28.9	29.1	642

標準純音聴力検査
左気導8000Hz (dB)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	19.5	11.4	88	33.9	20.6	83	51.7	21.5	79	66.0	18.5	77	41.9	25.4	327
女性	19.2	19.2	72	31.6	17.9	88	39.3	19.7	81	57.2	20.8	74	36.8	23.4	315
計	19.4	15.4	160	32.7	19.2	171	45.4	21.5	160	61.7	20.1	151	39.4	24.6	642

標準純音聴力検査
左骨導500Hz (dB) (難聴者のみ実施)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	30.0	0.0	2	22.3	14.2	13	27.4	17.4	17	35.0	15.8	29	30.0	16.3	61
女性	35.8	12.4	6	26.0	7.4	5	29.1	15.5	17	33.3	12.3	24	31.5	13.1	52
計	34.4	10.8	8	23.3	12.6	18	28.2	16.3	34	34.2	14.2	53	30.7	14.9	113

標準純音聴力検査
左骨導1000Hz (dB) (難聴者のみ実施)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	22.5	10.6	2	23.5	12.3	13	25.9	18.0	17	35.5	16.8	33	30.2	16.8	65
女性	45.0	26.5	3	26.7	7.6	3	30.0	15.1	10	37.8	11.6	25	35.6	13.9	41
計	36.0	23.0	5	24.1	11.4	16	27.4	16.8	27	36.5	14.7	58	32.3	15.9	106

標準純音聴力検査
左骨導2000Hz (dB) (難聴者のみ実施)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	25.0	-	1	34.4	14.0	17	38.1	14.4	32	45.0	17.7	49	40.8	16.5	99
女性	45.0	26.5	3	30.8	4.9	6	38.0	11.1	22	42.7	13.6	35	40.2	13.2	66
計	40.0	23.8	4	33.5	12.3	23	38.1	13.0	54	44.0	16.1	84	40.5	15.2	165

標準純音聴力検査
左骨導4000Hz (dB) (難聴者のみ実施)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	36.9	12.2	13	38.8	11.3	45	46.2	12.6	49	51.5	12.6	68	45.7	13.4	175
女性	36.0	18.8	5	33.8	14.6	12	40.4	12.7	23	44.7	12.7	39	41.3	13.7	79
計	36.7	13.7	18	37.7	12.1	57	44.4	12.8	72	49.1	13.0	107	44.3	13.6	254

インピーダンスオージオメトリー
ティンパノグラムの振幅ピーク時の外耳道圧 (右) (daPa)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	-5.5	33.1	73	-3.5	28.6	71	-5.7	24.7	54	-19.2	59.3	61	-8.2	38.8	259
女性	1.9	19.2	56	-2.7	20.9	73	-15.7	53.6	61	-11.9	43.5	51	-6.9	37.1	241
計	-2.3	28.1	129	-3.1	24.9	144	-11.0	42.7	115	-15.8	52.6	112	-7.6	38.0	500

インピーダンスオージオメトリー
静的コンプライアンス (右) (mmhos)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	0.96	0.77	73	0.98	0.94	71	0.85	1.02	54	0.80	0.68	61	0.91	0.86	259
女性	0.55	0.25	56	0.75	0.66	73	0.65	0.53	61	0.54	0.46	51	0.63	0.52	241
計	0.78	0.64	129	0.86	0.82	144	0.75	0.80	115	0.68	0.60	112	0.78	0.73	500

インピーダンスオージオメトリー
ティンパノグラムの振幅ピーク時の外耳道圧（左）（daPa）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	-4.9	35.6	73	-6.7	36.4	67	-14.7	47.2	56	-10.8	42.0	60	-8.9	40.0	256
女性	1.3	13.8	54	-6.8	34.0	75	-9.2	42.3	59	-7.9	37.4	51	-5.8	33.9	239
計	-2.2	28.6	127	-6.7	35.0	142	-11.9	44.7	115	-9.5	39.8	111	-7.4	37.2	495

インピーダンスオージオメトリー
静的コンプライアンス（左）（mmhos）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	0.89	0.74	73	0.75	0.73	67	0.89	0.68	56	0.84	1.07	60	0.84	0.81	256
女性	0.48	0.21	54	0.69	0.70	75	0.66	0.52	59	0.58	0.59	51	0.61	0.55	239
計	0.72	0.61	127	0.72	0.71	142	0.77	0.61	115	0.72	0.89	111	0.73	0.71	495

インピーダンスオージオメトリー
中耳共振周波数（右）（Hz）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	798.6	202.3	70	756.6	224.8	68	854.4	204.4	45	820.0	207.0	55	802.1	211.9	238
女性	862.3	252.7	53	837.7	259.1	62	843.3	240.7	52	875.0	278.3	42	852.8	255.6	209
計	826.0	226.6	123	795.3	244.2	130	848.5	223.5	97	843.8	240.7	97	825.8	234.5	447

インピーダンスオージオメトリー
中耳共振周波数（左）（Hz）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	827.9	227.2	70	778.1	190.6	64	796.3	237.3	41	785.2	217.8	54	798.3	216.8	229
女性	799.0	205.9	50	864.5	230.0	62	893.9	260.7	49	846.3	251.1	41	851.7	237.4	202
計	815.8	218.2	120	820.6	214.5	126	849.4	253.7	90	811.6	233.4	95	823.3	228.0	431

右眼眼压 (mmHg)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	14.64	2.35	88	14.10	2.94	84	13.27	2.62	78	12.52	2.92	79	13.67	2.82	329
女性	13.15	2.61	72	12.99	2.33	88	13.90	2.56	82	12.83	3.01	74	13.23	2.64	316
計	13.97	2.57	160	13.53	2.70	172	13.59	2.60	160	12.67	2.95	153	13.45	2.74	645

左眼眼压 (mmHg)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	14.67	2.49	88	13.95	2.88	84	13.27	2.61	79	13.04	3.36	76	13.77	2.90	327
女性	13.03	2.64	72	12.95	2.60	88	13.87	2.86	82	12.86	3.03	74	13.19	2.80	316
計	13.93	2.68	160	13.44	2.78	172	13.58	2.75	161	12.95	3.20	150	13.48	2.87	643

右眼視神経陥凹 (比率)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	0.41	0.11	87	0.41	0.12	84	0.42	0.14	78	0.42	0.14	76	0.42	0.13	325
女性	0.38	0.12	71	0.41	0.13	86	0.42	0.13	78	0.42	0.14	66	0.41	0.13	301
計	0.40	0.11	158	0.41	0.12	170	0.42	0.13	156	0.42	0.14	142	0.41	0.13	626

左眼視神経陥凹 (比率)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	0.42	0.11	87	0.42	0.14	83	0.41	0.13	77	0.41	0.14	72	0.41	0.13	319
女性	0.39	0.12	72	0.41	0.13	86	0.40	0.13	77	0.43	0.15	68	0.41	0.13	303
計	0.40	0.11	159	0.41	0.13	169	0.41	0.13	154	0.42	0.14	140	0.41	0.13	622

右水晶体前囊皮質混濁量 (cct)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	2419.8	588.5	79	3429.5	873.3	72	4180.9	1022	63	5124.1	1128	59	3677.0	1340	273
女性	2533.6	696.4	58	3522.4	808.2	76	4426.3	1189	68	5407.1	1283	59	3964.2	1438	261
計	2468.0	636.5	137	3477.2	838.9	148	4308.3	1114	131	5265.6	1212	118	3817.4	1395	534

左水晶体前囊皮質混濁量 (cct)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	2329.0	716.9	78	3283.3	907.8	73	4329.8	1201	63	4816.5	971.0	57	3574.4	1350	271
女性	2415.7	663.4	58	3470.5	843.3	76	4607.7	1283	64	5464.0	1134	57	3961.6	1493	255
計	2366.0	693.4	136	3378.8	877.6	149	4469.9	1246	127	5140.3	1100	114	3762.1	1433	526

右水晶体核前部混濁量 (cct)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	2103.3	602.9	75	2890.9	650.6	62	3473.2	867.3	57	4543.2	1433	41	3069.0	1218	235
女性	2346.7	565.4	55	3125.3	844.9	67	3809.0	1504	60	4858.4	1455	47	3473.1	1436	229
計	2206.2	597.4	130	3012.6	763.9	129	3645.4	1242	117	4711.6	1445	88	3268.5	1344	464

左水晶体核前部混濁量 (cct)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	2006.0	596.6	71	2778.6	702.7	57	3523.5	799.8	54	4225.0	1014	34	2938.5	1096	216
女性	2297.2	567.3	54	3036.7	746.8	62	3812.9	1042	49	4357.7	1325	41	3290.4	1191	206
計	2131.8	599.5	125	2913.1	734.4	119	3661.2	929.7	103	4297.5	1188	75	3110.3	1156	422

右中心視野閾値 (dB)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	30.5	2.6	73	30.8	2.3	70	29.9	3.3	54	26.1	6.8	62	29.4	4.5	259
女性	30.6	2.7	56	30.5	2.4	75	28.2	4.2	59	27.3	4.0	49	29.3	3.6	239
計	30.5	2.7	129	30.6	2.3	145	29.0	3.9	113	26.6	5.7	111	29.3	4.1	498

左中心視野閾値 (dB)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	30.7	2.4	73	30.7	2.1	70	30.2	2.9	54	28.0	4.7	61	29.9	3.3	258
女性	30.3	2.7	56	29.8	3.4	75	28.3	4.4	61	27.7	4.9	53	29.1	4.0	245
計	30.6	2.5	129	30.2	2.9	145	29.2	3.9	115	27.8	4.8	114	29.5	3.7	503

右視野平均感度 (dB)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	27.1	1.7	73	26.6	1.8	70	25.8	2.3	54	22.0	5.6	62	25.5	3.7	259
女性	27.3	1.4	56	26.4	1.9	75	24.0	3.1	59	22.1	4.3	50	25.1	3.4	240
計	27.2	1.6	129	26.5	1.9	145	24.9	2.9	113	22.1	5.0	112	25.3	3.6	499

左視野平均感度 (dB)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	27.0	1.6	73	26.7	1.5	70	25.2	2.4	54	23.5	4.4	61	25.7	3.0	258
女性	26.8	1.3	56	26.3	1.7	75	24.3	2.9	61	22.9	3.8	53	25.2	2.9	245
計	26.9	1.5	129	26.5	1.6	145	24.8	2.7	115	23.2	4.1	114	25.5	3.0	503

右眼屈折球面等価値 (Diopter)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	-1.34	1.43	88	-0.91	1.26	84	-0.14	0.86	77	-0.24	1.34	76	-0.69	1.34	325
女性	-0.91	1.36	72	-0.49	1.24	88	-0.05	1.48	82	0.04	1.20	72	-0.35	1.37	314
計	-1.15	1.41	160	-0.70	1.26	172	-0.10	1.21	159	-0.10	1.28	148	-0.52	1.36	639

左眼屈折球面等価値 (Diopter)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	-1.27	1.42	88	-0.88	1.33	84	-0.05	0.86	78	-0.08	1.33	75	-0.60	1.36	325
女性	-0.94	1.35	72	-0.53	1.17	88	0.12	1.10	80	0.18	0.95	72	-0.29	1.24	312
計	-1.12	1.39	160	-0.70	1.26	172	0.04	0.99	158	0.05	1.16	147	-0.45	1.31	637

青黄色覚正答率 (両眼) (%)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	98.1	5.0	87	96.7	5.2	84	92.9	11.6	77	85.5	21.0	77	93.5	13.1	325
女性	98.1	7.4	72	95.5	9.8	88	92.5	10.9	81	79.7	22.5	74	91.6	15.3	315
計	98.1	6.2	159	96.0	7.9	172	92.7	11.2	158	82.6	21.8	151	92.6	14.3	640

赤緑色覚正答率（両眼）（％）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	95.7	16.9	87	95.2	15.9	84	90.3	21.1	77	88.2	24.4	78	92.5	19.9	326
女性	98.3	6.8	71	95.2	13.8	88	95.2	10.1	81	84.4	24.2	73	93.4	15.9	313
計	96.9	13.3	158	95.2	14.8	172	92.8	16.5	158	86.4	24.3	151	92.9	18.0	639

コントラスト感度 1.5(C/D)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	47.6	19.2	88	39.7	14.3	84	37.7	17.5	78	31.4	15.7	77	39.4	17.8	327
女性	41.6	16.6	72	38.6	14.3	88	32.7	14.3	82	27.2	11.5	74	35.1	15.2	316
計	44.9	18.3	160	39.1	14.3	172	35.1	16.1	160	29.3	13.9	151	37.3	16.7	643

コントラスト感度 3(C/D)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	93.7	32.0	88	76.3	29.2	84	76.7	38.6	78	62.7	37.7	77	77.9	36.0	327
女性	84.5	35.7	72	83.8	30.9	88	70.0	34.0	82	53.9	24.8	74	73.4	33.8	316
計	89.6	33.9	160	80.1	30.2	172	73.3	36.4	160	58.4	32.2	151	75.7	35.0	643

コントラスト感度 6(C/D)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	101.6	44.6	88	89.0	44.9	84	74.2	44.4	78	52.0	35.2	77	80.1	46.3	327
女性	96.0	45.2	72	95.9	41.5	88	71.7	48.9	82	41.8	27.7	74	77.0	47.0	316
計	99.1	44.8	160	92.5	43.2	172	72.9	46.6	160	47.0	32.0	151	78.6	46.6	643

コントラスト感度 12(C/D)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	60.5	32.6	88	52.7	32.0	84	39.9	28.2	78	22.5	22.7	77	44.6	32.5	327
女性	53.4	27.1	72	57.5	34.5	88	35.6	28.9	82	16.3	14.4	74	41.2	31.9	316
計	57.3	30.4	160	55.2	33.3	172	37.7	28.5	160	19.4	19.2	151	42.9	32.3	643

コントラスト感度 18(C/D)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	19.0	12.0	88	16.3	10.0	84	12.3	9.6	78	7.3	8.9	77	14.0	11.1	327
女性	18.2	12.0	72	19.3	12.7	88	12.5	11.6	82	5.6	5.6	74	14.1	12.1	316
計	18.6	11.9	160	17.8	11.5	172	12.4	10.6	160	6.5	7.5	151	14.0	11.6	643

右眼遠見常用対数視力

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	-0.01	0.17	88	-0.02	0.18	84	-0.10	0.22	78	-0.20	0.25	79	-0.08	0.22	329
女性	-0.05	0.33	72	-0.08	0.29	88	-0.25	0.41	82	-0.31	0.41	73	-0.17	0.38	315
計	-0.03	0.26	160	-0.05	0.25	172	-0.18	0.34	160	-0.25	0.34	152	-0.12	0.31	644

左眼遠見常用対数視力

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	-0.01	0.18	88	-0.00	0.16	84	-0.08	0.23	79	-0.22	0.31	78	-0.07	0.24	329
女性	-0.10	0.37	72	-0.05	0.21	88	-0.16	0.22	82	-0.24	0.32	74	-0.14	0.29	316
計	-0.05	0.28	160	-0.03	0.19	172	-0.12	0.23	161	-0.23	0.32	152	-0.10	0.27	645

右眼遠見矯正対数視力

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	0.07	0.09	88	0.05	0.11	84	-0.04	0.19	78	-0.13	0.23	79	-0.01	0.18	329
女性	0.05	0.26	72	0.05	0.12	88	-0.08	0.29	82	-0.20	0.37	72	-0.04	0.29	314
計	0.06	0.19	160	0.05	0.11	172	-0.06	0.25	160	-0.16	0.30	151	-0.03	0.24	643

左眼遠見矯正対数視力

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	0.08	0.10	88	0.05	0.10	84	-0.02	0.21	79	-0.14	0.30	78	-0.01	0.21	329
女性	0.03	0.22	72	0.03	0.12	88	-0.05	0.15	82	-0.14	0.24	73	-0.03	0.20	315
計	0.06	0.17	160	0.04	0.11	172	-0.03	0.18	161	-0.14	0.27	151	-0.02	0.20	644

右眼近見常用对数視力

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	-0.10	0.16	87	-0.29	0.26	84	-0.31	0.24	78	-0.37	0.23	78	-0.26	0.25	327
女性	-0.17	0.22	71	-0.24	0.20	87	-0.36	0.31	81	-0.44	0.33	72	-0.30	0.28	311
計	-0.13	0.19	158	-0.27	0.23	171	-0.33	0.28	159	-0.41	0.28	150	-0.28	0.27	638

左眼近見常用对数視力

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	-0.09	0.16	87	-0.25	0.26	84	-0.30	0.29	79	-0.32	0.27	77	-0.24	0.26	327
女性	-0.18	0.30	72	-0.23	0.21	87	-0.32	0.23	82	-0.36	0.27	74	-0.27	0.26	315
計	-0.13	0.24	159	-0.24	0.24	171	-0.31	0.26	161	-0.34	0.27	151	-0.26	0.26	642

右眼近見矯正对数視力

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	-0.04	0.05	51	-0.09	0.10	51	-0.11	0.12	24	-0.19	0.18	37	-0.10	0.13	163
女性	-0.06	0.08	31	-0.09	0.09	41	-0.11	0.16	31	-0.16	0.20	27	-0.10	0.14	130
計	-0.05	0.07	82	-0.09	0.09	92	-0.11	0.14	55	-0.18	0.19	64	-0.10	0.13	293

左眼近見常用对数視力

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	-0.04	0.06	51	-0.09	0.11	51	-0.07	0.07	25	-0.17	0.16	37	-0.09	0.12	164
女性	-0.06	0.11	31	-0.07	0.09	41	-0.11	0.12	31	-0.18	0.21	27	-0.10	0.14	130
計	-0.05	0.08	82	-0.08	0.10	92	-0.09	0.10	56	-0.17	0.18	64	-0.09	0.13	294

静止視力对数（两眼）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	-0.03	0.12	88	-0.06	0.11	84	-0.13	0.13	78	-0.21	0.20	78	-0.11	0.16	328
女性	-0.06	0.10	71	-0.08	0.12	88	-0.15	0.15	81	-0.24	0.18	73	-0.13	0.16	313
計	-0.05	0.11	159	-0.07	0.12	172	-0.14	0.14	159	-0.23	0.19	151	-0.12	0.16	641

動体視力対数（両眼）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	-0.29	0.19	88	-0.38	0.24	84	-0.44	0.22	79	-0.60	0.24	79	-0.42	0.25	330
女性	-0.29	0.17	72	-0.34	0.21	88	-0.50	0.26	82	-0.71	0.24	73	-0.46	0.27	315
計	-0.29	0.18	160	-0.36	0.23	172	-0.47	0.24	161	-0.65	0.24	152	-0.44	0.26	645

遠見常用視力
右眼

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
		0.3未満	男性	1	1.1	1	1.2	3	3.8	2	2.5
	女性	2	2.8	4	4.5	8	9.8	14	18.9	28	8.9
	計	3	1.9	5	2.9	11	6.8	16	10.5	35	5.4
0.3-0.6	男性	11	12.5	14	16.7	20	25.3	32	40.5	77	23.3
	女性	13	18.1	18	20.5	31	37.8	20	27.0	82	25.9
	計	24	15.0	32	18.6	51	31.7	52	34.0	159	24.6
0.7以上	男性	76	86.4	69	82.1	56	70.9	45	57.0	246	74.5
	女性	57	79.2	66	75.0	43	52.4	40	54.1	206	65.2
	計	133	83.1	135	78.5	99	61.5	85	55.6	452	70.0

遠見常用視力
左眼

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
		記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	1	1.3
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	1	0.7	1	0.2
0.3未満	男性	1	1.1	1	1.2	1	1.3	5	6.3	8	2.4
	女性	6	8.3	3	3.4	1	1.2	7	9.5	17	5.4
	計	7	4.4	4	2.3	2	1.2	12	7.8	25	3.9
0.3-0.6	男性	11	12.5	7	8.3	19	24.1	33	41.8	70	21.2
	女性	8	11.1	15	17.0	31	37.8	22	29.7	76	24.1
	計	19	11.9	22	12.8	50	31.1	55	35.9	146	22.6
0.7以上	男性	76	86.4	76	90.5	59	74.7	40	50.6	251	76.1
	女性	58	80.6	70	79.5	50	61.0	45	60.8	223	70.6
	計	134	83.8	146	84.9	109	67.7	85	55.6	474	73.4

遠見矯正視力
右眼

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.3
	計	-	-	-	-	-	-	1	0.7	1	0.2
0.3未満	男性	-	-	-	-	2	2.5	1	1.3	3	0.9
	女性	1	1.4	-	-	2	2.4	7	9.5	10	3.2
	計	1	0.6	-	-	4	2.5	8	5.2	13	2.0
0.3-0.6	男性	1	1.1	2	2.4	12	15.2	20	25.3	35	10.6
	女性	-	-	5	5.7	15	18.3	18	24.3	38	12.0
	計	1	0.6	7	4.1	27	16.8	38	24.8	73	11.3
0.7以上	男性	87	98.9	82	97.6	65	82.3	58	73.4	292	88.5
	女性	71	98.6	83	94.3	65	79.3	48	64.9	267	84.5
	計	158	98.8	165	95.9	130	80.7	106	69.3	559	86.5

遠見矯正視力
左眼

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	1	1.3	1	0.3
	女性	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.3
	計	-	-	-	-	-	-	2	1.3	2	0.3
0.3未満	男性	-	-	-	-	1	1.3	2	2.5	3	0.9
	女性	2	2.8	-	-	-	-	2	2.7	4	1.3
	計	2	1.3	-	-	1	0.6	4	2.6	7	1.1
0.3-0.6	男性	-	-	1	1.2	8	10.1	21	26.6	30	9.1
	女性	1	1.4	7	8.0	14	17.1	19	25.7	41	13.0
	計	1	0.6	8	4.7	22	13.7	40	26.1	71	11.0
0.7以上	男性	88	100.0	83	98.8	70	88.6	55	69.6	296	89.7
	女性	69	95.8	81	92.0	68	82.9	52	70.3	270	85.4
	計	157	98.1	164	95.3	138	85.7	107	69.9	566	87.6

近見常用視力
右眼

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	1.1	-	-	-	-	-	-	1	0.3
	女性	-	-	1	1.1	-	-	-	-	1	0.3
	計	1	0.6	1	0.6	-	-	-	-	2	0.3
0.3未満	男性	2	2.3	10	11.9	12	15.2	15	19.0	39	11.8
	女性	5	6.9	4	4.5	12	14.6	19	25.7	40	12.7
	計	7	4.4	14	8.1	24	14.9	34	22.2	79	12.2
0.3-0.6	男性	13	14.8	37	44.0	35	44.3	45	57.0	130	39.4
	女性	22	30.6	42	47.7	48	58.5	39	52.7	151	47.8
	計	35	21.9	79	45.9	83	51.6	84	54.9	281	43.5
0.7以上	男性	72	81.8	37	44.0	32	40.5	19	24.1	160	48.5
	女性	45	62.5	41	46.6	22	26.8	16	21.6	124	39.2
	計	117	73.1	78	45.3	54	33.5	35	22.9	284	44.0

近見常用視力
左眼

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	1.1	-	-	-	-	1	1.3	2	0.6
	女性	-	-	1	1.1	-	-	-	-	1	0.3
	計	1	0.6	1	0.6	-	-	1	0.7	3	0.5
0.3未満	男性	3	3.4	11	13.1	11	13.9	14	17.7	39	11.8
	女性	7	9.7	6	6.8	11	13.4	12	16.2	36	11.4
	計	10	6.3	17	9.9	22	13.7	26	17.0	75	11.6
0.3-0.6	男性	13	14.8	29	34.5	33	41.8	36	45.6	111	33.6
	女性	15	20.8	38	43.2	44	53.7	42	56.8	139	44.0
	計	28	17.5	67	39.0	77	47.8	78	51.0	250	38.7
0.7以上	男性	71	80.7	44	52.4	35	44.3	28	35.4	178	53.9
	女性	50	69.4	43	48.9	27	32.9	20	27.0	140	44.3
	計	121	75.6	87	50.6	62	38.5	48	31.4	318	49.2

静止視力（両眼）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	1	1.3	1	1.3	2	0.6
	女性	1	1.4	-	-	1	1.2	1	1.4	3	0.9
	計	1	0.6	-	-	2	1.2	2	1.3	5	0.8
0.3未満	男性	-	-	-	-	-	-	2	2.5	2	0.6
	女性	-	-	-	-	1	1.2	4	5.4	5	1.6
	計	-	-	-	-	1	0.6	6	3.9	7	1.1
0.3-0.6	男性	9	10.2	11	13.1	26	32.9	37	46.8	83	25.2
	女性	6	8.3	12	13.6	23	28.0	40	54.1	81	25.6
	計	15	9.4	23	13.4	49	30.4	77	50.3	164	25.4
0.7以上	男性	79	89.8	73	86.9	52	65.8	39	49.4	243	73.6
	女性	65	90.3	76	86.4	57	69.5	29	39.2	227	71.8
	計	144	90.0	149	86.6	109	67.7	68	44.4	470	72.8

動体視力（両眼）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.3
	計	-	-	-	-	-	-	1	0.7	1	0.2
0.3未満	男性	9	10.2	22	26.2	18	22.8	45	57.0	94	28.5
	女性	6	8.3	16	18.2	29	35.4	52	70.3	103	32.6
	計	15	9.4	38	22.1	47	29.2	97	63.4	197	30.5
0.3-0.6	男性	53	60.2	51	60.7	55	69.6	33	41.8	192	58.2
	女性	48	66.7	54	61.4	48	58.5	20	27.0	170	53.8
	計	101	63.1	105	61.0	103	64.0	53	34.6	362	56.0
0.7以上	男性	26	29.5	11	13.1	6	7.6	1	1.3	44	13.3
	女性	18	25.0	18	20.5	5	6.1	1	1.4	42	13.3
	計	44	27.5	29	16.9	11	6.8	2	1.3	86	13.3

立体視検査
テトマスステレオテスト

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	1.1	1	1.2	1	1.3	2	2.5	5	1.5
	女性	1	1.4	1	1.1	2	2.4	2	2.7	6	1.9
	計	2	1.3	2	1.2	3	1.9	4	2.6	11	1.7
不良 (200秒以下)	男性	3	3.4	3	3.6	12	15.2	20	25.3	38	11.5
	女性	6	8.3	5	5.7	13	15.9	17	23.0	41	13.0
	計	9	5.6	8	4.7	25	15.5	37	24.2	79	12.2
普通 (80 - 140秒)	男性	4	4.5	9	10.7	21	26.6	21	26.6	55	16.7
	女性	3	4.2	10	11.4	16	19.5	24	32.4	53	16.8
	計	7	4.4	19	11.0	37	23.0	45	29.4	108	16.7
良好 (60秒以上)	男性	80	90.9	71	84.5	45	57.0	36	45.6	232	70.3
	女性	62	86.1	72	81.8	51	62.2	31	41.9	216	68.4
	計	142	88.8	143	83.1	96	59.6	67	43.8	448	69.3

立体視検査
TNOステレオテスト

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	4	4.5	3	3.6	7	8.9	15	19.0	29	8.8
	女性	10	13.9	7	8.0	7	8.5	4	5.4	28	8.9
	計	14	8.8	10	5.8	14	8.7	19	12.4	57	8.8
良好 (120秒以上)	男性	76	86.4	65	77.4	40	50.6	26	32.9	207	62.7
	女性	50	69.4	70	79.5	48	58.5	32	43.2	200	63.3
	計	126	78.8	135	78.5	88	54.7	58	37.9	407	63.0
あり (240秒以下)	男性	4	4.5	12	14.3	19	24.1	24	30.4	59	17.9
	女性	8	11.1	7	8.0	20	24.4	23	31.1	58	18.4
	計	12	7.5	19	11.0	39	24.2	47	30.7	117	18.1
立体視なし	男性	4	4.5	4	4.8	13	16.5	14	17.7	35	10.6
	女性	4	5.6	4	4.5	7	8.5	15	20.3	30	9.5
	計	8	5.0	8	4.7	20	12.4	29	19.0	65	10.1

右眼眼底所見
糖尿病網膜症

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	1	1.3	1	1.3	2	0.6
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	1	0.6	1	0.7	2	0.3
なし	男性	87	98.9	83	98.8	74	93.7	76	96.2	320	97.0
	女性	72	100.0	86	97.7	76	92.7	68	91.9	302	95.6
	計	159	99.4	169	98.3	150	93.2	144	94.1	622	96.3
単純網膜症	男性	-	-	-	-	-	-	1	1.3	1	0.3
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	1	0.7	1	0.2
前増殖性網膜症	男性	-	-	-	-	1	1.3	-	-	1	0.3
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	1	0.6	-	-	1	0.2
透見不能	男性	1	1.1	1	1.2	3	3.8	1	1.3	6	1.8
	女性	-	-	2	2.3	6	7.3	6	8.1	14	4.4
	計	1	0.6	3	1.7	9	5.6	7	4.6	20	3.1

右眼眼底所見
Keith-Wagener

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	1	1.3	1	1.3	2	0.6
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	1	0.6	1	0.7	2	0.3
K-W 0	男性	68	77.3	43	51.2	28	35.4	18	22.8	157	47.6
	女性	51	70.8	44	50.0	28	34.1	10	13.5	133	42.1
	計	119	74.4	87	50.6	56	34.8	28	18.3	290	44.9
K-W I	男性	17	19.3	33	39.3	38	48.1	44	55.7	132	40.0
	女性	20	27.8	41	46.6	42	51.2	42	56.8	145	45.9
	計	37	23.1	74	43.0	80	49.7	86	56.2	277	42.9
K-W IIa	男性	1	1.1	6	7.1	9	11.4	12	15.2	28	8.5
	女性	-	-	2	2.3	3	3.7	12	16.2	17	5.4
	計	1	0.6	8	4.7	12	7.5	24	15.7	45	7.0
K-W IIb	男性	1	1.1	-	-	-	-	2	2.5	3	0.9
	女性	-	-	-	-	3	3.7	2	2.7	5	1.6
	計	1	0.6	-	-	3	1.9	4	2.6	8	1.2
K-W III	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.3
	計	-	-	-	-	-	-	1	0.7	1	0.2
透見不能	男性	1	1.1	2	2.4	3	3.8	2	2.5	8	2.4
	女性	1	1.4	1	1.1	6	7.3	7	9.5	15	4.7
	計	2	1.3	3	1.7	9	5.6	9	5.9	23	3.6

右眼眼底所見
黄斑変性

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	1	1.3	1	1.3	2	0.6
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	1	0.6	1	0.7	2	0.3
なし	男性	84	95.5	80	95.2	66	83.5	68	86.1	298	90.3
	女性	70	97.2	83	94.3	70	85.4	59	79.7	282	89.2
	計	154	96.3	163	94.8	136	84.5	127	83.0	580	89.8
ドルーゼン	男性	2	2.3	2	2.4	7	8.9	3	3.8	14	4.2
	女性	1	1.4	2	2.3	2	2.4	3	4.1	8	2.5
	計	3	1.9	4	2.3	9	5.6	6	3.9	22	3.4
萎縮	男性	-	-	-	-	-	-	1	1.3	1	0.3
	女性	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.3
	計	-	-	-	-	-	-	2	1.3	2	0.3
滲出、出血	男性	-	-	-	-	1	1.3	-	-	1	0.3
	女性	-	-	-	-	1	1.2	1	1.4	2	0.6
	計	-	-	-	-	2	1.2	1	0.7	3	0.5
黄斑上膜	男性	-	-	-	-	-	-	2	2.5	2	0.6
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	2	1.3	2	0.3
その他	男性	-	-	-	-	1	1.3	1	1.3	2	0.6
	女性	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.3
	計	-	-	-	-	1	0.6	2	1.3	3	0.5
透見不能	男性	2	2.3	2	2.4	3	3.8	3	3.8	10	3.0
	女性	1	1.4	3	3.4	9	11.0	9	12.2	22	7.0
	計	3	1.9	5	2.9	12	7.5	12	7.8	32	5.0

左眼眼底所見
糖尿病網膜症

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	2	2.5	2	0.6
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	2	1.3	2	0.3
なし	男性	87	98.9	82	97.6	75	94.9	71	89.9	315	95.5
	女性	72	100.0	87	98.9	76	92.7	68	91.9	303	95.9
	計	159	99.4	169	98.3	151	93.8	139	90.8	618	95.7
単純網膜症	男性	-	-	-	-	-	-	1	1.3	1	0.3
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	1	0.7	1	0.2
前増殖性網膜症	男性	-	-	-	-	1	1.3	-	-	1	0.3
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	1	0.6	-	-	1	0.2
透見不能	男性	1	1.1	2	2.4	3	3.8	5	6.3	11	3.3
	女性	-	-	1	1.1	6	7.3	6	8.1	13	4.1
	計	1	0.6	3	1.7	9	5.6	11	7.2	24	3.7

左眼眼底所見
Keith-Wagener

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	2	2.5	2	0.6
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	2	1.3	2	0.3
K-W 0	男性	63	71.6	45	53.6	29	36.7	15	19.0	152	46.1
	女性	50	69.4	46	52.3	28	34.1	10	13.5	134	42.4
	計	113	70.6	91	52.9	57	35.4	25	16.3	286	44.3
K-W I	男性	22	25.0	33	39.3	35	44.3	47	59.5	137	41.5
	女性	22	30.6	38	43.2	43	52.4	44	59.5	147	46.5
	計	44	27.5	71	41.3	78	48.4	91	59.5	284	44.0
K-W IIa	男性	1	1.1	5	6.0	12	15.2	9	11.4	27	8.2
	女性	-	-	3	3.4	5	6.1	9	12.2	17	5.4
	計	1	0.6	8	4.7	17	10.6	18	11.8	44	6.8
K-W IIb	男性	1	1.1	-	-	-	-	-	-	1	0.3
	女性	-	-	-	-	-	-	2	2.7	2	0.6
	計	1	0.6	-	-	-	-	2	1.3	3	0.5
K-W III	男性	-	-	-	-	-	-	1	1.3	1	0.3
	女性	-	-	-	-	-	-	2	2.7	2	0.6
	計	-	-	-	-	-	-	3	2.0	3	0.5
透見不能	男性	1	1.1	1	1.2	3	3.8	5	6.3	10	3.0
	女性	-	-	1	1.1	6	7.3	7	9.5	14	4.4
	計	1	0.6	2	1.2	9	5.6	12	7.8	24	3.7

左眼眼底所見
黄斑変性

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	2	2.5	2	0.6
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	2	1.3	2	0.3
なし	男性	83	94.3	79	94.0	71	89.9	61	77.2	294	89.1
	女性	70	97.2	85	96.6	72	87.8	62	83.8	289	91.5
	計	153	95.6	164	95.3	143	88.8	123	80.4	583	90.2
ドルーゼン	男性	3	3.4	2	2.4	4	5.1	4	5.1	13	3.9
	女性	1	1.4	1	1.1	1	1.2	2	2.7	5	1.6
	計	4	2.5	3	1.7	5	3.1	6	3.9	18	2.8
萎縮	男性	-	-	-	-	-	-	1	1.3	1	0.3
	女性	1	1.4	-	-	-	-	-	-	1	0.3
	計	1	0.6	-	-	-	-	1	0.7	2	0.3
滲出、出血	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.3
	計	-	-	-	-	-	-	1	0.7	1	0.2
黄斑上膜	男性	-	-	-	-	-	-	1	1.3	1	0.3
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	1	0.7	1	0.2
その他	男性	-	-	-	-	-	-	1	1.3	1	0.3
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	1	0.7	1	0.2
透見不能	男性	2	2.3	3	3.6	4	5.1	9	11.4	18	5.5
	女性	-	-	2	2.3	9	11.0	9	12.2	20	6.3
	計	2	1.3	5	2.9	13	8.1	18	11.8	38	5.9