

P9 緊張病性の行動

いいえ	1
はい	5

拒絶症 対象者が常に、言われたことの反対の行動をすること。

両面価値 2つの選択肢の間で揺れ動くこと。

強制把握 対象者が面接者の手を何度も握ったり、握ったら離すことができなかつたりすること。

反響言語・反響動作 面接者の動きや発言をまねすること。

ろう屈症 対象者の手足に抵抗かなく、外からの力で動かすことができる。

硬直 との方向の動きに対しても、反対方向に同じ力で抵抗する。

けいれん的動作 自発的な動きが円滑でないこと。

凍結 ある姿勢を長時間保持し続けること。

命令自動・受け身の動きに対して過度に協調すること。

P10 対象者は面接中にアルコールを飲んでいたか。

いいえ	1
はい	5

P11 対象者は面接中にアルコールに酔っている、または薬物を使って恍惚としているように見えたか。つまり、対象者のしゃへり方が不明瞭であったり、歩行時によろめいたり、つまずいたり、息がアルコール臭かつたりしたか。

いいえ	1
はい	5

セクションX

面接者による評価 質問X1-X9を質問せずに記入する。

X1 対象者はすべての答えるべき質問に回答したか。

1つ以上の質間に回答しなかった	1
すべての答えるべき質間に回答した（質問X4へ）	5

X2 対象者はいずれかの質間に答えるのを拒否したか。

いいえ（質問X3へ）	1
はい	5

A 対象者はいくつの質問を拒否したか。

拒否された質問数 ___/___/___

B 対象者はどの質問を拒否したか。

質問 _____ 質問 _____
質問 _____ 質問 _____

質問 _____ から 質問 _____ まで。

X3 対象者はすべての質問を理解したか。

いいえ

1

はい (質問X4へ)

5

A 対象者はどの質問を理解しなかったか。

質問 _____ 質問 _____
質問 _____ 質問 _____

質問 _____ から 質問 _____ まで。

X4 対象者は少数民族の一員か。

いいえ (質問X6へ)	1
はい	5

A 対象者の民族グループは、社会的により高い地位にあるか低い地位にあるか。

高い地位	1
少数民族と違わない	3
低い地位	5

X5 面接は途中で中止したか。

いいえ (質問X6へ)	1
はい	5

A 中止の理由は何か（あてはまるものをすべて記入）。

面接者の急な事情	1
対象者の急な事情	2
対象者が疲れた、飽きた	3
対象者が質問に腹を立てた	4
対象者が質問に動転した	5
その他	6

記入_____

B 対象者が回答した最後の質問はどれか。

質問 _____

X6 面接は〔2回以上に〕分けて行なわれたか。

いいえ (質問X8へ)	1
はい	5

A 面接開始から何分後に面接は中断したか。

____/____時間 ____/____分

B との質問の後か。

質問____/____/____

X7 これは本人以外の代理者への面接か。

いいえ (質問X8へ)
はい

1
5

A. 代理者の対象者との関係は。

B 代理者への面接理由は。

昏睡・昏睡状態	0 1
手術後の回復期	0 2
その他の理由で入院中	0 3
脳卒中	0 4
盲目	0 5
難聴	0 6
ミニメンタル（知的能力）テストに不合格	0 7
死亡	0 8
調査期間中不在で、電話面接もできなかった	0 9
その他 記入_____	1 0

X8 対象者および面接についての面接者の記述

カード B 1

- B 2 より多くの、またはより強いタバコを必要とした。
- B 3 チェーンスモーカーになった。
- B 4 そのつもりよりもずっと多くタバコを吸ってしまった。
- B 5 タバコをやめたいとか本数を減らしたいと思った。
- B 6 タバコをやめようとか、本数を減らそうとしてもできなかった。
- B 7 タバコをやめたり本数を減らしたあとに問題。
- B 1 1 問題を消すためにまたタバコを吸いはじめた。
- B 1 2 重い病気の時によくないとわかっているのにタバコを吸った。
- B 1 3 A タバコのために健康に問題が起きてても吸った。
- B 1 4 A タバコのために神経に問題が起きてても吸った。
- B 1 5 タバコに依存していると感した。
- B 1 6 A タバコを吸うために活動をやめた。

カードD 1

グループ1

- 生き物：
- ・ 昆虫
- ・ ヘビ
- ・ 鳥
- ・ その他の動物

グループ2

- ・ 高い所
- ・ 嵐
- ・ 雷やいなびかり
- ・ プールや湖など水に入ること

グループ3

- ・ 飛行機に乗ること
- 周囲を囲まれた場所：洞窟、トンネル、エレベーター

グループ4

- ・ 血をみること
- ・ 注射をされること
- ・ 歯医者にゆくこと
- ・ 病院にゆくこと

- 1 心臓がドキドキしたり、脈が早くなったり
2. 汗が出る
3. 体がふるえたり揺れたりする
4. 口が乾く
5. 息が切れた
6. のどがつまる感じ
7. 胸が痛かったり、苦しくなった
8. 吐き気がしたり、胃が苦しくなった
9. めまいがしたり、気を失いそうになった
10. 自分自身や周囲のものに現実感がない感じがした
11. 自制心を無くしたり、気が狂ったようになったり、意識がなくなってしまうのではと心配した
12. 死ぬのではないかと心配した
13. 体がほてったり寒気がした
14. しびれたり、ピリピリした

カード D 2

- 1 誰かにみられるかもしれない場所で、食事をしたり、飲物を飲んだりすること
- 2 話す話題がないのではないかとか、あなたの言うことが馬鹿げて聞こえるのではと思って、人に話かけること
- 3 誰かが見ている前で字を書くこと
- 4 会議や授業に参加したり、発言したりすること
- 5 パーティやその他の社交的な集まりに出かけること
- 6 人前で話したり、発言したりすること
- 7 あなたが注目のまとになるようなこれ以外の状況

1. 心臓がドキドキしたり、脈が早くなる
- 2 汗が出る
- 3 体がふるえたり揺れたりする
- 4 口が乾く
- 5 息が切れる
- 6 のどがつまる感じがする
- 7 胸が痛かったり、苦しくなった
8. めまいがしたり、気を失いそうになる
- 9 自分自身や周囲のものに現実感がないような感じがする
- 10 取り乱したり、気が狂ったようになったり、意識がなくなってしまうのではと心配する
- 11 死ぬのではないかと心配する
- 12 体がほてったり寒気がしたりする
13. 指や足がしびれたり、ピリピリしたりする

カードD 3

- 1 一人で外出すること
- 2 バス、電車、車に乗ること
3. 人混みの中にいたり、行列に並ぶこと
- 4 お店のような、公共の場所にいること

- 1 心臓がドキドキしたり、脈が早くなつた
- 2 汗が出る
3. 体がふるえたり揺れたりする
- 4 口が乾く
- 5 息が切れた
6. のどがつまる感じがした
7. 胸が痛かったり、苦しくなつた
- 8 吐き気がしたり、胃が苦しくなつた
- 9 めまいがしたり、気を失いそうになつた
10. 自分自身や周囲のものに現実感がない感じがした
11. 自制心を無くしたり、気が狂つたようになつたり、意識がなくなってしまうのではと心配した
12. 死ぬのではないかと心配した
- 13 体がほてったり寒気がした
14. 指や足がしびれたり、ピリピリした

カード D 4

- 1 心臓がドキドキしたり、脈が早くなつた
- 2 汗が出る
3. 体がふるえたり揺れたりする
4. 口が乾く
- 5 息が切れた
- 6 のどがつまる感じがした
- 7 胸が痛かったり、苦しくなつた
- 8 吐き気がしたり、胃が苦しくなつた
- 9 めまいがしたり、気を失いそうになつた
10. 自分自身や周囲のものに現実感がない感じがした
- 11 自制心を無くしたり、気が狂つたようになつたり、意識がなくなってしまうのではと心配した
12. 死ぬのではないかと心配した
- 13 体がほてつたり寒気がした
- 14 指や足がしびれたり、ピリピリした

カードD 5

1. 落ち着かない
2. 気持ちが高ぶったり、怒りっぽい
3. 疲れやすい
4. 自分のしていることに気持ちを集中することが難しい
5. いつもよりイライラする
6. 筋肉のこわばり、ヒリヒリまたはズキズキした痛み
7. 寝つきが悪い、ぐっすり眠れない
8. 心臓がドキドキしたり、脈が速くなる
9. 汗をかく
10. 体がふるえたり揺れたりする
11. 口が乾く
12. 息が切れる
13. のどがしめつけられる
14. のどがつまる感じ
15. 胸が痛かったり、苦しくなった
16. 吐き気がしたり、胃が苦しくなった
17. めまいがしたり、ふらついたりする
18. 自分自身や周囲のものに現実感がないような感じ
19. 自制心を無くしたり、気が狂ったようになったり、意識がなくなってしまうのではと心配
20. 死ぬのではないかと心配
21. 体がほてったり寒気がする
22. 指や足がしびれたり、ピリピリする
23. のどに固まりでもあるような感じ
24. ちょっとしたことでびっくりする

カード J 1

アルコールの換算表

ウイスキー、ブランデーなど

小さなグラス (30ml) または

水割りシングル 1 杯 = 1 杯

ホトル (750ml) 1 本 = 30 杯

ワイン

グラスに 1 杯 = 1 杯

ホトル (750ml) 1 本 = 6 杯

ワインクーラー 1 杯 = 1 杯

シェリー酒グラス 1 杯 = 2 杯

ビール

缶ヒール (350ml) 1 本 = 1 杯

ヒンビール大 1 本 = 2 杯

大ジョッキ 1 杯 = 2 杯

日本酒

1 合 = 2 杯

2 合 = 4 杯

コップ酒 1 杯 = 2 杯

焼酎

お湯割り (お湯7 焼酎3) 1 杯 = 1 杯

ウーロン割り 1 杯 = 1 杯

チューハイ 中ジョッキ 1 杯 = 2 杯

シャンパン

グラス 1 杯 = 1 杯

カクテル

グラス 1 杯 = 2 杯

梅酒

コップ小 (100ml) 1 杯 = 1 杯

1 杯 = 純アルコール約 9 グラム

カード J 2

ふるえ（手のふるえ）

眠れない

とても神経質になる

とても落ち着かない感じがする

汗をかく

吐き気がする、吐いてしまう

頭痛

力がはいらない

他の人にはわからないようなものを見たり、聞いたり、感じたりする

けいれん発作

カード J 3

肝臓病や肝炎

胃の病気や吐血

手足のピリピリした感じやしびれ

飲んでいない時でも、物覚えがわるい

すい臓炎

その他の病気

カード J 4

いつもしている活動に关心がなくなる

ゆううつになる

疑い深くなったり、他の人を信じられなくなる

奇妙な考えを持つようになる

カードK1

- 1 戦争で直接戦闘をした経験
- 2 命にかかわるような事故
- 3 火事、洪水、その他の自然災害
- 4 誰かがひどく傷つけられたり、殺されたりしたことを目撃
- 5 性的な暴行（レイプ）。つまりあなたが望まないのに、誰かが、脅しやある程度力づくであなたと性的関係を持つこと
- 6 性的ないたずら。つまり、あなたが望まないのに、誰かがあなたの性器にふれたり、さわること
- 7 身体的にひどく襲われたり、暴行されたこと
- 8 武器で脅されたり、捕虜になったり、誘拐されたこと
- 9 捷問をうけたり、テロにあったこと
- 10 非常にストレスになったり、気持ちが乱されるようなその他の出来事
- 11 誰か親しい人に上記のような出来事のどれかがおきて、強いショックを受けたこと

カード L 1

A : 医薬品

睡眠薬	ハイミナール	パビナール
覚醒剤	鎮静剤	アンフェタミン
精神安定剤	バルビツール剤	塩酸ペチジン (オビスタン、ペチロルファン)
セルシン、ホリゾン (ジアゼパム)	セコバルビタール	モルヒネ
コントール、バランス (クロルジアゼポキシド)	コデイン	メサドン
ダルボン	ジラウジッド	

B : 薬物

ピンロウジ	ガソリン	クラック
マリファナ（大麻）	トルエン	ヘロイン
コカの葉	ペヨーテ	D M T
ハシシュ	メスカリン	
カート	L S D	P C P
ガンジャ	サイロシビン	接着剤（ボンド）
バング	アヘン	シンナー
吸入剤	コカイン	

カード L 2

あなたに処方されたものではなくて、6回以上使用したことのある薬。

大麻・マリファナ、ハシシュ、バング、ガンジャ

覚醒剤 アンフェタミン、カート、ビンロウジ、ヒロポン

鎮静剤・精神安定剤、睡眠薬、バルビツール剤、セコバルビタール、セルシン、
ホリゾン(ジアゼパム)、コントール、バランス(クロルシアゼポキシド)、
ハイミナール

アヘン類・ヘロイン、コテイン、塩酸ペチジン(オビスタン、ペチロルファン)、
モルヒネ、パビナール、メサドン、ダルボン、アヘン、ジラウジッド
コカイン、クラック、コカの葉

P C P P C P (フェンシクリジン)

幻覚剤 LSD、メスカリン、ペヨーテ、サイロシビン、DMT

吸入剤：接着剤(ボンド)、トルエン、ガソリン、シンナー

その他 記入

使用方法

6 静注、静脈注射

5 皮下注射、筋肉注射

4 煙を吸う、霧状にして吸う

3 鼻から吸う、嗅ぐ

2 口から(錠剤で、飲む、噛む)

1 その他

カード L 3

疲れた、またはへとへとになった感じ

汗をかく

下痢

不安感

ゆううつ

イライラ

落ちつかない

眠れない

ふるえる（手のふるえ）

胃が痛む

頭痛がする

力が入らない

吐き気、または嘔吐する

けいれんまたは発作をおこす

筋肉の痛み、またはけいれん

涙が出る、鼻水が出る

あくびが出る

（薬が）強く欲しくなる

本当はそこにはないものを見たり聞いたりする

心臓が速く打つ

食欲に変化がある

熱が出る

カードM1

目をとじて下さい

カード M 2

