

表34 医療機関別集計(1)

	A (N=504)	B (N=98)	C (N=504)	D (N=367)	全体 (N=1473)	$\chi^2$
年齢階級						
19歳以下	8 1.6%	3 3.1%	11 2.2%	4 1.1%	26 1.8%	34.02 **
20~24歳	65 12.9%	9 9.2%	70 13.9%	53 14.4%	197 13.4%	
25~29歳	211 41.9%	29 29.6%	194 38.5%	184 50.1%	618 42.0%	
30~34歳	171 33.9%	39 39.8%	167 33.1%	104 28.3%	481 32.7%	
35~42歳	49 9.7%	18 18.4%	62 12.3%	22 6.0%	151 10.3%	
最終学歴						
中学校	13 2.6%	5 5.1%	16 3.2%	10 2.7%	44 3.0%	25.11 *
高等学校	254 50.4%	37 37.8%	221 43.9%	156 42.5%	668 45.4%	
専門学校	69 13.7%	17 17.3%	90 17.9%	66 18.0%	242 16.4%	
短期大学	130 25.8%	22 22.4%	120 23.9%	81 22.1%	353 24.0%	
大学・大学院	38 7.5%	17 17.3%	56 11.1%	54 14.7%	165 11.2%	

(\*  $p < 0.05$  \*\*  $p < 0.01$ )

表35 医療機関別集計(2)

	A (N=504)	B (N=98)	C (N=504)	D (N=367)	全体 (N=1473)	$\chi^2$
妊娠前の喫煙状況						
喫煙していなかった	369 73.7%	79 81.4%	351 69.9%	230 62.7%	1029 70.1%	21.23 **
以前喫煙していたがやめた	39 7.8%	8 8.2%	40 8.0%	34 9.3%	121 8.2%	
喫煙していた	93 18.6%	10 10.3%	111 22.1%	103 28.1%	317 21.6%	
妊娠中の喫煙状況						
喫煙していない	464 93.5%	94 97.9%	449 89.4%	331 90.2%	1338 91.6%	11.39 *
喫煙している	32 6.5%	2 2.1%	53 10.6%	36 9.8%	123 8.4%	
喫煙が胎児に及ぼす影響に関する認知						
知らない	36 7.2%	6 6.2%	48 9.6%	24 6.5%	114 7.8%	3.63
知っている	464 92.8%	91 93.8%	453 90.4%	343 93.5%	1351 92.2%	
受動喫煙の状況						
受動喫煙していない	189 37.7%	33 34.4%	183 36.5%	127 34.7%	532 36.3%	1.01
受動喫煙している	312 62.3%	63 65.6%	318 63.5%	239 65.3%	932 63.7%	
周囲の人からの喫煙に関するアドバイスの有無						
ない	351 70.8%	72 75.8%	362 73.0%	264 72.5%	1049 72.3%	1.29
ある	145 29.2%	23 24.2%	134 27.0%	100 27.5%	402 27.7%	
妊娠中に喫煙している者の今後の禁煙・節煙の意思						
ぜひ禁煙したい	9 29.0%	0 0.0%	12 22.6%	11 31.4%	32 26.4%	8.75
できれば禁煙したい	16 51.6%	1 50.0%	28 52.8%	19 54.3%	64 52.9%	
節煙したい	5 16.1%	1 50.0%	12 22.6%	2 5.7%	20 16.5%	
禁煙も節煙もしたくない	1 3.2%	0 0.0%	1 1.9%	3 8.6%	5 4.1%	

(\*  $p < 0.05$  \*\*  $p < 0.01$ )

表36 医療機関別集計(3)

	A (N=504)	B (N=98)	C (N=504)	D (N=367)	全体 (N=1473)	$\chi^2$
妊娠前の飲酒頻度						
飲んでいなかった	151 30.1%	24 25.0%	132 26.4%	79 21.6%	386 26.4%	27.11 *
年に1, 2回	83 16.5%	20 20.8%	74 14.8%	65 17.8%	242 16.5%	
月に1, 2回	137 27.3%	26 27.1%	142 28.4%	107 29.2%	412 28.1%	
週に1, 2回	70 13.9%	16 16.7%	94 18.8%	47 12.8%	227 15.5%	
週に3, 4回	26 5.2%	6 6.3%	30 6.0%	27 7.4%	89 6.1%	
ほとんど毎日	35 7.0%	4 4.2%	28 5.6%	41 11.2%	108 7.4%	
妊娠前の1回当たりの飲酒量						
飲んでいなかった	150 29.8%	24 24.7%	127 25.2%	78 21.3%	379 25.8%	15.29
コップ・グラスに1杯未満	118 23.4%	26 26.8%	114 22.7%	76 20.8%	334 22.7%	
コップ・グラスに1, 2杯	163 32.3%	34 35.1%	179 35.6%	149 40.7%	525 35.7%	
コップ・グラスに3~5杯	63 12.5%	10 10.3%	73 14.5%	51 13.9%	197 13.4%	
コップ・グラスに6杯以上	10 2.0%	3 3.1%	10 2.0%	12 3.3%	35 2.4%	
妊娠中の飲酒状況						
飲酒していない	453 89.9%	90 91.8%	427 85.1%	307 83.7%	1277 86.8%	10.86 *
飲酒している	51 10.1%	8 8.2%	75 14.9%	60 16.3%	194 13.2%	
飲酒が胎児に及ぼす影響に関する認知						
知らない	85 16.9%	13 13.3%	103 20.5%	92 25.1%	293 19.9%	11.87 **
知っている	419 83.1%	85 86.7%	400 79.5%	275 74.9%	1179 80.1%	
周囲の人からの飲酒に関するアドバイスの有無						
ない	351 71.5%	72 77.4%	376 76.6%	272 75.6%	1071 74.6%	4.09
ある	140 28.5%	21 22.6%	115 23.4%	88 24.4%	364 25.4%	
妊娠中に飲酒している者の今後の禁酒・節酒の意思						
ぜひ禁酒したい	2 4.3%	2 33.3%	7 10.0%	7 14.0%	18 10.4%	6.63
できれば禁酒したい	17 36.2%	1 16.7%	22 31.4%	14 28.0%	54 31.2%	
節酒したい	22 46.8%	2 33.3%	32 45.7%	23 46.0%	79 45.7%	
禁酒も節酒もしたくない	6 12.8%	1 16.7%	9 12.9%	6 12.0%	22 12.7%	

(\* p&lt;0.05 \*\* p&lt;0.01)