

追跡データ

6ヶ月後生死	1年後生死
死亡の場合その理由	死亡の場合その理由
6ヶ月後followの有無	1年後followの有無
6ヶ月までの再入院	6ヶ月から1年までの再入院
再入院回数	再入院回数
再入院理由	再入院理由
再入院保険点数	再入院保険点数

参加施設

24 施設 データ協力 22 施設


国立

札幌病院
仙台病院
霞ヶ浦病院
埼玉病院
東京災害医療センター
京都病院
大阪南病院
姫路病院
呉医療センター
善通寺病院
長崎医療センター

函館病院
水戸病院
晴嵐荘病院
東京医療センター
名古屋病院
○大阪病院（班長）
神戸病院
岡山医療センター
岩国病院
九州医療センター
九州循環器病センター

大蔵病院 横浜病院

HOSPnet



急性心筋梗塞 登録数

(国立病院22施設)

1999-2001

1年目	658例
2年目	506例
3年目	843例
	<hr/>
	2007例

HOSPnetによる登録状況


初年度登録	19施設
HOSPnetによる登録	9施設
Internetを介したe-mail添付	3施設
Floppyでの送付	3施設
郵送あるいはFax	4施設
最終的登録	22施設
HOSPnetによる登録	18施設

急性心筋梗塞内訳

N 2007例

年齢 66.9±12.2(17-101才)

性別 M:F = 74:26






図 10 男性の年齢分布




図 11 女性の年齢分布

急性期の治療




図 12

急性期抗凝固剤の使用




図 13

急性期抗血小板薬の使用




図 14

治療後の狭窄度およびTIMI




図 15

右心力于実施率 40%(697例)




図 16

入院中死亡率




图 17

TIMI分類と入院中死亡率




図 18

急性期死因




図 19

退院前のCAG、PTCA実施率




図 20

退院後の投薬率(1654例)




図 21

退院後の生命予後

6ヶ月追跡	生存	死亡
947	929	18


死亡率1.9%

死因


心不全	再梗塞	脑梗塞	不整脈	その他
4	3	1	1	9

退院後6ヶ月生命予後

ACE阻害剤



B-ブロツカー




抗血小板薬

($P < 0.001$)

抗血小板薬

$P < 0.001$



6ヶ月内の再入院

再入院	
有	無
566	460

回数	1回	2回	3回	4回
508	51	5	2	

理由	f/u CAG	PTCA(+stent)	狭心症	心不全
399	91	29	20	

CABG	不整脈	再梗塞	その他
13	5	9	37