
県別ベンチマーキングによる評価

松本 邦愛
(国立医療・病院管理研究所
医療政策研究部)

1. 健康指標の選別

健康日本 21 はこれまでの健康政策と違い、新しい理念を掲げている。生活習慣病が中心の今日の日本の疾病構造では、個人一人一人の自覚の基に生活習慣を変えていくことが健康を実現するための重要なきっかけとなる。しかし、個人の努力のみでは健康は実現されず、関連するグループがそれを支え、さらに行政がそれを支援することが提唱されている。

個人の努力を中心としてさまざまな関係者がそれを支援するためには共通の目標が必要で、健康日本 21 の重要な特徴は目標値を掲げたことにある。9分野 93 の数値目標が国レベルの目標値として提案されている。しかし、これらの目標の中には、疾病の自然史からするときっかけとなる生活習慣や危険要因などに関連するものから、その結果として疾病や障害の段階に至るものまでさまざまである。

そこで研究者らはこの過程を「生活習慣」「危険要因」「疾病罹患」「死亡状況」「障害者率」の五つの自然史の段階に分け、さらに「生活習慣」から「危険要因」に至る段階に介入する「健康行動」や、「危険要因」から「疾病罹患」の過程に介入する「予防介入」、さらには結果をどのように受け止めるかの「主観受留」の3項目を付け加えて、8分野の評価を提案した(図1)。さらにこれらの8分野で、6つの指標を国レベルで提案された93の指標の中から選出し、疾病の自然史に対応した健康関連指標を開発した。

2. 県別ベンチ・マーキング

各分野の定義と使用データの出所については以下に記す表1のとおりである。官庁統計を用い、サンプル数が足りない変数ではデータプール法を用いている。同レベルで提案された目標値と関連した各分野の変数は表2にその対比を示している。「生活習慣」「健康行動」「危険要因」の諸項目については、健康日本21の主な目標であり、また、国民栄養調査・国民生活基礎調査の主な調査項目なので、国レベルで提案された目標と、県別ベンチマークで算出する項目とほぼ一致している。

しかし、「予防介入」や結果としての「疾病罹患」「死亡状況」「障害者率」については健康日本21では健康寿命の延長が目標とされているために、その中に全て含まれていると考えられる。本研究ではそれを具体的に変更可能な変数として抽出し分析した。健康寿命に関しては長谷川、他(2001)を参考とした。

上述の48の変数について、既存調査の1995年頃のデータを元に、各種調査から基準値を算出した。基準値と全国平均値との比率を計算し、1-47位までよい値の順番に順位付けを行った。95年には阪神淡路大震災があり、実際には兵庫が除かれているデータが多いため、実際にはデータは46都道府県の順位付けになっている(表3)。

3. レーダー・チャートによる県別評価

各側面の評価をさらにわかりやすくするために、集計可能な六つの指標を軸に設定した

レーダー・チャートに示した。レーダー・チャートの各軸の目盛は都道府県別の全国ランキングで、順位が良いほど指標値が大きくなるように作成した。レーダー・チャートが外側に広がるほど評価は高く、形がいびつに凹んだ部分は評価が低いことを意味する。

このようなレーダー・チャートの表示は、各県ではどの領域が弱いのかをパターンで見ることができるようになる点で有用である。例えば北海道の場合だと、実際の健康習慣は男女とも極めて全般的に弱いにも関わらず、個人がそれを直そうとする健康行動は行っていると判断できる（図2）。このように各県別の特徴を分析することが可能となるのである。

参考文献・謝辞

- ・ *Benchmarking in health Care, Joint Commission, (2000)*
- ・ 辻一郎、『健康寿命』麦秋社、(1998)、東京
- ・ 長谷川敏彦：「歯科医療と評価（5）疾病を測る」、『日本歯科医師会雑誌』、VOL. 49, NO. 5 PP. 442 - 443, 1996
- ・ 長谷川敏彦、高本和彦、福田吉治、「標準早死損失年（PYLLSR）と区間死亡率（LSMR）の概念分析と健康政策への応用」『厚生指標』1999:46(4) pp34-39
- ・ 長谷川敏彦、他『健康日本 21 計画の基本概念と推進手段に関する計画』報告書、2000. 3
- ・ 長谷川敏彦、他『健康日本 21 計画の評価等に資する早世及び健康寿命の指標の算定に関する研究』報告書 2001. 3
- ・ 福田吉治、長谷川敏彦、八谷寛、田端航也、「日本の疾病負担と障害調整生存年（DALY）」、『厚生指標』1999:46(4) pp28-33

なお、本研究は平成 10 年－11 年度厚生省科学研究費補助金（健康総合研究事業）『健康日本 21 計画の基本概念と推進手段に関する計画』（主任研究者：長谷川敏彦）および、平成 12 年度厚生省科学研究費補助金（健康総合研究事業）『健康日本 21 計画の評価等に資する早世及び健康寿命の指標の算定に関する研究』（主任研究者：長谷川敏彦）に基づいて行われた。

図 1：疾病の自然史と健康決定要因




表1：変数の定義とデータの出所

データの出所・集計方法

	使用データの出所	集計方法
生活習慣	「国民生活基礎調査」平成7年個票、「国民栄養調査」昭和61年～平成11年個票	それぞれの項目に関して当てはまる割合を集計。
健康行動	「国民生活基礎調査」平成7年個票	それぞれの項目に関して当てはまる割合を集計。
危険要因	「国民栄養調査」昭和61年～平成11年個票	それぞれの項目に関して当てはまる割合を集計。
予防介入	「国民生活基礎調査」平成7年個票、「国民栄養調査」昭和61年～平成11年個票、「老人保健事業報告」平成7年度	それぞれの項目に関して当てはまる割合を集計。
疾病罹患	「患者調査」平成8年個票	以下の算式により10万人あたりの退院患者、総患者数を推計。 (年齢階級・性別全主傷病における全国規模推計患者数÷年齢階級・性別全国人口)×100000
障害者率	「国民生活基礎調査」平成7年個票、「老人保健施設調査」平成7年、「社会福祉施設調査」平成7年、平成8年、「患者調査」平成8年個票	寝たきり老人の推計は、在宅のもの(国民生活基礎調査 平成7年個票より)、施設のもの(老人保健施設調査 平成7年、社会福祉施設調査 平成7年8年より)、病院へ入院しているもの(患者調査 平成7年より)を合計して算出した。障害者は「日常生活への影響の有無」で「ある」と答えたもの(国民生活基礎調査 平成7年個票より)に社会福祉施設入所者で介助が必要な者(老人保健施設調査 平成7年、社会福祉施設調査 平成7年より)を合計して10万人あたりで算出。
死亡状況	「人口動態統計」平成5年～平成9年	「国民生活基礎調査」平成7年個票、「老人保健施設調査」平成7年、「社会福祉施設調査」平成7年、平成8年、「患者調査」平成8年個票を用いて、年齢階級別の障害の程度を測定し、平成7年「都道府県生命表」とあわせてHALEを算出。
主観受留	「国民生活基礎調査」平成7年個票	それぞれの項目に関して当てはまる割合を集計。

表2：変数の定義と健康日本21目標値との対比

	変数名	健康日本21での目標	定義
生活習慣	朝食	朝食欠食率の減少	「朝食を取っているか否か」で「否」と答えたものの割合
	繊維摂取	質量ともにきちんとした食事をする人の増加	一日の摂取量が10g以下のものの割合
	カルシウム摂取	カルシウムに富む食品摂取量の増加	一日の摂取量が600mg以下のものの割合
	脂肪摂取	脂肪エネルギー比率の減少	高脂肪エネルギー比が25%以上のものの割合
	カロリーバランス	質量ともにきちんとした食事をする人の増加	摂取量が必要量の20%以上多いものの割合
	歩行	日常生活における歩数の増加	一日8000歩以下のものの割合
健康行動	規則正しい食事	質量ともにきちんとした食事をする人の増加	「規則正しい食事をしているか否か」で「している」と答えたものの割合
	バランスのとれた食事	質量ともにきちんとした食事をする人の増加	「バランスのとれた食事をしているか否か」で「している」と答えたものの割合
	定期的に運動	運動習慣者の増加	「定期的に運動しているか否か」で「している」と答えたものの割合
	気分転換の時間有	ストレス	「気分転換の時間があるか否か」で「している」と答えたものの割合
	十分な睡眠時間	睡眠	「十分な睡眠時間があるか否か」で「している」と答えたものの割合
	全部実行		上記5項目をすべて実行しているものの割合
	飲酒	多量に飲酒する人の減少	飲酒は1日1合以上飲んでいるものの割合。









危険要因	飲酒	多量に飲酒する人の減少	飲酒は1日1合以上飲んでいるものの割合。
	喫煙	たばこ	「喫煙の有無」で「有」と答えたものの割合
	血糖	糖尿病有病者数の減少	140 以上のものの割合
	善玉コレステロール	高脂血症の減少	HDLが 40 以下のものの割合
	高血圧		収縮期血圧が 140 以上のものの割合
	肥満	適正体重を維持している人の増加	BMI値 25 以上のものの割合
予防介入	健康診断	健康診断を受ける人の増加	「健康診断の受診の有無」で「有」と答えたものの割合
	かかりつけ医有		「かかりつけ医の有無」で「有」と答えたものの割合
	アクセス		「受診の必要性の有無」で「有」と答えたもののうち、病院・診療所・老人保健施設に通っているものの割合
	高血圧未発見		収縮期血圧が 140 以上のもののうち血圧降下剤を飲んでいないものの割合
	高血圧管理		血圧降下剤を飲んでいるもののうちで収縮期血圧が 140 未満のものの割合
癌検診未把握	がん検診受診者の増加	胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がんの検診受診者のうち未把握のものの割合	
疾病罹患	総患者0-14		10 万人当たりの0歳から 14 歳までのすべての患者数
	総患者 15-64		10 万人当たりの 15.歳から 64 歳までのすべての患者数
	総患者 65-		10 万人当たりの 64 歳以上のすべての患者数
	退院患者0-14		10 万人当たりの0.歳から 14 歳までの退院患者数
	退院患者 15-64		10 万人当たりの 15.歳から 64 歳までの退院患者数
	退院患者 65-		10 万人当たりの 64 歳以上の退院患者数
障害者率	寝たきり全体		10 万人当たりすべての寝たきり者の数
	寝たきり在宅率		全寝たきり者のうち、在宅の寝たきり者の割合
	寝たきり 65-		10 万人当たり 65 歳以上の寝たきり者の数
	軽い障害		「日常生活への影響の有無」で「ある」と答えたものに社会福祉施設入所者で介助が必要な者を合計したもの(10 万人当たり)
	脳卒中		寝たきりの原因が脳卒中であるもの(10 万人当たり)
	骨折		寝たきりの原因が骨折であるもの(10 万人当たり)
死亡状況	健康寿命		生存者の健康状態、障害の状態を考慮した健康指標で、平均寿命から障害を割り引いた健康な状態での寿命のこと。
	全LSM0-64		10 万位あたりで0歳から 64 歳までに死亡する人数。
	癌LSM0-64		10 万位あたりで癌によって0歳から 64 歳までに死亡する人数。
	事故LSM0-64		10 万位あたりで事故によって0歳から 64 歳までに死亡する人数。
	自殺LSM0-64		10 万位あたりで自殺によって0歳から 64 歳までに死亡する人数。
IMR		1000 人当たりの乳幼児死亡数	
主観受留	自覚ある		「自覚症状の有無」で「有」と答えたものの割合
	健康状態よい全		「健康意識」で「よい」「まあよい」「ふつう」と答えたものの割合
	健康状態よい 65-		65 歳以上で「健康意識」で「よい」「まあよい」「ふつう」と答えたものの割合
	生活に支障全		「日常生活への影響の有無」で「ある」と答えたものの割合
	生活に支障 65-		65 歳以上で「日常生活への影響の有無」で「ある」と答えたものの割合
	ストレス	ストレス	「ストレスの有無」で「有」と答えたものの割合

県別ベンチマーキング

北海道

男性

女性



北海道

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1 (IMR)	3,015	9	0.821	2,851	22	0.918
LSM5 (U5MR)	4,774	14	0.929	4,079	23	0.951
LSM65	16,757	26	1.020	8,334	39	1.025
LSM三大疾患	9,710	37	1.036	5,296	44	1.046
寝たきりのもの全体	866	24	1.267	1,405	24	1.203
障害者全体	731	20	1.140	980	23	1.152
煙草	0.583	31	1.061	0.203	47	1.955
飲酒(1合以上)	0.516	17	0.978	0.105	45	1.396
肥満(BMIが30以上の者)	0.260	46	1.300	0.231	40	1.241
高血圧(BPH140以上)	0.330	24	1.020	0.252	25	1.035
健康行動すべて実行	0.072	9	1.121	0.072	4	1.166

総合指標順位

	男性		女性
	実数	ランク	
行動	12		11
習慣	47		47
介入	36		33
要因	45		46
障害	26		31
罹患	37		39
主観	22		35
死亡	33		43
総合健康指標	40		44

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.636	44	1.207	0.720	43	1.175
カロリーバランス悪い	0.233	37	1.085	0.235	36	1.060
高脂肪エネルギー比	0.475	21	0.929	0.545	12	0.898
カルシウム不足	0.639	34	1.030	0.699	41	1.092
繊維不足	0.771	24	1.003	0.814	31	1.030
朝食抜き	0.208	45	1.249	0.157	46	1.435

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.525	31	0.991	0.596	44	0.927
バランスのとれた食事	0.365	11	1.046	0.424	26	0.992
定期的に運動	0.275	25	1.009	0.248	6	1.116
気分転換の時間有	0.316	8	1.062	0.307	10	1.072
十分な睡眠時間	0.475	12	1.053	0.504	7	1.064
全部実行	0.072	9	1.121	0.072	4	1.166

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.260	46	1.300	0.231	40	1.241
高血圧(BPH140以上)	0.330	24	1.020	0.252	25	1.035
HDL不足	0.220	37	1.121	0.075	24	1.054
血糖値高	0.074	42	1.278	0.045	39	1.228
喫煙	0.583	31	1.061	0.203	47	1.955
飲酒	0.516	17	0.978	0.105	45	1.396

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.595	34	0.948	0.444	42	0.830
かかりつけ医有	0.491	42	0.889	0.557	43	0.877
アクセス良	0.699	23	1.016	0.758	5	1.055
高血圧未把握	0.234	13	0.921	0.189	23	0.996
高血圧コントロール	0.467	28	1.032	0.430	28	1.006
癌検診結果未把握率	0.026	25	1.004	0.010	27	0.956

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	32370	18	0.913	26706	16	0.899
総患者15歳-64歳	35966	28	1.100	48436	37	1.119
総患者65歳以上	130224	36	1.078	143153	31	1.041
退院患者0歳-14歳	946	43	1.377	694	35	1.222
退院患者15歳-64歳	800	40	1.302	919	42	1.226
退院患者65歳以上	2474	43	1.181	1921	45	1.363

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	866	24	1.267	1,405	24	1.203
寝たきり在宅率	0.032	46	0.203	0.045	46	0.345
寝たきり65歳以上	4985	36	1.262	7580	36	1.253
寝たきり脳卒中	220	21	1.181	388	34	1.344
寝たきり骨折	9	8	0.388	34	5	0.577
軽い障害(在宅)	731	20	1.140	980	23	1.152

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	73,283	43	0.997	79,001	44	0.997
全LSMO歳-64歳	16,757	26	1.020	8,334	39	1.025
癌LSMO歳-64歳	6,008	36	1.024	3,634	41	1.030
事故LSMO歳-64歳	1,999	35	1.229	620	39	1.183
自殺LSMO歳-64歳	1,283	22	1.015	464	11	0.932
乳児死亡率	3,015	9	0.821	2,851	22	0.918

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.259	22	1.001	0.327	25	1.013
健康状態良全	0.911	10	0.991	0.884	5	0.983
健康状態良65歳以上	0.820	30	1.007	0.765	8	0.966
生活に支障全年齢	0.080	20	1.003	0.100	32	1.067
生活に支障65歳以上	0.200	14	0.940	0.236	22	1.000
ストレス	0.366	24	0.995	0.427	25	0.997



青森県

男性

女性



青森県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	4,584	38	1.248	5,639	47	1.815
LSM5(U5MR)	5,324	28	1.036	7,832	47	1.825
LSM65	20,098	47	1.224	8,470	42	1.042
LSM三大疾患	11,268	47	1.202	5,234	40	1.034
寝たきりのもの全体	893	27	1.307	1,530	27	1.310
障害者全体	1,110	45	1.730	1,153	34	1.355
喫煙	0,599	41	1.089	0,090	28	0.869
飲酒(1合以上)	0,618	43	1.172	0,080	39	1.068
肥満(BMIが30以上の者)	0,251	45	1.255	0,258	46	1.386
高血圧(BPH140以上)	0,359	34	1.107	0,273	37	1.122
健康行動すべて実行	0,058	36	0.901	0,052	42	0.837

総合指標順位

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
行動	31			42		
習慣	19			44		
介入	30			19		
要因	42			47		
障害	31			29		
罹患	39			47		
主観	28			20		
死亡	47			45		
総合健康指標	43			45		

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.602	37	1.142	0.742	45	1.211
カロリーバランス悪い	0.190	8	0.884	0.204	18	0.919
高脂肪エネルギー比	0.467	19	0.914	0.578	22	0.951
カルシウム不足	0.607	17	0.977	0.678	38	1.059
繊維不足	0.739	13	0.962	0.757	12	0.959
朝食抜き	0.161	32	0.967	0.112	34	1.027

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.543	22	1.025	0.632	35	0.983
バランスのとれた食事	0.333	38	0.954	0.385	41	0.900
定期的に運動	0.235	45	0.862	0.175	45	0.789
気分転換の時間有	0.288	31	0.967	0.258	36	0.901
十分な睡眠時間	0.496	3	1.100	0.535	1	1.129
全部実行	0.058	36	0.901	0.052	42	0.837

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.251	45	1.255	0.258	46	1.386
高血圧(BPH140以上)	0.359	34	1.107	0.273	37	1.122
HDL不足	0.152	3	0.778	0.083	34	1.167
血糖値高	0.054	20	0.926	0.048	44	1.311
喫煙	0.599	41	1.089	0.090	28	0.869
飲酒	0.618	43	1.172	0.080	39	1.068

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.594	35	0.946	0.512	28	0.957
かかりつけ医有	0.476	44	0.862	0.556	44	0.876
アクセス良	0.700	22	1.016	0.732	18	1.019
高血圧未把握	0.250	23	0.984	0.119	2	0.628
高血圧コントロール	0.392	10	0.867	0.383	8	0.895
癌検診結果未把握率	0.023	18	0.884	0.009	19	0.856

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	43,731	44	1.233	34,858	42	1.174
総患者15歳-64歳	38,989	41	1.193	57,334	47	1.325
総患者65歳以上	118,401	25	0.980	167,845	46	1.220
退院患者0歳-14歳	757	32	1.101	583	29	1.026
退院患者15歳-64歳	704	32	1.145	819	32	1.093
退院患者65歳以上	2,083	24	0.994	1,438	29	1.021

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	893	27	1.307	1,530	27	1.310
寝たきり在宅率	0.122	31	0.782	0.105	31	0.796
寝たきり65歳以上	5,147	39	1.303	7,580	35	1.253
寝たきり脳卒中	261	29	1.402	360	29	1.247
寝たきり骨折	8	5	0.360	44	9	0.764
軽い障害(在宅)	1,110	45	1.730	1,153	34	1.355

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	72,420	47	0.985	79,423	40	1.005
全LSM0歳-64歳	20,098	47	1.224	8,470	42	1.042
癌LSM0歳-64歳	6,611	44	1.127	3,511	31	0.995
事故LSM0歳-64歳	2,184	45	1.343	563	27	1.075
自殺LSM0歳-64歳	1,722	42	1.361	503	29	1.011
乳児死亡率	4,584	38	1.248	5,639	47	1.815

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.255	19	0.987	0.309	12	0.955
健康状態良全	0.913	15	0.993	0.898	21	0.998
健康状態良65歳以上	0.794	7	0.975	0.766	9	0.967
生活に支障全年齢	0.080	22	1.005	0.089	16	0.946
生活に支障65歳以上	0.231	35	1.082	0.230	19	0.978
ストレス	0.339	11	0.922	0.416	20	0.971



岩手県

男性

女性



岩手県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	2,974	8	0.810	3,648	35	1.174
LSM5(U5MR)	4,539	10	0.883	4,808	34	1.121
LSM65	17,139	32	1.044	7,796	14	0.959
LSM三大疾患	9,427	27	1.006	4,778	14	0.944
寝たきりのもの全体	873	25	1.278	1,388	22	1.188
障害者全体	967	40	1.507	1,056	28	1.241
煙草	0.590	36	1.073	0.048	5	0.465
飲酒(1合以上)	0.644	46	1.222	0.084	41	1.114
肥満(BMIが30以上の者)	0.230	39	1.153	0.238	42	1.277
高血圧(BPH140以上)	0.371	39	1.145	0.275	39	1.131
健康行動すべて実行	0.057	39	0.892	0.051	43	0.822

総合指標順位

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
行動	45			46		
習慣	2			20		
介入	3			3		
要因	46			30		
障害	28			21		
罹患	30			37		
主観	29			27		
死亡	27			24		
総合健康指標	28			34		

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.556	26	1.054	0.707	41	1.154
カロリーバランス悪い	0.196	12	0.912	0.249	44	1.120
高脂肪エネルギー比	0.374	3	0.731	0.480	2	0.790
カルシウム不足	0.529	1	0.852	0.614	15	0.959
繊維不足	0.691	4	0.899	0.711	4	0.900
朝食抜き	0.121	2	0.729	0.078	4	0.715

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.532	26	1.004	0.645	26	1.005
バランスのとれた食事	0.302	46	0.866	0.353	46	0.826
定期的に運動	0.224	46	0.821	0.156	46	0.702
気分転換の時間有	0.258	45	0.867	0.236	46	0.826
十分な睡眠時間	0.451	29	1.001	0.477	25	1.007
全部実行	0.057	39	0.892	0.051	43	0.822

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.230	39	1.153	0.238	42	1.277
高血圧(BPH140以上)	0.371	39	1.145	0.275	39	1.131
HDL不足	0.142	1	0.723	0.073	23	1.026
血糖値高	0.069	36	1.194	0.033	17	0.905
喫煙	0.590	36	1.073	0.048	5	0.465
飲酒	0.644	46	1.222	0.084	41	1.114

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.710	5	1.131	0.654	3	1.223
かかりつけ医有	0.448	45	0.811	0.530	45	0.834
アクセス良	0.706	17	1.025	0.756	6	1.052
高血圧未把握	0.140	1	0.551	0.137	5	0.723
高血圧コントロール	0.383	7	0.845	0.382	7	0.894
癌検診結果未把握率	0.016	5	0.610	0.005	3	0.466

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	37637	32	1.061	29799	28	1.003
総患者15歳-64歳	37851	37	1.158	52277	45	1.208
総患者65歳以上	124783	28	1.033	146374	36	1.064
退院患者0歳-14歳	883	37	1.285	714	37	1.256
退院患者15歳-64歳	603	17	0.980	773	26	1.031
退院患者65歳以上	2065	23	0.986	1331	17	0.945

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	873	25	1.278	1,388	22	1.188
寝たきり在宅率	0.082	43	0.529	0.082	36	0.623
寝たきり65歳以上	3989	21	1.010	6032	22	0.997
寝たきり脳卒中	217	19	1.163	377	30	1.306
寝たきり骨折	23	24	1.052	35	6	0.599
軽い障害(在宅)	967	40	1.507	1,056	28	1.241

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	73,906	34	1.005	80,109	30	1.009
全LSM0歳-64歳	17,139	32	1.044	7,796	14	0.959
癌LSM0歳-64歳	5,227	6	0.891	3,252	10	0.922
事故LSM0歳-64歳	1,904	28	1.171	521	17	0.994
自殺LSM0歳-64歳	1,804	45	1.426	544	38	1.093
乳児死亡率	2,974	8	0.810	3,648	35	1.174

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.248	13	0.959	0.313	13	0.969
健康状態良全	0.912	14	0.993	0.895	16	0.995
健康状態良65歳以上	0.801	12	0.983	0.777	14	0.980
生活に支障全年齢	0.088	38	1.113	0.098	26	1.047
生活に支障65歳以上	0.241	42	1.129	0.244	32	1.035
ストレス	0.345	14	0.937	0.410	16	0.957



宮城県

男性

女性



宮城県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	3,510	19	0.956	2,479	8	0.798
LSM5(U5MR)	4,914	16	0.956	4,290	28	1.000
LSM65	15,528	12	0.946	7,741	11	0.952
LSM三大疾患	9,089	19	0.970	4,960	26	0.980
寝たきりのもの全体	599	13	0.876	927	7	0.793
障害者全体	669	12	1.043	942	18	1.106
煙草	0,560	26	1.017	0,085	24	0.820
飲酒(1合以上)	0,518	20	0.982	0,059	19	0.782
肥満(BMIが30以上の者)	0,240	43	1.201	0,243	44	1.303
高血圧(BPH140以上)	0,326	22	1.007	0,252	26	1.037
健康行動すべて実行	0,061	30	0.945	0,059	30	0.953

総合指標順位

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
行動	32			24		
習慣	37			18		
介入	11			6		
要因	31			37		
障害	17			6		
罹患	18			17		
主観	8			9		
死亡	17			16		
総合健康指標	19			7		

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0,589	34	1.118	0,652	33	1.064
カロリーバランス悪い	0,220	26	1.023	0,212	21	0.953
高脂肪エネルギー比	0,556	42	1.087	0,603	29	0.992
カルシウム不足	0,573	5	0.923	0,595	6	0.929
繊維不足	0,754	19	0.981	0,722	5	0.914
朝食抜き	0,151	28	0.907	0,101	24	0.921

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0,525	30	0.991	0,650	21	1.012
バランスのとれた食事	0,343	31	0.982	0,439	11	1.029
定期的な運動	0,246	42	0.902	0,196	41	0.881
気分転換の時間有	0,310	14	1.042	0,299	13	1.047
十分な睡眠時間	0,452	28	1.003	0,482	17	1.018
全部実行	0,061	30	0.945	0,059	30	0.953

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0,240	43	1.201	0,243	44	1.303
高血圧(BPH140以上)	0,326	22	1.007	0,252	26	1.037
HDL不足	0,190	19	0.970	0,075	25	1.058
血糖値高	0,047	14	0.813	0,042	31	1.132
喫煙	0,560	26	1.017	0,085	24	0.820
飲酒	0,518	20	0.982	0,059	19	0.782

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0,724	2	1.154	0,647	5	1.210
かかりつけ医有	0,504	40	0.912	0,592	41	0.933
アクセス良	0,672	29	0.976	0,700	31	0.974
高血圧未把握	0,214	6	0.843	0,135	4	0.713
高血圧コントロール	0,472	30	1.042	0,374	6	0.875
癌検診結果未把握率	0,005	1	0.199	0,002	1	0.186

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	3,304	19	0.932	2,567	13	0.864
総患者15歳-64歳	31,505	15	0.964	42,166	18	0.974
総患者65歳以上	118,151	24	0.978	133,303	24	0.969
退院患者0歳-14歳	509	2	0.741	463	8	0.814
退院患者15歳-64歳	646	21	1.050	798	28	1.064
退院患者65歳以上	2,057	21	0.982	1,352	21	0.959

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	599	13	0.876	927	7	0.793
寝たきり在宅率	0,257	4	1.653	0,266	1	2.014
寝たきり65歳以上	3,570	16	0.903	4,963	9	0.820
寝たきり脳卒中	241	26	1.297	235	10	0.815
寝たきり骨折	35	33	1.605	53	14	0.911
軽い障害(在宅)	669	12	1.043	942	18	1.106

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	74,204	25	1.010	79,810	37	0.996
全LSMO歳-64歳	15,528	12	0.946	7,741	11	0.952
癌LSMO歳-64歳	5,621	19	0.958	3,434	28	0.973
事故LSMO歳-64歳	1,618	13	0.995	479	10	0.914
自殺LSMO歳-64歳	1,227	17	0.970	481	17	0.967
乳児死亡率	3,510	19	0.956	2,479	8	0.798

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0,233	5	0.901	0,297	6	0.920
健康状態良全	0,928	37	1.010	0,912	39	1.014
健康状態良65歳以上	0,836	37	1.026	0,817	40	1.032
生活に支障全年齢	0,077	15	0.965	0,087	14	0.931
生活に支障65歳以上	0,193	10	0.906	0,224	14	0.951
ストレス	0,365	23	0.991	0,424	23	0.990



秋田県

男性

女性



秋田県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	2,956	6	0.805	4,061	41	1.307
LSM5(U5MR)	4,223	6	0.821	5,641	44	1.315
LSM65	17,715	39	1.079	8,044	24	0.989
LSM三大疾患	9,879	41	1.054	5,088	35	1.005
寝たきりのもの全体	1,003	37	1.467	1,542	28	1.320
障害者全体	842	29	1.311	860	14	1.011
煙草	0,594	38	1.079	0,075	20	0.725
飲酒(1合以上)	0,689	47	1.307	0,048	7	0.634
肥満(BMIが30以上の者)	0,235	40	1.175	0,252	45	1.352
高血圧(BPH140以上)	0,343	32	1.058	0,240	19	0.986
健康行動すべて実行	0,064	24	0.993	0,064	19	1.041

総合指標順位

	男性		女性
	実数	ランク	
行動	28		30
習慣	24		14
介入	9		4
要因	47		29
障害	37		22
罹患	24		34
主観	11		17
死亡	42		46
総合健康指標	33		26

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0,655	47	1.243	0,738	44	1.204
カロリーバランス悪い	0,255	45	1.186	0,225	30	1.014
高脂肪エネルギー比	0,380	4	0.743	0,470	1	0.774
カルシウム不足	0,588	9	0.947	0,610	11	0.953
繊維不足	0,658	3	0.856	0,697	3	0.882
朝食抜き	0,127	5	0.760	0,089	11	0.816

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0,547	20	1.032	0,652	19	1.015
バランスのとれた食事	0,349	23	1.000	0,425	25	0.995
定期的に運動	0,242	43	0.890	0,177	44	0.796
気分転換の時間有	0,272	39	0.915	0,246	43	0.859
十分な睡眠時間	0,462	16	1.024	0,488	12	1.031
全部実行	0,064	24	0.993	0,064	19	1.041

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0,235	40	1.175	0,252	45	1.352
高血圧(BPH140以上)	0,343	32	1.058	0,240	19	0.986
HDL不足	0,171	10	0.872	0,071	20	0.998
血糖値高	0,071	39	1.216	0,042	33	1.143
喫煙	0,594	38	1.079	0,075	20	0.725
飲酒	0,689	47	1.307	0,048	7	0.634

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0,699	7	1.115	0,659	2	1.232
かかりつけ医有	0,502	41	0.908	0,617	35	0.973
アクセス良	0,707	15	1.027	0,755	8	1.051
高血圧未把握	0,239	18	0.939	0,100	1	0.526
高血圧コントロール	0,312	2	0.689	0,267	1	0.626
癌検診結果未把握率	0,035	37	1.345	0,011	31	1.062

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	41,248	41	1.163	32,688	34	1.101
総患者15歳-64歳	35,411	25	1.083	51,210	43	1.184
総患者65歳以上	109,620	12	0.907	137,068	27	0.996
退院患者0歳-14歳	811	34	1.180	595	30	1.046
退院患者15歳-64歳	647	23	1.052	768	24	1.024
退院患者65歳以上	2,108	26	1.006	1,345	19	0.954

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	1,003	37	1.467	1,542	28	1.320
寝たきり在宅率	0,176	22	1.129	0,100	32	0.759
寝たきり65歳以上	4,661	29	1.180	6,193	24	1.024
寝たきり脳卒中	278	34	1.496	397	35	1.376
寝たきり骨折	60	42	2.735	45	13	0.779
軽い障害(在宅)	842	29	1.311	860	14	1.011

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	73,291	42	0.997	79,380	41	0.995
全LSM0歳-64歳	17,715	39	1.079	8,044	24	0.989
癌LSM0歳-64歳	6,321	39	1.077	3,783	44	1.072
事故LSM0歳-64歳	2,046	40	1.258	587	33	1.120
自殺LSM0歳-64歳	1,858	46	1.469	658	47	1.323
乳児死亡率	2,956	6	0.805	4,061	41	1.307

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0,255	18	0.986	0,327	24	1.012
健康状態良全	0,921	30	1.002	0,897	18	0.997
健康状態良65歳以上	0,836	36	1.026	0,812	36	1.025
生活に支障全年齢	0,083	31	1.046	0,104	39	1.106
生活に支障65歳以上	0,200	13	0.938	0,236	23	1.002
ストレス	0,336	10	0.913	0,393	7	0.917



山形県

男性

女性



山形県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	4,132	30	1,125	2,667	15	0,858
LSM5(U5MR)	6,109	37	1,188	3,429	4	0,799
LSM65	15,315	9	0,933	7,435	4	0,914
LSM三大疾患	8,900	13	0,949	4,561	4	0,901
寝たきりのもの全体	758	20	1,109	1,375	20	1,177
障害者全体	852	32	1,327	1,227	42	1,441
煙草	0,587	33	1,068	0,059	10	0,564
飲酒(1合以上)	0,554	32	1,050	0,055	12	0,727
肥満(BMIが30以上の者)	0,217	31	1,088	0,239	43	1,281
高血圧(BPH140以上)	0,408	46	1,260	0,274	38	1,126
健康行動すべて実行	0,063	25	0,984	0,057	33	0,930

総合指標順位

	男性		女性	
	実数	ランク	実数	ランク
行動	26		36	
習慣	34		28	
介入	8		2	
要因	33		28	
障害	18		23	
罹患	26		36	
主観	23		30	
死亡	20		9	
総合健康指標	22		25	

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0,616	41	1,170	0,757	47	1,235
カロリーバランス悪い	0,275	47	1,277	0,232	33	1,043
高脂肪エネルギー比	0,409	8	0,800	0,500	4	0,823
カルシウム不足	0,538	2	0,867	0,558	2	0,871
繊維不足	0,632	1	0,822	0,668	2	0,846
朝食抜き	0,145	22	0,870	0,101	25	0,925

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0,578	3	1,091	0,668	10	1,039
バランスのとれた食事	0,350	22	1,002	0,420	28	0,983
定期的に運動	0,236	44	0,864	0,179	43	0,805
気分転換の時間有	0,276	37	0,929	0,246	42	0,860
十分な睡眠時間	0,459	21	1,017	0,478	23	1,009
全部実行	0,063	25	0,984	0,057	33	0,930

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0,217	31	1,088	0,239	43	1,281
高血圧(BPH140以上)	0,408	46	1,260	0,274	38	1,126
HDL不足	0,153	4	0,779	0,085	37	1,204
血糖値高	0,045	11	0,778	0,032	16	0,873
喫煙	0,587	33	1,068	0,059	10	0,564
飲酒	0,554	32	1,050	0,055	12	0,727

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0,718	3	1,144	0,661	1	1,235
かかりつけ医有	0,576	16	1,042	0,668	10	1,053
アクセス良	0,750	2	1,090	0,770	3	1,072
高血圧未把握	0,214	7	0,844	0,122	3	0,642
高血圧コントロール	0,523	40	1,156	0,462	34	1,080
癌検診結果未把握率	0,030	32	1,164	0,009	17	0,834

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	41,821	42	1,179	34,556	41	1,164
総患者15歳-64歳	36,384	29	1,113	50,552	42	1,168
総患者65歳以上	111,867	19	0,926	131,777	22	0,958
退院患者0歳-14歳	721	30	1,050	622	34	1,094
退院患者15歳-64歳	653	24	1,063	875	39	1,167
退院患者65歳以上	1,938	13	0,925	1,226	12	0,870

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	758	20	1,109	1,375	20	1,177
寝たきり在宅率	0,189	17	1,212	0,240	3	1,818
寝たきり65歳以上	3,233	9	0,818	5,361	14	0,886
寝たきり脳卒中	267	32	1,433	411	37	1,423
寝たきり骨折	21	21	0,964	109	41	1,883
軽い障害(在宅)	852	32	1,327	1,227	42	1,441

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	74,412	19	1,012	80,231	25	1,011
全LSM0歳-64歳	15,315	9	0,933	7,435	4	0,914
癌LSM0歳-64歳	5,364	9	0,914	3,281	11	0,930
事故LSM0歳-64歳	1,683	15	1,035	568	29	1,084
自殺LSM0歳-64歳	1,488	37	1,176	474	14	0,952
乳児死亡率	4,132	30	1,125	2,667	15	0,858

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0,267	29	1,032	0,327	23	1,010
健康状態良全	0,915	17	0,995	0,891	9	0,990
健康状態良65歳以上	0,810	23	0,994	0,783	16	0,988
生活に支障全年齢	0,082	27	1,032	0,102	34	1,092
生活に支障65歳以上	0,205	16	0,961	0,240	26	1,017
ストレス	0,343	12	0,933	0,392	6	0,915



福島県

男性

女性



福島県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1 (IMR)	3.125	10	0.851	2.415	5	0.777
LSM5 (U5MR)	5.018	21	0.976	4.026	20	0.938
LSM65	16745	25	1.020	8155	31	1.003
LSM三大疾患	9610	33	1.025	4977	28	0.983
寝たきりのもの全体	659	17	0.965	1104	15	0.945
障害者全体	983	41	1.532	1241	43	1.458
煙草	0.630	46	1.145	0.106	36	1.021
飲酒(1合以上)	0.589	39	1.116	0.074	34	0.988
肥満(BMIが30以上の者)	0.219	33	1.096	0.234	41	1.256
高血圧(BPH140以上)	0.363	36	1.120	0.268	36	1.101
健康行動すべて実行	0.077	4	1.206	0.065	18	1.049

総合指標順位

	男性		女性	
	実数	ランク	実数	ランク
行動	13		16	
習慣	12		16	
介入	14		13	
要因	39		45	
障害	20		15	
罹患	16		14	
主観	6		13	
死亡	23		27	
総合健康指標	11		13	

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.608	40	1.153	0.715	42	1.166
カロリーバランス悪い	0.215	22	0.998	0.233	34	1.050
高脂肪エネルギー比	0.467	19	0.914	0.557	14	0.917
カルシウム不足	0.582	7	0.937	0.599	7	0.935
繊維不足	0.646	2	0.841	0.643	1	0.815
朝食抜き	0.133	11	0.796	0.086	9	0.790

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.562	12	1.061	0.677	7	1.055
バランスのとれた食事	0.353	18	1.012	0.433	18	1.014
定期的に運動	0.262	34	0.962	0.210	32	0.945
気分転換の時間有	0.301	20	1.013	0.273	25	0.956
十分な睡眠時間	0.483	11	1.070	0.478	24	1.008
全部実行	0.077	4	1.206	0.065	18	1.049

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.219	33	1.096	0.234	41	1.256
高血圧(BPH140以上)	0.363	36	1.120	0.268	36	1.101
HDL不足	0.188	17	0.959	0.080	30	1.133
血糖値高	0.047	15	0.816	0.045	38	1.226
喫煙	0.630	46	1.145	0.106	36	1.021
飲酒	0.589	39	1.116	0.074	34	0.988

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.633	21	1.009	0.553	19	1.034
かかりつけ医有	0.540	33	0.977	0.636	27	1.001
アクセス良	0.716	6	1.040	0.751	9	1.044
高血圧未把握	0.238	17	0.938	0.180	17	0.949
高血圧コントロール	0.442	18	0.976	0.402	17	0.941
癌検診結果未把握率	0.027	26	1.025	0.010	26	0.956

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	28000	5	0.790	22574	6	0.760
総患者15歳-64歳	32750	21	1.002	44494	22	1.028
総患者65歳以上	100700	9	0.833	120928	12	0.879
退院患者0歳-14歳	658	20	0.958	475	12	0.835
退院患者15歳-64歳	656	26	1.067	806	29	1.074
退院患者65歳以上	2090	25	0.998	1367	23	0.970

障害

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	659	17	0.965	1104	15	0.945
寝たきり在宅率	0.112	37	0.719	0.137	21	1.039
寝たきり65歳以上	3202	8	0.810	4795	6	0.792
寝たきり脳卒中	136	7	0.730	301	18	1.043
寝たきり骨折	21	22	0.972	39	7	0.664
軽い障害(在宅)	983	41	1.532	1241	43	1.458

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	73.948	32	1.006	79.984	34	0.997
全LSMO歳-64歳	16745	25	1.020	8155	31	1.003
癌LSMO歳-64歳	5713	26	0.974	3380	24	0.958
事故LSMO歳-64歳	1743	20	1.072	599	35	1.142
自殺LSMO歳-64歳	1337	26	1.057	479	16	0.964
乳児死亡率	3.125	10	0.851	2.415	5	0.777

主観

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.228	3	0.882	0.292	5	0.902
健康状態良全	0.929	39	1.010	0.900	24	1.001
健康状態良65歳以上	0.826	32	1.013	0.802	27	1.013
生活に支障全年齢	0.074	12	0.936	0.099	29	1.051
生活に支障65歳以上	0.197	12	0.926	0.242	29	1.027
ストレス	0.325	4	0.882	0.376	3	0.877

