









# 福井県

男性

女性



# 福井県

## 基本指標

|                | 男性     |     |       | 女性    |     |       |
|----------------|--------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | 実数     | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| LSM1 (IMR)     | 4,164  | 31  | 1.134 | 2,519 | 9   | 0.811 |
| LSM5 (U5MR)    | 5,633  | 33  | 1.096 | 3,778 | 13  | 0.881 |
| LSM65          | 14,774 | 3   | 0.900 | 7,402 | 3   | 0.910 |
| LSM三大疾患        | 8,000  | 2   | 0.853 | 4,432 | 1   | 0.876 |
| 寝たきりのもの全体      | 790    | 22  | 1.155 | 1,614 | 34  | 1.382 |
| 障害者全体          | 811    | 26  | 1.264 | 1,297 | 45  | 1.524 |
| 煙草             | 0,644  | 47  | 1.172 | 0,087 | 26  | 0.839 |
| 飲酒(1合以上)       | 0,539  | 26  | 1.022 | 0,066 | 29  | 0.881 |
| 肥満(BMIが30以上の者) | 0,183  | 11  | 0.918 | 0,179 | 17  | 0.958 |
| 高血圧(BPH140以上)  | 0,269  | 3   | 0.830 | 0,198 | 2   | 0.813 |
| 健康行動すべて実行      | 0,066  | 17  | 1.025 | 0,056 | 36  | 0.905 |

## 総合指標順位

|        | 男性 |     | 女性 |     |
|--------|----|-----|----|-----|
|        | 実数 | ランク | 実数 | ランク |
| 行動     | 25 |     | 35 |     |
| 習慣     | 40 |     | 23 |     |
| 介入     | 25 |     | 26 |     |
| 要因     | 10 |     | 16 |     |
| 障害     | 22 |     | 37 |     |
| 罹患     | 22 |     | 27 |     |
| 主観     | 39 |     | 32 |     |
| 死亡     | 6  |     | 1  |     |
| 総合健康指標 | 23 |     | 28 |     |

## 習慣

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 運動不足       | 0,583 | 32  | 1.107 | 0,627 | 25  | 1.023 |
| カロリーバランス悪い | 0,240 | 38  | 1.115 | 0,227 | 31  | 1.022 |
| 高脂肪エネルギー比  | 0,398 | 5   | 0.778 | 0,546 | 13  | 0.899 |
| カルシウム不足    | 0,610 | 21  | 0.983 | 0,630 | 20  | 0.984 |
| 繊維不足       | 0,746 | 16  | 0.971 | 0,779 | 22  | 0.986 |
| 朝食抜き       | 0,167 | 34  | 1.002 | 0,101 | 26  | 0.926 |

## 行動

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 規則正しい食事    | 0,560 | 15  | 1.057 | 0,668 | 9   | 1.040 |
| バランスのとれた食事 | 0,339 | 33  | 0.972 | 0,407 | 35  | 0.953 |
| 定期的に運動     | 0,269 | 30  | 0.987 | 0,216 | 30  | 0.972 |
| 気分転換の時間有   | 0,290 | 29  | 0.976 | 0,262 | 34  | 0.918 |
| 十分な睡眠時間    | 0,454 | 25  | 1.007 | 0,467 | 31  | 0.986 |
| 全部実行       | 0,066 | 17  | 1.025 | 0,056 | 36  | 0.905 |

## 要因

|                | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|----------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 肥満(BMIが30以上の者) | 0,183 | 11  | 0.918 | 0,179 | 17  | 0.958 |
| 高血圧(BPH140以上)  | 0,269 | 3   | 0.830 | 0,198 | 2   | 0.813 |
| HDL不足          | 0,192 | 22  | 0.981 | 0,072 | 22  | 1.017 |
| 血糖値高           | 0,024 | 2   | 0.414 | 0,041 | 30  | 1.117 |
| 喫煙             | 0,644 | 47  | 1.172 | 0,087 | 26  | 0.839 |
| 飲酒             | 0,539 | 26  | 1.022 | 0,066 | 29  | 0.881 |

## 介入

|           | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|           | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 健診受診率高    | 0,589 | 37  | 0.939 | 0,497 | 32  | 0.930 |
| かかりつけ医有   | 0,628 | 1   | 1.137 | 0,703 | 1   | 1.108 |
| アクセス良     | 0,651 | 41  | 0.945 | 0,679 | 41  | 0.945 |
| 高血圧未把握    | 0,292 | 36  | 1.150 | 0,202 | 33  | 1.068 |
| 高血圧コントロール | 0,296 | 1   | 0.655 | 0,352 | 4   | 0.823 |
| 癌検診結果未把握率 | 0,037 | 41  | 1.424 | 0,015 | 42  | 1.418 |

## 罹患

|             | 男性      |     |       | 女性      |     |       |
|-------------|---------|-----|-------|---------|-----|-------|
|             | 実数      | ランク | 全国比   | 実数      | ランク | 全国比   |
| 総患者0歳-14歳   | 34,576  | 23  | 0.975 | 32,936  | 37  | 1.109 |
| 総患者15歳-64歳  | 32,456  | 19  | 0.993 | 41,989  | 17  | 0.970 |
| 総患者65歳以上    | 106,962 | 11  | 0.885 | 115,255 | 9   | 0.838 |
| 退院患者0歳-14歳  | 608     | 13  | 0.884 | 536     | 21  | 0.943 |
| 退院患者15歳-64歳 | 785     | 38  | 1.277 | 854     | 36  | 1.140 |
| 退院患者65歳以上   | 2,353   | 37  | 1.123 | 1,823   | 44  | 1.294 |

## 障害



|           | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|           | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 寝たきり全体    | 790   | 22  | 1.155 | 1,614 | 34  | 1.382 |
| 寝たきり在宅率   | 0,116 | 33  | 0.746 | 0,132 | 24  | 1.004 |
| 寝たきり65歳以上 | 4078  | 23  | 1.032 | 7,195 | 34  | 1.189 |
| 寝たきり脳卒中   | 245   | 27  | 1.318 | 345   | 23  | 1.196 |
| 寝たきり骨折    | 10    | 11  | 0.465 | 117   | 42  | 2.006 |
| 軽い障害(在宅)  | 811   | 26  | 1.264 | 1,297 | 45  | 1.524 |

## 死亡

|             | 男性     |     |       | 女性     |     |       |
|-------------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|             | 実数     | ランク | 全国比   | 実数     | ランク | 全国比   |
| 健康寿命        | 75,503 | 2   | 1.027 | 81,309 | 4   | 1.013 |
| 全LSM0歳-64歳  | 14,774 | 3   | 0.900 | 7,402  | 3   | 0.910 |
| 癌LSM0歳-64歳  | 5,176  | 3   | 0.882 | 3,151  | 6   | 0.893 |
| 事故LSM0歳-64歳 | 1,912  | 31  | 1.176 | 630    | 41  | 1.202 |
| 自殺LSM0歳-64歳 | 1,242  | 20  | 0.982 | 436    | 3   | 0.877 |
| 乳児死亡率       | 4,164  | 31  | 1.134 | 2,519  | 9   | 0.811 |

## 主観









|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 自覚有        | 0,285 | 42  | 1.102 | 0,339 | 36  | 1.050 |
| 健康状態良全     | 0,909 | 7   | 0.989 | 0,892 | 10  | 0.991 |
| 健康状態良65歳以上 | 0,799 | 10  | 0.981 | 0,765 | 7   | 0.965 |
| 生活に支障全年齢   | 0,087 | 36  | 1.098 | 0,096 | 25  | 1.028 |
| 生活に支障65歳以上 | 0,216 | 25  | 1.013 | 0,243 | 31  | 1.031 |
| ストレス       | 0,358 | 21  | 0.972 | 0,403 | 12  | 0.941 |



# 山梨県

男性

女性



# 山梨県

## 基本指標

|                | 男性     |     |       | 女性    |     |       |
|----------------|--------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | 実数     | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| LSM1(IMR)      | 5,386  | 44  | 1.467 | 3,706 | 37  | 1.193 |
| LSM5(U5MR)     | 6,557  | 41  | 1.276 | 5,435 | 42  | 1.267 |
| LSM65          | 16,935 | 28  | 1.031 | 7,992 | 22  | 0.983 |
| LSM三大疾患        | 9,453  | 29  | 1.008 | 4,744 | 12  | 0.937 |
| 寝たきりのもの全体      | 730    | 19  | 1.068 | 1,172 | 17  | 1.003 |
| 障害者全体          | 536    | 4   | 0.835 | 862   | 16  | 1.013 |
| 煙草             | 0.547  | 17  | 0.995 | 0.071 | 16  | 0.679 |
| 飲酒(1合以上)       | 0.535  | 23  | 1.015 | 0.064 | 26  | 0.845 |
| 肥満(BMIが30以上の者) | 0.237  | 41  | 1.186 | 0.196 | 31  | 1.053 |
| 高血圧(BPH140以上)  | 0.367  | 38  | 1.132 | 0.320 | 47  | 1.316 |
| 健康行動すべて実行      | 0.078  | 2   | 1.217 | 0.070 | 8   | 1.133 |

## 総合指標順位

|        | 男性 |     | 女性 |
|--------|----|-----|----|
|        | 実数 | ランク |    |
| 行動     | 4  | 8   |    |
| 習慣     | 26 | 12  |    |
| 介入     | 41 | 39  |    |
| 要因     | 43 | 42  |    |
| 障害     | 16 | 18  |    |
| 罹患     | 6  | 4   |    |
| 主観     | 2  | 3   |    |
| 死亡     | 24 | 14  |    |
| 総合健康指標 | 15 | 6   |    |

## 習慣

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 運動不足       | 0.601 | 35  | 1.140 | 0.644 | 29  | 1.050 |
| カロリーバランス悪い | 0.259 | 46  | 1.202 | 0.223 | 28  | 1.004 |
| 高脂肪エネルギー比  | 0.477 | 23  | 0.932 | 0.606 | 31  | 0.997 |
| カルシウム不足    | 0.592 | 13  | 0.954 | 0.652 | 28  | 1.018 |
| 繊維不足       | 0.695 | 5   | 0.905 | 0.749 | 11  | 0.948 |
| 朝食抜き       | 0.127 | 6   | 0.760 | 0.078 | 2   | 0.711 |

## 行動

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 規則正しい食事    | 0.569 | 6   | 1.073 | 0.682 | 5   | 1.062 |
| バランスのとれた食事 | 0.370 | 7   | 1.059 | 0.467 | 5   | 1.094 |
| 定期的に運動     | 0.290 | 6   | 1.063 | 0.222 | 23  | 0.998 |
| 気分転換の時間有   | 0.319 | 5   | 1.074 | 0.292 | 19  | 1.023 |
| 十分な睡眠時間    | 0.453 | 27  | 1.004 | 0.471 | 29  | 0.996 |
| 全部実行       | 0.078 | 2   | 1.217 | 0.070 | 8   | 1.133 |

## 要因

|                | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|----------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 肥満(BMIが30以上の者) | 0.237 | 41  | 1.186 | 0.196 | 31  | 1.053 |
| 高血圧(BPH140以上)  | 0.367 | 38  | 1.132 | 0.320 | 47  | 1.316 |
| HDL不足          | 0.228 | 43  | 1.164 | 0.098 | 44  | 1.378 |
| 血糖値高           | 0.071 | 40  | 1.223 | 0.052 | 47  | 1.420 |
| 喫煙             | 0.547 | 17  | 0.995 | 0.071 | 16  | 0.679 |
| 飲酒             | 0.535 | 23  | 1.015 | 0.064 | 26  | 0.845 |

## 介入

|           | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|           | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 健診受診率高    | 0.623 | 23  | 0.993 | 0.543 | 23  | 1.015 |
| かかりつけ医有   | 0.518 | 39  | 0.938 | 0.604 | 38  | 0.951 |
| アクセス良     | 0.695 | 24  | 1.010 | 0.724 | 21  | 1.007 |
| 高血圧未把握    | 0.315 | 46  | 1.241 | 0.203 | 34  | 1.073 |
| 高血圧コントロール | 0.477 | 31  | 1.054 | 0.554 | 43  | 1.297 |
| 癌検診結果未把握率 | 0.031 | 33  | 1.169 | 0.013 | 38  | 1.272 |

## 罹患

|             | 男性    |     |       | 女性     |     |       |
|-------------|-------|-----|-------|--------|-----|-------|
|             | 実数    | ランク | 全国比   | 実数     | ランク | 全国比   |
| 総患者0歳-14歳   | 36042 | 27  | 1.016 | 31805  | 31  | 1.071 |
| 総患者15歳-64歳  | 27818 | 5   | 0.851 | 36352  | 3   | 0.840 |
| 総患者65歳以上    | 93696 | 4   | 0.775 | 107276 | 5   | 0.780 |
| 退院患者0歳-14歳  | 692   | 25  | 1.007 | 520    | 19  | 0.914 |
| 退院患者15歳-64歳 | 549   | 8   | 0.893 | 635    | 4   | 0.847 |
| 退院患者65歳以上   | 1601  | 1   | 0.765 | 1196   | 7   | 0.849 |

## 障害



|           | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|           | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 寝たきり全体    | 730   | 19  | 1.068 | 1,172 | 17  | 1.003 |
| 寝たきり在宅率   | 0.141 | 26  | 0.908 | 0.126 | 25  | 0.959 |
| 寝たきり65歳以上 | 3722  | 20  | 0.942 | 5254  | 13  | 0.868 |
| 寝たきり脳卒中   | 208   | 17  | 1.115 | 207   | 6   | 0.718 |
| 寝たきり骨折    | 12    | 13  | 0.546 | 88    | 32  | 1.510 |
| 軽い障害(在宅)  | 536   | 4   | 0.835 | 862   | 16  | 1.013 |

## 死亡

|             | 男性     |     |       | 女性     |     |       |
|-------------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|             | 実数     | ランク | 全国比   | 実数     | ランク | 全国比   |
| 健康寿命        | 75,381 | 5   | 1.026 | 81,815 | 2   | 1.006 |
| 全LSM0歳-64歳  | 16,935 | 28  | 1.031 | 7,992  | 21  | 0.983 |
| 癌LSM0歳-64歳  | 5,647  | 22  | 0.963 | 3,248  | 9   | 0.921 |
| 事故LSM0歳-64歳 | 1,832  | 25  | 1.127 | 472    | 8   | 0.900 |
| 自殺LSM0歳-64歳 | 1,438  | 30  | 1.137 | 615    | 44  | 1.236 |
| 乳児死亡率       | 5,386  | 44  | 1.467 | 3,706  | 37  | 1.193 |

## 主観









|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 自覚有        | 0.220 | 2   | 0.849 | 0.276 | 2   | 0.852 |
| 健康状態良全     | 0.936 | 45  | 1.019 | 0.915 | 42  | 1.016 |
| 健康状態良65歳以上 | 0.853 | 43  | 1.047 | 0.825 | 42  | 1.042 |
| 生活に支障全年齢   | 0.072 | 9   | 0.902 | 0.083 | 9   | 0.887 |
| 生活に支障65歳以上 | 0.196 | 11  | 0.921 | 0.213 | 8   | 0.903 |
| ストレス       | 0.322 | 2   | 0.876 | 0.377 | 4   | 0.881 |



# 長野県

男性

女性



# 長野県

## 基本指標

|                | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|----------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| LSM1(IMR)      | 2,625 | 3   | 0.715 | 2,575 | 11  | 0.829 |
| LSM5(U5MR)     | 3,562 | 3   | 0.693 | 3,763 | 11  | 0.877 |
| LSM65          | 13906 | 1   | 0.847 | 7367  | 2   | 0.906 |
| LSM三大疾患        | 7933  | 1   | 0.846 | 4580  | 5   | 0.905 |
| 寝たきりのもの全体      | 659   | 16  | 0.964 | 1326  | 19  | 1.135 |
| 障害者全体          | 716   | 19  | 1.116 | 939   | 17  | 1.103 |
| 煙草             | 0.536 | 11  | 0.975 | 0.086 | 25  | 0.824 |
| 飲酒(1合以上)       | 0.558 | 33  | 1.057 | 0.054 | 10  | 0.724 |
| 肥満(BMIが30以上の者) | 0.196 | 21  | 0.979 | 0.187 | 23  | 1.004 |
| 高血圧(BPH140以上)  | 0.422 | 47  | 1.304 | 0.317 | 46  | 1.302 |
| 健康行動すべて実行      | 0.071 | 10  | 1.106 | 0.075 | 2   | 1.215 |

## 総合指標順位

|        | 男性 |     |     | 女性 |     |     |
|--------|----|-----|-----|----|-----|-----|
|        | 実数 | ランク | 全国比 | 実数 | ランク | 全国比 |
| 行動     | 6  |     |     | 1  |     |     |
| 習慣     | 11 |     |     | 13 |     |     |
| 介入     | 17 |     |     | 18 |     |     |
| 要因     | 14 |     |     | 20 |     |     |
| 障害     | 15 |     |     | 17 |     |     |
| 罹患     | 9  |     |     | 10 |     |     |
| 主観     | 24 |     |     | 18 |     |     |
| 死亡     | 1  |     |     | 2  |     |     |
| 総合健康指標 | 1  |     |     | 2  |     |     |

## 習慣

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 運動不足       | 0.604 | 39  | 1.146 | 0.648 | 32  | 1.057 |
| カロリーバランス悪い | 0.216 | 23  | 1.003 | 0.217 | 24  | 0.979 |
| 高脂肪エネルギー比  | 0.476 | 22  | 0.930 | 0.636 | 40  | 1.048 |
| カルシウム不足    | 0.595 | 14  | 0.958 | 0.609 | 10  | 0.951 |
| 繊維不足       | 0.731 | 12  | 0.952 | 0.759 | 13  | 0.961 |
| 朝食抜き       | 0.112 | 1   | 0.675 | 0.080 | 5   | 0.735 |

## 行動

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 規則正しい食事    | 0.567 | 8   | 1.070 | 0.689 | 4   | 1.073 |
| バランスのとれた食事 | 0.383 | 2   | 1.098 | 0.464 | 6   | 1.086 |
| 定期的に運動     | 0.281 | 19  | 1.032 | 0.241 | 12  | 1.086 |
| 気分転換の時間有   | 0.333 | 4   | 1.121 | 0.326 | 5   | 1.142 |
| 十分な睡眠時間    | 0.461 | 18  | 1.023 | 0.487 | 14  | 1.028 |
| 全部実行       | 0.071 | 10  | 1.106 | 0.075 | 2   | 1.215 |

## 要因

|                | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|----------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 肥満(BMIが30以上の者) | 0.196 | 21  | 0.979 | 0.187 | 23  | 1.004 |
| 高血圧(BPH140以上)  | 0.422 | 47  | 1.304 | 0.317 | 46  | 1.302 |
| HDL不足          | 0.155 | 5   | 0.789 | 0.062 | 11  | 0.880 |
| 血糖値高           | 0.039 | 5   | 0.665 | 0.026 | 4   | 0.706 |
| 喫煙             | 0.536 | 11  | 0.975 | 0.086 | 25  | 0.824 |
| 飲酒             | 0.558 | 33  | 1.057 | 0.054 | 10  | 0.724 |

## 介入

|           | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|           | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 健診受診率高    | 0.674 | 10  | 1.074 | 0.586 | 11  | 1.096 |
| かかりつけ医有   | 0.587 | 12  | 1.062 | 0.666 | 11  | 1.049 |
| アクセス良     | 0.670 | 32  | 0.973 | 0.685 | 39  | 0.954 |
| 高血圧未把握    | 0.233 | 11  | 0.918 | 0.178 | 15  | 0.941 |
| 高血圧コントロール | 0.506 | 37  | 1.118 | 0.431 | 29  | 1.008 |
| 癌検診結果未把握率 | 0.023 | 17  | 0.874 | 0.007 | 11  | 0.673 |

## 罹患

|             | 男性    |     |       | 女性     |     |       |
|-------------|-------|-----|-------|--------|-----|-------|
|             | 実数    | ランク | 全国比   | 実数     | ランク | 全国比   |
| 総患者0歳-14歳   | 26395 | 4   | 0.744 | 21005  | 3   | 0.707 |
| 総患者15歳-64歳  | 27570 | 4   | 0.843 | 38033  | 6   | 0.879 |
| 総患者65歳以上    | 91001 | 3   | 0.753 | 101947 | 4   | 0.741 |
| 退院患者0歳-14歳  | 908   | 40  | 1.322 | 768    | 40  | 1.352 |
| 退院患者15歳-64歳 | 674   | 28  | 1.096 | 849    | 35  | 1.133 |
| 退院患者65歳以上   | 1974  | 16  | 0.943 | 1341   | 18  | 0.952 |

## 障害



|           | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|           | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 寝たきり全体    | 659   | 16  | 0.964 | 1326  | 19  | 1.135 |
| 寝たきり在宅率   | 0.156 | 25  | 1.001 | 0.264 | 2   | 2.005 |
| 寝たきり65歳以上 | 3113  | 7   | 0.788 | 5506  | 16  | 0.910 |
| 寝たきり脳卒中   | 195   | 15  | 1.050 | 335   | 20  | 1.159 |
| 寝たきり骨折    | 19    | 19  | 0.875 | 91    | 36  | 1.569 |
| 軽い障害(在宅)  | 716   | 19  | 1.116 | 939   | 17  | 1.103 |

## 死亡

|             | 男性     |     |       | 女性     |     |       |
|-------------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|             | 実数     | ランク | 全国比   | 実数     | ランク | 全国比   |
| 健康寿命        | 75,411 | 4   | 1.026 | 80,689 | 12  | 0.986 |
| 全LSM0歳-64歳  | 13906  | 1   | 0.847 | 7367   | 2   | 0.906 |
| 癌LSM0歳-64歳  | 4599   | 1   | 0.784 | 3144   | 5   | 0.891 |
| 事故LSM0歳-64歳 | 1601   | 12  | 0.985 | 475    | 9   | 0.907 |
| 自殺LSM0歳-64歳 | 1237   | 19  | 0.978 | 581    | 41  | 1.168 |
| 乳児死亡率       | 2.625  | 3   | 0.715 | 2.575  | 11  | 0.829 |

## 主観









|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 自覚有        | 0.258 | 21  | 0.997 | 0.314 | 14  | 0.970 |
| 健康状態良全     | 0.920 | 27  | 1.001 | 0.901 | 28  | 1.002 |
| 健康状態良65歳以上 | 0.818 | 28  | 1.004 | 0.805 | 30  | 1.016 |
| 生活に支障全年齢   | 0.088 | 39  | 1.115 | 0.103 | 36  | 1.101 |
| 生活に支障65歳以上 | 0.214 | 24  | 1.004 | 0.240 | 27  | 1.019 |
| ストレス       | 0.371 | 25  | 1.009 | 0.415 | 19  | 0.968 |



# 岐阜県

男性

女性



# 岐阜県

## 基本指標

|                | 男性     |     |       | 女性    |     |       |
|----------------|--------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | 実数     | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| LSM1(JMR)      | 3,970  | 28  | 1.081 | 2,850 | 21  | 0.917 |
| LSM5(U5MR)     | 5,132  | 23  | 0.998 | 3,766 | 12  | 0.878 |
| LSM65          | 15,218 | 6   | 0.927 | 8,240 | 34  | 1.013 |
| LSM三大疾患        | 8,823  | 11  | 0.941 | 5,242 | 41  | 1.036 |
| 寝たきりのもの全体      | 592    | 10  | 0.866 | 1,024 | 11  | 0.877 |
| 障害者全体          | 771    | 24  | 1.201 | 798   | 11  | 0.938 |
| 喫煙             | 0,600  | 42  | 1.090 | 0,089 | 27  | 0.853 |
| 飲酒(1合以上)       | 0,504  | 12  | 0.956 | 0,056 | 16  | 0.745 |
| 肥満(BMIが30以上の者) | 0,164  | 2   | 0.822 | 0,172 | 8   | 0.920 |
| 高血圧(BPH140以上)  | 0,267  | 2   | 0.823 | 0,220 | 8   | 0.905 |
| 健康行動すべて実行      | 0,055  | 43  | 0.863 | 0,048 | 46  | 0.780 |

## 総合指標順位

|        | 男性 |     |     | 女性 |     |     |
|--------|----|-----|-----|----|-----|-----|
|        | 実数 | ランク | 全国比 | 実数 | ランク | 全国比 |
| 行動     | 43 |     |     | 44 |     |     |
| 習慣     | 3  |     |     | 2  |     |     |
| 介入     | 10 |     |     | 16 |     |     |
| 要因     | 16 |     |     | 4  |     |     |
| 障害     | 6  |     |     | 12 |     |     |
| 罹患     | 14 |     |     | 15 |     |     |
| 主観     | 31 |     |     | 24 |     |     |
| 死亡     | 5  |     |     | 35 |     |     |
| 総合健康指標 | 8  |     |     | 15 |     |     |

## 習慣

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 運動不足       | 0,563 | 27  | 1.068 | 0,602 | 15  | 0.982 |
| カロリーバランス悪い | 0,211 | 19  | 0.982 | 0,194 | 12  | 0.874 |
| 高脂肪エネルギー比  | 0,457 | 14  | 0.894 | 0,526 | 7   | 0.867 |
| カルシウム不足    | 0,614 | 23  | 0.990 | 0,664 | 34  | 1.037 |
| 繊維不足       | 0,727 | 10  | 0.947 | 0,761 | 16  | 0.963 |
| 朝食抜き       | 0,126 | 4   | 0.755 | 0,078 | 3   | 0.712 |

## 行動

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 規則正しい食事    | 0,521 | 32  | 0.983 | 0,643 | 28  | 1.001 |
| バランスのとれた食事 | 0,337 | 34  | 0.964 | 0,404 | 37  | 0.945 |
| 定期的に運動     | 0,262 | 36  | 0.960 | 0,201 | 39  | 0.906 |
| 気分転換の時間有   | 0,278 | 36  | 0.935 | 0,257 | 37  | 0.900 |
| 十分な睡眠時間    | 0,434 | 36  | 0.963 | 0,450 | 38  | 0.951 |
| 全部実行       | 0,055 | 43  | 0.863 | 0,048 | 46  | 0.780 |

## 要因

|                | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|----------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 肥満(BMIが30以上の者) | 0,164 | 2   | 0.822 | 0,172 | 8   | 0.920 |
| 高血圧(BPH140以上)  | 0,267 | 2   | 0.823 | 0,220 | 8   | 0.905 |
| HDL不足          | 0,218 | 36  | 1.112 | 0,081 | 31  | 1.141 |
| 血糖値高           | 0,065 | 31  | 1.117 | 0,028 | 6   | 0.765 |
| 喫煙             | 0,600 | 42  | 1.090 | 0,089 | 27  | 0.853 |
| 飲酒             | 0,504 | 12  | 0.956 | 0,056 | 16  | 0.745 |

## 介入

|           | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|           | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 健診受診率高    | 0,613 | 27  | 0.977 | 0,501 | 31  | 0.937 |
| かかりつけ医有   | 0,587 | 10  | 1.063 | 0,676 | 6   | 1.065 |
| アクセス良     | 0,707 | 14  | 1.027 | 0,695 | 33  | 0.967 |
| 高血圧未把握    | 0,235 | 15  | 0.923 | 0,172 | 13  | 0.908 |
| 高血圧コントロール | 0,486 | 32  | 1.073 | 0,420 | 24  | 0.983 |
| 癌検診結果未把握率 | 0,019 | 11  | 0.727 | 0,006 | 5   | 0.549 |

## 罹患

|             | 男性      |     |       | 女性      |     |       |
|-------------|---------|-----|-------|---------|-----|-------|
|             | 実数      | ランク | 全国比   | 実数      | ランク | 全国比   |
| 総患者0歳-14歳   | 33,352  | 20  | 0.941 | 26,924  | 19  | 0.907 |
| 総患者15歳-64歳  | 32,343  | 18  | 0.989 | 41,722  | 16  | 0.964 |
| 総患者65歳以上    | 110,688 | 15  | 0.916 | 129,179 | 19  | 0.939 |
| 退院患者0歳-14歳  | 701     | 27  | 1.021 | 597     | 32  | 1.051 |
| 退院患者15歳-64歳 | 566     | 11  | 0.921 | 689     | 7   | 0.919 |
| 退院患者65歳以上   | 1,888   | 10  | 0.902 | 1,295   | 16  | 0.919 |

## 障害



|           | 男性     |     |       | 女性     |     |       |
|-----------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|           | 実数     | ランク | 全国比   | 実数     | ランク | 全国比   |
| 寝たきり全体    | 592    | 10  | 0.866 | 1,024  | 11  | 0.877 |
| 寝たきり在宅率   | 0,124  | 30  | 0.799 | 0,232  | 4   | 1.761 |
| 寝たきり65歳以上 | 30,165 | 5   | 0.763 | 50,210 | 10  | 0.830 |
| 寝たきり脳卒中   | 165    | 10  | 0.884 | 352    | 27  | 1.219 |
| 寝たきり骨折    | 7      | 4   | 0.307 | 86     | 29  | 1.476 |
| 軽い障害(在宅)  | 771    | 24  | 1.201 | 798    | 11  | 0.938 |

## 死亡

|             | 男性     |     |       | 女性     |     |       |
|-------------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|             | 実数     | ランク | 全国比   | 実数     | ランク | 全国比   |
| 健康寿命        | 74,781 | 12  | 1.017 | 80,388 | 18  | 0.996 |
| 全LSM0歳-64歳  | 15,218 | 6   | 0.927 | 8,240  | 34  | 1.013 |
| 癌LSM0歳-64歳  | 5,444  | 11  | 0.928 | 3,589  | 36  | 1.017 |
| 事故LSM0歳-64歳 | 1,641  | 14  | 1.009 | 601    | 36  | 1.146 |
| 自殺LSM0歳-64歳 | 1,115  | 8   | 0.881 | 502    | 27  | 1.010 |
| 乳児死亡率       | 3,970  | 28  | 1.081 | 2,850  | 21  | 0.917 |

## 主観

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 自覚有        | 0,280 | 38  | 1.081 | 0,346 | 39  | 1.071 |
| 健康状態良全     | 0,918 | 24  | 0.999 | 0,903 | 30  | 1.003 |
| 健康状態良65歳以上 | 0,803 | 14  | 0.985 | 0,795 | 25  | 1.004 |
| 生活に支障全年齢   | 0,074 | 11  | 0.928 | 0,086 | 12  | 0.914 |
| 生活に支障65歳以上 | 0,217 | 26  | 1.017 | 0,230 | 18  | 0.974 |
| ストレス       | 0,382 | 33  | 1.038 | 0,439 | 28  | 1.024 |













# 静岡県

男性

女性



# 静岡県

## 基本指標

|                | 男性     |     |       | 女性    |     |       |
|----------------|--------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | 実数     | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| LSM1(IMR)      | 3,587  | 20  | 0.977 | 2,663 | 14  | 0.857 |
| LSM5(U5MR)     | 4,967  | 18  | 0.966 | 4,283 | 27  | 0.998 |
| LSM65          | 15,851 | 19  | 0.965 | 7,783 | 13  | 0.957 |
| LSM三大疾患        | 9,282  | 24  | 0.990 | 4,915 | 22  | 0.971 |
| 寝たきりのもの全体      | 539    | 6   | 0.788 | 936   | 8   | 0.801 |
| 障害者全体          | 563    | 7   | 0.877 | 756   | 7   | 0.888 |
| 煙草             | 0,555  | 23  | 1.008 | 0,097 | 34  | 0.937 |
| 飲酒(1合以上)       | 0,510  | 14  | 0.967 | 0,066 | 28  | 0.876 |
| 肥満(BMIが30以上の者) | 0.162  | 1   | 0.812 | 0.157 | 3   | 0.842 |
| 高血圧(BPH140以上)  | 0.295  | 6   | 0.910 | 0.254 | 28  | 1.042 |
| 健康行動すべて実行      | 0.070  | 11  | 1.094 | 0.066 | 12  | 1.074 |

## 総合指標順位

|        | 男性 |     |     | 女性 |     |     |
|--------|----|-----|-----|----|-----|-----|
|        | 実数 | ランク | 全国比 | 実数 | ランク | 全国比 |
| 行動     | 17 |     |     | 13 |     |     |
| 習慣     | 13 |     |     | 6  |     |     |
| 介入     | 12 |     |     | 21 |     |     |
| 要因     | 5  |     |     | 18 |     |     |
| 障害     | 12 |     |     | 4  |     |     |
| 罹患     | 8  |     |     | 1  |     |     |
| 主観     | 14 |     |     | 7  |     |     |
| 死亡     | 16 |     |     | 6  |     |     |
| 総合健康指標 | 3  |     |     | 1  |     |     |

## 習慣

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 運動不足       | 0.512 | 9   | 0.971 | 0.586 | 11  | 0.956 |
| カロリーバランス悪い | 0.247 | 43  | 1.148 | 0.215 | 22  | 0.967 |
| 高脂肪エネルギー比  | 0.502 | 30  | 0.981 | 0.611 | 32  | 1.006 |
| カルシウム不足    | 0.612 | 22  | 0.987 | 0.592 | 5   | 0.924 |
| 繊維不足       | 0.743 | 15  | 0.967 | 0.796 | 27  | 1.008 |
| 朝食抜き       | 0.133 | 10  | 0.796 | 0.089 | 12  | 0.817 |

## 行動

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 規則正しい食事    | 0.550 | 18  | 1.039 | 0.681 | 6   | 1.061 |
| バランスのとれた食事 | 0.347 | 26  | 0.994 | 0.433 | 19  | 1.014 |
| 定期的に運動     | 0.279 | 21  | 1.023 | 0.228 | 18  | 1.027 |
| 気分転換の時間有   | 0.310 | 13  | 1.042 | 0.295 | 15  | 1.032 |
| 十分な睡眠時間    | 0.445 | 32  | 0.986 | 0.463 | 33  | 0.979 |
| 全部実行       | 0.070 | 11  | 1.094 | 0.066 | 12  | 1.074 |

## 要因

|                | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|----------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 肥満(BMIが30以上の者) | 0.162 | 1   | 0.812 | 0.157 | 3   | 0.842 |
| 高血圧(BPH140以上)  | 0.295 | 6   | 0.910 | 0.254 | 28  | 1.042 |
| HDL不足          | 0.178 | 12  | 0.907 | 0.046 | 1   | 0.646 |
| 血糖値高           | 0.066 | 34  | 1.133 | 0.039 | 27  | 1.058 |
| 喫煙             | 0.555 | 23  | 1.008 | 0.097 | 34  | 0.937 |
| 飲酒             | 0.510 | 14  | 0.967 | 0.066 | 28  | 0.876 |

## 介入

|           | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|           | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 健診受診率高    | 0.651 | 14  | 1.038 | 0.569 | 14  | 1.064 |
| かかりつけ医有   | 0.530 | 34  | 0.960 | 0.618 | 34  | 0.974 |
| アクセス良     | 0.715 | 8   | 1.038 | 0.726 | 20  | 1.010 |
| 高血圧未把握    | 0.224 | 9   | 0.881 | 0.186 | 20  | 0.979 |
| 高血圧コントロール | 0.495 | 35  | 1.093 | 0.414 | 21  | 0.969 |
| 癌検診結果未把握率 | 0.022 | 15  | 0.828 | 0.010 | 22  | 0.913 |

## 罹患

|             | 男性     |     |       | 女性      |     |       |
|-------------|--------|-----|-------|---------|-----|-------|
|             | 実数     | ランク | 全国比   | 実数      | ランク | 全国比   |
| 総患者0歳-14歳   | 33,393 | 21  | 0.942 | 24,629  | 10  | 0.829 |
| 総患者15歳-64歳  | 30,717 | 11  | 0.940 | 38,421  | 7   | 0.888 |
| 総患者65歳以上    | 99,906 | 8   | 0.827 | 114,475 | 8   | 0.832 |
| 退院患者0歳-14歳  | 525    | 6   | 0.764 | 428     | 3   | 0.753 |
| 退院患者15歳-64歳 | 543    | 7   | 0.884 | 665     | 5   | 0.887 |
| 退院患者65歳以上   | 2,061  | 22  | 0.984 | 12,110  | 9   | 0.859 |

## 障害



|           | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|           | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 寝たきり全体    | 539   | 6   | 0.788 | 936   | 8   | 0.801 |
| 寝たきり在宅率   | 0.181 | 18  | 1.162 | 0.139 | 20  | 1.052 |
| 寝たきり65歳以上 | 3,106 | 6   | 0.786 | 4,700 | 4   | 0.777 |
| 寝たきり脳卒中   | 191   | 14  | 1.026 | 234   | 9   | 0.809 |
| 寝たきり骨折    | 53    | 39  | 2.425 | 29    | 4   | 0.505 |
| 軽い障害(在宅)  | 563   | 7   | 0.877 | 756   | 7   | 0.888 |

## 死亡

|             | 男性     |     |       | 女性     |     |       |
|-------------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|             | 実数     | ランク | 全国比   | 実数     | ランク | 全国比   |
| 健康寿命        | 74,440 | 18  | 1.013 | 80,217 | 26  | 0.998 |
| 全LSM0歳-64歳  | 15,851 | 19  | 0.965 | 7,783  | 13  | 0.957 |
| 推LSM0歳-64歳  | 5,801  | 30  | 0.989 | 3,345  | 21  | 0.948 |
| 事故LSM0歳-64歳 | 1,590  | 11  | 0.978 | 501    | 14  | 0.956 |
| 自殺LSM0歳-64歳 | 1,109  | 6   | 0.876 | 415    | 1   | 0.835 |
| 乳児死亡率       | 3,587  | 20  | 0.977 | 2,663  | 14  | 0.857 |

## 主観









|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 自覚有        | 0.248 | 12  | 0.958 | 0.303 | 9   | 0.937 |
| 健康状態良全     | 0.923 | 34  | 1.005 | 0.916 | 44  | 1.018 |
| 健康状態良65歳以上 | 0.836 | 35  | 1.025 | 0.845 | 46  | 1.067 |
| 生活に支障全年齢   | 0.076 | 14  | 0.960 | 0.084 | 10  | 0.896 |
| 生活に支障65歳以上 | 0.212 | 23  | 0.994 | 0.206 | 3   | 0.874 |
| ストレス       | 0.387 | 35  | 1.052 | 0.447 | 35  | 1.044 |



# 愛知県

男性

女性



# 愛知県

## 基本指標

|                | 男性     |     |       | 女性    |     |       |
|----------------|--------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | 実数     | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| LSM1(IMR)      | 3,458  | 17  | 0.942 | 3,570 | 34  | 1,149 |
| LSM5(U5MR)     | 4,620  | 12  | 0.899 | 4,769 | 33  | 1,112 |
| LSM65          | 15,431 | 11  | 0.940 | 8,172 | 32  | 1,005 |
| LSM三大疾患        | 9,256  | 23  | 0.987 | 5,264 | 43  | 1,040 |
| 寝たきりのもの全体      | 539    | 7   | 0.789 | 938   | 9   | 0.803 |
| 障害者全体          | 452    | 3   | 0.704 | 615   | 1   | 0.722 |
| 煙草             | 0,555  | 24  | 1,009 | 0,109 | 37  | 1,045 |
| 飲酒(1合以上)       | 0,515  | 16  | 0,977 | 0,079 | 35  | 1,045 |
| 肥満(BMIが30以上の者) | 0,173  | 4   | 0,863 | 0,171 | 7   | 0,918 |
| 高血圧(BPH140以上)  | 0,277  | 5   | 0,854 | 0,219 | 6   | 0,900 |
| 健康行動すべて実行      | 0,059  | 33  | 0,925 | 0,058 | 31  | 0,948 |

## 総合指標順位

|        | 男性 |     | 女性 |
|--------|----|-----|----|
|        | 実数 | ランク |    |
| 行動     | 35 |     | 29 |
| 習慣     | 6  |     | 24 |
| 介入     | 31 |     | 35 |
| 要因     | 3  |     | 15 |
| 障害     | 9  |     | 8  |
| 罹患     | 21 |     | 31 |
| 主観     | 15 |     | 11 |
| 死亡     | 14 |     | 39 |
| 総合健康指標 | 10 |     | 24 |

## 習慣

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 運動不足       | 0,509 | 8   | 0,965 | 0,595 | 14  | 0,971 |
| カロリーバランス悪い | 0,192 | 9   | 0,890 | 0,224 | 29  | 1,011 |
| 高脂肪エネルギー比  | 0,556 | 41  | 1,086 | 0,650 | 42  | 1,070 |
| カルシウム不足    | 0,644 | 36  | 1,038 | 0,653 | 29  | 1,020 |
| 繊維不足       | 0,803 | 29  | 1,045 | 0,806 | 28  | 1,020 |
| 朝食抜き       | 0,137 | 14  | 0,824 | 0,092 | 19  | 0,842 |

## 行動

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 規則正しい食事    | 0,506 | 38  | 0,955 | 0,633 | 33  | 0,985 |
| バランスのとれた食事 | 0,346 | 28  | 0,990 | 0,431 | 21  | 1,009 |
| 定期的に運動     | 0,273 | 28  | 1,002 | 0,225 | 20  | 1,012 |
| 気分転換の時間有   | 0,306 | 18  | 1,029 | 0,297 | 14  | 1,040 |
| 十分な睡眠時間    | 0,430 | 37  | 0,954 | 0,464 | 32  | 0,979 |
| 全部実行       | 0,059 | 33  | 0,925 | 0,058 | 31  | 0,948 |

## 要因

|                | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|----------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 肥満(BMIが30以上の者) | 0,173 | 4   | 0,863 | 0,171 | 7   | 0,918 |
| 高血圧(BPH140以上)  | 0,277 | 5   | 0,854 | 0,219 | 6   | 0,900 |
| HDL不足          | 0,201 | 28  | 1,024 | 0,076 | 27  | 1,070 |
| 血糖値高           | 0,053 | 18  | 0,920 | 0,030 | 10  | 0,824 |
| 喫煙             | 0,555 | 24  | 1,009 | 0,109 | 37  | 1,045 |
| 飲酒             | 0,515 | 16  | 0,977 | 0,079 | 35  | 1,045 |

## 介入

|           | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|           | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 健診受診率高    | 0,620 | 24  | 0,988 | 0,450 | 39  | 0,841 |
| かかりつけ医有   | 0,568 | 22  | 1,029 | 0,648 | 19  | 1,020 |
| アクセス良     | 0,652 | 40  | 0,946 | 0,702 | 29  | 0,977 |
| 高血圧未把握    | 0,252 | 24  | 0,993 | 0,196 | 30  | 1,033 |
| 高血圧コントロール | 0,450 | 22  | 0,993 | 0,432 | 30  | 1,010 |
| 癌検診結果未把握率 | 0,023 | 19  | 0,891 | 0,010 | 23  | 0,931 |

## 罹患

|             | 男性     |     |       | 女性     |     |       |
|-------------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|             | 実数     | ランク | 全国比   | 実数     | ランク | 全国比   |
| 総患者0歳-14歳   | 4,398  | 46  | 1,241 | 3,829  | 47  | 1,290 |
| 総患者15歳-64歳  | 31,027 | 14  | 0,949 | 44,742 | 23  | 1,034 |
| 総患者65歳以上    | 12,581 | 30  | 1,041 | 15,456 | 42  | 1,124 |
| 退院患者0歳-14歳  | 879    | 36  | 1,280 | 793    | 41  | 1,395 |
| 退院患者15歳-64歳 | 498    | 3   | 0,810 | 736    | 16  | 0,982 |
| 退院患者65歳以上   | 1,841  | 6   | 0,879 | 1,164  | 2   | 0,826 |

## 障害



|           | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|           | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 寝たきり全体    | 539   | 7   | 0,789 | 938   | 9   | 0,803 |
| 寝たきり在宅率   | 0,224 | 9   | 1,441 | 0,204 | 9   | 1,543 |
| 寝たきり65歳以上 | 3,696 | 19  | 0,935 | 5,766 | 20  | 0,953 |
| 寝たきり脳卒中   | 167   | 11  | 0,900 | 289   | 17  | 1,001 |
| 寝たきり骨折    | 35    | 32  | 1,572 | 45    | 12  | 0,773 |
| 軽い障害(在宅)  | 452   | 3   | 0,704 | 615   | 1   | 0,722 |

## 死亡

|             | 男性     |     |       | 女性     |     |       |
|-------------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|             | 実数     | ランク | 全国比   | 実数     | ランク | 全国比   |
| 健康寿命        | 73,827 | 36  | 1,004 | 78,853 | 45  | 0,983 |
| 全LSM0歳-64歳  | 15,431 | 11  | 0,940 | 8,172  | 32  | 1,005 |
| 癌LSM0歳-64歳  | 5,658  | 24  | 0,964 | 3,628  | 40  | 1,028 |
| 事故LSM0歳-64歳 | 1,426  | 6   | 0,877 | 484    | 11  | 0,924 |
| 自殺LSM0歳-64歳 | 1,040  | 2   | 0,822 | 482    | 19  | 0,970 |
| 乳児死亡率       | 3,458  | 17  | 0,942 | 3,570  | 34  | 1,149 |

## 主観









|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 自覚有        | 0,262 | 25  | 1,014 | 0,319 | 18  | 0,985 |
| 健康状態良全     | 0,922 | 32  | 1,003 | 0,905 | 34  | 1,006 |
| 健康状態良65歳以上 | 0,816 | 26  | 1,002 | 0,794 | 23  | 1,002 |
| 生活に支障全年齢   | 0,062 | 2   | 0,779 | 0,077 | 2   | 0,823 |
| 生活に支障65歳以上 | 0,177 | 4   | 0,829 | 0,216 | 9   | 0,918 |
| ストレス       | 0,381 | 32  | 1,037 | 0,425 | 24  | 0,992 |



# 三重県

男性

女性



# 三重県

## 基本指標

|                | 男性     |     |       | 女性    |     |       |
|----------------|--------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | 実数     | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| LSM1 (IMR)     | 3,252  | 13  | 0.885 | 4,612 | 46  | 1.484 |
| LSM5 (U5MR)    | 5,831  | 35  | 1.134 | 5,912 | 46  | 1.378 |
| LSM65          | 15,566 | 14  | 0.948 | 7,777 | 12  | 0.956 |
| LSM三大疾患        | 8,663  | 7   | 0.924 | 4,829 | 16  | 0.954 |
| 寝たきりのもの全体      | 655    | 15  | 0.958 | 1,178 | 18  | 1.009 |
| 障害者全体          | 924    | 39  | 1.440 | 1,102 | 32  | 1.295 |
| 煙草             | 0.552  | 21  | 1.004 | 0.055 | 7   | 0.532 |
| 飲酒(1合以上)       | 0.493  | 5   | 0.935 | 0.036 | 4   | 0.476 |
| 肥満(BMIが30以上の者) | 0.194  | 19  | 0.972 | 0.178 | 16  | 0.958 |
| 高血圧(BPH140以上)  | 0.338  | 26  | 1.043 | 0.278 | 40  | 1.141 |
| 健康行動すべて実行      | 0.066  | 19  | 1.021 | 0.062 | 23  | 1.001 |

## 総合指標順位

|        | 男性 |     | 女性 |
|--------|----|-----|----|
|        | 実数 | ランク |    |
| 行動     | 24 |     | 15 |
| 習慣     | 4  |     | 4  |
| 介入     | 37 |     | 43 |
| 要因     | 22 |     | 10 |
| 障害     | 19 |     | 19 |
| 罹患     | 11 |     | 9  |
| 主観     | 38 |     | 21 |
| 死亡     | 7  |     | 13 |
| 総合健康指標 | 13 |     | 4  |

## 習慣

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 運動不足       | 0.526 | 12  | 0.998 | 0.569 | 5   | 0.928 |
| カロリーバランス悪い | 0.166 | 4   | 0.771 | 0.188 | 10  | 0.849 |
| 高脂肪エネルギー比  | 0.549 | 40  | 1.073 | 0.588 | 25  | 0.969 |
| カルシウム不足    | 0.620 | 26  | 1.000 | 0.661 | 31  | 1.032 |
| 繊維不足       | 0.821 | 35  | 1.069 | 0.827 | 33  | 1.047 |
| 朝食抜き       | 0.137 | 13  | 0.823 | 0.091 | 14  | 0.831 |

## 行動

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 規則正しい食事    | 0.533 | 25  | 1.006 | 0.675 | 8   | 1.052 |
| バランスのとれた食事 | 0.348 | 24  | 0.998 | 0.438 | 15  | 1.025 |
| 定期的に運動     | 0.280 | 20  | 1.028 | 0.228 | 19  | 1.025 |
| 気分転換の時間有   | 0.291 | 27  | 0.980 | 0.276 | 24  | 0.967 |
| 十分な睡眠時間    | 0.438 | 35  | 0.972 | 0.462 | 34  | 0.976 |
| 全部実行       | 0.066 | 19  | 1.021 | 0.062 | 23  | 1.001 |

## 要因

|                | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|----------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 肥満(BMIが30以上の者) | 0.194 | 19  | 0.972 | 0.178 | 16  | 0.958 |
| 高血圧(BPH140以上)  | 0.338 | 26  | 1.043 | 0.278 | 40  | 1.141 |
| HDL不足          | 0.198 | 26  | 1.009 | 0.071 | 18  | 0.996 |
| 血糖値高           | 0.067 | 35  | 1.151 | 0.035 | 19  | 0.955 |
| 喫煙             | 0.552 | 21  | 1.004 | 0.055 | 7   | 0.532 |
| 飲酒             | 0.493 | 5   | 0.935 | 0.036 | 4   | 0.476 |

## 介入

|           | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|           | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 健診受診率高    | 0.620 | 25  | 0.988 | 0.512 | 27  | 0.958 |
| かかりつけ医有   | 0.584 | 13  | 1.057 | 0.647 | 20  | 1.020 |
| アクセス良     | 0.661 | 35  | 0.960 | 0.700 | 30  | 0.974 |
| 高血圧未把握    | 0.317 | 47  | 1.247 | 0.234 | 43  | 1.233 |
| 高血圧コントロール | 0.422 | 12  | 0.931 | 0.497 | 39  | 1.163 |
| 癌検診結果未把握率 | 0.055 | 47  | 2.107 | 0.027 | 47  | 2.558 |

## 罹患

|             | 男性     |     |       | 女性     |     |       |
|-------------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|             | 実数     | ランク | 全国比   | 実数     | ランク | 全国比   |
| 総患者0歳-14歳   | 31,598 | 14  | 0.891 | 27,391 | 20  | 0.922 |
| 総患者15歳-64歳  | 30,833 | 12  | 0.943 | 40,207 | 11  | 0.929 |
| 総患者65歳以上    | 11,125 | 16  | 0.921 | 11,785 | 11  | 0.857 |
| 退院患者0歳-14歳  | 665    | 23  | 0.967 | 548    | 25  | 0.965 |
| 退院患者15歳-64歳 | 591    | 14  | 0.961 | 747    | 19  | 0.996 |
| 退院患者65歳以上   | 1,873  | 7   | 0.894 | 1,174  | 3   | 0.833 |

## 障害



|           | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|           | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 寝たきり全体    | 655   | 15  | 0.958 | 1,178 | 18  | 1.009 |
| 寝たきり在宅率   | 0.221 | 11  | 1.420 | 0.168 | 14  | 1.274 |
| 寝たきり65歳以上 | 3,517 | 14  | 0.890 | 5,676 | 19  | 0.938 |
| 寝たきり脳卒中   | 143   | 9   | 0.769 | 360   | 28  | 1.246 |
| 寝たきり骨折    | 49    | 38  | 2.240 | 59    | 19  | 1.017 |
| 軽い障害(在宅)  | 924   | 39  | 1.440 | 1,102 | 32  | 1.295 |

## 死亡

|             | 男性     |     |       | 女性     |     |       |
|-------------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|             | 実数     | ランク | 全国比   | 実数     | ランク | 全国比   |
| 健康寿命        | 74,543 | 15  | 1.014 | 80,443 | 16  | 1.020 |
| 全LSM0歳-64歳  | 15,566 | 14  | 0.948 | 7,777  | 12  | 0.956 |
| 癌LSM0歳-64歳  | 5,330  | 8   | 0.908 | 3,293  | 13  | 0.933 |
| 事故LSM0歳-64歳 | 1,945  | 32  | 1.196 | 590    | 34  | 1.125 |
| 自殺LSM0歳-64歳 | 1,042  | 3   | 0.824 | 442    | 4   | 0.890 |
| 乳児死亡率       | 3,252  | 13  | 0.885 | 4,612  | 46  | 1.484 |

## 主観









|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 自覚有        | 0.278 | 37  | 1.074 | 0.333 | 31  | 1.031 |
| 健康状態良全     | 0.921 | 29  | 1.002 | 0.912 | 38  | 1.013 |
| 健康状態良65歳以上 | 0.798 | 9   | 0.980 | 0.807 | 33  | 1.019 |
| 生活に支障全年齢   | 0.088 | 37  | 1.113 | 0.103 | 35  | 1.097 |
| 生活に支障65歳以上 | 0.222 | 31  | 1.043 | 0.235 | 21  | 0.997 |
| ストレス       | 0.387 | 34  | 1.051 | 0.445 | 33  | 1.037 |



# 滋賀県

男性

女性



# 滋賀県

## 基本指標

|                | 男性     |     |       | 女性    |     |       |
|----------------|--------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | 実数     | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| LSM1(IMR)      | 4,291  | 34  | 1.168 | 3,081 | 28  | 0.992 |
| LSM5(U5MR)     | 4,983  | 19  | 0.969 | 4,255 | 26  | 0.992 |
| LSM65          | 14,517 | 2   | 0.884 | 7,631 | 8   | 0.939 |
| LSM三大疾患        | 8,184  | 3   | 0.873 | 4,667 | 7   | 0.922 |
| 寝たきりのもの全体      | 593    | 12  | 0.868 | 908   | 6   | 0.778 |
| 障害者全体          | 671    | 13  | 1.046 | 792   | 10  | 0.930 |
| 煙草             | 0,575  | 28  | 1.045 | 0,075 | 18  | 0.719 |
| 飲酒(1合以上)       | 0,497  | 7   | 0.943 | 0,055 | 13  | 0.734 |
| 肥満(BMIが30以上の者) | 0,184  | 12  | 0.922 | 0,187 | 22  | 1.004 |
| 高血圧(BPH140以上)  | 0,394  | 44  | 1.217 | 0,288 | 43  | 1.181 |
| 健康行動すべて実行      | 0,055  | 44  | 0.853 | 0,050 | 45  | 0.806 |

## 総合指標順位

|        | 男性 |     | 女性 |     |
|--------|----|-----|----|-----|
|        | 実数 | ランク | 実数 | ランク |
| 行動     | 40 |     | 41 |     |
| 習慣     | 17 |     | 17 |     |
| 介入     | 39 |     | 32 |     |
| 要因     | 19 |     | 23 |     |
| 障害     | 10 |     | 1  |     |
| 罹患     | 4  |     | 7  |     |
| 主観     | 26 |     | 25 |     |
| 死亡     | 3  |     | 7  |     |
| 総合健康指標 | 17 |     | 14 |     |

## 習慣

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 運動不足       | 0,523 | 11  | 0.992 | 0,609 | 18  | 0.994 |
| カロリーバランス悪い | 0,229 | 32  | 1.066 | 0,237 | 38  | 1.067 |
| 高脂肪エネルギー比  | 0,361 | 2   | 0.706 | 0,535 | 9   | 0.880 |
| カルシウム不足    | 0,642 | 35  | 1.034 | 0,632 | 22  | 0.986 |
| 繊維不足       | 0,809 | 33  | 1.052 | 0,793 | 25  | 1.004 |
| 朝食抜き       | 0,155 | 30  | 0.933 | 0,093 | 20  | 0.847 |

## 行動

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 規則正しい食事    | 0,519 | 33  | 0.979 | 0,648 | 24  | 1.008 |
| バランスのとれた食事 | 0,345 | 29  | 0.988 | 0,417 | 32  | 0.978 |
| 定期的に運動     | 0,277 | 23  | 1.017 | 0,215 | 31  | 0.968 |
| 気分転換の時間有   | 0,291 | 28  | 0.977 | 0,268 | 30  | 0.937 |
| 十分な睡眠時間    | 0,411 | 40  | 0.911 | 0,435 | 43  | 0.918 |
| 全部実行       | 0,055 | 44  | 0.853 | 0,050 | 45  | 0.806 |

## 要因

|                | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|----------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 肥満(BMIが30以上の者) | 0,184 | 12  | 0.922 | 0,187 | 22  | 1.004 |
| 高血圧(BPH140以上)  | 0,394 | 44  | 1.217 | 0,288 | 43  | 1.181 |
| HDL不足          | 0,197 | 25  | 1.003 | 0,064 | 13  | 0.905 |
| 血糖値高           | 0,046 | 12  | 0.792 | 0,036 | 22  | 0.983 |
| 喫煙             | 0,575 | 28  | 1.045 | 0,075 | 18  | 0.719 |
| 飲酒             | 0,497 | 7   | 0.943 | 0,055 | 13  | 0.734 |

## 介入

|           | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|           | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 健診受診率高    | 0,647 | 17  | 1.031 | 0,551 | 20  | 1.030 |
| かかりつけ医有   | 0,563 | 24  | 1.020 | 0,638 | 25  | 1.006 |
| アクセス良     | 0,649 | 43  | 0.943 | 0,656 | 45  | 0.913 |
| 高血圧未把握    | 0,236 | 16  | 0.930 | 0,198 | 31  | 1.042 |
| 高血圧コントロール | 0,545 | 44  | 1.205 | 0,398 | 13  | 0.930 |
| 癌検診結果未把握率 | 0,037 | 40  | 1.408 | 0,011 | 34  | 1.076 |

## 罹患

|             | 男性     |     |       | 女性     |     |       |
|-------------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|             | 実数     | ランク | 全国比   | 実数     | ランク | 全国比   |
| 総患者0歳-14歳   | 25,636 | 2   | 0.723 | 19,253 | 2   | 0.648 |
| 総患者15歳-64歳  | 28,421 | 8   | 0.869 | 38,986 | 8   | 0.901 |
| 総患者65歳以上    | 11,010 | 13  | 0.911 | 12,170 | 13  | 0.885 |
| 退院患者0歳-14歳  | 657    | 19  | 0.957 | 579    | 28  | 1.019 |
| 退院患者15歳-64歳 | 965    | 10  | 0.919 | 745    | 18  | 0.993 |
| 退院患者65歳以上   | 1,928  | 12  | 0.920 | 1,249  | 14  | 0.886 |

## 障害



|           | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|           | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 寝たきり全体    | 593   | 12  | 0.868 | 908   | 6   | 0.778 |
| 寝たきり在宅率   | 0,264 | 3   | 1.698 | 0,180 | 12  | 1.367 |
| 寝たきり65歳以上 | 3,472 | 13  | 0.879 | 4,669 | 3   | 0.772 |
| 寝たきり脳卒中   | 212   | 18  | 1.137 | 128   | 1   | 0.443 |
| 寝たきり骨折    | 33    | 30  | 1.484 | 25    | 2   | 0.439 |
| 軽い障害(在宅)  | 671   | 13  | 1.046 | 792   | 10  | 0.930 |

## 死亡

|             | 男性     |     |       | 女性     |     |       |
|-------------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|             | 実数     | ランク | 全国比   | 実数     | ランク | 全国比   |
| 健康寿命        | 75,509 | 1   | 1.027 | 81,081 | 6   | 1.008 |
| 全LSM0歳-64歳  | 14,517 | 2   | 0.884 | 7,631  | 8   | 0.939 |
| 癌LSM0歳-64歳  | 5,226  | 4   | 0.891 | 3,319  | 18  | 0.941 |
| 事故LSM0歳-64歳 | 1,752  | 22  | 1.077 | 582    | 31  | 1.111 |
| 自殺LSM0歳-64歳 | 1,186  | 12  | 0.938 | 473    | 13  | 0.951 |
| 乳児死亡率       | 4,291  | 34  | 1.168 | 3,081  | 28  | 0.992 |

## 主観

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 自覚有        | 0,259 | 23  | 1.001 | 0,331 | 28  | 1.023 |
| 健康状態良全     | 0,920 | 26  | 1.001 | 0,904 | 31  | 1.005 |
| 健康状態良65歳以上 | 0,820 | 29  | 1.006 | 0,804 | 29  | 1.015 |
| 生活に支障全年齢   | 0,076 | 13  | 0.957 | 0,091 | 19  | 0.975 |
| 生活に支障65歳以上 | 0,234 | 39  | 1.099 | 0,249 | 36  | 1.056 |
| ストレス       | 0,388 | 36  | 1.053 | 0,446 | 34  | 1.042 |













# 京都府

男性

女性



# 京都府

## 基本指標

|                | 男性     |     |       | 女性    |     |       |
|----------------|--------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | 実数     | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| LSM1(IMR)      | 3,679  | 23  | 1.002 | 4,311 | 43  | 1.388 |
| LSM5(U5MR)     | 5,068  | 22  | 0.986 | 5,260 | 39  | 1.226 |
| LSM65          | 15,312 | 8   | 0.932 | 7,700 | 10  | 0.947 |
| LSM三大疾患        | 8,802  | 9   | 0.939 | 4,796 | 15  | 0.948 |
| 寝たきりのもの全体      | 577    | 9   | 0.844 | 1,081 | 14  | 0.926 |
| 障害者全体          | 754    | 22  | 1.176 | 1,050 | 26  | 1.234 |
| 煙草             | 0.540  | 13  | 0.983 | 0.115 | 39  | 1.107 |
| 飲酒(1合以上)       | 0.502  | 10  | 0.953 | 0.080 | 37  | 1.060 |
| 肥満(BMIが30以上の者) | 0.182  | 8   | 0.913 | 0.161 | 4   | 0.864 |
| 高血圧(BPH140以上)  | 0.342  | 30  | 1.054 | 0.259 | 29  | 1.064 |
| 健康行動すべて実行      | 0.067  | 14  | 1.050 | 0.060 | 26  | 0.974 |

## 総合指標順位

|        | 男性 |     | 女性 |
|--------|----|-----|----|
|        | 実数 | ランク |    |
| 行動     | 18 |     | 25 |
| 習慣     | 44 |     | 31 |
| 介入     | 44 |     | 37 |
| 要因     | 12 |     | 35 |
| 障害     | 8  |     | 16 |
| 罹患     | 17 |     | 16 |
| 主観     | 30 |     | 26 |
| 死亡     | 8  |     | 17 |
| 総合健康指標 | 21 |     | 30 |

## 習慣

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 運動不足       | 0.538 | 15  | 1.020 | 0.624 | 24  | 1.018 |
| カロリーバランス悪い | 0.251 | 44  | 1.168 | 0.223 | 27  | 1.004 |
| 高脂肪エネルギー比  | 0.570 | 44  | 1.114 | 0.621 | 35  | 1.022 |
| カルシウム不足    | 0.577 | 6   | 0.930 | 0.574 | 4   | 0.896 |
| 繊維不足       | 0.797 | 28  | 1.037 | 0.849 | 39  | 1.075 |
| 朝食抜き       | 0.177 | 40  | 1.062 | 0.102 | 27  | 0.933 |

## 行動

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 規則正しい食事    | 0.501 | 40  | 0.945 | 0.612 | 42  | 0.952 |
| バランスのとれた食事 | 0.363 | 12  | 1.038 | 0.453 | 8   | 1.060 |
| 定期的に運動     | 0.286 | 9   | 1.047 | 0.241 | 14  | 1.083 |
| 気分転換の時間有   | 0.312 | 10  | 1.050 | 0.307 | 9   | 1.074 |
| 十分な睡眠時間    | 0.400 | 45  | 0.888 | 0.420 | 45  | 0.888 |
| 全部実行       | 0.067 | 14  | 1.050 | 0.060 | 26  | 0.974 |

## 要因

|                | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|----------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 肥満(BMIが30以上の者) | 0.182 | 8   | 0.913 | 0.161 | 4   | 0.864 |
| 高血圧(BPH140以上)  | 0.342 | 30  | 1.054 | 0.259 | 29  | 1.064 |
| HDL不足          | 0.205 | 29  | 1.048 | 0.057 | 7   | 0.812 |
| 血糖値高           | 0.062 | 27  | 1.065 | 0.052 | 46  | 1.395 |
| 喫煙             | 0.540 | 13  | 0.983 | 0.115 | 39  | 1.107 |
| 飲酒             | 0.502 | 10  | 0.953 | 0.080 | 37  | 1.060 |

## 介入

|           | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|           | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 健診受診率高    | 0.549 | 42  | 0.875 | 0.432 | 44  | 0.808 |
| かかりつけ医有   | 0.568 | 23  | 1.028 | 0.640 | 24  | 1.009 |
| アクセス良     | 0.650 | 42  | 0.944 | 0.692 | 36  | 0.962 |
| 高血圧未把握    | 0.261 | 28  | 1.027 | 0.188 | 22  | 0.991 |
| 高血圧コントロール | 0.511 | 38  | 1.129 | 0.577 | 46  | 1.350 |
| 癌検診結果未把握率 | 0.024 | 20  | 0.901 | 0.007 | 10  | 0.655 |

## 罹患

|             | 男性     |     |       | 女性     |     |       |
|-------------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|             | 実数     | ランク | 全国比   | 実数     | ランク | 全国比   |
| 総患者0歳-14歳   | 25882  | 3   | 0.730 | 25140  | 11  | 0.847 |
| 総患者15歳-64歳  | 32645  | 20  | 0.999 | 41228  | 15  | 0.953 |
| 総患者65歳以上    | 116831 | 23  | 0.967 | 143673 | 33  | 1.044 |
| 退院患者0歳-14歳  | 582    | 12  | 0.847 | 511    | 17  | 0.900 |
| 退院患者15歳-64歳 | 581    | 13  | 0.944 | 728    | 13  | 0.972 |
| 退院患者65歳以上   | 2215   | 32  | 1.057 | 1390   | 25  | 0.987 |

## 障害



|           | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|           | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 寝たきり全体    | 577   | 9   | 0.844 | 1,081 | 14  | 0.926 |
| 寝たきり在宅率   | 0.141 | 27  | 0.907 | 0.133 | 23  | 1.009 |
| 寝たきり65歳以上 | 3366  | 12  | 0.852 | 5465  | 15  | 0.903 |
| 寝たきり脳卒中   | 128   | 4   | 0.688 | 236   | 11  | 0.817 |
| 寝たきり骨折    | 8     | 6   | 0.379 | 57    | 17  | 0.976 |
| 軽い障害(在宅)  | 754   | 22  | 1.176 | 1,050 | 26  | 1.234 |

## 死亡

|             | 男性     |     |       | 女性     |     |       |
|-------------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|             | 実数     | ランク | 全国比   | 実数     | ランク | 全国比   |
| 健康寿命        | 74,639 | 13  | 1.015 | 80,566 | 13  | 0.994 |
| 全LSM0歳-64歳  | 15,312 | 8   | 0.932 | 7,700  | 10  | 0.947 |
| 癌LSM0歳-64歳  | 5,733  | 27  | 0.977 | 3,431  | 27  | 0.972 |
| 事故LSM0歳-64歳 | 1,414  | 5   | 0.870 | 446    | 6   | 0.850 |
| 自殺LSM0歳-64歳 | 1,165  | 11  | 0.921 | 497    | 25  | 0.999 |
| 乳児死亡率       | 3,679  | 23  | 1.002 | 4,311  | 43  | 1.388 |

## 主観









|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 自覚有        | 0.270 | 34  | 1.046 | 0.338 | 34  | 1.044 |
| 健康状態良全     | 0.922 | 31  | 1.003 | 0.900 | 25  | 1.001 |
| 健康状態良65歳以上 | 0.825 | 31  | 1.013 | 0.803 | 28  | 1.014 |
| 生活に支障全年齢   | 0.083 | 32  | 1.047 | 0.091 | 18  | 0.975 |
| 生活に支障65歳以上 | 0.231 | 36  | 1.083 | 0.229 | 17  | 0.973 |
| ストレス       | 0.401 | 40  | 1.090 | 0.450 | 36  | 1.050 |



# 大阪府

男性

女性



# 大阪府

## 基本指標

|                | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|----------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| LSM1(IMR)      | 3.153 | 11  | 0.858 | 2.826 | 13  | 0.845 |
| LSM5(U5MR)     | 4.498 | 8   | 0.875 | 3.579 | 5   | 0.834 |
| LSM65          | 17778 | 40  | 1.083 | 8605  | 45  | 1.058 |
| LSM三大疾患        | 10340 | 45  | 1.103 | 5403  | 47  | 1.067 |
| 寝たきりのもの全体      | 533   | 5   | 0.780 | 840   | 4   | 0.719 |
| 障害者全体          | 681   | 17  | 1.062 | 771   | 9   | 0.906 |
| 煙草             | 0.545 | 16  | 0.991 | 0.138 | 45  | 1.332 |
| 飲酒(1合以上)       | 0.509 | 13  | 0.966 | 0.104 | 44  | 1.385 |
| 肥満(BMIが30以上の者) | 0.190 | 15  | 0.950 | 0.169 | 6   | 0.907 |
| 高血圧(BPH140以上)  | 0.275 | 4   | 0.848 | 0.222 | 10  | 0.913 |
| 健康行動すべて実行      | 0.061 | 29  | 0.947 | 0.065 | 15  | 1.057 |

## 総合指標順位

|        | 男性 |     | 女性 |
|--------|----|-----|----|
|        | 実数 | ランク |    |
| 行動     | 27 | 20  |    |
| 習慣     | 38 | 43  |    |
| 介入     | 46 | 45  |    |
| 要因     | 11 | 25  |    |
| 障害     | 11 | 13  |    |
| 罹患     | 33 | 32  |    |
| 主観     | 43 | 39  |    |
| 死亡     | 35 | 42  |    |
| 総合健康指標 | 38 | 40  |    |

## 習慣

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 運動不足       | 0.481 | 5   | 0.912 | 0.574 | 7   | 0.936 |
| カロリーバランス悪い | 0.216 | 24  | 1.005 | 0.235 | 35  | 1.057 |
| 高脂肪エネルギー比  | 0.574 | 45  | 1.121 | 0.645 | 41  | 1.061 |
| カルシウム不足    | 0.649 | 38  | 1.045 | 0.665 | 35  | 1.038 |
| 繊維不足       | 0.826 | 37  | 1.075 | 0.850 | 40  | 1.077 |
| 朝食抜き       | 0.179 | 41  | 1.074 | 0.116 | 37  | 1.063 |

## 行動

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 規則正しい食事    | 0.482 | 42  | 0.911 | 0.619 | 39  | 0.963 |
| バランスのとれた食事 | 0.359 | 15  | 1.028 | 0.439 | 13  | 1.029 |
| 定期的に運動     | 0.282 | 18  | 1.033 | 0.241 | 15  | 1.083 |
| 気分転換の時間有   | 0.302 | 19  | 1.016 | 0.320 | 7   | 1.119 |
| 十分な睡眠時間    | 0.417 | 39  | 0.925 | 0.435 | 42  | 0.918 |
| 全部実行       | 0.061 | 29  | 0.947 | 0.065 | 15  | 1.057 |

## 要因

|                | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|----------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|                | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 肥満(BMIが30以上の者) | 0.190 | 15  | 0.950 | 0.169 | 6   | 0.907 |
| 高血圧(BPH140以上)  | 0.275 | 4   | 0.848 | 0.222 | 10  | 0.913 |
| HDL不足          | 0.191 | 20  | 0.976 | 0.067 | 14  | 0.947 |
| 血糖値高           | 0.077 | 44  | 1.321 | 0.037 | 26  | 0.998 |
| 喫煙             | 0.545 | 16  | 0.991 | 0.138 | 45  | 1.332 |
| 飲酒             | 0.509 | 13  | 0.966 | 0.104 | 44  | 1.385 |

## 介入

|           | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|           | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 健診受診率高    | 0.557 | 41  | 0.887 | 0.422 | 45  | 0.789 |
| かかりつけ医有   | 0.574 | 20  | 1.039 | 0.660 | 13  | 1.040 |
| アクセス良     | 0.634 | 44  | 0.921 | 0.680 | 40  | 0.946 |
| 高血圧未把握    | 0.310 | 42  | 1.219 | 0.241 | 44  | 1.270 |
| 高血圧コントロール | 0.493 | 34  | 1.089 | 0.457 | 33  | 1.068 |
| 癌検診結果未把握率 | 0.036 | 39  | 1.392 | 0.014 | 41  | 1.363 |

## 罹患

|             | 男性     |     |       | 女性     |     |       |
|-------------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|             | 実数     | ランク | 全国比   | 実数     | ランク | 全国比   |
| 総患者0歳-14歳   | 38249  | 33  | 1.079 | 35205  | 43  | 1.185 |
| 総患者15歳-64歳  | 36573  | 33  | 1.119 | 44165  | 21  | 1.021 |
| 総患者65歳以上    | 144793 | 41  | 1.198 | 165251 | 44  | 1.201 |
| 退院患者0歳-14歳  | 712    | 28  | 1.036 | 565    | 27  | 0.994 |
| 退院患者15歳-64歳 | 613    | 19  | 0.997 | 709    | 9   | 0.945 |
| 退院患者65歳以上   | 2249   | 34  | 1.074 | 1438   | 28  | 1.021 |

## 障害

|           | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|           | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 寝たきり全体    | 533   | 5   | 0.780 | 840   | 4   | 0.719 |
| 寝たきり在宅率   | 0.109 | 38  | 0.703 | 0.076 | 39  | 0.578 |
| 寝たきり65歳以上 | 3330  | 10  | 0.843 | 5140  | 11  | 0.849 |
| 寝たきり脳卒中   | 132   | 6   | 0.708 | 200   | 5   | 0.693 |
| 寝たきり骨折    | 11    | 12  | 0.482 | 65    | 22  | 1.125 |
| 軽い障害(在宅)  | 681   | 17  | 1.062 | 771   | 9   | 0.906 |

## 死亡

|             | 男性     |     |       | 女性     |     |       |
|-------------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|             | 実数     | ランク | 全国比   | 実数     | ランク | 全国比   |
| 健康寿命        | 72.782 | 45  | 0.990 | 78.707 | 46  | 0.977 |
| 全LSM0歳-64歳  | 17778  | 40  | 1.083 | 8605   | 45  | 1.058 |
| 癌LSM0歳-64歳  | 6878   | 47  | 1.172 | 3899   | 47  | 1.105 |
| 事故LSM0歳-64歳 | 1361   | 4   | 0.837 | 432    | 5   | 0.825 |
| 自殺LSM0歳-64歳 | 1217   | 16  | 0.962 | 502    | 26  | 1.009 |
| 乳児死亡率       | 3.153  | 11  | 0.858 | 2.626  | 13  | 0.845 |

## 主観

|            | 男性    |     |       | 女性    |     |       |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|            | 実数    | ランク | 全国比   | 実数    | ランク | 全国比   |
| 自覚有        | 0.289 | 45  | 1.117 | 0.364 | 45  | 1.127 |
| 健康状態良全     | 0.912 | 13  | 0.993 | 0.899 | 22  | 0.999 |
| 健康状態良65歳以上 | 0.793 | 5   | 0.974 | 0.786 | 19  | 0.992 |
| 生活に支障全年齢   | 0.080 | 21  | 1.005 | 0.096 | 23  | 1.022 |
| 生活に支障65歳以上 | 0.228 | 33  | 1.070 | 0.264 | 44  | 1.120 |
| ストレス       | 0.430 | 45  | 1.168 | 0.489 | 45  | 1.141 |

