

表1 健康日本21健康指標項目の地方計画における記載状況 その1

都道府県	目標1-1 80歳における20歯以上の自分の歯を有する者の割合			目標1-2 60歳における24歯以上の自分の歯を有する者の割合			目標2 3歳児におけるう歯のない者の割合の増加			目標3 12歳児における1人平均う歯数(DMF歯数)の減少		
	現状		目標	現状		目標	現状		目標	現状		目標
	1993年	1999年	20%以上	1993年	1999年	50%以上	1993年	1999年	59.5%	1993年	1998年	2.9歯
国	11.5%	15.3%	20%以上	44.1%	53.2%	50%以上	1993年	1999年	59.5%	1993年	1998年	2.9歯
北海道	3.3%	18.2%	20%以上	33.5%	40.3%	50%以上	1993年	1999年	57.3%	1993年	1993年	3.1歯
青森	18.2%		20%以上	40.3%		50%以上			42.8%	1993年	1993年	3.1歯
岩手									48.4%	1993年	1993年	2.98歯
宮城												
秋田							今後調査		43.9%	1998年	1999年	3.91歯
山形	14.6%		25%以上	46.1%		55%以上	1995年	1999年	45.8%	1999年	2000年	2.3歯
福島	11.8%		20%以上	43.8%		50%以上	1997年	1999年	50.2%	1999年	2000年	3.1歯
茨城	26.8%			55.2%		67.3%	2001年	1999年	67.3%	1999年	1999年	3.25歯
栃木							H13調査		58.1%	1999年	1999年	3.3歯
群馬	21.0%		30%以上	54.5%		60%以上	2000年	2000年	59.3%	2000年	2000年	2.9歯
埼玉			20%以上						66.4%	1999年	1999年	2.9歯
千葉	15.6%		20%以上	39.8%		50%以上	2000年	2000年	62.2%	1999年	2000年	2.3歯
東京	27.0%		30%以上	55.2%		65%以上	1999年	1999年	70.3%	1999年	1999年	2.6歯
神奈川	15.5%		30%以上						70.3%	1999年	1999年	2.8歯
新潟	21.0%		30%以上	65.0%		75%以上	1999年	1999年	1.8本	1999年	1999年	1.8歯
富山	23.3%		30%以上	56.3%		60%以上	1999年	1999年	61.9%	2000年	2000年	2.6歯
石川							今後調査		57.2%	1997年	1997年	
福井	18.2%			42.7%			1996年	1996年		1996年	1996年	3.5歯
山梨	6.0%		15%以上	34.4%		45%以上	1998年	1998年	59.2%	1998年	1998年	3.47歯
長野	4.5%		20%以上	33.0%		50%以上	1998年	1998年	63.6%	1999年	2000年	2.3歯
岐阜	27.6%		30%以上	55.6%		65%以上	1999年	1999年	70.0%	1999年	2000年	2.6歯
静岡	14.2%		20%以上						71.5%	2000年	2000年	2.4歯
愛知	9.4%		32%以上						68.5%	1999年	1999年	2.7歯
三重	21.4%		43%以上						56.7%	1999年	1999年	3.44歯
滋賀				32.1%		50%以上	1999年	1999年	61.1%	1999年	1999年	2.79歯
京都				46.0%		50%以上	2000年	2000年	61.0%	1998年	1998年	2.4歯
大阪	36.5%		20%以上	57.2%		50%以上	2000年	2000年	59.5%	1998年	1998年	2.9歯
兵庫			20%以上			50%以上			70.6%	1999年	1999年	2.7歯
奈良						50%以上			60.3%	1999年	1999年	1歯以下
和歌山			20%以上			50%以上			53.7%	1998年	1998年	2.9歯
鳥取	22.2%		30%以上	48.5%		55%以上			65.3%	1998年	1998年	2.4歯
島根	1.9本		12本以上	15本		22本以上	1999年	1999年	60.1%	1997年	1997年	2.97歯
岡山	8.7%		20%以上	20.5%		40%以上	1999年	1999年	61.5%	1999年	1999年	2.6歯
広島	36.2%		40%以上	62.3%		70%以上	2000年	2000年	67.1%	1999年	2000年	2.2歯
山口									60.6%	1998年	1998年	2.66歯
徳島			35%以上	48.0%		50%以上	1998年	1998年	47.2%	1999年	1999年	2.2歯以下
香川	28.3%		35%以上	58.5%		70%以上	2000年	2000年	55.9%	1999年	1999年	2.5歯
愛媛			40%以上			60%以上			58.0%	1999年	2000年	男子2.40 女子2.89
高知	30.7%		40%以上	55.1%		60%以上	2001年	2001年	60.5%	2000年	2000年	3.6歯
福岡												
福岡	25.6%		30%以上	43.1%		50%以上	1999年	1999年	39.4%	1998年	1998年	3.33歯
佐賀	17.0%		34%以上			増加						3.5歯
長崎			20%以上			50%以上	今後調査		52.7%	1998年	1998年	3.7歯
熊本	11.4%		20%以上	47.6%		55%以上	2000年	2000年	51.7%	1999年	1999年	6.7%以上
大分	17.3%		20%以上	33.2%		40%以上	1998年	1998年	44.0%	1998年	1998年	80%以上
宮崎	12.0%		20%以上	35.0%		50%以上	2000年	2000年	11.3%	1999年	2000年	3.45歯
鹿児島	14.3%		10%以上	34.5%		45%以上	1998年	1998年	43.5%	1999年	2000年	3.6歯
沖縄												4.7歯

表1 健康日本21健康指標項目の地方計画における記載状況 その2

都道府県	目標4-1 40歳における進行した歯周炎に罹患している者(4mm以上の歯周ポケットを有する者)の割合の減少		目標4-2 50歳における進行した歯周炎に罹患している者(4mm以上の歯周ポケットを有する者)の割合の減少		目標4-1, 4-2 注	計画策定状況
	現状	目標	現状	目標		
国	32.0%	1998年 22%以下	46.9%	1998年 33%以下		策定時のデータ 策定後のデータ
北海道	39.8%	1993年 30%以下	46.0%	1993年 35%以下		
青森	36.4%	25%以下	45.45%			
岩手	38.4%	1999年 34%以下	<--		45-64歳	
宮城						策定中
秋田		今後調査		今後調査		
山形	43.3%	25%以下	65.6%		40%以下	
福島	38.1%	1999年 25%以下	51.5%	1999年 35%以下		
茨城		今後調査		今後調査		
栃木			25.6%		17.9%以下	
群馬	31.2%	2000年 22%以下	40.0%	2000年 30%以下		
埼玉		30%以下			40%以下	40歳代、50歳代
千葉	30.4%	2000年 20%以下	40.5%	2000年 30%以下		40歳代、50歳代
東京	31.7%	1999年 20%以下	48.9%	1999年 30%以下		
神奈川	32.0%	25%以下				
新潟	31.0%	1999年 25%以下	42%	1999年 35%以下		
富山	36.9%	1999年 30%以下	<--			
石川						
福井						H13年までの計画
山梨						
長野	63.3%	1998年 44%以下	76.2%	1998年 53%以下		40歳代、50歳代
岐阜	42.4%	2000年 30%以下	56.5%	2000年 40%以下		40歳代、50歳代
静岡	40.4%	1997年 22%以下	60.7%	1997年 33%以下		
愛知	21.0%	1999年 10%以下	32.0%	1999年 16%以下		
三重	20.8%	1999年 10%以下	28.0%	1999年 14%以下		
滋賀						
京都	53.1%	2000年	60.8%	2000年	40歳代、50歳代	
大阪		22%以下			33%以下	
兵庫		22%以下			33%以下	
奈良						
和歌山	56.0%	39%以下	73.0%		51%以下	40歳代、50歳代
鳥取	31.2%	20%以下	46.5%		30%以下	
島根						
岡山	45.8%	1999年 20%以下				
広島	37.3%	2000年 30%以下	54.2%	2000年 40%以下		
山口						
徳島						
香川						
愛媛		今後調査		今後調査		
高知	53.2%	2001年 40%以下	<--			
福岡		1999年 20%以下	45.0%	1999年 30%以下		策定中
佐賀	32.7%					
長崎		今後調査		今後調査		
熊本						
大分	51.1%	1995年 35%以下			40歳代	
宮崎	47.5%	1998年 30%以下	52.5%	1998年 40%以下		
鹿児島	47.2%	2000年 33%以下	67.4%	2000年 47%以下		
沖縄			61.0%		40%以下	

表2 健康日本21における健康指標別の目標設定都道府県数及び割合

	目標1-1 80歳における20歯以上の自分の歯を有する者の割合	目標1-2 60歳における24歯以上の自分の歯を有する者の割合	目標2 3歳児におけるう歯のない者の割合の増加	目標3 12歳児における1人平均う歯数(DMF歯数)の減少	目標4-1 40歳における進行した歯周炎に罹患している者(4mm以上の歯周ポケットを有する者)の割合の減少	目標4-2 50歳における進行した歯周炎に罹患している者(4mm以上の歯周ポケットを有する者)の割合の減少
国目標						
より小	2 (4.4)	4 (8.9)	17 (37.8)	0 (0.0)	7 (15.6)	10 (22.2)
と一致	15 (33.3)	14 (31.1)	22 (48.9)	27 (60.0)	4 (8.9)	3 (6.7)
より大	15 (33.3)	11 (24.4)	5 (11.1)	16 (35.6)	17 (37.8)	14 (31.1)
「増加」のみ	1 (2.2)	2 (4.4)	(0.0)	-	-	-
「減少」のみ	-	-	-	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
異なる基準	1 (2.2)	1 (2.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
一致項目なし	11 (24.4)	13 (28.9)	1 (2.2)	2 (4.4)	17 (37.8)	18 (40.0)
合計	45 (100.0)	45 (100.0)	45 (100.0)	45 (100.0)	45 (100.0)	45 (100.0)

数値は都道府県数、かっこ内は割合(%)

表4 健康日本21における健康指標別の目標設定都道府県数及び割合

	リスク低減目標1-1 定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者の割合の増加	リスク低減目標1-2 定期的に歯科検診を受けている者の割合の増加	リスク低減目標2-1 3歳までにフッ化物歯面塗布を受けたことのある者の割合	リスク低減目標2-2 間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者の割合	リスク低減目標3-1 学童期におけるフッ化物配合歯磨剤使用者の割合	リスク低減目標3-2 学童期において過去1年間に個別的歯垢清掃指導を受けたことのある者の割合
国目標						
より小	2 (4.4)	1 (2.2)	4 (8.9)	未設定のため 数値目標設定	4 (8.9)	0 (0.0)
と一致	8 (17.8)	18 (40.0)	13 (28.9)	12 (26.7)	17 (37.8)	10 (22.2)
より大	5 (11.1)	12 (26.7)	7 (15.6)	-	1 (2.2)	5 (11.1)
「増加」のみ	3 (6.7)	3 (6.7)	4 (8.9)	-	0 (0.0)	2 (4.4)
「減少」のみ	-	-	-	8 (17.8)	-	-
今後設定	1 (2.2)	1 (2.2)	1 (2.2)	2 (4.4)	3 (6.7)	2 (4.4)
一致項目なし	26 (57.8)	10 (22.2)	16 (35.6)	23 (51.1)	20 (44.4)	28 (62.2)
合計	45 (100.0)	45 (100.0)	45 (100.0)	45 (100.0)	45 (100.0)	45 (100.0)

	リスク低減目標4-1-1 40歳における歯間部清掃用器具を使用している者の割合	リスク低減目標4-1-2 50歳における歯間部清掃用器具を使用している者の割合	リスク低減目標4-2 喫煙が及ぼす健康影響についての知識の普及(歯周病)	リスク低減目標4-3 喫煙、節煙を希望するものに対する禁煙支援プログラムをすべての市町村で受けられるようにする。
国目標				
より小	5 (11.1)	3 (6.7)	未設定のため 数値目標設定	0 (0.0)
と一致	18 (40.0)	16 (35.6)	16 (35.6)	4 (8.9)
より大	7 (15.6)	6 (13.3)	-	-
「増加」のみ	1 (2.2)	1 (2.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
「減少」のみ	-	-	-	-
今後設定	1 (2.2)	0 (0.0)	5 (11.1)	0 (0.0)
一致項目なし	13 (28.9)	19 (42.2)	24 (53.3)	41 (91.1)
合計	45 (100.0)	45 (100.0)	45 (100.0)	45 (100.0)

数値は都道府県数、かっこ内は割合(%)

表3 健康日本21リスク低減目標項目の地方計画における記載状況 その1

都道府県名	リスク低減目標1-1				リスク低減目標1-2			
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者の割合の増加				定期的に歯科検診を受けている者の割合の増加			
	現状値	現状 対象年齢	調査年	目標	現状値	現状 対象年齢	調査年	目標
国	15.3%	55-64歳	1992年	30%以上	16.4%	55-64歳	1993年	30%以上
					18.6%	55-64歳	1999年	
北海道					10.4%	55-64歳		30%以上
青森					15.6%			30%以上
岩手								
宮城								
秋田	今後調査			増加	今後調査			増加
山形	今後調査			2倍以上	今後調査			2倍以上
福島	17.1%			25%以上	17.2%			25%以上
茨城					10.2%			30%以上
栃木								
群馬	7.8%		2000年	30%以上	7.8%		2000年	30%以上
埼玉					34.8%		2000年	50%以上
千葉	39.2%		2000年	60%以上	38.8%		2000年	60%以上
東京	20.0%	20-39歳	1999年	50%以上	<---			
	39.6%	40-64歳	1999年	60%以上	<---			
	25.4%	65歳以上	1999年	70%以上	<---			
神奈川								
新潟	4%	成人	1999年	20%以上				
富山	15.4%	55-64歳	1999年	30%以上			1999年	30%以上
石川								
福井								
山梨	18.1%	20歳以上	1999年	35%以上	19.5%		1999年	35%以上
長野	8.3%	55-64歳	1998年	30%以上	12.6%		1998年	30%以上
岐阜					43.3%	高齢	2000年	60%以上
静岡					14.4%	35-44歳	1997年	30%以上
愛知					13.8%		2000年	68%以上
三重					33.8%		1999年	68%以上
滋賀					7.0%	40歳代	1999年	30%以上
					8.5%	50歳代	1999年	30%以上
京都					21.5%	20歳以上	2000年	30%以上
大阪	15.9%		1992年	30%以上	16.4%	55-64歳	1993年	30%以上
兵庫	20.6%	55-64歳	1997年	30%以上	18.6%	55-64歳	1999年	30%以上
奈良					44.1%			80%以上
和歌山	8.3%		1999年	30%以上	5.9%			30%以上
鳥取	6.47%			30%以上	8.27%			30%以上
島根					32.8%		1999年	50%以上
岡山					59.6%		2000年	70%以上
広島	44.9%		2000年	50%以上	19.0%			30%以上
山口					7.0%		1998,9年	50%以上
徳島					21.6%	40歳		30%以上
香川					31.7%	50歳		40%以上
					32.0%	60歳		40%以上
愛媛					41.9%	40歳		+10%
	35.7%	50歳		+10%	49.8%	50歳		+10%
	35.1%	60歳		+10%	52.9%	60歳		+10%
高知					17.0%	成人	2001年	30%以上
福岡								
佐賀								
長崎				30%以上				
熊本		35-44歳	2001年	未設定		35-44歳	2001年	未設定
		45-54歳	2001年	未設定		45-54歳	2001年	未設定
		55-64歳	2001年	未設定		55-64歳	2001年	未設定
大分					14.4%	20歳以上	2000年	30%以上
宮崎					7.2%		1998年	30%以上
鹿児島	20.8%	55-64歳	2000年	40%以上	11.9%	55-64歳	2000年	40%以上
沖縄					28.0%	50歳代		40%以上

イタリックはその都道府県の値でないもの(国の値や他地域のデータによるもの)

表3 健康日本21リスク低減目標項目の地方計画における記載状況 その2

都道府県名	リスク低減目標2-1			リスク低減目標2-2			
	3歳までにフッ化物歯面塗布を受けたことのある者の割合			間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者の割合			
	現状		目標	現状		目標	
	現状値	調査年		現状値	対象年齢	調査年	
国	39.6%	1993年	50%以上	29.9%	1歳6か月児	1991年	
	52.3%	1999年					
北海道	32.4%		40%以上	38.1%	1歳6か月児		38.1%以下
青森	29.0%		40%以上	調査予定	1歳6か月児		
岩手	39.6%	1993年	50%以上	26.3%			10%以下
宮城							
秋田	今後調査		増加	今後調査			減少
山形				30.7%	1歳6か月児		15%以下
福島							
茨城			50%以上				
栃木							
群馬	今後調査		70%以上	今後調査			20%以下
埼玉	47.7%	1999年	50%以上				
千葉	35.0%	2000年	50%以上	14.9%		2000年	減少
東京							
神奈川							
新潟	52.0%	1999年	70%以上				
富山	41.4%	1999年	50%以上	65.4%	1歳6か月児	2000年	50%以下
石川							
福井							
山梨	19.5%	1999年	30%以上	2004年度	設定予定		減らす
長野	今後調査		増加	今後調査			減少
岐阜							
静岡	52.3%	1999年	今後設定	33.9%	4歳児	1995年	減少
愛知	52.8%	1998年	85%以上	16.0%	1歳6か月児	1999年	8%以下
三重	33.3%	1999年	67%以上				
滋賀	23.0%	1999年	40%以上	13.0%	3歳児	1999年	5%以下
京都							
大阪	39.6%	1993年	50%以上	39.2%	1歳6か月児	1998年	
兵庫	42.0%		50%以上	29.9%			今後設定
奈良							
和歌山	39.6%	1993年	50%以上	29.9%			
鳥取	16.2%		50%以上	8.7%			減らす
島根							
岡山	32.0%	1999年	50%以上	58.5%	1999年	1999年	30%以下
広島			50%以上				減少
山口			増やす				減らす
徳島							
香川			増加				
愛媛	33.9%		50%以上	39.6%			30%以下
高知	20.2%	2001年	50%以上	7.2%	1歳6か月児	2000年	0%
福岡							
佐賀							
長崎			60%以上				
熊本				2001年	設定予定		未設定
大分							
宮崎							
鹿児島	84.0%	2000年	94%以上	40.6%	1歳6か月児	2000年	36%以下
沖縄	51.4%		70%以上	23.4%	1歳6か月児		10%以下

イタリックはその都道府県の値でないもの(国の値や他地域のデータによるもの)

表3 健康日本21リスク低減目標項目の地方計画における記載状況 その3

都道府県名	リスク低減目標3-1				リスク低減目標3-2			
	学童期におけるフッ化物配合歯磨剤使用者の割合				学童期において過去1年間に個別的歯垢清掃指導を受けたことのある者の割合			
	現状値	現状対象	調査年	目標	現状値	現状対象	調査年	目標
国	45.6%	児童	1991年	90%以上	12.8%	15-24歳	1993年	30%以上
					18.3%	15-24歳	1999年	
北海道	54.9%			90%以上	29.5%			40%以上
青森	調査予定							
岩手								
宮城								
秋田	今後調査				今後調査			
山形								
福島								
茨城								
栃木								
群馬	今後調査				今後調査			
埼玉	45.6%		1991年	90%以上				
千葉	52.2%	小1	2000年	90%以上	学齢期			
	21.0%	小4	2000年	90%以上	21.6%	15-19歳	1999年	30%以上
	21.0%	中1	2000年	90%以上				
	21.4%	高1	2000年	90%以上				
東京	15.6%	小学生		90%以上				
	17.2%	中学生		90%以上				
神奈川								
新潟	71%	4-14歳	1999年	90%以上	47%		1999年	60%以上
富山					45.0%	5-24歳	1999年	50%以上
石川								
福井								
山梨								
長野	41.9%		1998年	90%以上	今後調査			
岐阜								
静岡	データなし				データなし			
愛知								
三重	31.7%		1998年	95%以上				
滋賀								
京都								
大阪	45.6%		1991年	90%以上	12.8%		1993年	30%以上
兵庫	13.9%		1997年	90%以上	19.7%		1999年	30%以上
奈良								
和歌山	45.6%		1991年	90%以上	18.3%		1999年	30%以上
鳥取					6.01%			30%以上
島根								
岡山	36.8%		1999年	50%以上	4.0%		1999年	60%以上
広島	35.3%	15-24歳	2000年	90%以上	21.1%	15-24歳	2000年	30%以上
山口								
徳島								
香川								
愛媛	38.9%	小中高		50%以上	20.1%	小中高		30%以上
高知	未把握							
福岡								
佐賀								
長崎								
熊本	項目あり				項目あり			
大分								
宮崎	2001年	調査		調査後	2001年	調査		増やす
鹿児島	22.7%	中1		46%以上	24.2%	中1		50%以上
沖縄	43.5%			80%以上				

イタリックはその都道府県の値でないもの(国の値や他地域のデータによるもの)

表3 健康日本21リスク低減目標項目の地方計画における記載状況 その4

都道府県名	リスク低減目標4-1-1			リスク低減目標4-1-2		
	40歳における歯間部清掃用器具を使用している者の割合			50歳における歯間部清掃用器具を使用している者の割合		
	現状		目標	現状		目標
	現状値	調査年		現状値	調査年	
国	19.3%	1993年	50%以上	17.8%	1993年	50%以上
	32.6%	1999年		29.3%	1999年	
北海道	19.0%		50%以上	16.7%		50%以上
青森	11.7%		35%以上	14.8%		40%以上
岩手	26.0%		50%以上	<---	15歳以上	
宮城						
秋田	今後調査		増加	今後調査		増加
山形	今後調査		50%以上	今後調査		50%以上
福島						
茨城	10.0%	2000年	30%以上	<---		
栃木						
群馬	31.3%	2000年	60%以上	30.5%	2000年	60%以上
埼玉	26.6%	2000年	50%以上	23.7%	2000年	50%以上
千葉	42.6%	2000年	60%以上	43.8%	2000年	60%以上
東京	44.6%	1999年	80%以上	<---	40-64歳	
神奈川						
新潟	19.0%		40%以上			
富山	16.8%	1999年	30%以上	<---	35-54歳	
石川						
福井						
山梨						
長野						
岐阜						
静岡	10.7%	1997年	50%以上	<---	45-64歳	
愛知						
三重	24.4%	1999年	73%以上	<---		
滋賀	28.8%	1999年	50%以上	26.0%	1999年	50%以上
京都	48.0%	2000年	60%以上			
大阪	19.3%	1993年	50%以上	17.8%	1993年	50%以上
兵庫	32.6%	1999年	50%以上	29.3%	1999年	50%以上
奈良	31.9%	2000年	50%以上	<---		
和歌山	12.2%	1999年	50%以上	10.4%	1999年	50%以上
	8.6%	1999年	50%以上	6.1%	1999年	50%以上
鳥取	17.1%		50%以上	12.4%		50%以上
	17.8%		50%以上	19.8%		50%以上
島根						
岡山						
広島	32.5%	2000年	50%以上	33.6%	2000年	50%以上
山口						
徳島						
香川	49.5%		70%以上	46.6%		65%以上
愛媛	36.7%		50%以上	34.1%		50%以上
高知	24.5%	2001年	50%以上	<---		
福岡						
佐賀						
長崎			30%以上			
熊本	項目あり		未設定			
大分	37.1%	2000年	50%以上	<---	40-50歳代	
宮崎	19.4%	1998年	50%以上	12.3%	1998年	50%以上
鹿児島	29.2%	2000年	60%以上	20.7%	2000年	60%以上
沖縄	18.4%		50%以上	<---	50歳代	

イタリックはその都道府県の値でないもの(国の値や他地域のデータによるもの)

表3 健康日本21リスク低減目標項目の地方計画における記載状況 その5

都道府県名	リスク低減目標4-2			リスク低減目標4-3		
	喫煙が及ぼす健康影響についての知識の普及(歯周病)			喫煙、節煙を希望するものに対する禁煙支援プログラムをすべての市町村で受けられるようにする		
	現状	調査年	目標	現状	調査年	目標
	現状値	調査年		現状値	調査年	
国	27.3%	1998年				100%
北海道						
青森						
岩手						
宮城						
秋田						
山形	今後調査		100%			
福島						
茨城			80%			
栃木						
群馬	今後調査		100%			
埼玉	20.7%	2000年	80%以上			
千葉	21.2%	2000年	100%	19.0%	2000年	100%
東京			100%			
神奈川						
新潟	項目あり		未設定			
富山			50%以上	0%	1999年	100%
石川						
福井						
山梨	項目あり		未設定			
長野						
岐阜	50.4%	2000年	100%			
静岡						
愛知	16.2%	2000年	100%	10.3%	2000年	100%
三重						
滋賀						
京都						
大阪	27.3%	1998年	100%	6.8%		100%
兵庫	項目あり		未設定			
奈良						
和歌山	27.3%	1998年				
	<---	上:フロ	下:歯間ブラシ			
鳥取						
	<---	上:フロ	下:歯間ブラシ			
島根						
岡山						
広島						
山口						
徳島						
香川						
愛媛	40.1%	20歳代	100%			
	27.0%	40歳代	100%			
	20.8%	60歳代	100%			
高知	24.4%	1998年	100%			
福岡						
佐賀						
長崎						
熊本			100%			
大分			100%			
宮崎	2001年	調査予定	後設定			
鹿児島	項目あり		未設定			
沖縄						

イタリックはその都道府県の値でないもの(国の値や他地域のデータによるもの)



## 研究成果の刊行に関する一覧表

## 書籍

著者氏名	論文タイトル名	書籍全体の 編集者名	書 籍 名	出版社名	出版地	出版年	ページ
	な し						

## 雑誌

発表者名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
青山 旬、宮武光吉	21世紀の歯科保健医療制度 - 平成11年歯科疾患実態調査報 告等から-	日本歯科医学 会誌	21巻	29-38	2002

20011028

以降は雑誌/図書等に掲載された論文となりますので  
P46「研究成果の刊行に関する一覧表」をご参照ください