

反抗挑戦性障害

注：スクリーニングが陽性の場合に限り、反抗挑戦性障害の追加質問
を実施すること。

反抗挑戦性障害

1. かんしゃくを起こす

簡単に気持ちが混乱して、かんしゃくをおこしたことがあるか？頭にくくることが多かったか？すぐに頭にきたり、いろいろしてかんしゃくを起こしたことは何回ぐらいあるか？不機嫌になると、どのようになったか？何をしたか？

P C S

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：時々激しいかんしゃくを起こし、同年代のふつうの子供よりも重度かつしばしば起こる。

3 3 3 閾値レベル：重度のかんしゃくが週2～5回起こる。

過去：

P C S

2. しばしば大人と口論する

大人と口論したことがしばしばあるか？親や教師とはどうか？どのようなことで、彼らと口論になったのか？彼らとよく言い争いになったか？争いでどの程度不愉快だったか？彼らと口論になったか？

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：時々親および／または教師と口論する。同年代のふつうの子供よりも重度かつしばしば起こる。

3 3 3 閾値レベル：しばしば親および／または教師と口論する。毎日またはほぼ毎日。

過去：

P C S

3. しばしば規則に従えない

規則を守らず、家庭や学校で叱られたりしたことがあるか？学校で教師に迷惑をかけたか？どのようなことでだったか？家の仕事を手伝わなかつたり、家庭内のルールを守らずに、両親から怒られたことがあるか？それは何回ぐらい起こったか？叱られたり、見付かったりせずに済んだことは何回くらいあるか？

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：時々大人の要求、または規則に積極的に反抗または拒否する（例：家庭での手伝いを拒否するなど）。同年代のふつうの子供よりも不服従がしばしば起こる。

3 3 3 閾値レベル：しばしば大人の要求、または規則に積極的に反抗または拒否する。毎日またはほぼ毎日。

過去：

P C S

上記項目の現在の評価のいずれかでスコア3が存在する場合は、スクリーニング面接終了後、追加質問#4「行動障害」の「反抗挑戦性障害」（現在）の項を完了すること。

上記項目の過去の評価のいずれかでスコア3が存在する場合は、スクリーニング面接終了後、追加質問#4「行動障害」の「反抗挑戦性障害」（過去）の項を完了すること。

反抗挑戦性障害を示す証拠なし。

注：（現在および過去の反抗挑戦性障害のおおよその日付を記録すること）

反抗挑戦性障害の追加質問

1. いらいらさせられやすい、または怒りやすい

誰かにいらいらして、気に障ることがよくあるか？どういうことがそうさせるか？したいことをしてはいけないと親に言わると、実際に腹が立つか？どのようなことか？他にも実際に気に障ることがあるか？いらいらしたり、気に障った時は何をするか？そういうことは、どれくらいの頻度で起こるか？

P C S

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：時々いらいらさせられやすい、または怒りやすい。同年代のふつうの子供よりもいらだちがしばしば起こる（週1～3回）。

3 3 3 閾値レベル：毎日またはほぼ毎日、いらいらさせられやすい、または怒りやすい。

過去：

— P — C — S —

2. 怒り、または腹をたてる

よく親に腹が立ったり、怒りっぽくなったりするか？教師や、兄弟、姉妹、友人にはどうか？人から怒りっぽいと言われたことがあるか？だれに、どれくらいの頻度で起こるか？

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：時々怒り、または腹をたてる。同年代のふつうの子供よりも怒りがしばしば起こる（週1～3回）。

3 3 3 閾値レベル：毎日またはほぼ毎日、怒り、または腹をたてる。

過去：

— P — C — S —

3. 意地悪で執念深い

誰かに不公平なことをされると、仕返しをしようとするか？例えば、どんなことか？兄弟や友人に迷惑をかけられたり、腹の立つようなことをされたとする。あなたは仕返しをするか？以前にそんなことがあったか？しばしばか？誰かに何をされても、そのまま放って置くことがあるか？それはよくあるか？

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：時々意地悪および／または執念深い。同年代のふつうの子供よりも意地悪がしばしば起こる（週1～3回）。

3 3 3 閾値レベル：毎日またはほぼ毎日、意地悪／およびまたは執念深い。

過去：

— P — C — S —

4. 悪い言葉をいう

にくまれ口をきいたり、悪口を言うことが多いか？教師や親から言葉遣いが悪いと文句を言われるか？どれくらいの頻度で汚い言葉を使うか？

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：時々悪い言葉をいう。同年代のふつうの子供よりもしばしば起こる。

3 3 3 閾値レベル：毎日またはほぼ毎日過剰に悪い言葉をいう。

過去：

— P — C — S —

5. 故意に他人をいらだたせる

母親から何かをするように言われると、普通はそれに従うか？例えばゲームをやめるように言われた時、それに従うか、それとも母親の言うことが聞こえないふりをして、ゲームを続けるか？わざと怒らせるようなことをすると人から言われたことがあるか？親や教師、兄弟からはどうか？どういうことについて文句を言われるか？自分でもその通りだと思うか？

兄弟姉妹へのいじめはスコアに入れないこと。

6. 自分の失敗を他人のせいにする

叱られたりした時、自分のしたことに自分で責任を負うのは難しいか？たいていは自分の失敗か、他人の失敗か？自分のやったことにどれくらいの頻度で責任を取るか？自分に降りかかる面倒な事のほとんどを他人のせいだと思うか、それとも自分の失敗だと思うか？

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：故意に他人をいらだたせるようなことをしたことが1～2度ある。

3 3 3 閾値レベル：故意に他人をいらだたせるようなことをしたことが何度もある。

過去：

P C S

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：時々自分の失敗を他人のせいにする。同年代のふつうの子供よりも責任の否定がしばしば起こる。

3 3 3 閾値レベル：50%以上は自分の失敗をしばしば他人のせいにする。

過去：

P C S

7. 持続期間

自分の不機嫌（または他の症状）はどれくらい続いているか？

	基準	親のCE	親のMSP	子供のCE	子供のMSP	サマリーCE	サマリーモード
自分の不機嫌（または他の症状）はどれくらい続いているか？	6ヶ月またはそれ以上	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

8. 障害

a. 社会的に（同年代の子供と）：

b. 家族と：

c. 学校で：

9. 結実因子（プレシピタント）の証拠
(具体的に)：

10. 反抗挑戦性障害の証拠

a. DSM-III-R 基準

1. 評価した9つの反抗の症状（例：かんしゃくを起こす；しばしば大人と口論する；規則に従えない；いろいろさせられやすい、または怒りやすい；怒り、または腹をたてる；意地悪で執念深い；悪い言葉をいう；故意に他人をいらだたせる；自分の失敗を他人のせいにする）のうち5つの基準を満たす。
2. 症状の持続期間が6カ月またはそれ以上。
および、
3. 行為障害の基準を満たさず、反抗症状が精神病性障害、気分変調症、MDD、軽躁病または躁病のエピソードの経過中にのみ起こるものではない。

サマリー CE	サマリー MSP
------------	-------------

0 1 2 0 1 2

b. DSM-IV 基準

DSM-IV基準以降、悪い言葉をいうことに関する評価が削除された。反抗挑戦性障害(ODD)と診断するためには、残る8つの症状のうち4つの基準を満たし、さらに機能障害の証拠が存在する必要がある。

0 1 2 0 1 2

行 為 障 害

注：スクリーニングが陽性の場合に限り、行為障害の追加質問を実施すること。

行為障害

1. 嘘をつく

友達に嘘をついたことがあるか？教師には？親には？人に嘘つきと言わされたことがあるか？それはなぜか？どのような嘘をついたか？今までについたもっとも悪い嘘は？嘘について、自分のために人に何かをさせたか？嘘について、借りているお金や物を返さなかつたことがあるか？誰かにペテン師と呼ばれたことがあるか？約束を守らずに、よく文句を言われるか？どれくらいの頻度で嘘をついたか？

注：詐欺や他人を「だます」ために嘘をついた場合に限り、陽性と評価すること。

2. (学校を) さぼる

学校をさぼって、1日中行かなかつたことがあるか？その時、どこに行ったのか？学校に行ってから、勝手に早引きしたことがあるか？遅刻はどうか？時々、午前中の授業に出なかつたことがあるか？何回ぐらいか？

青年では：初めて学校をさぼったのは、何歳の時か？

注：(学校を) さぼる行為が13歳以前から始まる場合に限り、陽性と評価すること。

3. 取っ組み合いの喧嘩をはじめる

殴り合いのけんかをしたことがあるか？最初にけんかを仕掛けるのはだれか？今までで最悪のけんかは何か？どのようなことが起こったか？誰かけがをしたか？いつも誰とけんかをしたのか？教師を殴ったことがあるか？父親や母親はどうか？他の大人は？どれくらいの頻度でけんかしたのか？だれかを殺そうとしたり、殺したいと思ったことがあるか？

あなたまたは友人のだれかは暴力団に属しているか？秘密組織か同胞組織か？それとも別の暴力団か？

殺人企図の証拠がある場合は、ここにチェックする。

暴力団に関係している証拠がある場合は、ここにチェックする。

4. 他人をいじめ、脅迫し、威嚇する

他の子供にひどく腹を立てたことがあるか？時々、仕返しをしたことがあるか？どのようにか？悪口を言うか？なぐるようにして脅かしたか？押したり、足をすくったりするか？手から本をたたき落したりするか、後ろから近づいて顔を平手で叩いたりするか？そういうことをどのくらいの頻度でしたか？

P C S

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：時々嘘をつく。同年代のふつうの子供よりもしばしば嘘をつく。

3 3 3 閾値レベル：しばしば嘘をつく。週に数回またはそれ以上。

過去：

P C S

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：(学校を) さぼる行為が1回ある。

3 3 3 閾値レベル：(学校を) さぼる行為が何回もある(例：2回またはそれ以上)

過去：

P C S

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：同年代の子供との喧嘩のみ。友人に重篤な怪我を負わせたことはない(例：縫合などの医学的介入を必要としない)。

3 3 3 閾値レベル：何回も喧嘩をしたがあり、友人に重篤な怪我を負わせたことが1回またはそれ以上ある。または、大人(例：教師、親)に対する取っ組み合いの喧嘩が少なくとも1回ある。

過去：

P C S

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：他人をいじめ、脅迫し、威嚇する経験が1～2回のみある。

3 3 3 閾値レベル：他人をいじめ、脅迫し、威嚇

する経験が3回またはそれ以上ある。

過去：

\bar{P} \bar{C} \bar{S}

5. (被害者の面前ではない) 非攻撃的な盗み

去年1年間に何かを盗んだか？これまでに盗んだ物でもっとも高価な物は何か？他に何を盗んだか？だれからか？どこの店から？店からおもちゃを盗んだことがあるか？母親からお金を盗んだことがあるか？他にも何かあるか？どれくらいの頻度で、盗んだか？

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：被害者の面前ではなく盗んだことが1回のみある。

3 3 3 閾値レベル：被害者の面前ではなく盗んだことが2回またはそれ以上ある。

過去：

\bar{P} \bar{C} \bar{S}

上記項目の現在の評価のいずれかでスコア3が存在する場合は、スクリーニング面接終了後、追加質問#4「行動障害」の「行為障害」(現在)の項を完了すること。

上記項目の過去の評価のいずれかでスコア3が存在する場合は、スクリーニング面接終了後、追加質問#4「行動障害」の「行為障害」(過去)の項を完了すること。

行為障害を示す証拠なし。

注：(現在および過去の行為障害のおおよその日付を記録すること。暴力団との関係についても記載すること)

行為障害の追加質問

P C S

1. 破壊行為

人の物をわざと壊すことがあるか？窓を割ったりしたことは？自動車を叩きつぶしたことは？他には？これまでにわざと壊したり、めちゃめちゃにしたり、破壊した物でもっとも高価な物は何か？本当に怒りを感じている時にはどうか？わざと人の物を壊したことは、だいたいどのくらいの頻度であるか？

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：1～2回の小さい破壊行為（例：わざと他人のおもちゃを壊す）がある。

3 3 3 閾値レベル：3回またはそれ以上の中等度～重度の破壊行為がある。

過去：

\bar{P} \bar{C} \bar{S}

2. 破壊や侵入

過去6ヵ月間にあなたか友人の誰かの自動車を壊して中に侵入したことがあるか？家は？どこかの店は？倉庫は？他の建物は？家や自動車、店などの建物を壊して侵入したことが、だいたい何回ぐらいあるか？

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：住居、車、店または他の建造物に侵入した友人と一緒にしたが、積極的には関与していない。

3 3 3 閾値レベル：住居、車、店または建造物に

1回またはそれ以上、侵入したことがある。

過去：

P C S

3. (被害者の面前での) 攻撃的な盗み

過去6ヵ月以内にあなたか友人の誰かが、人から物を盗んだことがあるか?財布をひったくったか?強奪したか?脅したか?何回ぐらいか?

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：攻撃的に盗みを犯した友人と一緒にいたが、積極的には関与していない。

3 3 3 閾値レベル：強奪、財布のひったくり、たかり、武装強盗などの経験が1回またはそれ以上ある。

過去：

P C S

4. 放火

過去6ヵ月以内に火事を起こしたか?なぜ火事を起こしたのか?マッチで遊んでいて、過って火事になったのか、それともわざと放火したのか?怒っていたのか?大きな被害を引き起こそうとしたのか、だれかへの仕返しか?自分が起こした火事のために発生したもっとも重大な損害はなにか?だいたい何回くらい火事を起こしたか?

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：火遊び。損害を起こす意図はなく、怒りに起因する放火ではない。

3 3 3 閾値レベル：損害を引き起こす意図があるか、怒りに起因する放火の経験が1回またはそれ以上ある。

過去：

P C S

5. しばしば夜遅く外出する

夜は何時に家に帰るよう言われているか?門限を過ぎても、外出したままことが多いか?一番遅い時で、何時ぐらいまで外出していたか?一晩中、外出していた時もあったか?そういうことは何回ぐらいあるか?

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：一晩中またはほぼ一晩中の外出が1回のみある。

3 3 3 閾値レベル：一晩中またはほぼ一晩中の外出が数回(2回またはそれ以上)ある。

過去：

P C S

6. 夜通しの家出

過去6ヵ月間に家出をしたことがあるか?なぜか?家から逃げ出したいと思うようなことが家であるのか?どれくらいの期間家出をしたのか?何回くらいしたのか?

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：一晩の家出が1回のみあるか、短時間の家出が数回ある。

3 3 3 閾値レベル：少なくとも二晩にわたっての家出が1回またはそれ以上あるか、一晩の

家出が2回以上ある。

過去：

PC S

7. 武器の使用

ナイフや銃をいつも持ち歩いているかナンチャクは？れんがや割れたびん、その他の武器を他人に向かつて使用したことがあるか？自分を守るために使用したか？誰かに仕返しするために、武器を使うと脅したことがあるか？

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：武器を使用すると脅迫したことはあるが、使用したことは一度もない。

3 3 3 閾値レベル：重大な身体的危険を加えるような武器（例：ナイフ、煉瓦、割れた瓶、銃）を使用したことが、1回またはそれ以上ある。

過去：

PC S

8. 人に対して身体的に残酷であること

誰かを一番ひどく殴ったのは、どんな時か？理由もなく、またはただ気に入らないという理由だけで、だれかを叩きのめしたことがあるか？どのようなことが起こったか？相手にけがをさせたか？

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：他人をいじめることははあるが（例：押したり、威嚇する）、殴りつけたり、重大な怪我を負わせたことはない。

3 3 3 閾値レベル：他人をいじめるまたは身体的に残酷であることによって、中等度から重度の怪我（例：挫傷、裂傷）を負わせた。

過去：

PC S

9. 性行為を強いること

自分との性行為や、相手が望む以上に深い関係になることを強要したことがあるか？そういうことをしたと誰かに言わされたことがあるか？どのようなことが起こったと言わされたか？そういうことが何回ぐらいあるか？

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：性器以外の愛撫を強いたことが1回またはそれ以上ある。

3 3 3 閾値レベル：性器愛撫、オーラルセックス、膣性交および／または肛門性交を強いたことが1回またはそれ以上ある。

過去：

PC S

10. 動物に対して身体的に残酷であること

動物を傷つけたり、苦しませるのが好きな子供もいる。あなたは過去6ヶ月間にわざと動物を傷つけたり、傷つけようとしたことがあるか？ビービー銃で動物を撃つことがあるか？動物に毒を食べさせた

0 0 0 情報なし

1 1 1 症状なし

2 2 2 閾値レベル未満：動物を殺傷または苦しめた経験が1回のみある。

ことがあるか？他のものは？他には何をしたか？過去6ヵ月間にだいたい何回ぐらい、わざと動物を傷つけたか？

333 動物を殺傷または苦しめた経験が2回またはそれ以上ある。

過去：

P C S

11. 障害		親の CE	親の MSP	子供の CE	子供の MSP	サマリー CE	サマリー MSP
a. 社会的に（同年代の子供と）：		0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
b. 家族と：		0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
c. 学校で：		0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
12. 持続期間	基準						
(陽性と確認された行為障害の症状)はどれくらい持続したか？	6ヵ月またはそれ以上	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
13. 集団型							
(陽性と確認された行為障害の症状)はたいていは、友達と一緒にしたのか？他の子供とか？	行為上の問題が仲間との集団活動としておこることの多いもの。	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
14. 単独攻撃型							
(陽性と確認された行為障害の症状)はたいていは、自分一人でしたのか？	ほとんどの行為障害の行動がそのものの自身によって開始されたもの。(集団行動でない)	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2

15. 分類不能型		0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
面談で話した行為のうち、一部は友達と一緒にを行い、残りは一人でやったのか？	集団型にも単独攻撃型にも分類できない行為障害の症状。						
16. 小児期発症型		0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
(陽性と確認された項目)を初めて行ったのは何歳の時か？	10歳になるまでに行為障害の症状の少なくとも1つは発症。						
17. 青年期発症型		0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2
10歳までは、こういうことをまったくしたことがなかったか？	10歳になるまでは行為障害の症状はまったく認められない。						
18. 行為障害の証拠					サマリー CE	サマリー MSP	
DSM-III-R 基準							
A. 評価した所定の6ヵ月間に以下の13の症状のうち少なくとも3つが基準を満たす。					0 1 2	0 1 2	
嘘をつく、(学校を)さぼる、取っ組み合いの喧嘩、(被害者に面と向かうことのない)非攻撃的な盗み、破壊行為、破壊や侵入、(被害者に面と向かった)攻撃的な盗み、放火、夜通しの家出、武器の使用、人に対して身体的に残酷であること、性的行為を強いること、動物に対して身体的に残酷であること。							
B. 症状の持続期間が6ヵ月またはそれ以上。および、							
C. 18歳以上の場合、反社会性人格障害の基準を満たさない。							
DSM-IV 基準							
A. 過去12ヵ月間に以下の15の行為のうち少なくとも3つが基準を満たし、過去6ヵ月間に少なくとも1つ症状が存在する。					0 1 2	0 1 2	
嘘をつく、(学校を)さぼる、取っ組み合いの喧嘩、いじめる、しばしば夜遅く外出する、(被害者の面前ではない)非攻撃的な盗み、破壊行為、破壊や侵入、(被害者の面前での)攻撃的な盗み、放火、夜通しの家出、武器の使用、人に対して身体的に残酷であること、性的行為を強いること、動物に対して身体的に残酷であること。							
B. 行動が臨床的に著しい障害を引き起こしている。および、							
C. 18歳以上の場合、反社会性人格障害の基準を満たさない。							
小児期発症型							
10歳になるまでに基準の症状がすくなくとも1つ発症。					0 1 2	0 1 2	

<u>青年期発症型</u> 10歳になるまでは基準の症状はまったく認められない。	0	1	2	0	1	2
<u>軽症</u> 行為上の問題があったとしても、診断に必要な項目数よりもわずかに多いだけであり、こうした行為上の問題によって他者に軽微な損害しか与えていない場合（例：嘘をつく、（学校を）さぼる、夜遅く外出する）。	0	1	2	0	1	2
<u>中等症</u> 症状の数および作用が「軽症」と「重症」の間に位置する（例：被害者の面前ではない盗み、破壊行為）。	0	1	2	0	1	2
<u>重症</u> 行為障害の症状の数が診断に必要な項目数よりもはるかに多いか、またはこうした行為によって他者に著しい損害を与えている場合（例：性行為を強いること、武器の使用、被害者の面前での盗み、破壊や侵入）。	0	1	2	0	1	2

KIDDIE - SADS - PL

アンサーシート

AD/HD（注意欠陥/多動性障害）

AD/HDのスクリーニングと追加質問の両方を最後まで完了すること。

以下の項目を次のスコアで評価する。0＝情報なし 1＝症状なし 2＝閾値レベル未満 3＝閾値レベル

スクリーニング	現在のエピソード	もっとも重症の過去のエピソード	症状の種類	備考
1. 課題や遊びの活動で注意を集中し続けることが難しい	0 1 2 3	0 1 2 3	I	
2. 気が散りやすい	0 1 2 3	0 1 2 3	I	
3. 座っていることが難しい	0 1 2 3	0 1 2 3	H	
4. 衝動性	DSM-IV基準でないため、評価しないこと。			
追加質問	現在のエピソード	もっとも重症の過去のエピソード	症状の種類	
1. しばしば不注意な間違いをする	0 1 2 3	0 1 2 3	I	
2. 聞いていない	0 1 2 3	0 1 2 3	I	
3. 指示に従うことが難しい	0 1 2 3	0 1 2 3	I	
4. 課題を順序だてて行うことが難しい	0 1 2 3	0 1 2 3	I	
5. 注意を要する課題を嫌う／避ける	0 1 2 3	0 1 2 3	I	
6. ものをなくしてしまう	0 1 2 3	0 1 2 3	I	
7. 日々の活動で忘れっぽい	0 1 2 3	0 1 2 3	I	
8. そわそわする	0 1 2 3	0 1 2 3	H	
9. 過度に走ったりよじ登ったりする	0 1 2 3	0 1 2 3	H	
10. じっとしていない／何かに駆り立てられるように活動する	0 1 2 3	0 1 2 3	H	
11. おとなしく遊ぶことが難しい	0 1 2 3	0 1 2 3	H	
12. 出し抜けに答えてしまう	0 1 2 3	0 1 2 3	H	
13. 順番を待つのが難しい	0 1 2 3	0 1 2 3	H	
14. さえぎったり、邪魔したりする	0 1 2 3	0 1 2 3	H	
15. (未完成のまま)次にうつる	DSM-IV基準でないため、評価しないこと。			
16. 過度にしゃべる	0 1 2 3	0 1 2 3	H	
17. 身体的に危険な行動をとる	DSM-IV基準でないため、評価しないこと。			

AD/HD（続き）

以下の項目を次のスコアで評価する。0＝情報なし 1＝症状なし 2＝症状あり

	現在のエピソード	もっとも重症の過去のエピソード	備考
18. 持続期間（6カ月またはそれ以上）	0 1 2	0 1 2	
19. 発症年齢（7歳以前に発症）	0 1 2	0 1 2	
20. 障害	現在のエピソード	もっとも重症の過去のエピソード	
a. 社会的に（同年代の子供と）	0 1 2	0 1 2	
b. 家族と	0 1 2	0 1 2	
c. 学校で	0 1 2	0 1 2	

21. AD/HDの証拠 (DSM-III-R)	DSM-IV基準でないため、評価しないこと。
-----------------------------	------------------------

スクリーニングおよび追加質問的回答にもとづいて、以下の質問に答えること。

22. AD/HDの証拠 (DSM-IV)	現在のエピソード	もっとも重症の過去のエピソード
不注意：症状の種類Iの項目はいくつスコア3と評価されたか？	Iのスコア3の合計：_____個	Iのスコア3の合計：_____個
多動／衝動性：症状の種類IIの項目はいくつスコア3と評価されたか？	IIのスコア3の合計：_____個	IIのスコア3の合計：_____個

項目18～22に対する回答にもとづいて、以下の質問に答えること。

	現在のエピソード	もっとも重症の過去のエピソード
1. 不注意優勢型：Iの項目はスコア3が計6個以上あるが、IIは5個以下である。	はい いいえ	はい いいえ
2. 多動性／衝動性優勢型：IIの項目はスコア3が計6個以上あるが、Iは5個以下である。	はい いいえ	はい いいえ
3. 混合型：Iの項目はスコア3が計6個以上あり、IIも6個以上ある。	はい いいえ	はい いいえ
4. 追加質問の項目18「持続期間」はスコア2であったか？	はい いいえ	はい いいえ
5. 追加質問19「発症年齢」はスコア2であったか？	はい いいえ	はい いいえ
6. 追加質問20「障害」のうち2つ以上はスコア2であったか？	はい いいえ	はい いいえ

注：質問1～3のいずれかが「はい」であり、質問4～6がすべて「はい」である場合に限り、患者はAD/HDのDSM-IV基準に適合する。

	現在のエピソード	もっとも重症の過去のエピソード
患者はAD/HDのDSM-IV基準に適合するか？	はい いいえ	はい いいえ
患者はAD/HD、不注意優勢型のDSM-IV基準に適合するか？	はい いいえ	はい いいえ
患者はAD/HD、多動性／衝動性優勢型のDSM-IV基準に適合するか？	はい いいえ	はい いいえ
患者はAD/HD、混合型のDSM-IV基準に適合するか？	はい いいえ	はい いいえ

反抗挑戦性障害

以下の項目を次のスコアで評価する。 0 = 情報なし 2 = 閾値レベル未満
 1 = 症状なし 3 = 閾値レベル

<u>スクリーニング</u>	現在のエピソード	もっとも重症の過去のエピソード	備考
1. かんしゃくを起こす	0 1 2 3	0 1 2 3	
2. しばしば大人と口論する	0 1 2 3	0 1 2 3	
3. しばしば規則に従えない	0 1 2 3	0 1 2 3	

注：上記項目の1つでもスコア3がある場合に限り、反抗挑戦性障害の追加質問を実施すること。

<u>追加質問</u>	現在のエピソード	もっとも重症の過去のエピソード	備考
1. いらいらさせられやすい、または怒りやすい	0 1 2 3	0 1 2 3	
2. 怒り、または腹をたてる	0 1 2 3	0 1 2 3	
3. 意地悪で執念深い	0 1 2 3	0 1 2 3	
4. 悪い言葉をいう	DSM-IV基準でないため、評価しないこと。		
5. 故意に他人をいらだたせる	0 1 2 3	0 1 2 3	
6. 自分の失敗を他人のせいにする	0 1 2 3	0 1 2 3	

以下の項目を次のスコアで評価する。 0 = 情報なし

1 = 症状なし

2 = 症状あり

	現在のエピソード	もっとも重症の過去のエピソード	備考
7. 持続期間（6ヶ月またはそれ以上）	0 1 2	0 1 2	
8. 障害	現在のエピソード	もっとも重症の過去のエピソード	
a. 社会的に（同年代の子供と）	0 1 2	0 1 2	
b. 家族と	0 1 2	0 1 2	
c. 学校で	0 1 2	0 1 2	
9. 結実因子（プレシピタント）の証拠	0 1 2	0 1 2	
具体的に：			

反抗挑戦性障害（続き）

10 a. 反抗挑戦性障害の証拠 (DSM-III-R)	DSM-IV基準でないため、評価しないこと。			
---------------------------------	------------------------	--	--	--

10 b. 反抗挑戦性障害の証拠 (DSM-IV)	現在のエピソード	もっとも重症の過去のエピソード
i. スクリーニング 1～3 および／または追加質問 1～3、5～6 の評価でスコア 3 が 4 つ以上あったか？	はい　いいえ	はい　いいえ
ii. 追加質問 7 「持続期間」はスコア 2 であったか？	はい　いいえ	はい　いいえ
iii. 追加質問 8 「障害」の 1 つでもスコア 2 が あったか？	はい　いいえ	はい　いいえ

注：質問 i～iii がすべて「はい」であれば、反抗挑戦性障害のDSM-IV基準に適合する。

	現在のエピソード	もっとも重症の過去のエピソード
患者は反抗挑戦性障害のDSM-IV基準に適合するか？	はい　いいえ	はい　いいえ

行為障害

以下の項目を次のスコアで評価する。 0 = 情報なし　　2 = 関値レベル未満
 1 = 症状なし　　3 = 関値レベル
 NA = 該当なし

スクリーニング	現在のエピソード	もっとも重症の過去のエピソード	備考
1. 嘘をつく	0 1 2 3	0 1 2 3	
2. (学校を) さぼる	0 1 2 3	0 1 2 3	
3. 取っ組み合いの喧嘩をはじめる	0 1 2 3	0 1 2 3	
殺人企図	NA いいえ はい	NA いいえ はい	
暴力團に関係している	NA いいえ はい	NA いいえ はい	
4. 他人をいじめ、脅迫し、威嚇する	0 1 2 3	0 1 2 3	
5. (被害者の面前ではない) 非攻撃的な盗み (例: こそ泥、空き巣)	0 1 2 3	0 1 2 3	

注：上記項目の 1 つでもスコア 3 がある場合に限り、行為障害の追加質問を実施すること。

<u>追加質問</u>	現在のエピソード	もっとも重症の過去のエピソード	備考
1. 破壊行為	0 1 2 3	0 1 2 3	
2. 破壊や侵入	0 1 2 3	0 1 2 3	
3. (被害者の面前での)攻撃的な盗み(例:強盗)	0 1 2 3	0 1 2 3	
4. 放火	0 1 2 3	0 1 2 3	
5. しばしば夜遅く外出する	0 1 2 3	0 1 2 3	
6. 夜通しの家出	0 1 2 3	0 1 2 3	
7. 武器の使用	0 1 2 3	0 1 2 3	
8. 人に対して身体的に残酷であること	0 1 2 3	0 1 2 3	
9. 性行為を強いること	0 1 2 3	0 1 2 3	
10. 動物に対して身体的に残酷であること	0 1 2 3	0 1 2 3	

行為障害(続き)

以下の項目を次のスコアで評価する。 0 = 情報なし

1 = 症状なし

2 = 症状あり

11. 障害	現在のエピソード	もっとも重症の過去のエピソード	備考
a. 社会的に(同年代の子供と)	0 1 2	0 1 2	
b. 家族と	0 1 2	0 1 2	
c. 学校で	0 1 2	0 1 2	
12. 持続期間(6カ月またはそれ以上)	0 1 2	0 1 2	
13. 集団型	0 1 2	0 1 2	
14. 単独攻撃型	0 1 2	0 1 2	
15. 分類不能型	0 1 2	0 1 2	
16. 小児期発症型	0 1 2	0 1 2	
17. 青年期発症型	0 1 2	0 1 2	

18. 行為障害の証拠 (DSM-III-R)	DSM-IV基準でないため、評価しないこと。			
----------------------------	------------------------	--	--	--

18. 行為障害の証拠 (DSM-IV)	現在のエピソード	もっとも重症の過去のエピソード	
i. スクリーニング 1～5 および／または追加質問 1～10 の評価でスコア 3 が 3 つ以上あったか？	はい　いいえ	はい　いいえ	はい　いいえ
ii. 追加質問 11 「障害」の 1 つでもスコア 2 があったか？	はい　いいえ	はい　いいえ	はい　いいえ
iii. 追加質問 12 「持続期間」スコア 2 であったか？	はい　いいえ	はい　いいえ	はい　いいえ

注：質問 i ～ iii がすべて「はい」であれば、行為障害の DSM-IV 基準に適合する。

	現在のエピソード	もっとも重症の過去のエピソード	
患者は行為障害の DSM-IV 基準に適合するか？	はい　いいえ	はい　いいえ	はい　いいえ