

1	フェノバルビタール	注射剤	新生児痙攣・鎮静	5	①
1	プログリセム	経口	高インスリン性低血糖症	2	③
1	プロプラノロール	経口	ファロー四徴症	6	①
1	プロマゼパム	坐剤	痙攣の鎮静	29	①
1	ベラプロストナトリウム	経口	肺高血圧症	13>	④
1	ホスカルネットナトリウム	注射剤	サイトメガロウイルス感染症	3	①
1	メサラジン	経口	クローン病	3	④
1	メスナ	注射剤	移植前処置後の出血性膀胱炎の治療・予防（シクロホスファミドとの併用）	4	①
1	メフェナム酸	経口	動脈管開存症（PDA）	30	①
1	メロペネム	注射剤	感染症	4	④
1	ランソプラゾール	経口	逆流性食道炎	1	④
1	硫酸亜鉛	経口	亜鉛欠乏症	1	③
1	リン酸フルダラビン	注射剤	移植前処置	1	①
1	ワルファリンカリウム	経口	全身性エリテマトーデス	3	①
1	塩酸キナプリル	経口	蛋白尿改善	1	①
1	硫酸アトロピン	経口	幽門狭窄症	1	①

①	承認を受けている効能・効果及び用法・用量以外の目的での使用をする場合
②	小児に対する使用が禁忌となっている医薬品を使用する場合
③	医療用医薬品として認められていない院内製剤、個人輸入医薬品、試薬等を使用する場合
④	厳密には適応外使用には当てはまらないが、添付文書中の「使用上の注意」に「小児に対する安全性が確立されていない」等の記載がされている医薬品（有効性・安全性上疑問が残る）

小児薬物療法におけるデータネットワークのモデル研究

（主任研究者）石川 洋一

**ワルファリン錠及びミダゾラム注に関する処方実績調査**

（分担研究者） 山口 正和 国立成育医療センター 薬剤部主任

研究要旨

当研究班による平成 13 年度研究として、日本小児科学会・厚生科学研究大西班（小児医薬品調査研究班による分科会別の適応外使用改善に関する優先順位表）に基づき選定した 10 医薬品について使用実態調査を行った結果、ワルファリン錠及びミダゾラム注の小児における処方実績報告件数が多かったことから、使用実態を明確にするため再度処方実績調査を実施した。

同薬剤に関しては、添付文書上に小児における用法・用量の記載はなく、一方で、使用上の注意の項において「小児に対する安全性は確立していない」との記載がなされている。これは、事実上小児に対しての使用は適応外となり、臨床の現場における実際の使用状況から改善の必要性が強く求められているものである。

A. 研究目的

小児薬物療法における適応外使用が問題となっており、その状況の実態把握と小児治験・多施設臨床試験のネットワーク構築を目的として当研究班が発足した。

その第一段階の平成 13 年度研究として、日本小児科学会・厚生科学研究大西班（小児医薬品調査研究班による分科会別の適応外使用改善に関する優先順位表）に基づき選定した 10 医薬品について使用実態調査を行った。その結果、ワルファリン錠及びミダゾラム注の処方実績報告件数が多かったことから、使用実態を明確にするため再度処方実績調査を実施することとした。

B. 研究方法

1) 研究協力施設全科における 16 歳以下の患者のワルファリン錠及びミダゾラム注の使用実績について調査する。入院及び外来に関わら

ず一患者一データとする。

2) データ入力方法はインターネット・ホームページ「小児薬物療法研究」にアクセスし、所定のデータ入力画面の項目に従い入力を行う。

（ホームページアドレス：  
<http://www.ebm.ne.jp/cmt/index.html>）

3) 適応外使用の実態を調査することが目的であることから、保険請求病名ではなく実病名、有害事象の有無及び有効性等について調査を行うため、処方医師の協力を要請し実施する。

4) 調査期間は、平成 14 年 11 月 1 日より平成 14 年 11 月 30 日までの 1 ヶ月間とする。

（倫理面への配慮）

患者情報に関しては各研究協力施設の取り扱い規則に従うこととする。データには患者氏名および患者 ID など個人を特定できるものを用いず、管理番号を付けて情報を整理することにより、非個人情報化したデータとする。また、管理番号は研究協力者が管理する。

インフォームド・コンセントの必要性については、「疫学研究に関する倫理指針」から当該研究が人体から採取された試料を用いず既存資料等のみを用いる観察研究に該当するため、研究対象者からインフォームド・コンセントを受けを必ずしも要しないと考える。

### C. 研究結果

研究協力施設 31 施設（国立病院 10 施設、公立こども病院 14 施設、大学病院 7 施設）に調査依頼を行った。

その結果、25 施設（国立病院 6 施設、公立こども病院 13 施設、大学病院 6 施設）より調査結果を得た。

内訳はワルファリン錠 201 例、ミダゾラム注 508 例のデータとなっている。

#### 1. 年齢

ワルファリン錠：新生児 0 例、乳児 17 例、児童 134 例、青年期 41 例、その他 9 例

ミダゾラム注：新生児 15 例、乳児 160 例、児童 307 例、青年期 24 例、その他 2 例

#### 2. 診療科

ワルファリン錠：循環器科 88 例、小児科 58 例、心臓血管外科 37 例、腎消化器科 11 例、不明 1 例

ミダゾラム注：麻酔科 266 例、小児科 50 例、不明 43 例、循環器科 39 例、その他 110 例

#### 3. 対象疾患

ワルファリン錠：適応外使用 123 例、血栓塞栓症 30 例、静脈血栓症 22 例、緩徐に進行する脳血栓症等 15 例、心筋梗塞症 10 例、肺塞栓症 1 例

ミダゾラム注：麻酔前投薬 306 例、適応外使用 125 例、集中治療室における人工呼吸の沈静 47 例、全身麻酔の導入および維持 30 例

#### 4. 適応外使用

ワルファリン錠：術後の血栓予防 62 例、原発性肺高血圧 13 例、腎炎 13 例、川崎病 8 例、その他 27 例

ミダゾラム注：検査のための鎮静 48 例、鎮静 41 例、術後の鎮静 16 例、抗けいれん 15 例、その他 5 例

#### 5. 有効性（適応外使用）

ワルファリン錠：著効 15 例、有効 81 例、やや有効 7 例、無回答・未判定 20 例

ミダゾラム注：著効：13 例、有効 40 例、やや有効 13 例、無効：2 例、無回答・未判定 57 例

#### 6. 安全性（適応外使用）

ワルファリン錠：TT↓ 1 例、皮下出血 2 例、出血傾向 1 例、鼻出血 1 例

ミダゾラム注：hypobentilation 1 例

### D. 考察

ワルファリン錠およびミダゾラム注に関しては、臨床の現場で広く使用されている医薬品であり、それは小児領域においても例外ではない。これは、当研究班で実施した先の 10 品目の使用実態調査から、他の医薬品と比較してこの 2 品目がどの研究協力施設においても使用例が多く、また、どの施設においても使用されていたことから伺うことができる。

今回の調査では、使用年齢、使用診療科、対象疾患、適応外使用とその有効性・安全性のデータの他、使用薬用量や剤型のデータも収集しており、各年齢層別の薬用量や対象疾患別の薬用量も情報として加工することが可能である。

### E. 結論

添付文書上「小児における安全性が確認されていない」との記載がなされているワルファリン錠およびミダゾラム注における処方実績調査により、小児領域における両薬剤の使用状況と、承認されている効能・効果以外の適応外使用の実態が確認できた。

特にミダゾラム注では、注射としての使用以外に経口投与としても多く使用されていることが明らかとなり、剤型を変えての適応外使用


の状況も確認できた。

この調査結果を踏まえて、今後は医療現場、行政、企業に使用実態を公表し、早期の適応拡大へ向けての足がかりとなるように進めていきたい。


#### F. 研究発表

平成 15 年 3 月 29 日国立成育医療センター講堂における、当研究班協力施設担当者向け報告会にて報告済み。


### 使用実績（母体別）




### ミタゾラム注 使用実績（診療科別）




### 使用実績（年齢別）




### ミタゾラム注 使用実績（対象疾患別）



### 使用実績（診療区分別）




### ミタゾラム注 使用実績（投与経路）




ミタゾラム注一分布図


◆ 集中治療室における人工呼吸の鎮静




◆ 全身麻酔の導入および維持



◆ 麻酔前投薬





◆ 適応外使用




集中域拡大

集中域拡大




ワルファリン錠 使用実績 (診療科別)




ワルファリン錠一分布図


◆ 緩徐に進行する脳血栓症等の治療




ワルファリン錠 使用実績 (対象疾患別)




◆ 血栓塞栓症




◆ 心筋梗塞症



◆ 静脈血栓症



◆ 適応外使用



◆ ミタゾラム注：副作用あり

安全性(コメント)	対象疾患	対象疾患手入力	性別	満年齢	年齢区分	投与量	総合コメント
hypobentilation	適応外使用	けいれん	男	0	2. 乳児	0.3 mg	

◆ ミタゾラム注：副作用あり

安全性(コメント)	対象疾患	対象疾患手入力	性別	満年齢	年齢区分	投与量	総合コメント
TT↓	適応外使用	IgA腎症	男	5	3. 児童	1.5 mg	
皮下出血	適応外使用	三尖弁閉鎖症、フォンタン術後	女	5	3. 児童	2.2 mg	血栓予防
皮下出血、鼻出血	適応外使用	川崎病に伴う冠状動脈瘤	男	6	3. 児童	2.8 mg	
出血経口あり (2001.3.26)	適応外使用	川崎病巨大動脈瘤	女	9	3. 児童	3.4 mg	
鼻出血	適応外使用	人工弁置換術後(血栓予防)	男	10	3. 児童	5 mg	

◆ ワルファリン錠：因果関係は不明だが有害事象あり

安全性(コメント)	対象疾患	対象疾患手入力	性別	満年齢	年齢区分	投与量	総合コメント
月経過多	血栓塞栓症		女	13	4. 青年期	2 mg	人工弁置換術後 投与開始時期 1992年12月頃



	施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
	対象疾患			適応外使用分類		対象疾患手入力						年齢
1	公立こどもB	アレルギー科			入院 2002/11/01 ~ 2002/11/05 (5日間)	投与終了	注射	注射	25.00mg		8.7kg	2001/09/08
	集中治療室における人工呼吸の鎮静											女 1歳 2ヶ月
	用法・容量:											
	総合コメント:						安全性: 特になし					有効性: 有効
2	公立こどもB	アレルギー科			入院 2002/11/24 ~ 2002/11/26 (3日間)	投与終了	注射	注射	50.00mg		17.7kg	1993/12/06
	集中治療室における人工呼吸の鎮静											女 8歳 11ヶ月
	用法・容量:											
	総合コメント:						安全性: 特になし					有効性: 有効
3	公立こどもB	麻酔科			入院 2002/11/05 ~ 2002/11/05 (1日間)	投与終了	注射	注射	1.00mg	51.5cm	2.9kg	2002/10/29
	全身麻酔の導入および維持											男 0歳 0ヶ月
	用法・容量:											
	総合コメント: 処方時年齢 7日						安全性: 特になし					有効性: 著効
4	公立こどもB	麻酔科			入院 2002/11/27 ~ 2002/11/27 (1日間)	投与終了	注射	注射	1.00mg	57.5cm	5.1kg	2002/09/11
	全身麻酔の導入および維持											女 0歳 2ヶ月
	用法・容量:											
	総合コメント:						安全性: 特になし					有効性: 著効
5	公立こどもB	麻酔科			入院 2002/11/20 ~ 2002/11/20 (1日間)	投与終了	注射	注射	1.50mg	65.5cm	7.1kg	2002/05/22
	全身麻酔の導入および維持											男 0歳 5ヶ月
	用法・容量:											
	総合コメント:						安全性: 特になし					有効性: 著効
6	公立こどもB	麻酔科			入院 2002/11/25 ~ 2002/11/25 (1日間)	投与終了	注射	注射	2.00mg	68.9cm	8.0kg	2002/05/31
	全身麻酔の導入および維持											男 0歳 5ヶ月
	用法・容量:											
	総合コメント:						安全性: 特になし					有効性: 著効
7	公立こどもB	麻酔科			入院 2002/11/18 ~ 2002/11/18 (1日間)	投与終了	注射	注射	3.00mg	88.0cm	11.6kg	2001/03/06
	全身麻酔の導入および維持											女 1歳 8ヶ月
	用法・容量:											
	総合コメント:						安全性: 特になし					有効性: 著効
8	公立こどもB	麻酔科			入院 2002/11/08 ~ 2002/11/08 (1日間)	投与終了	注射	注射	0.50mg	66.0cm	8.3kg	2002/06/15
	適応外使用				手術後の鎮静	術後鎮静						男 0歳 4ヶ月
	用法・容量:											
	総合コメント:						安全性: 特になし					有効性: 著効
9	公立こどもB	麻酔科			入院 2002/11/06 ~ 2002/11/06 (1日間)	投与終了	注射	注射	0.50mg	69.0cm	7.6kg	2002/05/09
	適応外使用				手術後の鎮静	術後鎮静						男 0歳 5ヶ月
	用法・容量:											
	総合コメント:						安全性: 特になし					有効性: 著効
10	公立こどもB	麻酔科			入院 2002/11/13 ~ 2002/11/14 (2日間)	投与終了	注射	注射	20.00mg	112.1cm	17.8kg	1997/02/09
	適応外使用				手術後の鎮静	術後鎮静						男 5歳 9ヶ月
	用法・容量:											
	総合コメント:						安全性: 特になし					有効性: 著効
11	公立こどもB	麻酔科			入院 2002/11/05 ~ 2002/11/05 (1日間)	投与終了	注射	注射	1.00mg	121.0cm	21.1kg	1995/10/08
	適応外使用				手術後の鎮静	術後鎮静						女 7歳 0ヶ月
	用法・容量:											
	総合コメント:						安全性: 特になし					有効性: 有効
12	公立こどもB	麻酔科			入院 2002/11/27 ~ 2002/11/27 (1日間)	投与終了	水剤	内用	3.50mg	65.8cm	7.8kg	2001/08/30
	麻酔前投薬											女 1歳 2ヶ月
	用法・容量: 注射剤を液剤に調製											
	総合コメント: 奇形症候群 発達発育障害あり						安全性: 特になし					有効性: 有効
13	公立こどもB	麻酔科			入院 2002/11/15 ~ 2002/11/15 (1日間)	投与終了	水剤	内用	8.00mg	94.1cm	15.8kg	2000/05/24
	麻酔前投薬											女 2歳 5ヶ月
	用法・容量: 注射剤を液剤に調製											
	総合コメント:						安全性: 特になし					有効性: 有効
14	公立こどもB	麻酔科			入院 2002/11/22 ~ 2002/11/22 (1日間)	投与終了	水剤	内用	6.00mg	98.4cm	12.7kg	1999/03/10
	麻酔前投薬											女 3歳 8ヶ月
	用法・容量: 注射剤を液剤に調製											
	総合コメント:						安全性: 特になし					有効性: やや有効
15	公立こどもB	麻酔科			入院 2002/11/19 ~ 2002/11/19 (1日間)	投与終了	水剤	内用	8.50mg	104.4cm	17.3kg	1998/09/28
	麻酔前投薬											女 4歳 1ヶ月
	用法・容量: 注射剤を液剤に調製											
	総合コメント:						安全性: 特になし					有効性: やや有効
16	公立こどもB	麻酔科			入院 2002/11/19 ~ 2002/11/19 (1日間)	投与終了	水剤	内用	10.00mg	104.7cm	22.0kg	1998/06/20
	麻酔前投薬											男 4歳 4ヶ月
	用法・容量: 注射剤を液剤に調製											
	総合コメント:						安全性: 特になし					有効性: 有効
17	公立こどもB	麻酔科			入院 2002/11/01 ~ 2002/11/01 (1日間)	投与終了	水剤	内用	8.00mg	104.2cm	16.5kg	1998/01/17
	麻酔前投薬											女 4歳 9ヶ月
	用法・容量: 注射剤を液剤に調製											
	総合コメント:						安全性: 特になし					有効性: 有効
18	公立こどもB	麻酔科			入院 2002/11/20 ~ 2002/11/20 (1日間)	投与終了	水剤	内用	9.00mg	107.6cm	17.6kg	1997/05/01
	麻酔前投薬											女 5歳 6ヶ月
	用法・容量: 注射剤を液剤に調製											
	総合コメント:						安全性: 特になし					有効性: 著効

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日	
対象疾患	適応外使用分類		対象疾患手入力									
19	公立こどもB	麻酔科	入院	2002/11/20 ~ 2002/11/20 (1日間)	投与終了	水剤	内用	8.50mg	116.0cm	16.4kg	1997/05/16	
	麻酔前投薬										男 5歳 6ヶ月	
	用法・容量	注射剤を液剤に調製										
	総合コメント	安全性：特になし							有効性：無効			
20	公立こどもB	麻酔科	入院	2002/11/15 ~ 2002/11/15 (1日間)	投与終了	水剤	内用	9.50mg	113.3cm	19.2kg	1997/03/24	
	麻酔前投薬										女 5歳 7ヶ月	
	用法・容量	注射剤を液剤に調製										
	総合コメント	安全性：特になし							有効性：有効			
21	公立こどもB	麻酔科	入院	2002/11/01 ~ 2002/11/01 (1日間)	投与終了	水剤	内用	10.00mg	115.3cm	24.3kg	1996/07/30	
	麻酔前投薬										女 6歳 3ヶ月	
	用法・容量	注射剤を液剤に調製										
	総合コメント	安全性：特になし							有効性：有効			
22	公立こどもB	循環器科	入院	2002/11/21 ~ 2002/11/21 (1日間)	投与終了	水剤	内用	10.00mg		28.3kg	1995/06/21	
	麻酔前投薬										女 7歳 4ヶ月	
	用法・容量	注射剤を液剤に調製										
	総合コメント	安全性：特になし							有効性：著効			
23	公立こどもB	麻酔科	入院	2002/11/25 ~ 2002/11/25 (1日間)	投与終了	水剤	内用	10.00mg	148.9cm	31.6kg	1989/08/25	
	麻酔前投薬										男 13歳 2ヶ月	
	用法・容量	注射剤を液剤に調製										
	総合コメント	安全性：特になし							有効性：有効			
24	公立こどもC		～			注射	注射				1985/01/22	
	集中治療室における人工呼吸の鎮静										男 17歳 10ヶ月	
	用法・容量											
	総合コメント	安全性：							有効性：			
25	公立こどもC		～			注射	注射				1991/09/04	
	適応外使用	鎮静									女 11歳 3ヶ月	
	用法・容量											
	総合コメント	安全性：							有効性：			
26	公立こどもC		～			注射	注射				1986/02/03	
	適応外使用	抗けいれん									女 16歳 10ヶ月	
	用法・容量											
	総合コメント	安全性：							有効性：			
27	公立こどもC		～			注射	注射				2002/11/17	
	麻酔前投薬										女 0歳 0ヶ月	
	用法・容量											
	総合コメント	安全性：							有効性：			
28	公立こどもC		～			注射	注射				2002/11/16	
	麻酔前投薬										女 0歳 0ヶ月	
	用法・容量											
	総合コメント	安全性：							有効性：			
29	公立こどもC		～			注射	注射				2002/10/23	
	麻酔前投薬										男 0歳 1ヶ月	
	用法・容量											
	総合コメント	安全性：							有効性：			
30	公立こどもC		～			注射	注射				2002/10/30	
	麻酔前投薬										女 0歳 1ヶ月	
	用法・容量											
	総合コメント	安全性：							有効性：			
31	公立こどもC		～			注射	注射				2002/10/30	
	麻酔前投薬										男 0歳 1ヶ月	
	用法・容量											
	総合コメント	安全性：							有効性：			
32	公立こどもC		～			注射	注射				2002/10/22	
	麻酔前投薬										女 0歳 1ヶ月	
	用法・容量											
	総合コメント	安全性：							有効性：			
33	公立こどもC		～			注射	注射				2002/10/07	
	麻酔前投薬										女 0歳 2ヶ月	
	用法・容量											
	総合コメント	安全性：							有効性：			
34	公立こどもC		～			注射	注射				2002/10/07	
	麻酔前投薬										男 0歳 2ヶ月	
	用法・容量											
	総合コメント	安全性：							有効性：			
35	公立こどもC		～			注射	注射				2002/07/18	
	麻酔前投薬										男 0歳 4ヶ月	
	用法・容量											
	総合コメント	安全性：							有効性：			
36	公立こどもC		～			注射	注射				2002/05/30	
	麻酔前投薬										女 0歳 6ヶ月	
	用法・容量											
	総合コメント	安全性：							有効性：			

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
対象疾患				適応外使用分類							年齢
37	公立こどもC	麻酔前投薬	~	~	~	注射	注射				2002/02/06 女 0歳 11ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:					安全性:					有効性:
38	公立こどもC	麻酔前投薬	~	~	~	注射	注射				2001/06/28 男 1歳 5ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:					安全性:					有効性:
39	公立こどもC	麻酔前投薬	~	~	~	注射	注射				2001/03/10 女 1歳 8ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:					安全性:					有効性:
40	公立こどもC	麻酔前投薬	~	~	~	注射	注射				2000/11/04 女 2歳 1ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:					安全性:					有効性:
41	公立こどもC	麻酔前投薬	~	~	~	注射	注射				2000/06/01 男 2歳 5ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:					安全性:					有効性:
42	公立こどもC	麻酔前投薬	~	~	~	注射	注射				1999/12/16 男 2歳 11ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:					安全性:					有効性:
43	公立こどもC	麻酔前投薬	~	~	~	注射	注射				1999/07/26 女 3歳 3ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:					安全性:					有効性:
44	公立こどもC	麻酔前投薬	~	~	~	注射	注射				1999/04/17 男 3歳 7ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:					安全性:					有効性:
45	公立こどもC	麻酔前投薬	~	~	~	注射	注射				1999/03/31 男 3歳 8ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:					安全性:					有効性:
46	公立こどもC	麻酔前投薬	~	~	~	注射	注射				1992/10/08 男 4歳 1ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:					安全性:					有効性:
47	公立こどもC	麻酔前投薬	~	~	~	注射	注射				1998/09/22 男 4歳 2ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:					安全性:					有効性:
48	公立こどもC	麻酔前投薬	~	~	~	注射	注射				1998/08/31 女 4歳 3ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:					安全性:					有効性:
49	公立こどもC	麻酔前投薬	~	~	~	注射	注射				1998/02/06 男 4歳 10ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:					安全性:					有効性:
50	公立こどもC	麻酔前投薬	~	~	~	注射	注射				1997/06/14 女 5歳 5ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:					安全性:					有効性:
51	公立こどもC	麻酔前投薬	~	~	~	注射	注射				1996/11/13 女 6歳 1ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:					安全性:					有効性:
52	公立こどもC	麻酔前投薬	~	~	~	注射	注射				1996/05/24 男 6歳 6ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:					安全性:					有効性:
53	公立こどもC	麻酔前投薬	~	~	~	注射	注射				1994/12/14 女 7歳 0ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:					安全性:					有効性:
54	公立こどもC	麻酔前投薬	~	~	~	注射	注射				1995/09/11 男 7歳 2ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:					安全性:					有効性:

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
対象疾患			適応外使用分類					対象疾患手入力			年齢
55	公立こどもC	麻酔前投薬	~		注射	注射					1994/06/10 女 8歳 5ヶ月
用法・容量:					安全性:						有効性:
総合コメント:											
56	公立こどもC	麻酔前投薬	~		注射	注射					1994/02/03 女 8歳 9ヶ月
用法・容量:					安全性:						有効性:
総合コメント:											
57	公立こどもC	麻酔前投薬	~		注射	注射					1990/09/15 女 12歳 3ヶ月
用法・容量:					安全性:						有効性:
総合コメント:											
58	公立こどもC	麻酔前投薬	~		注射	注射					1990/01/18 男 12歳 10ヶ月
用法・容量:					安全性:						有効性:
総合コメント:											
59	公立こどもC	麻酔前投薬	~		注射	注射					1989/09/26 男 13歳 2ヶ月
用法・容量:					安全性:						有効性:
総合コメント:											
60	公立こどもC	麻酔前投薬	~		注射	注射					1989/09/20 男 13歳 2ヶ月
用法・容量:					安全性:						有効性:
総合コメント:											
61	公立こどもC	麻酔前投薬	~		注射	注射					1979/09/29 女 23歳 2ヶ月
用法・容量:					安全性:						有効性:
総合コメント:											
62	公立こどもD	小児科 集中治療室における人工呼吸の鎮静	入院	2002/11/29 ~ 2002/12/05 (7日間)	投与終了	注射	注射	8.00mg	1.0kg		2002/11/16 女 0歳 0ヶ月
用法・容量:											12/2 ドルミ0.8ml+他=21mlで0.5ml/H 12/4 ドルミ1.4ml+他=21mlで0.8ml/H 12/5 0.3ml/H 12/5で止め。
総合コメント:											安全性: 特になし 有効性: 有効
63	公立こどもD	小児科 集中治療室における人工呼吸の鎮静	入院	2002/11/25 ~ 2002/11/27 (3日間)	投与終了	注射	注射		1.7kg		2002/11/23 女 0歳 0ヶ月
用法・容量:											11/25 ドルミ1.5ml+5%TZ20mlで1ml/H 22:10よりドルミ5ml+5%TZ15mlで0.3ml/H 11/26 0.5ml/H 11/27 17:30 止め。
総合コメント:											安全性: 特になし 有効性: 有効
64	公立こどもD	小児科 集中治療室における人工呼吸の鎮静	入院	2002/11/28 ~ 2002/12/03 (6日間)	投与終了	注射	注射		36.0cm	1.4kg	2002/11/27 男 0歳 0ヶ月
用法・容量:											11/28 鎮静ラインドルミ3ml+他=24mlで0.3ml/H 12/3 中止。
総合コメント:											安全性: 特になし 有効性: 有効
65	公立こどもD	小児科 集中治療室における人工呼吸の鎮静	入院	2002/11/16 ~ 2002/12/09 (24日間)	投与終了	注射	注射		2.6kg		2002/11/16 女 0歳 0ヶ月
用法・容量:											11/16 0.15ml iv 3回投与。11/17~12/8まで1日1A。12/9 10:00 止め。
総合コメント:											安全性: 特になし 有効性: 有効
66	公立こどもD	心臓血管外科 集中治療室における人工呼吸の鎮静	入院	2002/11/22 ~	(1日間) 投与終了	注射	注射	1.25mg	59.5cm	4.2kg	2002/07/13 女 0歳 4ヶ月
用法・容量:											
総合コメント:											安全性: 特になし 有効性: 有効
67	公立こどもD	心臓血管外科 集中治療室における人工呼吸の鎮静	入院	2002/11/06 ~ 2002/11/08 (2日間)	投与終了	注射	注射	0.30mg	65.4cm	6.1kg	2002/06/18 男 0歳 5ヶ月
用法・容量:											11/6 0.3mg iv(体動時)。11/8 1mg iv(睡眠)。
総合コメント:											安全性: 特になし 有効性: 有効
68	公立こどもD	心臓血管外科 集中治療室における人工呼吸の鎮静	入院	2002/11/21 ~ 2002/11/24 (2日間)	投与終了	注射	注射	1.00mg	60.0cm	5.1kg	2002/06/24 男 0歳 5ヶ月
用法・容量:											11/21 1mg 11/24 0.5mg 投与。
総合コメント:											安全性: 特になし 有効性: 有効
69	公立こどもD	麻酔科 全身麻酔の導入および維持	入院	2002/11/11 ~	(1日間) 投与終了	注射	注射	2.00mg	132.5cm	30.2kg	1994/02/11 男 8歳 9ヶ月
用法・容量:											agitationの為。
総合コメント:											安全性: 特になし 有効性: 有効
70	公立こどもD	麻酔科 麻酔前投薬	入院	2002/11/20 ~ 2002/11/27 (3日間)	投与終了	水剤,注射	内用,注射	3.00mg	66.5cm	6.7kg	2002/05/10 男 0歳 6ヶ月
用法・容量:											11/20 3mg内服。(心カテ) 11/26 3mg内服。(心カテ) 帰室時、1/8A iv。11/27 1/8A iv(体動激しく)。
総合コメント:											安全性: 特になし 有効性: 有効
71	公立こどもD	麻酔科 麻酔前投薬	入院	2002/11/12 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	4.00mg	8.0kg		2002/01/31 女 0歳 10ヶ月
用法・容量:											
総合コメント:											安全性: 特になし 有効性: 有効
72	公立こどもD	麻酔科 麻酔前投薬	入院	2002/11/22 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	4.00mg	70.0cm	8.4kg	2001/12/07 男 0歳 11ヶ月
用法・容量:											
総合コメント:											安全性: 特になし 有効性: 有効

	施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
	対象疾患				適応外使用分類	対象疾患手入力						年齢
73	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/19 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	4.00mg	72.0cm	9.0kg	2001/12/20
	用法・容量:										男	0歳 11ヶ月
	総合コメント:						安全性: 特になし				有効性:	有効
74	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/14 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	4.00mg		9.0kg	2001/12/21
	用法・容量:										女	0歳 11ヶ月
	総合コメント:						安全性: 特になし				有効性:	有効
75	公立こどもD 麻酔前投薬				~		水剤	内用	3.00mg		8.1kg	2001/12/24
	用法・容量:										女	0歳 11ヶ月
	総合コメント:						安全性:				有効性:	
76	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/05 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	3.00mg		.8kg	2001/12/24
	用法・容量:										女	0歳 11ヶ月
	総合コメント:						安全性: 特になし				有効性:	有効
77	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/14 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	5.00mg	73.5cm	9.5kg	2001/10/17
	用法・容量:										男	1歳 1ヶ月
	総合コメント:						安全性: 特になし				有効性:	有効
78	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/06 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	5.00mg	76.5cm	9.8kg	2001/07/16
	用法・容量:										男	1歳 4ヶ月
	総合コメント:						安全性: 特になし				有効性:	有効
79	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/25 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	5.00mg	78.1cm	11.3kg	2001/07/27
	用法・容量:										男	1歳 4ヶ月
	総合コメント:						安全性: 特になし				有効性:	有効
80	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/06 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	5.00mg	80.5cm	10.7kg	2001/06/10
	用法・容量:										男	1歳 5ヶ月
	総合コメント:						安全性: 特になし				有効性:	有効
81	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/12 ~ 2002/11/21	(2日間) 投与終了	水剤,注射	内用,注射	4.00mg		7.7kg	2001/01/18
	用法・容量:										男	1歳 10ヶ月
	総合コメント:						安全性: 特になし				有効性:	有効
82	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/26 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	6.00mg	84.5cm	13.3kg	2000/12/23
	用法・容量:										男	1歳 11ヶ月
	総合コメント:						安全性: 特になし				有効性:	有効
83	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/27 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	6.00mg	90.0cm	13.1kg	2000/10/27
	用法・容量:										男	2歳 1ヶ月
	総合コメント:						安全性: 特になし				有効性:	有効
84	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/08 ~	(1日間) 投与終了	注射	注射	1.00mg	77.8cm	8.7kg	2000/08/26
	用法・容量:										女	2歳 3ヶ月
	総合コメント:						安全性: 特になし				有効性:	有効
85	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/12 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	6.00mg	85.4cm	11.9kg	2000/07/26
	用法・容量:										男	2歳 4ヶ月
	総合コメント:						安全性: 特になし				有効性:	有効
86	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/22 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	6.00mg	87.7cm	12.2kg	2000/06/12
	用法・容量:										男	2歳 5ヶ月
	総合コメント:						安全性: 特になし				有効性:	有効
87	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/29 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	6.00mg	89.5cm	12.5kg	2000/04/05
	用法・容量:										女	2歳 7ヶ月
	総合コメント:						安全性: 特になし				有効性:	有効
88	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/15 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	7.00mg	91.5cm	13.5kg	1999/07/18
	用法・容量:										男	3歳 4ヶ月
	総合コメント:						安全性: 特になし				有効性:	有効
89	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/26 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	7.00mg	96.0cm	15.0kg	1999/07/07
	用法・容量:										男	3歳 4ヶ月
	総合コメント:						安全性: 特になし				有効性:	有効
90	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/01 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	8.00mg	99.8cm	16.2kg	1999/03/19
	用法・容量:										女	3歳 8ヶ月
	総合コメント:						安全性: 特になし				有効性:	有効

	施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
	対象疾患				適応外使用分類	対象疾患手入力						年齢
91	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/06 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	7.00mg	98.0cm	14.0kg	1999/03/17 男 3歳 8ヶ月
	用法・容量：全く飲まず。 総合コメント：											安全性：特になし 有効性：無効
92	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/06 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	7.00mg	96.1cm	14.6kg	1999/01/11 女 3歳 10ヶ月
	用法・容量： 総合コメント：											安全性：特になし 有効性：有効
93	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/22 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	6.00mg	95.2cm	11.6kg	1998/09/23 女 4歳 2ヶ月
	用法・容量：6mg経口投与。帰宅時体動大きく1mg iv。 総合コメント：											安全性：特になし 有効性：有効
94	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/06 ~	(1日間) 投与終了	注射	注射	2.00mg	103.4cm	16.1kg	1998/08/10 男 4歳 3ヶ月
	用法・容量： 総合コメント：											安全性：特になし 有効性：有効
95	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/19 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	10.00mg	107.4cm	21.2kg	1998/08/31 男 4歳 3ヶ月
	用法・容量： 総合コメント：											安全性：特になし 有効性：有効
96	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/27 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	5.00mg	94.0cm	10.4kg	1998/07/28 女 4歳 4ヶ月
	用法・容量：経口飲まず。経腸する。 総合コメント：心カテ検査											安全性：特になし 有効性：有効
97	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/06 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	8.00mg	101.4cm	17.7kg	1998/03/24 女 4歳 8ヶ月
	用法・容量： 総合コメント：											安全性：特になし 有効性：有効
98	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/22 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	10.00mg	108.1cm	19.7kg	1997/12/29 女 4歳 11ヶ月
	用法・容量： 総合コメント：											安全性：特になし 有効性：有効
99	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/06 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	8.00mg	105.4cm	16.2kg	1997/11/11 女 5歳 0ヶ月
	用法・容量： 総合コメント：											安全性：特になし 有効性：有効
100	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/18 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	8.00mg	108.2cm	17.0kg	1997/11/12 男 5歳 0ヶ月
	用法・容量： 総合コメント：											安全性：特になし 有効性：有効
101	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/22 ~	(1日間) 投与終了	注射	注射	3.50mg		28.3kg	1997/04/21 男 5歳 7ヶ月
	用法・容量： 総合コメント：											安全性：特になし 有効性：有効
102	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/13 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	9.00mg	114.7cm	18.6kg	1997/01/28 男 5歳 10ヶ月
	用法・容量： 総合コメント：											安全性：特になし 有効性：有効
103	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/25 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	10.00mg	114.1cm	23.1kg	1996/12/27 男 5歳 11ヶ月
	用法・容量： 総合コメント：											安全性：特になし 有効性：有効
104	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/08 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	9.00mg	110.0cm	18.6kg	1996/09/26 女 6歳 2ヶ月
	用法・容量： 総合コメント：											安全性：特になし 有効性：有効
105	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/14 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	9.00mg	111.0cm	19.0kg	1996/06/24 男 6歳 5ヶ月
	用法・容量： 総合コメント：											安全性：特になし 有効性：有効
106	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/25 ~	(1日間) 投与終了	水剤	内用	10.00mg	128.0cm	22.0kg	1992/08/14 女 10歳 3ヶ月
	用法・容量： 総合コメント：											安全性：特になし 有効性：有効
107	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/18 ~	(1日間) 投与終了	注射	注射	2.00mg		29.0kg	1992/01/12 男 10歳 10ヶ月
	用法・容量： 総合コメント：											安全性：特になし 有効性：有効
108	公立こどもD 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/14 ~	(1日間) 投与終了	注射	注射	2.00mg	155.0cm	56.3kg	1988/11/14 女 14歳 0ヶ月
	用法・容量： 総合コメント：											安全性：特になし 有効性：有効

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
対象疾患			適応外使用分類		対象疾患手入力						年齢
109	公立こどもE	形成外科		入院 2002/11/08 ~ 2002/11/08 (1日間)	投与終了	注射	内用	7.00mg	96.2cm	11.8kg	1999/05/17
		麻酔前投薬								男	3歳 6ヶ月
		用法・容量: ドルミカム7mg(1.4ml)とピーチジュース12.6mlを混ぜ計14mlとし、麻酔前に経口投与する。 総合コメント:				安全性: 特になし				有効性: 有効	
110	公立こどもE	外科		入院 2002/11/08 ~ 2002/11/08 (1日間)	投与終了	注射	内用	8.00mg	98.2cm	17.5kg	1998/12/10
		麻酔前投薬								男	4歳 0ヶ月
		用法・容量: ドルミカム8mg(1.6ml)とピーチジュース14.4mlを混ぜ計16mlとして麻酔前に経口投与する。 総合コメント:				安全性: 特になし				有効性: 有効	
111	公立こどもE	形成外科		入院 2002/11/06 ~ 2002/11/06 (1日間)	投与終了	注射	内用	8.00mg	97.1cm	14.0kg	1998/11/15
		麻酔前投薬								女	4歳 1ヶ月
		用法・容量: ドルミカム8mg(1.6ml)とピーチジュース14.4mlを混ぜ計16mlとして麻酔前に経口投与する。 総合コメント:				安全性: 特になし				有効性: 有効	
112	公立こどもE	心臓血管外科		入院 2002/11/28 ~ 2002/11/28 (1日間)	投与終了	注射	内用,注射	8.00mg	103.0cm	15.0kg	1997/09/03
		麻酔前投薬								女	5歳 3ヶ月
		用法・容量: ドルミカム8mg(1.6ml)をピーチジュース14.4mlと混ぜ計16mlとし麻酔前に経口投与する。 総合コメント:				安全性: 特になし				有効性: 有効	
113	公立こどもE	眼科		入院 2002/11/12 ~ 2002/11/12 (1日間)	投与終了	注射	内用	7.00mg	120.7cm	24.0kg	1996/10/06
		麻酔前投薬								女	6歳 2ヶ月
		用法・容量: ドルミカム7mg(1.4ml)にピーチジュース12.6mlを混ぜ、計14mlとして麻酔前に経口投与する。→→→ 総合コメント:				安全性: 特になし				有効性: 有効	
114	公立こどもE	眼科		入院 2002/11/21 ~ 2002/11/21 (1日間)	投与終了	注射	内用	7.00mg	121.5cm	23.0kg	1996/06/10
		麻酔前投薬								女	6歳 6ヶ月
		用法・容量: ドルミカム7mg(1.4ml)にピーチジュース12.6mlを混ぜ、計14mlとして麻酔前に経口投与する。 総合コメント:				安全性: 特になし				有効性: 有効	
115	公立こどもE	内分泌科 代謝内分泌科		入院 2002/11/01 ~ 2002/11/01 (1日間)	投与終了	注射	注射	4.00mg	135.4cm	19.4kg	1986/09/03
		麻酔前投薬								男	16歳 3ヶ月
		用法・容量: 静脈切開による中心静脈カテーテル挿入のため、麻酔前にドルミカム4mg、ケタラール19mg、硫アト0.19mgを静注した。 総合コメント:				安全性: 特になし				有効性: 有効	
116	公立こどもF	心臓血管外科		入院 2002/10/24 ~ 2002/11/30 (38日間)	継続中	注射	注射	36.00mg	70.0cm	4.0kg	2002/12/07
		集中治療室における人工呼吸の鎮静								女	0歳 11ヶ月
		用法・容量: 総合コメント:				安全性: 特になし				有効性: 有効	
117	公立こどもF	新生児科		入院 2002/11/02 ~ 2002/11/15 (14日間)	投与終了	注射	注射	5.00mg		2.5kg	2002/10/17
		適応外使用	鎮静		鎮静(絶対安静のため体動を抑える)					女	0歳 1ヶ月
		用法・容量: 総合コメント:				安全性: 特になし				有効性: 有効	
118	公立こどもF	麻酔科		入院 2002/11/15 ~ 2002/11/15 (1日間)	投与終了	水剤	内用	4.00mg			2001/10/14
		麻酔前投薬								男	1歳 1ヶ月
		用法・容量: 水剤に調整(イチゴ味に矯味) 総合コメント:				安全性: 特になし				有効性: 有効	
119	公立こどもF	麻酔科		入院 2002/11/25 ~ 2002/11/25 (1日間)	投与終了	水剤	内用	4.00mg			2000/01/09
		麻酔前投薬								男	2歳 10ヶ月
		用法・容量: 水剤に調整(イチゴ味に矯味) 総合コメント:				安全性: 特になし				有効性: 有効	
120	公立こどもF	麻酔科		入院 2002/11/01 ~ 2002/11/01 (1日間)	投与終了	水剤	内用	4.00mg			1999/12/13
		麻酔前投薬								男	2歳 11ヶ月
		用法・容量: 水剤に調整(イチゴ味に矯味) 総合コメント:				安全性: 特になし				有効性: 有効	
121	公立こどもF	麻酔科		入院 2002/11/11 ~ 2002/11/11 (1日間)	投与終了	水剤	内用	4.00mg			1999/10/10
		麻酔前投薬								女	3歳 1ヶ月
		用法・容量: 水剤に調整(イチゴ味に矯味) 総合コメント:				安全性: 特になし				有効性: 有効	
122	公立こどもF	麻酔科		入院 2002/11/08 ~ 2002/11/08 (1日間)	投与終了	水剤	内用	6.00mg			1999/06/25
		麻酔前投薬								男	3歳 5ヶ月
		用法・容量: 水剤に調整(イチゴ味に矯味) 総合コメント:				安全性: 特になし				有効性: 有効	
123	公立こどもF	麻酔科		入院 2002/11/25 ~ 2002/11/25 (1日間)	投与終了	水剤	内用	5.00mg			1999/06/04
		麻酔前投薬								男	3歳 5ヶ月
		用法・容量: 水剤に調整(イチゴ味に矯味) 総合コメント:				安全性: 特になし				有効性: 有効	
124	公立こどもF	麻酔科		入院 2002/11/11 ~ 2002/11/11 (1日間)	投与終了	水剤	内用	4.00mg			1998/12/07
		麻酔前投薬								女	3歳 11ヶ月
		用法・容量: 水剤に調整(イチゴ味に矯味) 総合コメント:				安全性: 特になし				有効性: 有効	
125	公立こどもF	麻酔科		入院 2002/11/08 ~ 2002/11/08 (1日間)	投与終了	水剤	内用	4.00mg			1997/12/02
		麻酔前投薬								女	4歳 11ヶ月
		用法・容量: 水剤に調整(イチゴ味に矯味) 総合コメント:				安全性: 特になし				有効性: 有効	
126	公立こどもG	新生児科		入院 2002/11/02 ~ 2002/11/07 (6日間)	投与終了	注射	注射	3.00mg	43.9cm	2.3kg	2002/11/02
		集中治療室における人工呼吸の鎮静								女	0歳 0ヶ月
		用法・容量: 0.125mg/h 総合コメント:				安全性:				有効性: 未判定	

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
対象疾患	適応外使用分類		対象疾患手入力		年齢						
127	公立こどもG	新生児科	入院	2002/11/02 ~ 2002/11/07 (6日間)	投与終了	注射	注射	3.00mg	43.9cm	2.3kg	2002/11/02
	集中治療室における人工呼吸の鎮静										女 0歳 0ヶ月
	用法・容量 : 0.125mg/h										有効性 : 未判定
	総合コメント :				安全性 : 特になし						
128	公立こどもG	新生児科	入院	2002/10/19 ~ 2002/11/05 (18日間)	投与終了	注射	注射	8.00mg	42.5cm	2.2kg	2002/09/26
	集中治療室における人工呼吸の鎮静										男 0歳 1ヶ月
	用法・容量 : 0.33mg/h										有効性 : 未判定
	総合コメント :				安全性 : 特になし						
129	公立こどもG	循環器科	入院	2002/11/24 ~ 2002/11/28 (5日間)	投与終了	注射	注射	9.60mg	55.9cm	3.7kg	2002/10/16
	集中治療室における人工呼吸の鎮静										女 0歳 1ヶ月
	用法・容量 : 0.4mg/h										有効性 : 未判定
	総合コメント :				安全性 : 特になし						
130	公立こどもG	循環器科	入院	2002/10/16 ~ 2002/11/01 (17日間)	投与終了	注射	注射	12.00mg	58.2cm	5.6kg	2002/06/19
	集中治療室における人工呼吸の鎮静										男 0歳 3ヶ月
	用法・容量 : 0.5mg/h										有効性 : 未判定
	総合コメント :				安全性 : 特になし						
131	公立こどもG	循環器科	入院	2002/11/04 ~ 2002/11/11 (8日間)	投与終了	注射	注射	105.60mg		23.0kg	2002/07/23
	集中治療室における人工呼吸の鎮静										女 0歳 3ヶ月
	用法・容量 : 4.4mg/h										有効性 : 未判定
	総合コメント :				安全性 : 特になし						
132	公立こどもG	循環器科	入院	2002/11/14 ~ 2002/11/15 (2日間)	投与終了	注射	注射	5.40mg	61.2cm	3.8kg	2002/03/06
	集中治療室における人工呼吸の鎮静										女 0歳 8ヶ月
	用法・容量 : 0.225mg/h										有効性 : 未判定
	総合コメント :				安全性 : 特になし						
133	公立こどもG	循環器科	入院	2002/11/03 ~ 2002/11/30 (28日間)	継続中	注射	注射	36.00mg		7.5kg	2002/01/22
	集中治療室における人工呼吸の鎮静										男 0歳 10ヶ月
	用法・容量 : 1.5mg/h										有効性 : 未判定
	総合コメント :				安全性 : 特になし						
134	公立こどもG	泌尿器科	入院	2002/11/16 ~ 2002/11/30 (15日間)	継続中	注射	注射	24.00mg	78.0cm	9.5kg	2000/12/12
	集中治療室における人工呼吸の鎮静										男 1歳 11ヶ月
	用法・容量 : 1mg/h										有効性 : 未判定
	総合コメント :				安全性 : 特になし						
135	公立こどもG	心臓血管外科	入院	2002/11/07 ~ 2002/11/11 (5日間)	投与終了	注射	注射	72.00mg	128.2cm	28.2kg	1993/08/20
	集中治療室における人工呼吸の鎮静										女 9歳 2ヶ月
	用法・容量 : 3mg/h										有効性 : 未判定
	総合コメント :				安全性 : 特になし						
136	公立こどもG	神経科	入院	2002/10/26 ~ 2002/11/13 (19日間)	投与終了	注射	注射	28.80mg	53.4cm	3.8kg	1991/01/07
	集中治療室における人工呼吸の鎮静										女 11歳 10ヶ月
	用法・容量 : 1.2mg/h										有効性 : 未判定
	総合コメント :				安全性 : 特になし						
137	公立こどもG	循環器科	入院	2002/11/07 ~ 2002/11/07 (1日間)	投与終了	注射	注射	1.00mg	60.0cm	4.6kg	2002/01/12
	適応外使用		検査のための鎮静								男 0歳 10ヶ月
	用法・容量 :		CT検査前								有効性 : 未判定
	総合コメント :				安全性 : 特になし						
138	公立こどもG	循環器科	入院	2002/11/07 ~ 2002/11/07 (1日間)	投与終了	注射	注射	1.00mg	60.0cm	4.6kg	2002/01/12
	適応外使用		検査のための鎮静								男 0歳 10ヶ月
	用法・容量 :		CT検査前								有効性 : 未判定
	総合コメント :				安全性 : 特になし						
139	公立こどもG	血液科	入院	2002/11/15 ~ 2002/11/15 (1日間)	投与終了	注射	注射	3.00mg		37.1kg	1989/07/27
	適応外使用		検査のための鎮静								女 13歳 3ヶ月
	用法・容量 : 3mg iv→		検査時								有効性 : 未判定
	総合コメント :				安全性 : 特になし						
140	公立こどもH	麻酔科	入院	2002/11/28 ~ 2002/11/28 (1日間)	投与終了	注射	内用	3.00mg			2002/06/09
	麻酔前投薬										女 0歳 4ヶ月
	用法・容量 : 注射剤を内服										有効性 :
	総合コメント :				安全性 :						
141	公立こどもH	麻酔科	入院	2002/11/15 ~ 2002/11/15 (1日間)	投与終了	注射	内用	3.00mg			2002/04/23
	麻酔前投薬										女 0歳 6ヶ月
	用法・容量 : 注射剤を内服										有効性 :
	総合コメント :				安全性 :						
142	公立こどもH	麻酔科	入院	2002/11/25 ~ 2002/11/25 (1日間)	投与終了	注射	内用	4.00mg			2002/04/03
	麻酔前投薬										男 0歳 6ヶ月
	用法・容量 : 注射剤を内服										有効性 :
	総合コメント :				安全性 :						
143	公立こどもH	麻酔科	入院	2002/11/22 ~ 2002/11/22 (1日間)	投与終了	注射	内用	4.00mg			2002/03/11
	麻酔前投薬										男 0歳 7ヶ月
	用法・容量 : 注射剤を内服										有効性 :
	総合コメント :				安全性 :						
144	公立こどもH	麻酔科	入院	2002/11/18 ~ 2002/11/18 (1日間)	投与終了	注射	内用	4.00mg			2002/02/10
	麻酔前投薬										女 0歳 8ヶ月
	用法・容量 : 注射剤を内服										有効性 :
	総合コメント :				安全性 :						



施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
対象疾患			適応外使用分類	対象疾患手入力							
145	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/13 ~ 2002/11/13	(1日間) 投与終了	注射	内用	5.00mg			2002/02/04 年 齢 男 0歳 8ヶ月
	麻酔前投薬										
	用法・容量 : 注射剤を内服										
	総合コメント :	安全性 :									有効性 :
146	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/26 ~ 2002/11/26	(1日間) 投与終了	注射	内用	4.00mg			2002/02/27 女 0歳 8ヶ月
	麻酔前投薬										
	用法・容量 : 注射剤を内服										
	総合コメント :	安全性 :									有効性 :
147	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/18 ~ 2002/11/18	(1日間) 投与終了	注射	内用	4.00mg			2002/01/09 女 0歳 9ヶ月
	麻酔前投薬										
	用法・容量 : 注射剤を内服										
	総合コメント :	安全性 :									有効性 :
148	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/27 ~ 2002/11/27	(1日間) 投与終了	注射	内用	4.00mg			2001/12/12 男 0歳 10ヶ月
	麻酔前投薬										
	用法・容量 : 注射剤を内服										
	総合コメント :	安全性 :									有効性 :
149	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/26 ~ 2002/11/26	(1日間) 投与終了	注射	内用	4.00mg			2001/12/05 男 0歳 10ヶ月
	麻酔前投薬										
	用法・容量 : 注射剤を内服										
	総合コメント :	安全性 :									有効性 :
150	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/21 ~ 2002/11/21	(1日間) 投与終了	注射	内用	3.00mg			2001/12/26 女 0歳 10ヶ月
	麻酔前投薬										
	用法・容量 : 注射剤を内服										
	総合コメント :	安全性 :									有効性 :
151	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/18 ~ 2002/11/18	(1日間) 投与終了	注射	内用	5.00mg			2001/12/28 女 0歳 10ヶ月
	麻酔前投薬										
	用法・容量 : 注射剤を内服										
	総合コメント :	安全性 :									有効性 :
152	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/29 ~ 2002/11/29	(1日間) 投与終了	注射	内用	4.00mg			2001/11/10 女 0歳 11ヶ月
	麻酔前投薬										
	用法・容量 : 注射剤を内服										
	総合コメント :	安全性 :									有効性 :
153	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/20 ~ 2002/11/20	(1日間) 投与終了	注射	内用	5.00mg			2001/11/07 男 0歳 11ヶ月
	麻酔前投薬										
	用法・容量 : 注射剤を内服										
	総合コメント :	安全性 :									有効性 :
154	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/18 ~ 2002/11/18	(1日間) 投与終了	注射	内用	5.00mg			2001/09/17 男 1歳 1ヶ月
	麻酔前投薬										
	用法・容量 : 注射剤を内服										
	総合コメント :	安全性 :									有効性 :
155	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/21 ~ 2002/11/21	(1日間) 投与終了	注射	内用	4.00mg			2001/09/13 女 1歳 1ヶ月
	麻酔前投薬										
	用法・容量 : 注射剤を内服										
	総合コメント :	安全性 :									有効性 :
156	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/18 ~ 2002/11/18	(1日間) 投与終了	注射	内用	5.00mg			2001/09/22 男 1歳 1ヶ月
	麻酔前投薬										
	用法・容量 : 注射剤を内服										
	総合コメント :	安全性 :									有効性 :
157	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/18 ~ 2002/11/18	(1日間) 投与終了	注射	内用	4.00mg			2001/09/14 女 1歳 1ヶ月
	麻酔前投薬										
	用法・容量 : 注射剤を内服										
	総合コメント :	安全性 :									有効性 :
158	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/18 ~ 2002/11/18	(1日間) 投与終了	注射	内用	5.00mg			2001/08/28 男 1歳 2ヶ月
	麻酔前投薬										
	用法・容量 : 注射剤を内服										
	総合コメント :	安全性 :									有効性 :
159	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/18 ~ 2002/11/18	(1日間) 投与終了	注射	内用	5.00mg			2001/08/16 女 1歳 2ヶ月
	麻酔前投薬										
	用法・容量 : 注射剤を内服										
	総合コメント :	安全性 :									有効性 :
160	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/28 ~ 2002/11/28	(1日間) 投与終了	注射	内用	3.00mg			2001/06/29 男 1歳 4ヶ月
	麻酔前投薬										
	用法・容量 : 注射剤を内服										
	総合コメント :	安全性 :									有効性 :
161	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/14 ~ 2002/11/14	(1日間) 投与終了	注射	内用	5.00mg			2001/05/17 女 1歳 5ヶ月
	麻酔前投薬										
	用法・容量 : 注射剤を内服										
	総合コメント :	安全性 :									有効性 :
162	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/20 ~ 2002/11/20	(1日間) 投与終了	注射	内用	7.00mg			2001/04/26 男 1歳 6ヶ月
	麻酔前投薬										
	用法・容量 : 注射剤を内服										
	総合コメント :	安全性 :									有効性 :

## WEB調査 実績データ

## ミタゾラム注

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
163	公立こどもH	麻酔科	適応外使用分類	入院 2002/11/12 ~ 2002/11/12 (1日間)	投与終了	注射	内用	5.00mg			2001/04/09 年 齢 男 1歳 6ヶ月
		麻酔前投薬									
		用法・容量：注射剤を内服									
		総合コメント：			安全性：						有効性：
164	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/19 ~ 2002/11/19 (1日間)	投与終了	注射	内用	5.00mg			2001/03/12 女 1歳 7ヶ月
		麻酔前投薬									
		用法・容量：注射剤を内服									
		総合コメント：			安全性：						有効性：
165	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/12 ~ 2002/11/12 (1日間)	投与終了	注射	内用	6.00mg			2001/03/28 男 1歳 7ヶ月
		麻酔前投薬									
		用法・容量：注射剤を内服									
		総合コメント：			安全性：						有効性：
166	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/20 ~ 2002/11/20 (1日間)	投与終了	注射	内用	6.00mg			2001/02/23 男 1歳 8ヶ月
		麻酔前投薬									
		用法・容量：注射剤を内服									
		総合コメント：			安全性：						有効性：
167	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/05 ~ 2002/11/05 (1日間)	投与終了	注射	内用	4.00mg			2001/12/29 女 1歳 10ヶ月
		麻酔前投薬									
		用法・容量：注射剤を内服									
		総合コメント：			安全性：						有効性：
168	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/22 ~ 2002/11/22 (1日間)	投与終了	注射	内用	6.00mg			2000/12/03 男 1歳 10ヶ月
		麻酔前投薬									
		用法・容量：注射剤を内服									
		総合コメント：			安全性：						有効性：
169	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/11 ~ 2002/11/11 (1日間)	投与終了	注射	内用	4.00mg			2000/11/08 女 1歳 11ヶ月
		麻酔前投薬									
		用法・容量：注射剤を内服									
		総合コメント：			安全性：						有効性：
170	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/20 ~ 2002/11/20 (1日間)	投与終了	注射	内用	6.00mg			2000/11/08 女 1歳 11ヶ月
		麻酔前投薬									
		用法・容量：注射剤を内服									
		総合コメント：			安全性：						有効性：
171	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/08 ~ 2002/11/08 (1日間)	投与終了	注射	内用	5.00mg			2000/11/01 女 1歳 11ヶ月
		麻酔前投薬									
		用法・容量：注射剤を内服									
		総合コメント：			安全性：						有効性：
172	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/05 ~ 2002/11/05 (1日間)	投与終了	注射	内用	3.00mg			2001/11/23 女 1歳 11ヶ月
		麻酔前投薬									
		用法・容量：注射剤を内服									
		総合コメント：			安全性：						有効性：
173	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/18 ~ 2002/11/18 (1日間)	投与終了	注射	内用	6.00mg			2000/10/04 男 2歳 0ヶ月
		麻酔前投薬									
		用法・容量：注射剤を内服									
		総合コメント：			安全性：						有効性：
174	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/05 ~ 2002/11/05 (1日間)	投与終了	注射	内用	4.00mg			2001/10/05 男 2歳 0ヶ月
		麻酔前投薬									
		用法・容量：注射剤を内服									
		総合コメント：			安全性：						有効性：
175	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/01 ~ 2002/11/01 (1日間)	投与終了	注射	内用	4.00mg			2001/09/23 男 2歳 1ヶ月
		麻酔前投薬									
		用法・容量：注射剤を内服									
		総合コメント：			安全性：						有効性：
176	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/07 ~ 2002/11/07 (1日間)	投与終了	注射	内用	3.00mg			2001/09/25 男 2歳 1ヶ月
		麻酔前投薬									
		用法・容量：注射剤を内服									
		総合コメント：			安全性：						有効性：
177	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/06 ~ 2002/11/06 (1日間)	投与終了	注射	内用	5.00mg			2001/07/03 男 2歳 3ヶ月
		麻酔前投薬									
		用法・容量：									
		総合コメント：			安全性：						有効性：
178	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/20 ~ 2002/11/20 (1日間)	投与終了	注射	内用	7.00mg			2000/07/13 男 2歳 3ヶ月
		麻酔前投薬									
		用法・容量：注射剤を内服									
		総合コメント：			安全性：						有効性：
179	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/12 ~ 2002/11/12 (1日間)	投与終了	注射	内用	5.00mg			2000/07/08 男 2歳 3ヶ月
		麻酔前投薬									
		用法・容量：注射剤を内服									
		総合コメント：			安全性：						有効性：
180	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/12 ~ 2002/11/12 (1日間)	投与終了	注射	内用	4.00mg			2000/07/17 男 2歳 3ヶ月
		麻酔前投薬									
		用法・容量：注射剤を内服									
		総合コメント：			安全性：						有効性：

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
対象疾患			適応外使用分類		対象疾患手入力						年齢
181	公立こどもH	麻酔科		入院 2001/11/01 ~ 2001/11/01	(1日間) 投与終了	注射	内用	4.00mg			2001/06/12
	麻酔前投薬									男	2歳 4ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
182	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/07 ~ 2002/11/07	(1日間) 投与終了	注射	内用	5.00mg			2001/06/28
	麻酔前投薬									男	2歳 4ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
183	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/07 ~ 2002/11/07	(1日間) 投与終了	注射	内用	4.00mg			2001/05/18
	麻酔前投薬									女	2歳 5ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
184	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/18 ~ 2002/11/18	(1日間) 投与終了	注射	内用	7.00mg			2000/05/16
	麻酔前投薬									男	2歳 5ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
185	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/27 ~ 2002/11/27	(1日間) 投与終了	注射	内用	7.00mg			2000/04/25
	麻酔前投薬									女	2歳 6ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
186	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/29 ~ 2002/11/29	(1日間) 投与終了	注射	内用	5.00mg			2000/03/19
	麻酔前投薬									女	2歳 7ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
187	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/15 ~ 2002/11/15	(1日間) 投与終了	注射	内用	7.00mg			2000/02/28
	麻酔前投薬									女	2歳 8ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
188	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/13 ~ 2002/11/13	(1日間) 投与終了	注射	内用	6.00mg			2000/02/08
	麻酔前投薬									女	2歳 8ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
189	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/21 ~ 2002/11/21	(1日間) 投与終了	注射	内用	5.00mg			2000/02/04
	麻酔前投薬									男	2歳 8ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
190	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/12 ~ 2002/11/12	(1日間) 投与終了	注射	内用	8.00mg			2000/02/21
	麻酔前投薬									男	2歳 8ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
191	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/08 ~ 2002/11/08	(1日間) 投与終了	注射	内用	7.00mg			2000/02/12
	麻酔前投薬									男	2歳 8ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
192	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/12 ~ 2002/11/12	(1日間) 投与終了	注射	内用	7.00mg			2000/01/31
	麻酔前投薬									男	2歳 9ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
193	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/18 ~ 2002/11/18	(1日間) 投与終了	注射	内用	7.00mg			2000/01/01
	麻酔前投薬									女	2歳 9ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
194	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/06 ~ 2002/11/06	(1日間) 投与終了	注射	内用	4.00mg			2000/12/14
	麻酔前投薬									女	2歳 10ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
195	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/05 ~ 2002/11/05	(1日間) 投与終了	注射	内用	5.00mg			2000/12/07
	麻酔前投薬									男	2歳 10ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
196	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/01 ~ 2002/11/01	(1日間) 投与終了	注射	内用	6.00mg			2000/11/17
	麻酔前投薬									男	2歳 11ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
197	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/07 ~ 2002/11/07	(1日間) 投与終了	注射	内用	5.00mg			1998/10/06
	麻酔前投薬									男	3歳 0ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
198	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/08 ~ 2002/11/08	(1日間) 投与終了	注射	内用	8.00mg			1998/10/27
	麻酔前投薬									男	3歳 0ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：

	施設名	診療科	診療科詳細	区分 投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
	対象疾患			適応外使用分類	対象疾患手入力						年齢
199	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/01 ~ 2002/11/01 (1日間)	投与終了	注射	内用	6.00mg			1999/10/27
	麻酔前投薬										男 3歳 0ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
200	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/27 ~ 2002/11/27 (1日間)	投与終了	注射	内用	6.00mg			1999/08/24
	麻酔前投薬										女 3歳 2ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
201	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/13 ~ 2002/11/13 (1日間)	投与終了	注射	内用	3.00mg			1999/07/14
	麻酔前投薬										男 3歳 3ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
202	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/15 ~ 2002/11/15 (1日間)	投与終了	注射	内用	7.00mg			1999/07/17
	麻酔前投薬										男 3歳 3ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
203	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/21 ~ 2002/11/21 (1日間)	投与終了	注射	内用	5.00mg			1999/05/29
	麻酔前投薬										女 3歳 5ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
204	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/22 ~ 2002/11/22 (1日間)	投与終了	注射	内用	6.00mg			1999/05/15
	麻酔前投薬										男 3歳 5ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
205	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/22 ~ 2002/11/22 (1日間)	投与終了	注射	内用	6.00mg			1999/04/24
	麻酔前投薬										女 3歳 6ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
206	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/27 ~ 2002/11/27 (1日間)	投与終了	注射	内用	5.00mg			1999/03/25
	麻酔前投薬										男 3歳 7ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
207	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/07 ~ 2002/11/07 (1日間)	投与終了	注射	内用	7.00mg			1999/03/22
	麻酔前投薬										女 3歳 7ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
208	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/07 ~ 2002/11/07 (1日間)	投与終了	注射	内用	6.00mg			2000/03/31
	麻酔前投薬										男 3歳 7ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
209	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/12 ~ 2002/11/12 (1日間)	投与終了	注射	内用	8.00mg			1999/02/18
	麻酔前投薬										男 3歳 8ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
210	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/01 ~ 2002/11/01 (1日間)	投与終了	注射	内用	6.00mg			2000/02/09
	麻酔前投薬										男 3歳 8ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
211	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/05 ~ 2002/11/05 (1日間)	投与終了	注射	内用	3.00mg			1999/12/11
	麻酔前投薬										女 3歳 10ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
212	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/14 ~ 2002/11/14 (1日間)	投与終了	注射	内用	7.00mg			1998/09/18
	麻酔前投薬										男 4歳 1ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
213	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/18 ~ 2002/11/18 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1998/08/17
	麻酔前投薬										女 4歳 2ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
214	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/07 ~ 2002/11/07 (1日間)	投与終了	注射	内用	7.00mg			1998/08/27
	麻酔前投薬										女 4歳 2ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
215	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/07 ~ 2002/11/07 (1日間)	投与終了	注射	内用	6.00mg			1998/08/13
	麻酔前投薬										女 4歳 2ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：
216	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/01 ~ 2002/11/01 (1日間)	投与終了	注射	内用	6.00mg			1999/06/01
	麻酔前投薬										男 4歳 4ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：					安全性：					有効性：