

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
対象疾患			適応外使用分類		対象疾患手入力					年齢	
217	公立こどもH 麻酔科			入院 2002/11/21 ~ 2002/11/21	(1日間) 投与終了	注射	内用	6.00mg			1998/05/16 女 4歳 5ヶ月
	麻酔前投薬 用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：										安全性： 有効性：
218	公立こどもH 麻酔科			入院 2002/11/14 ~ 2002/11/14	(1日間) 投与終了	注射	内用	7.00mg			1998/05/26 女 4歳 5ヶ月
	麻酔前投薬 用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：										安全性： 有効性：
219	公立こどもH 麻酔科			入院 2002/11/26 ~ 2002/11/26	(1日間) 投与終了	注射	内用	7.00mg			1998/05/27 女 4歳 5ヶ月
	麻酔前投薬 用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：										安全性： 有効性：
220	公立こどもH 麻酔科			入院 2002/11/14 ~ 2002/11/14	(1日間) 投与終了	注射	内用	5.00mg			1998/03/31 男 4歳 7ヶ月
	麻酔前投薬 用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：										安全性： 有効性：
221	公立こどもH 麻酔科			入院 2002/11/25 ~ 2002/11/25	(1日間) 投与終了	注射	内用	6.00mg			1998/02/27 女 4歳 8ヶ月
	麻酔前投薬 用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：										安全性： 有効性：
222	公立こどもH 麻酔科			入院 2002/11/13 ~ 2002/11/13	(1日間) 投与終了	注射	内用	5.00mg			1998/02/23 女 4歳 8ヶ月
	麻酔前投薬 用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：										安全性： 有効性：
223	公立こどもH 麻酔科			入院 2002/11/19 ~ 2002/11/19	(1日間) 投与終了	注射	内用	7.00mg			1998/01/28 女 4歳 9ヶ月
	麻酔前投薬 用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：										安全性： 有効性：
224	公立こどもH 麻酔科			入院 2002/11/14 ~ 2002/11/14	(1日間) 投与終了	注射	内用	7.00mg			1997/12/17 男 4歳 10ヶ月
	麻酔前投薬 用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：										安全性： 有効性：
225	公立こどもH 麻酔科			入院 2002/11/07 ~ 2002/11/07	(1日間) 投与終了	注射	内用	6.00mg			1997/12/29 女 4歳 10ヶ月
	麻酔前投薬 用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：										安全性： 有効性：
226	公立こどもH 麻酔科			入院 2002/11/11 ~ 2002/11/11	(1日間) 投与終了	注射	内用	7.00mg			1997/11/03 女 4歳 11ヶ月
	麻酔前投薬 用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：										安全性： 有効性：
227	公立こどもH 麻酔科			入院 2002/11/20 ~ 2002/11/20	(1日間) 投与終了	注射	内用	8.00mg			1997/10/11 男 5歳 0ヶ月
	麻酔前投薬 用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：										安全性： 有効性：
228	公立こどもH 麻酔科			入院 2002/11/05 ~ 2002/11/05	(1日間) 投与終了	注射	内用	7.00mg			1998/10/25 男 5歳 0ヶ月
	麻酔前投薬 用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：										安全性： 有効性：
229	公立こどもH 麻酔科			入院 2002/11/22 ~ 2002/11/22	(1日間) 投与終了	注射	内用	8.00mg			1997/09/20 女 5歳 1ヶ月
	麻酔前投薬 用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：										安全性： 有効性：
230	公立こどもH 麻酔科			入院 2002/11/11 ~ 2002/11/11	(1日間) 投与終了	注射	内用	10.00mg			1997/08/15 女 5歳 2ヶ月
	麻酔前投薬 用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：										安全性： 有効性：
231	公立こどもH 婦人科			入院 2002/11/28 ~ 2002/11/28	(1日間) 投与終了	注射	内用	9.00mg			1997/07/03 女 5歳 3ヶ月
	麻酔前投薬 用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：										安全性： 有効性：
232	公立こどもH 麻酔科			入院 2002/11/21 ~ 2002/11/21	(1日間) 投与終了	注射	内用	7.00mg			1997/06/06 男 5歳 4ヶ月
	麻酔前投薬 用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：										安全性： 有効性：
233	公立こどもH 麻酔科			入院 2002/11/01 ~ 2002/11/01	(1日間) 投与終了	注射	内用	7.00mg			1998/06/26 女 5歳 4ヶ月
	麻酔前投薬 用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：										安全性： 有効性：
234	公立こどもH 麻酔科			入院 2002/11/25 ~ 2002/11/25	(1日間) 投与終了	注射	内用	4.00mg			1997/06/18 男 5歳 4ヶ月
	麻酔前投薬 用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：										安全性： 有効性：

	施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
	対象疾患			適応外使用分類		対象疾患手入力						年齢
235	公立こどもH 麻酔科 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/11 ~ 2002/11/11 (1日間)	投与終了	注射	内用	7.00mg			1997/05/04 男 5歳 5ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服											安全性： 有効性：
236	公立こどもH 麻酔科 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/19 ~ 2002/11/19 (1日間)	投与終了	注射	内用	7.00mg			1997/05/04 女 5歳 5ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服											安全性： 有効性：
237	公立こどもH 麻酔科 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/06 ~ 2002/11/06 (1日間)	投与終了	注射	内用	7.00mg			1998/05/14 男 5歳 5ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服											安全性： 有効性：
238	公立こどもH 麻酔科 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/14 ~ 2002/11/14 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1997/03/17 女 5歳 7ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服											安全性： 有効性：
239	公立こどもH 麻酔科 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/13 ~ 2002/11/13 (1日間)	投与終了	注射	内用	9.00mg			1997/03/10 男 5歳 7ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服											安全性： 有効性：
240	公立こどもH 麻酔科 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/27 ~ 2002/11/27 (1日間)	投与終了	注射	内用	9.00mg			1997/02/13 女 5歳 8ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服											安全性： 有効性：
241	公立こどもH 麻酔科 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/19 ~ 2002/11/19 (1日間)	投与終了	注射	内用	7.00mg			1997/01/20 女 5歳 9ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服											安全性： 有効性：
242	公立こどもH 麻酔科 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/29 ~ 2002/11/29 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1997/01/26 男 5歳 9ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服											安全性： 有効性：
243	公立こどもH 麻酔科 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/13 ~ 2002/11/13 (1日間)	投与終了	注射	内用	5.00mg			1996/11/26 女 5歳 11ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服											安全性： 有効性：
244	公立こどもH 麻酔科 麻酔前投薬	婦人科			入院 2002/11/11 ~ 2002/11/11 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1996/10/15 男 6歳 0ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服											安全性： 有効性：
245	公立こどもH 麻酔科 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/20 ~ 2002/11/20 (1日間)	投与終了	注射	内用	8.00mg			1996/09/06 男 6歳 1ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服											安全性： 有効性：
246	公立こどもH 麻酔科 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/20 ~ 2002/11/20 (1日間)	投与終了	注射	内用	7.00mg			1996/09/06 女 6歳 1ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服											安全性： 有効性：
247	公立こどもH 麻酔科 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/21 ~ 2002/11/21 (1日間)	投与終了	注射	内用	8.00mg			1996/08/02 女 6歳 2ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服											安全性： 有効性：
248	公立こどもH 麻酔科 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/12 ~ 2002/11/12 (1日間)	投与終了	注射	内用	8.00mg			1996/08/10 女 6歳 2ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服											安全性： 有効性：
249	公立こどもH 麻酔科 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/25 ~ 2002/11/25 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1996/07/03 女 6歳 3ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服											安全性： 有効性：
250	公立こどもH 麻酔科 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/05 ~ 2002/11/05 (1日間)	投与終了	注射	内用	7.00mg			1997/06/03 男 6歳 4ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服											安全性： 有効性：
251	公立こどもH 麻酔科 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/28 ~ 2002/11/28 (1日間)	投与終了	注射	内用	12.00mg			1996/05/22 女 6歳 5ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服											安全性： 有効性：
252	公立こどもH 麻酔科 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/28 ~ 2002/11/28 (1日間)	投与終了	注射	内用	7.00mg			1996/05/07 女 6歳 5ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服											安全性： 有効性：

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
対象疾患	適応外使用分類		対象疾患手入力		年齢						
253	公立こどもH 麻酔科	麻酔科	入院	2002/11/20 ~ 2002/11/20 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1996/05/05 女 6歳 5ヶ月
麻酔前投薬											
用法・容量：注射剤を内服											
総合コメント：		安全性：									有効性：
254	公立こどもH 麻酔科	麻酔科	入院	2002/11/15 ~ 2002/11/15 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1996/04/15 女 6歳 6ヶ月
麻酔前投薬											
用法・容量：注射剤を内服											
総合コメント：		安全性：									有効性：
255	公立こどもH 麻酔科	麻酔科	入院	2002/11/06 ~ 2002/11/06 (1日間)	投与終了	注射	内用	7.00mg			1997/04/14 男 6歳 6ヶ月
麻酔前投薬											
用法・容量：注射剤を内服											
総合コメント：		安全性：									有効性：
256	公立こどもH 麻酔科	麻酔科	入院	2002/11/25 ~ 2002/11/25 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1996/04/29 女 6歳 6ヶ月
麻酔前投薬											
用法・容量：注射剤を内服											
総合コメント：		安全性：									有効性：
257	公立こどもH 麻酔科	麻酔科	入院	2002/11/06 ~ 2002/11/06 (1日間)	投与終了	注射	内用	8.00mg			1997/03/28 女 6歳 7ヶ月
麻酔前投薬											
用法・容量：注射剤を内服											
総合コメント：		安全性：									有効性：
258	公立こどもH 麻酔科	麻酔科	入院	2002/11/22 ~ 2002/11/22 (1日間)	投与終了	注射	内用	9.00mg			1996/02/24 男 6歳 8ヶ月
麻酔前投薬											
用法・容量：注射剤を内服											
総合コメント：		安全性：									有効性：
259	公立こどもH 麻酔科	麻酔科	入院	2002/11/22 ~ 2002/11/22 (1日間)	投与終了	注射	内用	9.00mg			1996/02/27 女 6歳 8ヶ月
麻酔前投薬											
用法・容量：注射剤を内服											
総合コメント：		安全性：									有効性：
260	公立こどもH 麻酔科	麻酔科	入院	2002/11/28 ~ 2002/11/28 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1996/01/14 女 6歳 9ヶ月
麻酔前投薬											
用法・容量：注射剤を内服											
総合コメント：		安全性：									有効性：
261	公立こどもH 麻酔科	麻酔科	入院	2002/11/07 ~ 2002/11/07 (1日間)	投与終了	注射	内用	4.00mg			1996/12/24 男 6歳 10ヶ月
麻酔前投薬											
用法・容量：注射剤を内服											
総合コメント：		安全性：									有効性：
262	公立こどもH 麻酔科	麻酔科	入院	2002/11/08 ~ 2002/11/08 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1995/08/04 女 7歳 2ヶ月
麻酔前投薬											
用法・容量：注射剤を内服											
総合コメント：		安全性：									有効性：
263	公立こどもH 麻酔科	麻酔科	入院	2002/11/05 ~ 2002/11/05 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1996/07/07 男 7歳 3ヶ月
麻酔前投薬											
用法・容量：注射剤を内服											
総合コメント：		安全性：									有効性：
264	公立こどもH 麻酔科	麻酔科	入院	2002/11/07 ~ 2002/11/07 (1日間)	投与終了	注射	内用	9.00mg			1996/07/18 女 7歳 3ヶ月
麻酔前投薬											
用法・容量：注射剤を内服											
総合コメント：		安全性：									有効性：
265	公立こどもH 麻酔科	麻酔科	入院	2002/11/07 ~ 2002/11/07 (1日間)	投与終了	注射	内用	12.00mg			1995/06/02 女 7歳 4ヶ月
麻酔前投薬											
用法・容量：注射剤を内服											
総合コメント：		安全性：									有効性：
266	公立こどもH 麻酔科	麻酔科	入院	2002/11/14 ~ 2002/11/14 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1995/06/06 女 7歳 4ヶ月
麻酔前投薬											
用法・容量：注射剤を内服											
総合コメント：		安全性：									有効性：
267	公立こどもH 麻酔科	麻酔科	入院	2002/11/26 ~ 2002/11/26 (1日間)	投与終了	注射	内用	9.00mg			1995/06/29 男 7歳 4ヶ月
麻酔前投薬											
用法・容量：注射剤を内服											
総合コメント：		安全性：									有効性：
268	公立こどもH 麻酔科	麻酔科	入院	2002/11/05 ~ 2002/11/05 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1996/05/18 女 7歳 5ヶ月
麻酔前投薬											
用法・容量：											
総合コメント：		安全性：									有効性：
269	公立こどもH 麻酔科	麻酔科	入院	2002/11/08 ~ 2002/11/08 (1日間)	投与終了	注射	内用	8.00mg			1995/05/09 女 7歳 5ヶ月
麻酔前投薬											
用法・容量：注射剤を内服											
総合コメント：		安全性：									有効性：
270	公立こどもH 麻酔科	麻酔科	入院	2002/11/05 ~ 2002/11/05 (1日間)	投与終了	注射	内用	9.00mg			1996/05/21 女 7歳 5ヶ月
麻酔前投薬											
用法・容量：注射剤を内服											
総合コメント：		安全性：									有効性：

	施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
	対象疾患				適応外使用分類	対象疾患手入力						年齢
271	公立こどもH 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/27 ~ 2002/11/27 (1日間)	投与終了	注射	内用	9.00mg			1995/04/06 男 7歳 6ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：											安全性： 有効性：
272	公立こどもH 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/29 ~ 2002/11/29 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1995/02/07 男 7歳 8ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：											安全性： 有効性：
273	公立こどもH 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/28 ~ 2002/11/28 (1日間)	投与終了	注射	内用	12.00mg			1994/11/03 女 7歳 11ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：											安全性： 有効性：
274	公立こどもH 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/06 ~ 2002/11/06 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1995/10/07 男 8歳 0ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：											安全性： 有効性：
275	公立こどもH 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/19 ~ 2002/11/19 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1994/10/30 男 8歳 0ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：											安全性： 有効性：
276	公立こどもH 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/07 ~ 2002/11/07 (1日間)	投与終了	注射	内用	8.00mg			1995/08/29 男 8歳 2ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：											安全性： 有効性：
277	公立こどもH 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/26 ~ 2002/11/26 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1994/06/01 女 8歳 4ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：											安全性： 有効性：
278	公立こどもH 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/13 ~ 2002/11/13 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1994/06/29 男 8歳 4ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：											安全性： 有効性：
279	公立こどもH 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/21 ~ 2002/11/21 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1994/02/14 男 8歳 8ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：											安全性： 有効性：
280	公立こどもH 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/11 ~ 2002/11/11 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1994/02/21 女 8歳 8ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：											安全性： 有効性：
281	公立こどもH 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/14 ~ 2002/11/14 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1994/01/27 男 8歳 9ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：											安全性： 有効性：
282	公立こどもH 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/15 ~ 2002/11/15 (1日間)	投与終了	注射	内用	8.00mg			1993/11/21 男 8歳 11ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：											安全性： 有効性：
283	公立こどもH 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/25 ~ 2002/11/25 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1993/10/01 男 9歳 0ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：											安全性： 有効性：
284	公立こどもH 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/12 ~ 2002/11/12 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1993/08/07 男 9歳 2ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：											安全性： 有効性：
285	公立こどもH 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/25 ~ 2002/11/25 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1992/12/12 女 9歳 10ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：											安全性： 有効性：
286	公立こどもH 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/28 ~ 2002/11/28 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1992/01/26 女 10歳 9ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：											安全性： 有効性：
287	公立こどもH 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/14 ~ 2002/11/14 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1991/11/24 男 10歳 11ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：											安全性： 有効性：
288	公立こどもH 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/01 ~ 2002/11/01 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1991/11/04 女 11歳 11ヶ月
	用法・容量：注射剤を内服 総合コメント：											安全性： 有効性：

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
対象疾患	適応外使用分類		対象疾患手入力								
年 齢											
289	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/07 ~ 2002/11/07 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1991/09/05
	麻酔前投薬										
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：				安全性：		有効性：				
290	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/15 ~ 2002/11/15 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1990/02/06
	麻酔前投薬										
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：				安全性：		有効性：				
291	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/15 ~ 2002/11/15 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1989/07/21
	麻酔前投薬										
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：				安全性：		有効性：				
292	公立こどもH	麻酔科		入院 2002/11/25 ~ 2002/11/25 (1日間)	投与終了	注射	内用	10.00mg			1988/07/02
	麻酔前投薬										
	用法・容量：注射剤を内服										
	総合コメント：				安全性：		有効性：				
293	公立こどもI	外科		入院 2002/11/13 ~ 2002/11/26 (14日間)	投与終了	注射	注射	20.00mg	52.2cm	3.9kg	2002/05/05
	集中治療室における人工呼吸の鎮静										
	用法・容量：										
	総合コメント：有効であり安全であった。				安全性：特になし		有効性：著効				
294	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/02 ~ 2002/11/02 (1日間)	投与終了	注射	注射	0.40mg			2002/10/28
	全身麻酔の導入および維持										
	用法・容量：										
	総合コメント：				安全性：特になし		有効性：著効				
295	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/19 ~ 2002/11/19 (1日間)	投与終了	注射	注射	0.50mg			2002/10/29
	全身麻酔の導入および維持										
	用法・容量：										
	総合コメント：				安全性：特になし		有効性：著効				
296	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/11 ~ 2002/11/11 (1日間)	投与終了	注射	注射	0.70mg			2002/10/04
	全身麻酔の導入および維持										
	用法・容量：										
	総合コメント：				安全性：特になし		有効性：著効				
297	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/14 ~ 2002/11/14 (1日間)	投与終了	注射	注射	0.70mg			2002/10/16
	全身麻酔の導入および維持										
	用法・容量：										
	総合コメント：				安全性：特になし		有効性：有効				
298	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/19 ~ 2002/11/19 (1日間)	投与終了	注射	注射	0.95mg			2002/08/01
	全身麻酔の導入および維持										
	用法・容量：										
	総合コメント：				安全性：特になし		有効性：有効				
299	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/21 ~ 2002/11/21 (1日間)	投与終了	注射	注射	4.00mg			2002/08/30
	全身麻酔の導入および維持										
	用法・容量：										
	総合コメント：				安全性：特になし		有効性：有効				
300	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/06 ~ 2002/11/06 (1日間)	投与終了	注射	注射	3.00mg			2002/07/11
	全身麻酔の導入および維持										
	用法・容量：										
	総合コメント：				安全性：特になし		有効性：有効				
301	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/28 ~ 2002/11/28 (1日間)	投与終了	注射	注射	8.00mg	62.7cm	6.3kg	2002/07/10
	全身麻酔の導入および維持										
	用法・容量：										
	総合コメント：特に問題なし				安全性：特になし		有効性：著効				
302	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/25 ~ 2002/11/25 (1日間)	投与終了	注射	注射	1.32mg			2001/09/29
	全身麻酔の導入および維持										
	用法・容量：										
	総合コメント：				安全性：特になし		有効性：有効				
303	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/18 ~ 2002/11/18 (1日間)	投与終了	注射	注射	7.50mg			2001/06/19
	全身麻酔の導入および維持										
	用法・容量：										
	総合コメント：				安全性：特になし		有効性：有効				
304	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/25 ~ 2002/11/25 (1日間)	投与終了	注射	注射	1.80mg			2001/02/09
	全身麻酔の導入および維持										
	用法・容量：										
	総合コメント：				安全性：特になし		有効性：有効				
305	公立こどもI	循環器科		外来 2002/11/01 ~ 2002/11/01 (1日間)	投与終了	注射	外用	9.00mg			2001/01/18
	全身麻酔の導入および維持										
	用法・容量：注腸										
	総合コメント：				安全性：特になし		有効性：有効				
306	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/15 ~ 2002/11/15 (1日間)	投与終了	注射	注射	2.70mg	96.0cm	13.6kg	1999/08/14
	全身麻酔の導入および維持										
	用法・容量：										
	総合コメント：				安全性：特になし		有効性：有効				

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
307	公立こどもI	循環器科	適応外使用	入院 2002/11/28 ~ 2002/12/11 (10日間)	投与終了	注射	注射	3.24mg	88.2cm	10.8kg	1999/06/15
											年齢 女 3歳 6ヶ月
用法・容量： 全身麻酔の導入および維持 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効											
308	公立こどもI	循環器科	適応外使用	入院 2002/11/11 ~ 2002/11/11 (1日間)	投与終了	注射	注射	30.00mg	119.0cm	26.0kg	1996/05/12
											年齢 女 6歳 7ヶ月
用法・容量：うち2mL注射薬を注腸 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効											
309	公立こどもI	整形外科	適応外使用	入院 2002/11/12 ~ 2002/11/12 (1日間)	投与終了	注射	注射	5.00mg	136.0cm	53.3kg	1993/10/04
											年齢 女 9歳 3ヶ月
用法・容量： 全身麻酔の導入および維持 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効											
310	公立こどもI	外科	適応外使用	入院 2002/11/27 ~ 2002/11/27 (1日間)	投与終了	注射	注射	0.20mg	48.0cm	2.6kg	2002/10/12
											年齢 男 0歳 2ヶ月
用法・容量： 鎮静 乳児肺炎(胆道シンチの検査時使用) 総合コメント：有効であった。安全であった。 安全性：特になし 有効性：有効											
311	公立こどもI	循環器科	適応外使用	入院 2002/11/28 ~ 2002/11/28 (1日間)	投与終了	注射	外用	5.00mg			2001/04/20
											年齢 男 1歳 8ヶ月
用法・容量：注腸 検査のための鎮静 検査のための鎮静 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効											
312	公立こどもI	循環器科	適応外使用	入院 2002/11/07 ~ 2002/11/07 (1日間)	投与終了	注射	外用	9.00mg			2000/06/30
											年齢 女 2歳 6ヶ月
用法・容量：注射薬を注腸した 検査のための鎮静 検査時(心エコー)鎮静 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効											
313	公立こどもI	神経科	適応外使用	外来 2002/11/25 ~ 2002/11/25 (1日間)	投与終了	注射	注射	2.00mg	83.0cm	10.0kg	2000/05/24
											年齢 男 2歳 7ヶ月
用法・容量： 鎮静 MRI検査のための鎮静 総合コメント：MRI検査のため、トリクロロール、エスクレ坐薬500mgと併用してドルミカムの静注をおこなって眠らせた。 安全性：特になし 有効性：有効											
314	公立こどもI	小児科	適応外使用	入院 2002/10/21 ~ 2002/10/21 (1日間)	投与終了	注射	注射	2.00mg	93.0cm	12.9kg	1999/11/21
		小児内科									年齢 女 3歳 1ヶ月
用法・容量：ミダゾラム10mgに生食を加え総量10mLにして2mLをゆすりivした。 川崎病(心筋シンチ時の鎮静目的) 総合コメント：心筋シンチのため、午前中から眠らせる必要があった。トリクロロール、エスクレ、アタラックスPでも眠らな いたため使用した。呼吸停止を起こさぬようゆっくり静注した。 安全性：特になし 有効性：有効											
315	公立こどもI	神経科	適応外使用	入院 2002/11/03 ~ 2002/11/05 (3日間)	投与終了	注射	注射		91.2cm	10.6kg	1997/06/26
											年齢 男 5歳 6ヶ月
用法・容量：初日37.5mg、2日目36mg→1.5mgを静注、それに引き続き1.5mg/hrで持続静注 てんかん てんかん発作重延状態 総合コメント：フェニトインの静注を併用したので、有効性については本例では明らかでない。呼吸抑制、血圧低下等 の有害事象はとくにみられなかった。 安全性：特になし 有効性：やや有効											
316	公立こどもI	神経科	適応外使用	入院 2002/11/15 ~ 2002/11/16 (1日間)	投与終了	注射	注射		92.0cm	8.3kg	1995/10/16
											年齢 男 7歳 2ヶ月
用法・容量：2mg/日1回、1mg/日1回 抗けいれん 痙攣発作時の治療 総合コメント：てんかんの患者 安全性：特になし 有効性：有効											
317	公立こどもI	神経科	適応外使用	外来 2002/11/11 ~ 2002/11/11 (1日間)	投与終了	注射	注射	2.60mg	100.0cm	13.0kg	1995/07/13
											年齢 男 7歳 5ヶ月
用法・容量： MRI検査のため鎮静が必要で、トリクロロールと併用して使用した 検査のための鎮静 MRI検査のための鎮静 総合コメント：MRI検査のため鎮静が必要で、トリクロロールと併用して使用した 安全性：特になし 有効性：有効											
318	公立こどもI	循環器科	適応外使用	入院 2002/11/19 ~ 2002/11/19 (1日間)	投与終了	注射	外用	4.00mg			1994/06/10
											年齢 男 8歳 6ヶ月
用法・容量：注腸 検査のための鎮静 検査のための鎮静 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効											
319	公立こどもI	神経科	適応外使用	外来 2002/11/20 ~ 2002/11/20 (1日間)	投与終了	注射	注射	6.00mg	140.0cm	38.0kg	1993/04/27
											年齢 男 9歳 8ヶ月
用法・容量： トリクロロール、エスクレ坐薬にて入眠するも体動がみられるため、→ドルミカムを使用し、その後体動消 失して検査可能となった。→呼吸抑制、SpO2低下などの有害事象はとくにみられなかった。 安全性：特になし 有効性：有効											
320	公立こどもI	神経科	適応外使用	入院 2002/10/23 ~ 2002/10/29 (7日間)	投与終了	注射	注射		130.0cm	25.0kg	1993/01/06
											年齢 女 9歳 11ヶ月
用法・容量：4mg/hrで持続 抗けいれん 痙攣発作の治療 総合コメント：急性限局性脳炎 安全性：特になし 有効性：有効											
321	公立こどもI	神経科	適応外使用	入院 2002/11/12 ~ 2002/11/13 (1日間)	投与終了	注射	注射	4.00mg	130.0cm	20.0kg	1992/02/05
											年齢 女 10歳 10ヶ月
用法・容量：0.2mg/kg/hr 抗けいれん 痙攣発作頻発時の治療 総合コメント：すみやかに痙攣発作消失した 安全性：特になし 有効性：有効											
322	公立こどもI	神経科	適応外使用	外来 2002/11/21 ~ 2002/11/21 (1日間)	投与終了	注射	注射	5.00mg	130.0cm	29.8kg	1991/06/24
											年齢 女 11歳 6ヶ月
用法・容量： MRI検査のためアタラックスPと併用してドルミカムを使用した。 検査のための鎮静 MRI検査のための鎮静 総合コメント：MRI検査のためアタラックスPと併用してドルミカムを使用した。 安全性：特になし 有効性：有効											
323	公立こどもI	血液科	麻酔前投薬	入院 2002/11/25 ~ 2002/11/25 (1日間)	投与終了	注射	注射	1.00mg			2001/04/24
		血液腫瘍科									年齢 男 1歳 8ヶ月
用法・容量： 血液腫瘍科 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効											
324	公立こどもI	外科	麻酔前投薬	入院 2002/11/14 ~ 2002/11/14 (1日間)	投与終了	注射	注射	5.50mg	82.5cm	11.5kg	2001/03/08
											年齢 男 1歳 9ヶ月
用法・容量：ミダゾラム5.5mgを麻酔前投薬として、注腸した。 総合コメント：有効であり安全性に問題なかった。 安全性：特になし 有効性：有効											

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
対象疾患			適応外使用分類		対象疾患手入力						年齢
325	公立こどもI	循環器科		入院 2002/12/02 ~ 2002/12/02	(1日間) 投与終了	注射	外用	11.00mg			2000/08/20 男 2歳 4ヶ月
	麻酔前投薬										安全性: 特になし 有効性: 有効
326	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/08 ~ 2002/11/08	(1日間) 投与終了	注射	外用	9.00mg			1999/10/22 男 3歳 2ヶ月
	麻酔前投薬										安全性: 特になし 有効性: 有効
327	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/07 ~ 2002/11/07	(1日間) 投与終了	注射	外用,注射	10.00mg			1999/10/19 男 3歳 2ヶ月
	麻酔前投薬										安全性: 特になし 有効性: 有効
328	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/25 ~ 2002/11/25	(1日間) 投与終了	注射	注射	9.00mg	81.6cm	9.7kg	1999/09/14 男 3歳 3ヶ月
	麻酔前投薬										安全性: 特になし 有効性: 有効
329	公立こどもI	外科		入院 2002/11/01 ~ 2002/11/08	(2日間) 投与終了	注射	注射	2.00mg	81.2cm	9.8kg	1999/07/23 男 3歳 5ヶ月
	麻酔前投薬										安全性: 特になし 有効性: 著効
330	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/29 ~ 2002/11/29	(1日間) 投与終了	注射	外用	7.00mg			1998/06/10 男 4歳 6ヶ月
	麻酔前投薬										安全性: 特になし 有効性: 有効
331	公立こどもI	血液科	血液腫瘍科	入院 2002/11/26 ~ 2002/11/26	(1日間) 投与終了	注射	注射	4.00mg			1998/05/15 女 4歳 7ヶ月
	麻酔前投薬										安全性: 特になし 有効性: 有効
332	公立こどもI	血液科	血液腫瘍科	入院 2002/11/13 ~ 2002/11/13	(1日間) 投与終了	注射	注射	2.50mg			1998/04/04 女 4歳 8ヶ月
	麻酔前投薬										安全性: 特になし 有効性: 有効
333	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/27 ~ 2002/11/27	(1日間) 投与終了	注射	注射	21.00mg	99.3cm	15.2kg	1998/03/05 女 4歳 9ヶ月
	麻酔前投薬										安全性: 特になし 有効性: 有効
334	公立こどもI	血液科	血液腫瘍科	外来 2002/11/20 ~ 2002/11/20	(1日間) 投与終了	注射	注射	2.00mg			1998/01/09 男 4歳 11ヶ月
	麻酔前投薬										安全性: 特になし 有効性: 有効
335	公立こどもI	循環器科		入院 2002/12/02 ~ 2002/12/02	(1日間) 投与終了	注射	外用	10.00mg			1997/12/17 男 5歳 0ヶ月
	麻酔前投薬										安全性: 特になし 有効性: 有効
336	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/13 ~ 2002/11/13	(1日間) 投与終了	注射	注射	40.00mg	113.4cm	20.3kg	1997/11/05 男 5歳 1ヶ月
	麻酔前投薬										安全性: 特になし 有効性: 有効
337	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/06 ~ 2002/11/06	(1日間) 投与終了	注射	注射	3.50mg	106.3cm	17.3kg	1996/12/09 女 6歳 0ヶ月
	麻酔前投薬										安全性: 特になし 有効性: 有効
338	公立こどもI	血液科	血液腫瘍科	入院 2002/11/17 ~ 2002/11/17	(1日間) 投与終了	注射	注射	3.00mg			1996/11/02 男 6歳 1ヶ月
	麻酔前投薬										安全性: 特になし 有効性: 有効
339	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/07 ~ 2002/11/07	(1日間) 投与終了	注射	注射	4.24mg	126.6cm	21.2kg	1993/06/05 男 9歳 6ヶ月
	麻酔前投薬										安全性: 特になし 有効性: 有効
340	公立こどもI	循環器科		入院 2002/11/13 ~ 2002/11/13	(1日間) 投与終了	注射	注射	36.00mg	133.5cm	27.5kg	1993/03/14 男 9歳 9ヶ月
	麻酔前投薬										安全性: 特になし 有効性: 有効
341	公立こどもI	血液科	血液腫瘍科	外来 2002/11/06 ~ 2002/11/06	(1日間) 投与終了	注射	注射	3.00mg			1990/11/05 男 12歳 1ヶ月
	麻酔前投薬										安全性: 特になし 有効性: 有効
342	公立こどもJ	新生児科	未熟児新生児科	入院 2002/11/09 ~ 2002/11/27	(19日間) 投与終了	注射	注射	0.10mg	50.0cm	3.6kg	2002/11/09 女 0歳 1ヶ月
	適応外使用		鎮静		新生児仮死 口蓋裂						安全性: 特になし 有効性: 未判定

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
343	公立こどもJ	新生児科	未熟児新生児科	入院 2002/10/02 ~	継続中	注射	注射	0.10mg	2.6kg	2.6kg	2002/10/02
	適応外使用	抗けいれん								男	0歳 2ヶ月
	用法・容量	: 0.05~0.1mg/kg/hr DIV 6day 0.1mg/kg/hr DIV 3day 0.05mg~0.025mg/kg/hr DIV 9day→→→→									
	総合コメント	安全性: 特になし 有効性: 未判定									
344	公立こどもJ	心臓血管外科		入院 2002/10/01 ~ 2002/11/12 (43日間)	投与終了	注射	注射	0.40mg	45.5cm	2.5kg	2002/09/26
	適応外使用	鎮静								男	0歳 2ヶ月
	用法・容量	: 10/1 0.1mg/kg/hr 10/1~11/12 0.4mg/kg/hr DIV									
	総合コメント	安全性: 特になし 有効性: 未判定									
345	公立こどもJ	心臓血管外科		入院 2002/09/06 ~	継続中	注射	注射	0.10mg	2.8kg	2.8kg	2002/09/06
	適応外使用	鎮静								女	0歳 3ヶ月
	用法・容量	: 0.1mg/kg/hr 11day 1weekあけて 11day									
	総合コメント	安全性: 有効性: 未判定									
346	公立こどもJ	新生児科	未熟児新生児科	入院 2002/05/11 ~ 2002/06/03 (24日間)	継続中	注射	注射	0.30mg	42.0cm	2.1kg	2002/05/10
	適応外使用	抗けいれん								男	0歳 7ヶ月
	用法・容量	: 0.1~0.3mg/kg/hr									
	総合コメント	安全性: 副作用あり: 概要を記載 hypobentilation 有効性: 未判定									
347	公立こどもJ	小児科		入院 2002/11/20 ~	継続中	注射	注射	0.09mg	6.6kg	6.6kg	2002/03/05
	適応外使用	鎮静								女	0歳 9ヶ月
	用法・容量	: 0.085mg/kg/hr DIV									
	総合コメント	安全性: 特になし 有効性: 未判定									
348	公立こどもJ	心臓血管外科		入院 2002/11/26 ~	継続中	注射	注射	0.30mg	60.0cm	4.2kg	2002/01/19
	適応外使用	手術後の鎮静								男	0歳 10ヶ月
	用法・容量	: 0.3mg/kg/hr									
	総合コメント	安全性: 特になし 有効性: 未判定									
349	公立こどもJ	泌尿器科		入院 2002/11/23 ~ 2002/11/26 (4日間)	投与終了	注射	注射	0.10mg	73.0cm	9.3kg	2001/09/02
	適応外使用	鎮静								男	1歳 2ヶ月
	用法・容量	: 0.1mg/kg/hr DIV									
	総合コメント	安全性: 特になし 有効性: 未判定									
350	公立こどもJ	心臓血管外科		入院 2002/10/21 ~	継続中	注射	注射	0.30mg	67.4cm	6.3kg	2001/12/14
	適応外使用	鎮静								女	1歳 11ヶ月
	用法・容量	: 0.3mg/kg/hr DIV									
	総合コメント	安全性: 特になし 有効性: 未判定									
351	公立こどもJ	心臓血管外科		入院 2002/11/25 ~ 2002/11/25 (1日間)	投与終了	注射	注射	0.20mg	95.0cm	13.1kg	1999/03/19
	適応外使用	手術後の鎮静								女	3歳 8ヶ月
	用法・容量	: 0.2mg/kg/hr DIV 10/23、11/25→									
	総合コメント	安全性: 特になし 有効性: 未判定									
352	公立こどもJ	循環器科		入院 2002/06/27 ~ 2002/11/01 (128日間)	投与終了	注射	注射	0.10mg	12.5kg	12.5kg	1998/08/25
	適応外使用	鎮静								男	4歳 3ヶ月
	用法・容量	: 0.1mg/kg/hr 1day→0.3mg/kg/hr 15day→0.15mg/kg/hr 1day→0.25mg/kg/hr 1day→0.1mg/kg/hr 14day→2mg iv→									
	総合コメント	安全性: 特になし 有効性: 未判定									
353	公立こどもJ	血液科	血液腫瘍科	入院 2002/11/21 ~	継続中	注射	注射	0.28mg	101.1cm	15.0kg	1998/01/22
	適応外使用	手術後の鎮静								女	4歳 10ヶ月
	用法・容量	: 0.28mg/kg/hr									
	総合コメント	安全性: 特になし 有効性: 未判定									
354	公立こどもJ	血液科	血液腫瘍科	入院 2002/10/01 ~ 2002/11/18 (49日間)	投与終了	注射	注射	0.25mg	95.0cm	15.0kg	1998/01/19
	適応外使用	手術後の鎮静								男	4歳 10ヶ月
	用法・容量	: 0.25mg/kg/hr DIV									
	総合コメント	安全性: 特になし 有効性: 未判定									
355	公立こどもJ	心臓血管外科		入院 2002/11/12 ~ 2002/11/13 (2日間)	投与終了	注射	注射	0.07mg	120.5cm	27.0kg	1996/11/29
	適応外使用	鎮静								男	6歳 0ヶ月
	用法・容量	: 0.07mg/kg/hr DIV									
	総合コメント	安全性: 特になし 有効性: 有効									
356	公立こどもJ	血液科	血液腫瘍科	入院 2002/11/21 ~ 2002/11/21 (1日間)	投与終了	注射	注射	0.10mg	20.2kg	20.2kg	1995/09/10
	適応外使用	鎮静								女	7歳 2ヶ月
	用法・容量	: 0.1mg/kg = 2mg iv									
	総合コメント	安全性: 特になし 有効性: 未判定									
357	公立こどもK	小児科		入院 2002/11/06 ~ 2002/11/06 (1日間)	投与終了	注射	注射	5.00mg	58.5cm	6.0kg	2002/07/23
	適応外使用	抗けいれん								男	0歳 3ヶ月
	用法・容量	: 点鼻で使用。									
	総合コメント	: 初期治療及び緊急時に著効を示す薬剤として使用しやすい。 安全性: 特になし 有効性: 著効									
358	公立こどもK	外科		入院 2002/11/20 ~ 2002/11/24 (4日間)	投与終了	注射	注射		3.2kg	3.2kg	2002/08/02
	適応外使用	鎮静								女	0歳 3ヶ月
	用法・容量	: 0.3mg/hで持続投与(0.1mg/kg/h)→									
	総合コメント	安全性: 特になし 有効性: 有効									
359	公立こどもK	小児科		外来 2002/11/12 ~ 2002/11/12 (1日間)	投与終了	注射	注射	12.00mg	10.2kg	10.2kg	2001/07/21
	適応外使用	抗けいれん								男	1歳 3ヶ月
	用法・容量	: 点鼻4回で1.2ml使用。→									
	総合コメント	: 点鼻使用は即効性があるため、血管ルート確保までに使用する場合が多い。→ 安全性: 特になし 有効性: 著効									
360	公立こどもK	薬剤検査科	薬剤検査科	外来 2002/11/05 ~ 2002/11/05 (1日間)	投与終了	注射	注射				1999/12/20
	適応外使用	抗けいれん								女	2歳 10ヶ月
	用法・容量	:									
	総合コメント	安全性: 有効性:									



施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
361	公立こどもK	小児科	適応外使用	外来 2002/11/05 ~ 2002/11/05 (1日間)	投与終了	注射	注射	20.00mg	15.0kg	1999/12/20	年齢 女 2歳 10ヶ月
	適応外使用	抗けいれん	けいれん(てんかん)								
用法・容量：点鼻から静注へ変えながら使用。→ 総合コメント：初期治療にミタゾラム著効を示す。→											
安全性：特になし											
有効性：著効											
362	公立こどもK	外科	適応外使用	外来 2002/11/08 ~ 2002/11/08 (1日間)	投与終了	注射	注射	3.00mg	99.4cm	15.6kg	1999/02/21
	適応外使用	鎮静	鎮静								女 3歳 8ヶ月
用法・容量：MRI実施時に弱ベチ注等との併用で使用。 総合コメント：											
安全性：特になし											
有効性：有効											
363	公立こどもK	小児科	適応外使用	外来 2002/11/19 ~ 2002/11/19 (1日間)	投与終了	注射	注射	12.00mg	100.0cm	13.9kg	1998/03/02
	適応外使用	抗けいれん	けいれん(てんかん)								男 4歳 8ヶ月
用法・容量：点鼻0.4ml-点鼻0.3ml-静注0.5mlで使用 総合コメント：けいれんの初期治療に著効を示す。→											
安全性：特になし											
有効性：著効											
364	公立こどもK	麻酔科	麻酔前投薬	入院 2002/11/14 ~ 2002/11/14 (1日間)	投与終了	注射	注射	1.00mg	77.5cm	12.2kg	2001/08/30
	麻酔前投薬										男 1歳 2ヶ月
用法・容量： 総合コメント：											
安全性：特になし											
有効性：著効											
365	公立こどもK	薬剤検査科	薬剤検査科	入院 2002/11/07 ~ 2002/11/07 (1日間)	投与終了	注射	内用,注射	1.00mg	101.4cm	17.5kg	1998/08/31
	麻酔前投薬										男 4歳 2ヶ月
用法・容量：弱ベチ注等に追加し、導入剤として使用。 総合コメント：											
安全性：特になし											
有効性：著効											
366	公立こどもL	麻酔科	集中治療室における人工呼吸の鎮静	入院 2002/11/18 ~ 2002/11/18 (1日間)	投与終了	注射	注射	1.00mg	4.9kg	2002/10/06	
	集中治療室における人工呼吸の鎮静										女 0歳 1ヶ月
用法・容量：ICU入室時鎮静のため静注 総合コメント：											
安全性：特になし											
有効性：有効											
367	公立こどもL	麻酔科	集中治療室における人工呼吸の鎮静	入院 2002/11/13 ~ 2002/11/13 (1日間)	投与終了	注射	注射	0.50mg	6.3kg	2002/08/10	
	集中治療室における人工呼吸の鎮静										男 0歳 3ヶ月
用法・容量：人工呼吸の鎮静のため1回使用 総合コメント：											
安全性：特になし											
有効性：著効											
368	公立こどもL	麻酔科	集中治療室における人工呼吸の鎮静	入院 2002/10/18 ~	継続中	注射	注射	3.00mg	63.0cm	5.1kg	2000/09/06
	集中治療室における人工呼吸の鎮静										女 2歳 1ヶ月
用法・容量：不穏時適宜iv。1回1mg×3回くらい使用。 総合コメント：											
安全性：特になし											
有効性：著効											
369	公立こどもL	麻酔科	全身麻酔の導入および維持	入院 2002/11/15 ~ 2002/11/21 (7日間)	投与終了	注射	注射		50.0cm	4.8kg	2002/05/31
	全身麻酔の導入および維持										男 0歳 5ヶ月
用法・容量：手術中3.5mgを分割して使用。その後ICUにて11/16不穏時0.5mgをiv4。11/16準夜帯より持続静注0.5mg~1mg/hを11/21まで。1日2~24mg 総合コメント：											
安全性：特になし											
有効性：著効											
370	公立こどもL	麻酔科	全身麻酔の導入および維持	入院 2002/11/20 ~ 2002/11/20 (1日間)	投与終了	注射	注射	5.00mg	70.6cm	7.4kg	2001/12/12
	全身麻酔の導入および維持										女 0歳 10ヶ月
用法・容量：手術施行時、全身麻酔維持のため計5mg静注 総合コメント：											
安全性：特になし											
有効性：有効											
371	公立こどもL	麻酔科	全身麻酔の導入および維持	入院 2002/11/26 ~ 2002/11/26 (1日間)	投与終了	注射	注射	2.00mg	18.6kg	1991/11/22	
	全身麻酔の導入および維持										女 11歳 0ヶ月
用法・容量：0.5mg×4の分割投与 総合コメント：											
安全性：特になし											
有効性：有効											
372	公立こどもL	麻酔科	全身麻酔の導入および維持	入院 2002/11/28 ~ 2002/11/28 (1日間)	投与終了	注射	注射	0.50mg	16.0kg	1990/08/18	
	全身麻酔の導入および維持										女 12歳 3ヶ月
用法・容量：全身麻酔維持のためiv 総合コメント：											
安全性：特になし											
有効性：著効											
373	公立こどもL	脳外科	適応外使用	入院 2002/11/03 ~	継続中	注射	注射				2002/06/02
	適応外使用	検査のための鎮静	検査時の鎮静、OP後のセデーション等								女 0歳 5ヶ月
用法・容量：検査時0.5mg、0.7+0.5+0.5+1mg、OP後1mg/hで使用 総合コメント：											
安全性：											
有効性：											
374	公立こどもL	脳外科	適応外使用	入院 2002/11/20 ~	(5日間) 継続中	注射	注射	1.00mg	71.4cm	10.4kg	2002/04/30
	適応外使用	検査のための鎮静	検査時の鎮静								男 0歳 7ヶ月
用法・容量：2+1+0.5+0.5mg、1mg、0.5mgなど状況に応じて使用 総合コメント：											
安全性：											
有効性：											
375	公立こどもL	麻酔科	適応外使用	入院 2002/11/28 ~ 2002/11/28 (1日間)	投与終了	注射	外用	3.00mg	70.9cm	8.5kg	2002/01/27
	適応外使用	鎮静	麻酔前投薬の注腸								男 0歳 10ヶ月
用法・容量：注腸 総合コメント：											
安全性：特になし											
有効性：有効											
376	公立こどもL	小児科	適応外使用	入院 2002/11/28 ~ 2002/11/28 (1日間)	投与終了	注射	注射	2.50mg	73.3cm	9.3kg	2001/12/04
	適応外使用	検査のための鎮静	検査時の鎮静								女 0歳 11ヶ月
用法・容量：1mg+1mg+0.5mgで十分眠らざインソール15mgをivした。 総合コメント：トリクロの後のivだが十分は寝ずインソールで十分な鎮静をえた											
安全性：特になし											
有効性：やや有効											
377	公立こどもL	脳外科	適応外使用	入院 2002/11/05 ~ 2002/11/05 (1日間)	投与終了	注射	注射		70.5cm	8.8kg	2001/11/20
	適応外使用	検査のための鎮静	検査時の鎮静								男 1歳 0ヶ月
用法・容量： 総合コメント：											
安全性：											
有効性：											
378	公立こどもL	脳外科	適応外使用	入院 ~	投与終了	注射	注射		74.0cm	9.8kg	2001/09/29
	適応外使用	検査のための鎮静	検査時の鎮静、麻酔前投薬等								男 1歳 1ヶ月
用法・容量： 総合コメント：											
安全性：											
有効性：											

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日	
対象疾患			適応外使用分類	対象疾患手入力						年齢		
379	公立こどもL	脳外科	脳外科	入院	～	継続中	注射	注射			2001/08/10	
	適応外使用	検査のための鎮静		検査時の鎮静						女	1歳 3ヶ月	
	用法・容量:									安全性:	有効性:	
	総合コメント:											
380	公立こどもL	脳外科	脳外科	入院	2002/11/13 ~ 2002/11/13	(1日間) 投与終了	注射	注射	1.00mg	79.0cm	9.0kg	2001/06/28
	適応外使用	検査のための鎮静		検査時の鎮静						男	1歳 4ヶ月	
	用法・容量:									安全性:	有効性:	
	総合コメント:											
381	公立こどもL	麻酔科		入院	2002/11/26 ~ 2002/11/26	(1日間) 投与終了	注射	外用	3.00mg	80.0cm	9.6kg	2001/04/10
	適応外使用	鎮静		麻酔前投薬の注腸						女	1歳 7ヶ月	
	用法・容量:注腸									安全性:特になし	有効性:有効	
	総合コメント:											
382	公立こどもL	小児科		入院	2002/11/22 ~ 2002/11/22	(1日間) 投与終了	注射	注射	3.00mg	92.0cm	12.6kg	2001/01/12
	適応外使用	検査のための鎮静		検査時の鎮静						男	1歳 10ヶ月	
	用法・容量:1.5mg+1mg+0.5mg 計3mg									安全性:特になし	有効性:やや有効	
	総合コメント:結局眠りきれずインソール37.5mgをivして鎮静を得た											
383	公立こどもL	麻酔科		入院	2002/11/06 ~ 2002/11/06	(1日間) 投与終了	注射	外用	3.00mg	75.0cm	7.8kg	2000/12/24
	適応外使用	鎮静		麻酔前投薬の注腸						女	1歳 10ヶ月	
	用法・容量:注腸									安全性:特になし	有効性:やや有効	
	総合コメント:											
384	公立こどもL	脳外科	脳外科	入院	～	(3日間) 投与終了	注射	注射			2000/10/29	
	適応外使用	検査のための鎮静		検査時の鎮静						男	2歳 0ヶ月	
	用法・容量:									安全性:	有効性:	
	総合コメント:											
385	公立こどもL	脳外科	脳外科	入院	2002/11/01 ~	(2日間) 継続中	注射	注射		76.5cm	9.2kg	2000/11/27
	適応外使用	検査のための鎮静		検査時の鎮静						女	2歳 0ヶ月	
	用法・容量:0.75+0.5mg、1mg									安全性:	有効性:	
	総合コメント:											
386	公立こどもL	麻酔科		入院	2002/11/12 ~ 2002/11/12	(1日間) 投与終了	注射	外用	2.00mg		8.9kg	2000/07/24
	適応外使用	鎮静		麻酔前投薬の注腸						女	2歳 3ヶ月	
	用法・容量:注腸									安全性:特になし	有効性:やや有効	
	総合コメント:											
387	公立こどもL	小児科		入院	2002/11/29 ~ 2002/11/29	(1日間) 投与終了	注射	注射	3.00mg	87.1cm	10.9kg	2000/06/24
	適応外使用	検査のための鎮静		検査時の鎮静						男	2歳 5ヶ月	
	用法・容量:1.5mg+1mg+0.5mg 計3mg									安全性:特になし	有効性:著効	
	総合コメント:エクスレspで寝ていて移動時に覚醒しivした。0.3mg/kg/日で著効した→											
388	公立こどもL	麻酔科		入院	2002/11/13 ~ 2002/11/13	(1日間) 投与終了	注射	注射	1.00mg	92.6cm	11.6kg	2000/04/08
	適応外使用	検査のための鎮静		検査時の鎮静						女	2歳 7ヶ月	
	用法・容量:Ct撮影時静注									安全性:特になし	有効性:有効	
	総合コメント:											
389	公立こどもL	脳外科	脳外科	外来	2002/11/20 ~ 2002/11/20	(1日間) 投与終了	注射	注射	2.00mg	93.3cm	13.0kg	1999/11/26
	適応外使用	検査のための鎮静		検査時の鎮静						男	2歳 11ヶ月	
	用法・容量:1.5+0.5mg→									安全性:	有効性:	
	総合コメント:											
390	公立こどもL	小児科		入院	2002/11/08 ~ 2002/11/08	(1日間) 投与終了	注射	注射	3.00mg	88.6cm	10.2kg	1999/10/28
	適応外使用	検査のための鎮静		検査時の鎮静						女	3歳 0ヶ月	
	用法・容量:1mg+1mg+1mg 計3mg									安全性:特になし	有効性:やや有効	
	総合コメント:結局眠らざインソール12.5mgをivし鎮静を得た											
391	公立こどもL	脳外科	脳外科	外来	2002/11/14 ~ 2002/11/14	(1日間) 投与終了	注射	注射	2.20mg	93.5cm	12.2kg	1999/06/18
	適応外使用	検査のための鎮静		検査時の鎮静						男	3歳 4ヶ月	
	用法・容量:1+1.2mg									安全性:	有効性:	
	総合コメント:											
392	公立こどもL	脳外科	脳外科	外来	2002/11/19 ~ 2002/11/19	(1日間) 投与終了	注射	注射				1998/07/31
	適応外使用	検査のための鎮静		検査時の鎮静						男	4歳 3ヶ月	
	用法・容量:									安全性:	有効性:	
	総合コメント:											
393	公立こどもL	脳外科	脳外科	外来	2002/11/11 ~ 2002/11/11	(1日間) 投与終了	注射	注射	1.30mg	107.6cm	17.6kg	1997/09/13
	適応外使用	検査のための鎮静		検査時の鎮静						男	5歳 1ヶ月	
	用法・容量:									安全性:	有効性:	
	総合コメント:											
394	公立こどもL	麻酔科		入院	2002/11/08 ~ 2002/11/08	(1日間) 投与終了	注射	外用	5.00mg	107.0cm	19.0kg	1997/03/23
	適応外使用	鎮静		麻酔前投薬の注腸						男	5歳 7ヶ月	
	用法・容量:注腸									安全性:特になし	有効性:有効	
	総合コメント:良好な鎮静が得られた。											
395	公立こどもL	脳外科	脳外科	外来	2002/11/19 ~ 2002/11/19	(1日間) 投与終了	注射	注射	1.80mg	99.5cm	18.2kg	1997/04/10
	適応外使用	検査のための鎮静		検査時の鎮静						女	5歳 7ヶ月	
	用法・容量:									安全性:	有効性:	
	総合コメント:											
396	公立こどもL	脳外科	脳外科	入院	～	投与終了	注射	注射		70.6cm	7.6kg	2002/01/17
	適応外使用	検査のための鎮静		検査時の鎮静等						男	5歳 10ヶ月	
	用法・容量:									安全性:	有効性:	
	総合コメント:											

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
対象疾患			適応外使用分類		対象疾患手入力						年齢
397	公立こどもL	麻酔科		入院 2002/11/27 ~ 2002/11/27	(1日間) 投与終了	注射	外用	4.00mg	105.6cm	16.0kg	1997/12/23
	適応外使用		鎮静		麻酔前投薬の注腸						女 5歳 11ヶ月
	用法・容量 : 生食3mlとともに注腸										
	総合コメント :						安全性 : 特になし				有効性 : やや有効
398	公立こどもL	麻酔科		入院 2002/11/19 ~ 2002/11/19	(1日間) 投与終了	注射	外用	5.00mg	22.0kg		1996/06/21
	適応外使用		鎮静		麻酔前投薬の注腸						男 6歳 4ヶ月
	用法・容量 : 注腸										
	総合コメント :						安全性 : 特になし				有効性 : 有効
399	公立こどもL	麻酔科		入院 2002/11/25 ~ 2002/11/25	(1日間) 投与終了	注射	注射	1.50mg	26.0kg		1996/06/10
	適応外使用		手術後の鎮静		術後の譫妄に対する鎮静						男 6歳 5ヶ月
	用法・容量 : 1mgivの後0.5mgivを追加										
	総合コメント :						安全性 : 特になし				有効性 : 著効
400	公立こどもL	麻酔科		入院 2002/11/06 ~ 2002/11/06	(1日間) 投与終了	注射	注射	2.00mg	124.0cm	28.2kg	1996/06/05
	適応外使用		検査のための鎮静		検査時の鎮静						女 6歳 5ヶ月
	用法・容量 : CT撮影時静注										
	総合コメント :						安全性 : 特になし				有効性 : 著効
401	公立こどもL	麻酔科		入院 ~		注射	注射		19.8kg		1996/03/09
	適応外使用		抗けいれん		抗けいれん						女 6歳 8ヶ月
	用法・容量 : 麻酔中2.8mg持続投与。病棟では数日間持続投与していた。										
	総合コメント :						安全性 : 特になし				有効性 : 未判定
402	公立こどもL	脳外科	脳外科	外来 2002/11/18 ~ 2002/11/18	(1日間) 投与終了	注射	注射	1.50mg	113.5cm	17.0kg	1995/11/28
	適応外使用			検査のための鎮静	検査時の鎮静						女 6歳 11ヶ月
	用法・容量 :										
	総合コメント :						安全性 :				有効性 :
403	公立こどもL	脳外科	脳外科	外来 2002/11/12 ~ 2002/11/12	(1日間) 投与終了	注射	注射	1.50mg	105.0cm	13.9kg	1994/10/26
	適応外使用			検査のための鎮静	検査時の鎮静						男 8歳 0ヶ月
	用法・容量 :										
	総合コメント :						安全性 :				有効性 :
404	公立こどもL	脳外科	脳外科	外来 2002/11/25 ~ 2002/11/25	(1日間) 投与終了	注射	注射	1.50mg	135.0cm	23.8kg	1993/03/10
	適応外使用			検査のための鎮静	検査時の鎮静						男 9歳 8ヶ月
	用法・容量 :										
	総合コメント :						安全性 :				有効性 :
405	公立こどもL	脳外科	脳外科	外来 2002/11/21 ~ 2002/11/21	(1日間) 投与終了	注射	注射	3.00mg	154.4cm	40.0kg	1993/02/18
	適応外使用			検査のための鎮静	検査時の鎮静						男 9歳 9ヶ月
	用法・容量 :										
	総合コメント :						安全性 :				有効性 :
406	公立こどもL	脳外科	脳外科	入院 ~	(1日間) 投与終了	注射	注射		134.8cm	37.6kg	1991/10/06
	適応外使用			検査のための鎮静	検査時の鎮静						男 11歳 1ヶ月
	用法・容量 :										
	総合コメント :						安全性 :				有効性 :
407	公立こどもL	麻酔科		入院 2002/11/21 ~ 2002/11/21	(1日間) 投与終了	注射	注射	1.00mg	126.0cm	16.4kg	1990/08/18
	適応外使用			検査のための鎮静	検査時の鎮静						女 12歳 3ヶ月
	用法・容量 : CT撮影時静注										
	総合コメント :						安全性 : 特になし				有効性 : 有効
408	公立こどもL	脳外科	脳外科	入院 ~		注射	注射		150.3cm	33.4kg	1989/10/14
	適応外使用			検査のための鎮静	検査時の鎮静						男 13歳 0ヶ月
	用法・容量 :										
	総合コメント :						安全性 :				有効性 :
409	公立こどもL	脳外科	脳外科	外来 2002/11/18 ~ 2002/11/18	(1日間) 投与終了	注射	注射	4.00mg	145.3cm	36.5kg	1989/02/22
	適応外使用			検査のための鎮静	検査時の鎮静						女 13歳 8ヶ月
	用法・容量 :										
	総合コメント :						安全性 :				有効性 :
410	公立こどもL	脳外科	脳外科	外来 2002/11/06 ~ 2002/11/06	(1日間) 投与終了	注射	注射	3.00mg	143.0cm	37.0kg	1988/10/18
	適応外使用			検査のための鎮静	検査時の鎮静						女 14歳 0ヶ月
	用法・容量 :										
	総合コメント :						安全性 :				有効性 :
411	公立こどもL	麻酔科		入院 2002/11/08 ~ 2002/11/08	(1日間) 投与終了	注射	外用	3.00mg		9.2kg	2002/01/01
	麻酔前投薬										男 0歳 10ヶ月
	用法・容量 : 注腸										
	総合コメント :						安全性 : 特になし				有効性 : やや有効
412	公立こどもL	麻酔科		入院 2002/11/14 ~ 2002/11/14	(1日間) 投与終了	注射	外用	3.00mg	18.0kg		1999/10/19
	麻酔前投薬										男 3歳 0ヶ月
	用法・容量 : 生食3mlとともに注腸										
	総合コメント :						安全性 : 特になし				有効性 : 著効
413	公立こどもL	麻酔科		入院 2002/11/07 ~ 2002/11/07	(1日間) 投与終了	注射	外用	3.00mg	10.0kg		1991/11/08
	麻酔前投薬										男 10歳 0ヶ月
	用法・容量 : 1mg/mlに希釈し3mlを注腸投与										
	総合コメント :						安全性 : 特になし				有効性 : 有効
414	公立こどもM	麻酔科		入院 2002/11/12 ~ 2002/11/12	(1日間) 投与終了	注射	外用	3.50mg	66.0cm	7.8kg	2002/01/12
	麻酔前投薬										男 0歳 10ヶ月
	用法・容量 : 注腸で投与 ケタラールと共に										
	総合コメント :						安全性 : 特になし				有効性 : 著効

	施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
	対象疾患				適応外使用分類	対象疾患手入力						年齢
415	公立こども 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/08 ~ 2002/11/08 (1日間)	投与終了	注射	外用	5.00mg	74.5cm	9.5kg	2001/10/23 1歳 1ヶ月
	用法・容量：注腸で投与	ケタラール										有効性： 著効
	総合コメント：											安全性： 特になし
416	公立こども 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/20 ~ 2002/11/20 (1日間)	投与終了	注射	外用	5.50mg	82.0cm	11.7kg	2001/05/15 1歳 6ヶ月
	用法・容量：注腸で投与	ケタラールと共に										有効性： 有効
	総合コメント：											安全性： 特になし
417	公立こども 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/07 ~ 2002/11/07 (1日間)	投与終了	注射	外用	6.00mg	87.0cm	12.6kg	2000/07/24 男 2歳 4ヶ月
	用法・容量：注腸で投与	ケタラールと共に										有効性： 著効
	総合コメント：											安全性： 特になし
418	公立こども 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/07 ~ 2002/11/07 (1日間)	投与終了	注射	外用	5.00mg	83.0cm	10.2kg	2000/05/22 女 2歳 6ヶ月
	用法・容量：注腸で投与	ケタラールと共に										有効性： 無効
	総合コメント：											安全性： 特になし
419	公立こども 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/06 ~ 2002/11/06 (1日間)	投与終了	注射	外用	6.50mg	88.5cm	12.9kg	2000/01/19 男 2歳 10ヶ月
	用法・容量：注腸で投与	ケタラールと共に										有効性： 著効
	総合コメント：											安全性： 特になし
420	公立こども 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/05 ~ 2002/11/05 (1日間)	投与終了	注射	外用	8.00mg	98.3cm	16.1kg	1999/11/08 男 3歳 0ヶ月
	用法・容量：注腸で投与	ケタラールと共に										有効性： 著効
	総合コメント：											安全性： 特になし
421	公立こども 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/05 ~ 2002/11/05 (1日間)	投与終了	注射	外用	7.00mg	94.0cm	14.0kg	1999/11/12 女 3歳 0ヶ月
	用法・容量：注腸で投与	ケタラールと共に										有効性： 著効
	総合コメント：											安全性： 特になし
422	公立こども 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/12 ~ 2002/11/12 (1日間)	投与終了	注射	外用	7.50mg	95.0cm	15.4kg	1999/09/17 男 3歳 2ヶ月
	用法・容量：注腸で投与											有効性： 有効
	総合コメント：											安全性： 特になし
423	公立こども 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/18 ~ 2002/11/18 (1日間)	投与終了	注射	外用	5.50mg	89.0cm	11.8kg	1999/07/24 男 3歳 4ヶ月
	用法・容量：注腸で投与	ケタラールと共に										有効性： 著効
	総合コメント：											安全性： 特になし
424	公立こども 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/15 ~ 2002/11/15 (1日間)	投与終了	注射	外用	8.00mg	95.6cm	15.3kg	1999/06/12 男 3歳 5ヶ月
	用法・容量：注腸で投与	ケタラールと共に										有効性： 有効
	総合コメント：											安全性： 特になし
425	公立こども 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/14 ~ 2002/11/14 (1日間)	投与終了	注射	外用	7.00mg	97.0cm	14.3kg	1999/03/06 男 3歳 8ヶ月
	用法・容量：注腸で投与	ケタラールと共に										有効性： 著効
	総合コメント：											安全性： 特になし
426	公立こども 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/11 ~ 2002/11/11 (1日間)	投与終了	注射	外用	6.50mg	99.5cm	14.8kg	1999/02/19 男 3歳 9ヶ月
	用法・容量：注腸で投与	ケタラールと共に										有効性： 有効
	総合コメント：											安全性： 特になし
427	公立こども 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/06 ~ 2002/11/06 (1日間)	投与終了	注射	外用	10.00mg	89.5cm	22.4kg	1999/02/09 女 3歳 9ヶ月
	用法・容量：注腸で投与	ケタラールと共に										有効性： 著効
	総合コメント：											安全性： 特になし
428	公立こども 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/13 ~ 2002/11/13 (1日間)	投与終了	注射	外用	6.00mg	104.6cm	14.3kg	1998/08/25 男 4歳 3ヶ月
	用法・容量：注腸で投与	ケタラールと共に										有効性： 有効
	総合コメント：											安全性： 特になし
429	公立こども 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/19 ~ 2002/11/19 (1日間)	投与終了	注射	外用	7.00mg	99.1cm	14.0kg	1997/12/22 男 4歳 11ヶ月
	用法・容量：注腸で投与	ケタラールと共に										有効性： 著効
	総合コメント：											安全性： 特になし
430	公立こども 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/01 ~ 2002/11/01 (1日間)	投与終了	注射	外用	8.50mg	107.0cm	17.4kg	1997/09/28 男 5歳 2ヶ月
	用法・容量：注腸で投与											有効性： 著効
	総合コメント：ケタラールと併用で											安全性： 特になし
431	公立こども 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/01 ~ 2002/11/01 (1日間)	投与終了	注射	外用	9.00mg	111.6cm	18.7kg	1997/03/11 男 5歳 8ヶ月
	用法・容量：注腸で投与											有効性： 著効
	総合コメント：											安全性： 特になし
432	公立こども 麻酔前投薬	麻酔科			入院 2002/11/01 ~ 2002/11/01 (1日間)	投与終了	注射	外用	6.00mg	98.4cm	16.6kg	1996/12/06 女 5歳 11ヶ月
	用法・容量：注腸で投与											有効性： 著効
	総合コメント：ケタラールと併用で											安全性： 特になし

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
対象疾患			適応外使用分類	対象疾患手入力							
433	公立こどもM	麻酔科		入院 2002/11/26 ~ 2002/11/26	(1日間) 投与終了	注射	外用	10.00mg	119.5cm	20.6kg	1996/11/21
麻酔前投薬 用法・容量：注腸で投与 ケタラールと共に 総合コメント：安全性：特になし 有効性： 著効											
434	公立こどもM	麻酔科		入院 2002/11/05 ~ 2002/11/05	(1日間) 投与終了	注射	外用	8.50mg	112.5cm	17.6kg	1996/10/17
麻酔前投薬 用法・容量：注腸で投与 ケタラールと共に 総合コメント：安全性：特になし 有効性： 著効											
435	公立こどもM	麻酔科		入院 2002/11/19 ~ 2002/11/19	(1日間) 投与終了	注射	外用	9.50mg	113.3cm	19.2kg	1996/06/10
麻酔前投薬 用法・容量：注腸で投与 ケタラールと共に 総合コメント：安全性：特になし 有効性： 有効											
436	公立こどもM	麻酔科		入院 2002/11/15 ~ 2002/11/15	(1日間) 投与終了	注射	外用	10.00mg	118.6cm	22.3kg	1995/11/17
麻酔前投薬 用法・容量：注腸で投与 ケタラールと共に 総合コメント：安全性：特になし 有効性： 著効											
437	公立こどもM	麻酔科		入院 2002/11/06 ~ 2002/11/06	(1日間) 投与終了	注射	外用	10.00mg	120.3cm	22.4kg	1995/06/05
麻酔前投薬 用法・容量：注腸で投与 ケタラールと共に 総合コメント：安全性：特になし 有効性： 著効											
438	公立こどもM	麻酔科		入院 2002/11/01 ~ 2002/11/01	(1日間)	注射	外用	10.00mg	124.0cm	21.0kg	1994/09/13
麻酔前投薬 用法・容量：注腸で投与 総合コメント：安全性：特になし 有効性： 著効											
439	公立こどもN	心臓血管外科		入院 2002/09/24 ~ 2002/09/30	(7日間) 投与終了	注射	注射	40.00mg	66.2cm	6.2kg	2002/06/08
集中治療室における人工呼吸の鎮静 用法・容量：心内修復手術後、持続点滴静注；9/25~9/30 ドルミカム20mg+5%ブドウ糖15mlを1日2回 1~3ml/h、頓用；静注 5mg/回 7.5mg/回 総合コメント：安全性：特になし 有効性： 有効											
440	公立こどもN	心臓血管外科		入院 2002/09/18 ~ 2002/09/19	(2日間) 投与終了	注射	注射	1.00mg	76.4cm	8.8kg	2001/06/18
集中治療室における人工呼吸の鎮静 用法・容量：頓用 1mg(9.18) 1mg(9.19) 総合コメント：安全性：特になし 有効性： 有効											
441	公立こどもN	心臓血管外科		入院 2002/09/11 ~ 2002/09/12	(2日間) 投与終了	注射	注射	1.00mg	85.0cm	10.4kg	2001/02/10
集中治療室における人工呼吸の鎮静 用法・容量：1回1mg静脈注射 9/11；4回 9/12；3回 総合コメント：安全性：特になし 有効性： 有効											
442	公立こどもN	心臓血管外科		入院 2002/09/19 ~ 2002/09/22	(4日間) 投与終了	注射	注射	20.00mg	73.5cm	7.6kg	2001/05/11
集中治療室における人工呼吸の鎮静 用法・容量：持続静注；9/19~9/22 ドルミカム20mg+5%ブドウ糖16mlを1日1回→頓用；9/20 1mg/回 9/21 1mg/回 総合コメント：安全性：特になし 有効性： 有効											
443	公立こどもN	心臓血管外科		入院 2002/09/25 ~ 2002/09/25	(1日間) 投与終了	注射	注射	8.00mg	99.0cm	15.0kg	1999/03/26
集中治療室における人工呼吸の鎮静 用法・容量：1回2mg 1日4回(15:00, 17:20, 17:50, 18:45) 総合コメント：安全性：特になし 有効性： 有効											
444	公立こどもN	心臓血管外科		入院 2002/09/12 ~ 2002/09/12	(1日間) 投与終了	注射	注射	40.00mg	97.0cm	14.0kg	1998/10/29
集中治療室における人工呼吸の鎮静 用法・容量：(ドルミカム20mg+5%ブドウ糖16ml)×2回→を2ml/h 総合コメント：安全性：特になし 有効性： 有効											
445	公立こどもN	心臓血管外科		入院 2002/09/10 ~ 2002/09/16	(7日間) 投与終了	注射	注射	40.00mg	68.3cm	6.9kg	2001/12/20
全身麻酔の導入および維持 用法・容量：持続；9/10マスキュラックス20mg+ドルミカム20mg+5%ブドウ糖16mlを1日2回、9/11~9/16ドルミカム20mg+5%ブドウ糖16mlを1日1回 頓用(不穏時) 総合コメント：安全性：特になし 有効性： 有効											
446	公立こどもN	新生児科		入院 2002/09/25 ~ 2002/09/26	(2日間) 投与終了	注射	注射	3.00mg	43.0cm	2.0kg	2002/09/24
適応外使用 用法・容量：ドルミカム5mg(1ml)+生食19mlを0.5ml/h フェノバール併用 総合コメント：安全性：特になし 有効性： 有効											
447	公立こどもN	新生児科		入院 2002/09/17 ~ 2002/09/17	(1日間) 投与終了	注射	注射	6.00mg	48.4cm	3.0kg	2002/09/17
適応外使用 用法・容量：ドルミカム10mg(2ml)+生食18mlを0.5ml/h 静脈注射 チトゾール併用→ 総合コメント：安全性： 有効性： 未判定											
448	公立こどもN	新生児科		入院 2002/09/02 ~ 2002/09/09	(8日間) 投与終了	注射	注射	1.80mg	35.0cm	1.2kg	2002/09/02
適応外使用 用法・容量：ドルミカム5mg(1ml)+生食19mlを0.3ml/h 総合コメント：安全性： 有効性： 未判定											
449	公立こどもN	外科		入院 2002/09/30 ~	(1日間) 投与終了	注射	注射	1.00mg	5.4kg		2002/07/31
適応外使用 用法・容量：頓用 1回1mg静脈注射 総合コメント：安全性：特になし 有効性： 有効											
450	公立こどもN	心臓血管外科		入院 2002/09/04 ~ 2002/09/05	(2日間) 投与終了	注射	注射	8.00mg	79.0cm	10.1kg	2001/08/07
適応外使用 用法・容量：頓用 静脈注射 2mg×2回/日(9月24日) 2mg×4回/日(9月25日) 総合コメント：安全性：特になし 有効性： 有効											

WEB調査 実績データ

ミタゾラム注

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
451	公立こどもN	心臓血管外科	適応外使用	入院 2002/09/07 ~ 2002/09/07	(1日間) 投与終了	注射	注射	1.00mg	76.0cm	8.5kg	2001/04/21
適応外使用 手術後の鎮静 対象疾患 手入力 ファロー四徴症根治術後、CT撮影前鎮静目的 用法・容量：頓用 1回1mg静脈注射 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効											
452	公立こどもN	眼科	適応外使用	入院 2002/09/24 ~ 2002/09/24	(1日間) 投与終了	注射	注射	2.00mg	93.8cm	15.5kg	1999/06/04
適応外使用 手術後の鎮静 対象疾患 麦粒腫切除術後の鎮静目的 用法・容量：1回2mg 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効											
453	公立こどもN	外科	適応外使用	入院 2002/09/09 ~ 2002/09/09	(1日間) 投与終了	注射	注射	2.00mg	21.1kg	1998/06/08	1998/06/08
適応外使用 手術後の鎮静 対象疾患 そけいリンパ腫切除後 用法・容量：頓用 1回2mg 静脈注射 術後のMRI前にエスクレラ座と同時に 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効											
454	公立こどもN	眼科	適応外使用	入院 1998/09/24 ~ 1998/09/24	(1日間) 投与終了	注射	注射	1.50mg	98.4cm	13.8kg	1998/09/19
適応外使用 手術後の鎮静 対象疾患 斜視術後の鎮静 用法・容量：頓用 1.5mg 静脈注射 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効											
455	公立こどもN	循環器科	適応外使用	入院 2002/09/03 ~ 2002/09/03	(1日間) 投与終了	注射	注射	8.00mg	101.0cm	14.8kg	1998/08/02
適応外使用 鎮静 対象疾患 心臓カテーテル検査後麻酔覚醒時鎮静目的 用法・容量：頓用 1回8mg静脈注射 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効											
456	公立こどもN	形成外科	適応外使用	入院 2002/09/17 ~ 2002/09/17	(1日間) 投与終了	注射	内用,注射	15.00mg	140.9cm	32.7kg	1993/05/31
適応外使用 鎮静 対象疾患 麻酔前投薬 用法・容量：ドルミカム15mg + 炭酸飲料20mlを終口 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効											
457	国立A	小児科	適応外使用	入院 2002/11/06 ~ 2002/11/06	(1日間) 投与終了	注射	注射	10.00mg	158.0cm	49.3kg	1988/03/25
適応外使用 鎮静 対象疾患 白血病マルク・ルンバルの鎮静 用法・容量：null 総合コメント：鎮静の目的。ECG,SpO2モニター使用null 安全性：特になし null 有効性：有効											
458	国立A	小児科	適応外使用	入院 2002/11/12 ~ 2002/11/12	(1日間) 投与終了	注射	注射	10.00mg	166.8cm	40.0kg	1987/10/21
適応外使用 鎮静 対象疾患 白血病マルク・ルンバルの鎮静 用法・容量：null 総合コメント：処置がやりやすい。ECG,SpO2モニター必要null 安全性：特になし null 有効性：有効											
459	国立B	小児科	適応外使用	入院 2002/11/21 ~ 2002/11/23	(3日間) 投与終了	注射	注射	16.80mg	11.0kg	2000/12/26	2000/12/26
適応外使用 抗けいれん 対象疾患 熱性けいれんの重積発作 用法・容量：生理食塩水で1mg/mlに希釈し、0.7mg/時間で点滴する。 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効											
460	国立B	小児科	適応外使用	入院 2002/11/26 ~ 2002/12/01	(6日間) 投与終了	注射	注射	40.00mg	17.0kg	1994/10/25	1994/10/25
適応外使用 てんかん 対象疾患 てんかん重積発作 用法・容量：生理食塩水で1mg/mlに希釈し、1.7ml/時間で点滴する。 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：著効											
461	国立C	小児科	適応外使用	入院 2002/11/23 ~ 2002/11/23	(1日間) 投与終了	注射	注射	.7kg	2002/11/16	2002/11/16	2002/11/16
適応外使用 鎮静 対象疾患 集中治療室における人工呼吸の鎮静 用法・容量：投与量は0.21mg/kg/hour 総合コメント：特になし 安全性：特になし 特にコメントなし 有効性：有効											
462	国立C	小児科	適応外使用	入院 2002/11/29 ~	継続中	注射	注射	1.8kg	2002/09/18	2002/09/18	2002/09/18
適応外使用 鎮静 対象疾患 集中治療室における人工呼吸の鎮静 用法・容量：投与量は0.444mg/kg/hour 総合コメント：特になし 安全性：特になし 特にコメントなし 有効性：有効											
463	国立C	小児科	適応外使用	入院 2002/11/24 ~ 2002/11/28	(5日間) 投与終了	注射	注射	1.4kg	2001/12/28	2001/12/28	2001/12/28
適応外使用 鎮静 対象疾患 集中治療室における人工呼吸の鎮静 用法・容量：投与量は0.11mg/kg/hour 総合コメント：とくにコメントなし 安全性：特になし 特にコメントなし 有効性：有効											
464	国立D	新生児科	適応外使用	入院 2002/11/17 ~ 2002/11/20	(4日間) 投与終了	注射	注射	40.00mg	2002/11/16	2002/11/16	2002/11/16
適応外使用 鎮静 対象疾患 集中治療室における人工呼吸の鎮静 用法・容量： 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効											
465	国立D	新生児科	適応外使用	入院 2002/11/01 ~ 2002/11/01	(1日間) 投与終了	注射	注射	40.00mg	46.0cm	4.0kg	2002/10/23
適応外使用 鎮静 対象疾患 集中治療室における人工呼吸の鎮静 用法・容量： 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効											
466	国立D	新生児科	適応外使用	入院 2002/11/01 ~ 2002/11/01	(1日間) 投与終了	注射	注射	40.00mg	39.0cm	1.4kg	2002/06/27
適応外使用 鎮静 対象疾患 集中治療室における人工呼吸の鎮静 用法・容量： 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効											
467	国立D	新生児科	適応外使用	入院 2002/11/29 ~ 2002/11/30	(2日間)	注射	注射	40.00mg	27.0cm	.5kg	2001/12/11
適応外使用 鎮静 対象疾患 集中治療室における人工呼吸の鎮静 用法・容量： 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効											
468	国立E	小児科	適応外使用	入院 2002/09/28 ~ 2002/10/07	(10日間) 投与終了	注射	注射	96.00mg	1.6kg	2002/09/27	2002/09/27
適応外使用 鎮静 対象疾患 鎮静目的 用法・容量：本来2~5µg/min/kgで投与すべきところを10倍量で投与した 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：無効											

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日	年齢
469	国立E	小児科	適応外使用	入院 2002/10/23 ~ 2002/10/27	(5日間) 投与終了	注射	注射	25.00mg	47.5cm	4.0kg	2002/10/20	0歳 2ヶ月
適応外使用 鎮静 低酸素性虚血性脳症 用法・容量：10/23 0.24mg/kg/hr→10/24 0.21mg/kg/hr→10/25 0.16mg/kg/hr→10/26 0.1mg/kg/hr→10/27 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：未判定												
470	国立E	小児科	適応外使用	入院 2002/08/06 ~ 2002/08/09	(4日間) 投与終了	注射	注射	6.00mg	75.0cm	10.3kg	2000/12/26	2歳 1ヶ月
適応外使用 検査のための鎮静 MRI検査等で鎮静目的 用法・容量： 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：著効												
471	大学B	小児科	適応外使用	入院 2002/11/02 ~ 2002/11/02	(1日間) 投与終了	注射	注射	4.50mg	70.2cm	9.2kg	2002/03/18	0歳 7ヶ月
適応外使用 抗けいれん 痙攣重積症 用法・容量： 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：無効												
472	大学C	小児科	適応外使用	入院 2002/11/20 ~ 2002/11/20	(1日間) 投与終了	注射	注射	2.50mg	72.4cm	9.2kg	2001/08/09	1歳 4ヶ月
適応外使用 検査のための鎮静 検査時の鎮静 用法・容量：トリクロロール使用禁止のため、MRI時の鎮静目的で使用 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効												
473	大学C	小児科	適応外使用	入院 2002/11/12 ~ 2002/11/12	(1日間) 投与終了	注射	注射	4.00mg	52.5cm	29.7kg	2000/07/01	2歳 5ヶ月
適応外使用 検査のための鎮静 検査時の鎮静 用法・容量：MRI時の鎮静目的に、トリクロロール無効時に使用 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効												
474	大学D		適応外使用	入院 2002/11/08 ~ 2002/11/08	(1日間) 投与終了	注射	注射	10.00mg	42.0cm	2.8kg	2002/08/05	0歳 4ヶ月
適応外使用 集中治療室における人工呼吸の鎮静 用法・容量： 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効												
475	大学D		適応外使用	入院 2002/11/25 ~ 2002/11/25	(1日間) 投与終了	注射	注射	20.00mg	70.0cm	7.4kg	2002/02/18	0歳 10ヶ月
適応外使用 全身麻酔の導入および維持 用法・容量： 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効												
476	大学D		適応外使用	入院 2002/11/27 ~ 2002/11/27	(1日間) 投与終了	注射	注射	10.00mg		9.1kg	2002/01/18	0歳 11ヶ月
適応外使用 全身麻酔の導入および維持 用法・容量： 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効												
477	大学D		適応外使用	入院 2002/11/22 ~ 2002/11/25	(4日間) 投与終了	注射	注射	10.00mg	55.6cm	3.6kg	2002/07/27	0歳 5ヶ月
適応外使用 麻酔前投薬 用法・容量： 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効												
478	大学E	小児科	適応外使用	入院 2002/11/17 ~ 2002/11/29	(5日間) 投与終了	注射	注射		52.0cm	3.8kg	2001/09/03	1歳 2ヶ月
適応外使用 集中治療室における人工呼吸の鎮静 用法・容量： 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：やや有効												
479	大学E	小児科	適応外使用	入院 2002/11/13 ~ 2002/11/21	(2日間) 投与終了	注射	注射	1.25mg	75.7cm	11.0kg	2001/05/25	1歳 6ヶ月
適応外使用 鎮静 骨髄穿刺・腰椎穿刺時の鎮静 用法・容量： 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：やや有効												
480	大学E	小児科	適応外使用	入院 2002/11/22 ~ 2002/11/22	(1日間) 投与終了	注射	注射	1.00mg	80.0cm	10.2kg	2000/11/07	2歳 0ヶ月
適応外使用 検査のための鎮静 MRIの鎮静 用法・容量： 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：やや有効												
481	大学E	小児科	適応外使用	入院 2002/11/15 ~ 2002/11/15	(1日間) 投与終了	注射	注射	1.25mg	89.0cm	11.5kg	2000/02/02	2歳 10ヶ月
適応外使用 鎮静 骨髄穿刺・腰椎穿刺時の鎮静 用法・容量： 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効												
482	大学E	小児科	適応外使用	外来 2002/11/19 ~ 2002/11/19	(1日間) 投与終了	注射	注射	1.25mg		15.0kg	1999/05/11	3歳 6ヶ月
適応外使用 鎮静 骨髄穿刺時の鎮静 用法・容量：頓用。 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効												
483	大学E	小児科	適応外使用	入院 2002/11/21 ~ 2002/11/21	(1日間) 投与終了	注射	注射	1.25mg	100.5cm	17.0kg	1998/07/27	4歳 4ヶ月
適応外使用 鎮静 骨髄穿刺・腰椎穿刺時の鎮静 用法・容量： 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：有効												
484	大学E	小児科	適応外使用	入院 2002/11/20 ~ 2002/11/20	(1日間) 投与終了	注射	注射	1.50mg	102.0cm	14.2kg	1998/05/28	4歳 6ヶ月
適応外使用 検査のための鎮静 MRIの鎮静 用法・容量：頓用。 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：やや有効												
485	大学E	小児科	適応外使用	入院 2002/11/06 ~ 2002/11/06	(1日間) 投与終了	注射	注射	1.25mg	103.5cm	16.0kg	1997/10/30	5歳 1ヶ月
適応外使用 鎮静 骨髄穿刺・腰椎穿刺時の鎮静 用法・容量： 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：やや有効												
486	大学E	小児科	適応外使用	入院 2002/11/01 ~ 2002/11/08	(2日間) 投与終了	注射	注射	1.50mg	105.5cm	16.8kg	1997/04/25	5歳 7ヶ月
適応外使用 鎮静 骨髄穿刺・腰椎穿刺時の鎮静 用法・容量： 総合コメント： 安全性：特になし 有効性：やや有効												

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
対象疾患			適応外使用分類		対象疾患手入力						年齢
487	大学E	小児科		入院 2002/11/11 ~ 2002/11/26	(2日間) 投与終了	注射	注射	1.75mg	117.3cm	22.0kg	1996/05/17
	適応外使用		鎮静		急性リンパ性白血病、骨髄穿刺・腰椎穿刺時の鎮静					男	6歳 6ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:				安全性: 特になし						有効性: やや有効
488	大学E	小児科		入院 2002/11/11 ~ 2002/11/11	(1日間) 投与終了	注射	注射		131.0cm	27.0kg	1994/05/13
	適応外使用		鎮静		中心静脈カテーテル挿入時の鎮静					男	8歳 6ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:				安全性: 特になし						有効性: 有効
489	大学E	小児科		外来 2002/11/05 ~ 2002/11/05	(1日間) 投与終了	注射	注射	7.50mg	151.1cm	61.8kg	1986/02/09
	適応外使用		処置前投薬		処置前投薬					男	16歳 9ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:				安全性: 特になし						有効性: 有効
490	大学F	小児科		入院 2002/11/22 ~ 2002/11/22	(1日間) 投与終了	注射	注射	10.00mg		3.2kg	2002/11/19
	集中治療室における人工呼吸の鎮静									女	0歳 0ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:				安全性:						有効性:
491	大学F	心臓血管外科		入院 2002/11/13 ~ 2002/11/15	(3日間) 投与終了	注射	注射	10.00mg			2002/10/09
	集中治療室における人工呼吸の鎮静									男	0歳 1ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:				安全性:						有効性:
492	大学F	小児科		入院 2002/11/02 ~ 2002/11/05	(3日間) 投与終了	注射	注射	10.00mg	41.0cm	1.9kg	2002/10/30
	集中治療室における人工呼吸の鎮静									男	0歳 1ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:				安全性:						有効性:
493	大学F	心臓血管外科		入院 ~	継続中	注射	注射		50.0cm	3.1kg	2002/09/09
	集中治療室における人工呼吸の鎮静									男	0歳 2ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:				安全性:						有効性:
494	大学F	外科 小児外科		入院 ~		注射	注射	10.00mg	56.0cm	4.7kg	2002/08/09
	集中治療室における人工呼吸の鎮静									女	0歳 4ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:				安全性:						有効性:
495	大学F	血液科 小児腫瘍科		入院 2002/11/20 ~ 2002/11/21	(2日間) 投与終了	注射	注射	100.00mg	102.5cm	17.5kg	1999/02/14
	集中治療室における人工呼吸の鎮静									男	3歳 9ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:				安全性:						有効性:
496	大学F	血液科 小児腫瘍科		入院 ~		注射	注射	30.00mg	70.3cm	7.3kg	2001/07/31
	全身麻酔の導入および維持									男	1歳 4ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:				安全性:						有効性:
497	大学F	小児科		入院 2002/11/22 ~ 2002/11/22	(1日間) 投与終了	注射	注射	10.00mg	50.8cm	3.2kg	2002/09/06
	適応外使用		手術後の鎮静		術後呼吸管理のための鎮静					男	0歳 3ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:				安全性:						有効性:
498	大学F	小児科		入院 2002/11/15 ~ 2002/11/15	(1日間) 投与終了	注射	注射	10.00mg	99.9cm	10.5kg	2001/10/23
	適応外使用		鎮静		HUS後脳障害に伴うけいれんの鎮静					女	1歳 1ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:				安全性:						有効性:
499	大学F	小児科		入院 ~		注射	注射	10.00mg	84.0cm	11.0kg	2000/07/13
	適応外使用		てんかん		非けいれん性てんかん重積状態					女	2歳 4ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:				安全性:						有効性:
500	大学F	外科 移植再建内視鏡外科		入院 2002/11/05 ~	投与終了	注射	注射	20.00mg	96.0cm	15.5kg	1999/09/30
	適応外使用		検査のための鎮静		肝生検時の鎮静					男	3歳 2ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:				安全性:						有効性:
501	大学F	小児科		入院 2002/11/18 ~ 2002/11/18	(1日間) 投与終了	注射	注射	10.00mg	100.0cm	14.5kg	1998/10/27
	適応外使用		検査のための鎮静		痛みを伴う検査時の鎮静					男	4歳 1ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:				安全性:						有効性:
502	大学F	小児科		入院 2002/11/22 ~ 2002/11/22	(1日間) 投与終了	注射	注射	10.00mg	110.0cm	19.0kg	1997/11/04
	適応外使用		検査のための鎮静		痛みを伴う検査時の鎮静					男	5歳 1ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:				安全性:						有効性:
503	大学F	小児科		入院 ~		注射	注射	140.00mg	91.0cm	13.0kg	1997/03/04
	適応外使用		鎮静		急性膝炎の鎮静					男	5歳 9ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:				安全性:						有効性:
504	大学F	小児科		入院 2002/11/21 ~ 2002/11/21	(1日間) 投与終了	注射	注射	10.00mg	120.0cm	27.2kg	1996/03/29
	適応外使用		検査のための鎮静		痛みを伴う検査時の鎮静					男	6歳 8ヶ月
	用法・容量:										
	総合コメント:				安全性:						有効性:



施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日	
対象疾患				適応外使用分類	対象疾患手入力						年齢	
505	大学F	血液科	小児腫瘍	入院	～	注射	注射	20.00mg	126.0cm	17.8kg	1991/05/04	
	適応外使用			鎮静	GVHD後の鎮静・除痛(持続投与)						女 11歳 7ヶ月	
	用法・容量:											
	総合コメント:					安全性:					有効性:	
506	大学F	小児科		入院	2002/11/06 ~ 2002/11/06 (1日間)	投与終了	注射	注射	10.00mg		1991/01/25	
	適応外使用			鎮静		腰椎穿刺時の鎮静					男 11歳 10ヶ月	
	用法・容量:											
	総合コメント:					安全性:					有効性:	
507	大学F	小児科		入院	～	(1日間) 投与終了	注射	注射	400.00mg		1987/02/13	
	適応外使用			てんかん		てんかん発作重積発作					女 15歳 9ヶ月	
	用法・容量:											
	総合コメント:					安全性:					有効性:	
508	大学F	呼吸器科	呼吸器外科	入院	2002/11/14 ~ 2002/11/14 (1日間)	投与終了	注射	注射	20.00mg	157.0cm	46.0kg	1987/03/17
	麻酔前投薬										男 15歳 8ヶ月	
	用法・容量:											
	総合コメント:					安全性:					有効性:	

## WEB調査 実績データ

## ワルファリンカリウム錠

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
対象疾患			適応外使用分類	対象疾患手入力						年齢	
1	公立こどもA	循環器科	外来	2002/03/14 ~	継続中	錠・カプセル	内用	2.70mg	146.0cm	31.3kg	1989/12/11
											男 12歳 11ヶ月
											安全性：特になし
											有効性：未判定
2	公立こどもA	腎臓科	外来	2002/03/14 ~	継続中	錠・カプセル	内用	2.00mg	121.5cm	22.0kg	1994/09/19
											女 8歳 2ヶ月
											安全性：特になし
											有効性：未判定
3	公立こどもA	腎臓科	外来	2002/09/07 ~	継続中	錠・カプセル	内用	2.50mg	142.9cm	43.9kg	1992/03/26
											女 10歳 8ヶ月
											安全性：特になし
											有効性：未判定
4	公立こどもA	腎臓科	入院	2002/11/11 ~	継続中	錠・カプセル	内用	2.00mg	138.8cm	31.1kg	1991/11/11
											女 11歳 0ヶ月
											安全性：特になし
											有効性：未判定
5	公立こどもA	腎臓科	外来	2002/08/16 ~	継続中	錠・カプセル	内用	1.50mg	138.5cm	27.8kg	1989/07/21
											女 13歳 4ヶ月
											安全性：特になし
											有効性：未判定
6	公立こどもA	腎臓科	外来	2002/08/16 ~	継続中	錠・カプセル	内用	1.50mg	158.2cm	55.3kg	1986/12/15
											女 15歳 11ヶ月
											安全性：特になし
											有効性：未判定
7	公立こどもB	循環器科	外来	2002/06/20 ~	継続中	散	内用	1.20mg	100.6cm	15.1kg	1999/05/22
											男 3歳 5ヶ月
											安全性：特になし
											有効性：有効
8	公立こどもB	循環器科	外来	1999/09/30 ~	継続中	錠・カプセル	内用	2.00mg	148.1cm	46.2kg	1989/01/24
											女 13歳 10ヶ月
											安全性：因果関係は不明だが有害事象あり
											有効性：有効
9	公立こどもB	循環器科	外来	1999/09/30 ~	継続中	錠・カプセル,散	内用	2.30mg	157.0cm	55.0kg	1987/01/16
											女 15歳 10ヶ月
											安全性：特になし
											有効性：有効
10	公立こどもB	循環器科	外来	2002/03/18 ~	継続中	散	内用	1.50mg	91.1cm	11.6kg	1999/12/15
											男 2歳 11ヶ月
											安全性：特になし
											有効性：有効
11	公立こどもB	循環器科	外来	1998/01/12 ~	継続中	散	内用	1.90mg	115.1cm	22.4kg	1996/07/01
											男 6歳 4ヶ月
											安全性：特になし
											有効性：有効
12	公立こどもB	循環器科	外来	2001/08/23 ~	継続中	散	内用	1.60mg	124.2cm	23.8kg	1996/05/12
											女 6歳 5ヶ月
											安全性：特になし
											有効性：有効
13	公立こどもB	循環器科	外来	1991/05/11 ~	継続中	錠・カプセル	内用	2.00mg	145.7cm	35.2kg	1990/01/30
											女 12歳 9ヶ月
											安全性：特になし
											有効性：有効
14	公立こどもC			2000/03/18 ~		錠・カプセル	内用				2000/03/18
											男 2歳 9ヶ月
											安全性：
											有効性：
15	公立こどもC			1999/12/16 ~		錠・カプセル	内用				1999/12/16
											男 3歳 0ヶ月
											安全性：
											有効性：
16	公立こどもC			1999/08/23 ~		錠・カプセル	内用				1999/08/23
											男 3歳 4ヶ月
											安全性：
											有効性：
17	公立こどもC			1999/03/19 ~		錠・カプセル	内用				1999/03/19
											男 3歳 9ヶ月
											安全性：
											有効性：
18	公立こどもC			1992/09/13 ~		錠・カプセル	内用				1992/09/13
											男 4歳 3ヶ月
											安全性：
											有効性：

	施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
	対象疾患				適応外使用分類	対象疾患手入力						年齢
19	公立こどもC 適応外使用 用法・容量： 総合コメント：				～	原発性肺高血圧症 原発性肺高血圧症	錠・カプセル	内用				1988/10/25 男 14歳 1ヶ月
							安全性：					有効性：
20	公立こどもC 適応外使用 用法・容量： 総合コメント：				～	原発性肺高血圧症 原発性肺高血圧症	錠・カプセル	内用				1985/09/16 女 17歳 3ヶ月
							安全性：					有効性：
21	公立こどもD 緩徐に進行する脳血栓症等の治療および予防 用法・容量：分1。 総合コメント：	心臓血管外科			外来 2002/10/01～	継続中	散	内用	0.60mg	52.0cm	3.5kg	2002/06/17 男 0歳 5ヶ月
							安全性：特になし					有効性：有効
22	公立こどもD 緩徐に進行する脳血栓症等の治療および予防 用法・容量： 総合コメント：	心臓血管外科			入院 2002/11/16～	継続中	散	内用	0.26mg		5.6kg	2002/01/06 男 0歳 10ヶ月
							安全性：特になし					有効性：有効
23	公立こどもD 緩徐に進行する脳血栓症等の治療および予防 用法・容量：分1。 総合コメント：	心臓血管外科			外来 2002/10/16～	継続中	散	内用	0.70mg	83.0cm	11.7kg	1999/10/29 男 3歳 1ヶ月
							安全性：特になし					有効性：有効
24	公立こどもD 緩徐に進行する脳血栓症等の治療および予防 用法・容量：分1。 総合コメント：	心臓血管外科			外来 2002/10/30～	継続中	散	内用	0.50mg	89.0cm	11.3kg	1999/10/15 女 3歳 1ヶ月
							安全性：特になし					有効性：有効
25	公立こどもD 緩徐に進行する脳血栓症等の治療および予防 用法・容量：分1。 総合コメント：	心臓血管外科			外来 2002/07/17～	継続中	散	内用	0.70mg		13.0kg	1999/01/23 女 3歳 10ヶ月
							安全性：特になし					有効性：有効
26	公立こどもD 緩徐に進行する脳血栓症等の治療および予防 用法・容量：分1。 総合コメント：	心臓血管外科			外来 2002/02/27～	継続中	散	内用	1.50mg	92.5cm	12.8kg	1998/10/12 男 4歳 1ヶ月
							安全性：特になし					有効性：有効
27	公立こどもD 緩徐に進行する脳血栓症等の治療および予防 用法・容量：分1。 総合コメント：	心臓血管外科			外来 2001/06/25～	継続中	散	内用	0.90mg	101.6cm	17.5kg	1997/11/26 男 5歳 0ヶ月
							安全性：特になし					有効性：有効
28	公立こどもD 血栓塞栓症 用法・容量：分1。 総合コメント：	心臓血管外科			外来 1999/05/31～	継続中	散	内用	0.90mg	101.2cm	16.7kg	1997/10/11 女 5歳 1ヶ月
							安全性：特になし					有効性：有効
29	公立こどもD 血栓塞栓症 用法・容量：分1。 総合コメント：	心臓血管外科			外来 1998/06/05～	継続中	散	内用	1.40mg	100.7cm	18.0kg	1995/08/09 女 7歳 3ヶ月
							安全性：特になし					有効性：有効
30	公立こどもE 静脈血栓症 用法・容量：SLEのためステロイド他5剤併用 総合コメント：抗リン脂質抗体症候群(実病名)→→最初の画面で実病名が入力できない！！	小児科	感染免疫科		外来 1999/07/21～2002/11/19 (1218日間)	継続中	錠・カプセル	内用	3.00mg	160.0cm	46.0kg	1984/09/14 女 18歳 2ヶ月
							安全性：特になし					有効性：有効
31	公立こどもE 適応外使用 用法・容量：1日1回 総合コメント：	小児科	循環器		外来 2002/06/28～2002/11/27 (153日間)	継続中	散	内用	0.90mg	89.0cm	13.0kg	1999/05/16 男 3歳 0ヶ月
					手術後の血栓予防	先天性大動脈縮窄 心室中隔欠損 人工弁血栓症	安全性：特になし 1日1回					有効性：有効
32	公立こどもE 適応外使用 用法・容量：1日1回 総合コメント：アスピリン併用	小児科	循環器		外来 2000/06/30～2002/11/07 (861日間)	継続中	散	内用	1.00mg	93.2cm	134.0kg	1991/01/01 女 5歳 11ヶ月
					単心室症	無脾症候群 単心室 肺動脈閉鎖	安全性：特になし					有効性：やや有効
33	公立こどもE 適応外使用 用法・容量： 総合コメント：冠動脈瘤	小児科	循環器		2002/05/28～2002/11/21 (178日間)	継続中	散	内用	2.20mg	120.5cm	23.0kg	1996/03/06 男 6歳 0ヶ月
					川崎病	MCLS	安全性：特になし					有効性：有効
34	公立こどもE 適応外使用 用法・容量：1日1回 総合コメント：	小児科	循環器		外来 1997/09/24～2002/11/25 (1889日間)	継続中	散	内用	1.80mg	112.4cm	19.2kg	1996/10/08 男 6歳 0ヶ月
					川崎病	MCLS	安全性：特になし 両冠動脈瘤→右動脈瘤内血栓					有効性：やや有効
35	公立こどもE 適応外使用 用法・容量：1日1回 総合コメント：強心剤併用	小児科	循環器		外来 1995/08/30～2002/11/13 (2633日間)	継続中	錠・カプセル,散	内用	1.90mg	126.0cm	23.8kg	1994/08/21 男 8歳 0ヶ月
					手術後の血栓予防	僧帽弁閉鎖不全 弁置換	安全性：特になし					有効性：有効
36	公立こどもE 適応外使用 用法・容量： 総合コメント：弁形成	循環器科			外来 1999/03/17～2002/11/07 (1332日間)	継続中	錠・カプセル	内用		163.9cm	62.2kg	1984/04/11 男 8歳 0ヶ月
					心室中隔欠損症	心室中隔欠損	安全性：特になし					有効性：著効

## WEB調査 実績データ

## ワルファリンカリウム錠

施設名	診療科	診療科詳細	区分	投与期間	投与状況	剤型	投与経路	投与量	身長	体重	生年月日
対象疾患			適応外使用分類		対象疾患手入力						年齢
37	公立こどもE	小児科 循環器	適応外使用	外来 1994/09/11 ~ 2002/11/25 (2998日間)	継続中	錠	内用	2.70mg	124.0cm	26.0kg	1993/10/05
			適応外使用	手術後の血栓予防	僧帽弁閉鎖不全 人工弁置換						女 9歳 0ヶ月
			用法・容量: 1日1回								
			総合コメント:			安全性:					有効性: 有効
38	公立こどもE	小児科 循環器	適応外使用	外来 1998/05/14 ~ 2002/11/20 (1652日間)	継続中	錠	内用	2.50mg	138.0cm	34.0kg	1993/11/07
			適応外使用	心室中隔欠損症	心室中隔欠損症						女 9歳 0ヶ月
			用法・容量: 1日1回								
			総合コメント: panaldin併用			安全性: 特になし					有効性: 有効
39	公立こどもE	小児科 腎臓	適応外使用	外来 2002/08/26 ~ 2002/11/11 (78日間)	継続中	錠・カプセル	内用	1.00mg	141.0cm	36.5kg	1992/08/21
			適応外使用	腎炎	慢性腎炎						女 10歳 4ヶ月
			用法・容量: 1日1回								
			総合コメント: ステロイド併用			安全性: 特になし					有効性: やや有効
40	公立こどもE	小児科 循環器	適応外使用	外来 1997/04/16 ~ 2002/11/06 (2031日間)	継続中	錠	内用	2.20mg	127.0cm	25.2kg	1990/03/21
			適応外使用	心内膜欠損症	心内膜症欠損症 大動脈縮窄症						女 12歳 9ヶ月
			用法・容量: 1日1回								
			総合コメント: 人工弁置換			安全性: 特になし					有効性: 有効
41	公立こどもE	小児科 循環器	適応外使用	外来 1998/05/11 ~ 2002/11/28 (1663日間)	継続中	錠・カプセル	内用	1.60mg	136.3cm	29.1kg	1990/09/25
			適応外使用	手術後の血栓予防	ファロー四徴 大動脈弁置換						女 13歳 0ヶ月
			用法・容量: 一日一回								
			総合コメント:			安全性: 特になし					有効性: 有効
42	公立こどもE	小児科 循環器	適応外使用	外来 2001/04/24 ~ 2002/11/05 (561日間)	継続中	錠・カプセル	内用	1.00mg	119.0cm	23.2kg	1989/01/06
			適応外使用	肺動脈形成不全	肺動脈形成不全						女 13歳 11ヶ月
			用法・容量: 1日1回→メチルジゴキシンと併用								
			総合コメント: 心房内血栓の予防			安全性: 特になし					有効性: 有効
43	公立こどもE	小児科 循環器	適応外使用	外来 1996/09/28 ~ 2002/11/11 (2236日間)	継続中	錠	内用	4.10mg	161.5cm	44.8kg	1987/02/25
			適応外使用	心室中隔欠損症	心室中隔欠損 大動脈弁置換						男 14歳 0ヶ月
			用法・容量: 1日1回								
			総合コメント:			安全性: 特になし					有効性: 有効
44	公立こどもE	小児科 腎臓科	適応外使用	外来 2002/06/06 ~ 2002/11/05 (153日間)	継続中	錠・カプセル	内用	1.00mg	166.0cm	56.2kg	1986/12/22
			適応外使用	腎炎	慢性腎炎 IgA腎症						男 15歳 11ヶ月
			用法・容量: 1日1回→ステロイド併用								
			総合コメント:			安全性: 特になし					有効性: 有効
45	公立こどもF	循環器科	適応外使用	外来 2002/11/21 ~ 2002/11/30 (10日間)	継続中	錠	内用	1.20mg	62.2cm	7.0kg	2002/06/27
			適応外使用	心筋梗塞症							女 0歳 5ヶ月
			用法・容量: 散剤に調整								
			総合コメント:			安全性:					有効性: 未判定
46	公立こどもF	心臓血管外科	適応外使用	入院 2002/11/06 ~ 2002/11/30 (25日間)	継続中	錠	内用	1.50mg	85.0cm	11.3kg	2000/07/12
			適応外使用	静脈血栓症							男 2歳 4ヶ月
			用法・容量: 散剤に調整								
			総合コメント:			安全性: 特になし					有効性: 有効
47	公立こどもF	循環器科	適応外使用	外来 2002/09/12 ~ 2002/11/30 (80日間)	継続中	錠	内用	1.00mg	90.0cm	11.0kg	2000/01/26
			適応外使用	静脈血栓症							女 2歳 10ヶ月
			用法・容量: 散剤に調整								
			総合コメント:			安全性:					有効性: 未判定
48	公立こどもF	循環器科	適応外使用	外来 1997/07/01 ~ 2002/11/30 (1979日間)	継続中	錠	内用	2.70mg	168.1cm	54.7kg	1988/06/06
			適応外使用	静脈血栓症							男 14歳 5ヶ月
			用法・容量: 散剤に調整								
			総合コメント:			安全性: 特になし					有効性: 有効
49	公立こどもF	心臓血管外科	適応外使用	入院 2002/11/05 ~ 2002/11/30 (26日間)	継続中	錠	内用	1.00mg	70.0cm	4.0kg	2001/12/07
			適応外使用	手術後の血栓予防	人工弁大動脈弁置換後						女 0歳 11ヶ月
			用法・容量: 散剤に調整								
			総合コメント:			安全性:					有効性: 著効
50	公立こどもF	循環器科	適応外使用	外来 1999/07/16 ~ 2002/11/30 (1234日間)	継続中	錠・カプセル	内用	5.00mg	136.7cm	37.5kg	1992/03/16
			適応外使用	手術後の血栓予防	人工弁置換術後(血栓予防)						男 10歳 8ヶ月
			用法・容量:								
			総合コメント:			安全性: 副作用あり: 概要を記載 鼻出血					有効性: 著効
51	公立こどもF	心臓血管外科	適応外使用	入院 ~	投与終了	錠	内用	0.60mg	70.0cm	6.5kg	2001/07/16
			適応外使用	肺塞栓症							女 1歳 4ヶ月
			用法・容量: 散剤に調整								
			総合コメント:			安全性: 特になし					有効性: 有効
52	公立こどもG	心臓血管外科	適応外使用	外来 2001/08/20 ~	継続中	錠	内用	2.30mg	82.2cm	11.0kg	2001/04/01
			適応外使用	血栓塞栓症							男 1歳 8ヶ月
			用法・容量: 1日1回朝食前								
			総合コメント:			安全性: 特になし					有効性: 未判定
53	公立こどもG	循環器科	適応外使用	入院 2001/09/18 ~	継続中	錠	内用	2.80mg	99.4cm	14.3kg	1998/08/25
			適応外使用	血栓塞栓症							男 4歳 3ヶ月
			用法・容量: 1回、朝食後								
			総合コメント:			安全性: 特になし					有効性: 未判定
54	公立こどもG	循環器科	適応外使用	外来 1998/11/25 ~	継続中	錠・カプセル, 散	内用	1.50mg	102.3cm	15.8kg	1998/01/29
			適応外使用	血栓塞栓症							女 4歳 10ヶ月
			用法・容量: 1回、朝食後								
			総合コメント:			安全性: 特になし					有効性: 未判定