

20030075(別冊4-5)

平成15年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）研究報告書

急性期入院医療試行診断群分類を活用した調査研究 (課題番号 H13-政策-034)

別冊 4 - 5
診断群分類の精緻化に関する研究
(MDC06-3)

平成16（2004）年4月

協力研究者 桑原 一彰
分担研究者 今中 雄一
主任研究者 松田 晋哉

平成 15 年度厚生科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）
急性期入院医療試行診断群分類を活用した調査研究
研究報告書

診断群分類の精緻化（定義テーブルの修正のために）

MDC6『門脈圧亢進症（食道、胃、消化管の静脈瘤を含む）（DPC6 術分類 060120）』

報告者

桑原 一彰	京都大学大学院医学研究科 医療経済学分野	博士課程（協力研究者）
今中 雄一	京都大学大学院医学研究科 医療経済学分野	教授（分担研究者）
松田 晋哉	産業医科大学公衆衛生学教室	教授（主任研究者）

特定機能病院で平成 15 年 4 月から順次導入された診断群分類（DPC）の問題点を整理し、より妥当な評価体制につなげていくことは急務である。今回、DPC6 術コード 060120『門脈圧亢進症（食道、胃、消化管の静脈瘤を含む）』を選択し、その分類の妥当性検証を、平成 14 年度 7 月から 10 月にかけて収集されたデータをもとに行った。各医療費関連指標において、年齢、性別などの患者因子や施設因子、併存症よりも、処置（特に中心静脈栄養、人工呼吸・透析など）に配慮（別途独立評価）を要することが判明した。医療の質に関する死亡リスク因子分析では、施設地域・母体に差はなかった。現行の診断群分類は、在院日数や一件支払い評価（包括範囲点数や総点数）で決定係数を若干上昇させた。

A. 研究背景と目的

平成 15 年度 4 月より特定機能病院において順次支払いに導入された診断群分類（DPC）は、臨床専門科別に組織された 21 のグループの意見をベースとして、資源投入量に影響をもたらすと示唆される臨床病名（ICD 対応）、その手術・処置（診療報酬点数上の K・J コード）、併存症併発症（ICD 対応）、それ以外の重症度から作成された。その『定義テーブル』は平成 14 年度 10 月以降、次々と改訂され、中央社会保険医療協議会の審議を経て、正式に平成 15 年 1 月に定義テーブル（β 版）として公表された。支払い評価作成には、

平成 14 年度 7 月から 10 月までの 4 ヶ月間で集積された特定機能病院 29 万件余りのデータから、医療保険対象患者でかつレセプト情報が整備された約 26 万件を抽出・活用された。そして前述『定義テーブル』にある、入院目的、診断、手術手技、副傷病名、重症度を組み合わせた分類で、集積症例 20 件以上、変動係数 1 以下ⁱの基準を満たした 575 傷病数、1860 分類が確定し、1 日あたりの包括支払い額が決定された。しかしこの分類の妥当性を更に向上させるためには、継続的な評価が不可欠である。すなわち疾患群として異質なものはないか、手術・処置などが臨床的観点か

らみると、在院日数や支払いなどにどのような問題があるのか、副傷病や年齢などの重症度において分類上配慮を要するものはないかなど、さまざまな観点から検証されるべき事項がある。今回、医療費関連指標として在院日数（以下 LOS）、診療報酬総点数(cALL)、包括範囲ⁱⁱⁱ一件点数(cDPC)、現行の『包括範囲一日点数(dDPC)』を目的変数として、前述の角度からいかなる問題点があるのか、平成14年度7月から10月まで特定機能病院で収集されたデータを活用し分析した。そしてそこで問題になった因子に関して、定義テーブルⁱⁱや樹形図^{iv}に反映させることで、より妥当な DPC 分類につなげることが大きな目的である。

研究目的：①定義テーブル上の疾患群や手術・処置、年齢の現状分析、②、医療費関連指標（LOS,cALL,cDPC,dDPC）を目的変数としてあげ、診断群分類上留意すべき説明因子を探り、定義テーブルに反映させ、より妥当なものにすること、③更に副傷病を同時に系統的整理し、かつ副傷病が上述医療費関連指標にいかなる問題をもっているのかを検討、④医療の質の評価として、退院時転帰（入院後24時間以内死亡を除く死亡退院）に影響をもつリスク因子（年齢なのか、疾患なのか、手術・処置なのか、地域や施設母体なのか）は何かの分析、である。

B.研究方法

対象

平成14年度7月から10月まで特定機能病院から収集した患者情報（臨床情報（様式1）、診療報酬点数情報（様式2他））の内、MDC 6『門脈圧亢進症（食道、胃、消化管の静脈瘤を含む）（DPC6 衍分類 060120）』の1014

件〔内入院後24時間以内死亡18件、退院時死亡患者52件〕である。ここで説明因子として分析したものは以下の通りである。

患者属性因子

① 年齢因子：

15歳未満、15歳以上65歳未満、65歳以上の3カテゴリー

② 性別

③ 施設地域：北海道(region1)、東北(region2)、関東、中部(region4)、近畿(region5)、中国(region6)、四国(region7)、九州(region8)

④ 施設母体：国立(inst1)、公立(inst2)、私立

⑤ 救急車搬送の有無(ambulcat)

臨床情報

⑥ 疾患群^v：ICD10 は食道静脈瘤の部位と病像を明示しているので、ここでは ICD がもつ臨床情報で以下のようにカテゴリー化した。

pv1：食道静脈瘤破裂

pv2：食道静脈瘤

pv3：胃静脈瘤

pv4：門脈血栓症

他、不明他群

⑦ 手術手技^{vi}：

在院中の手術手技情報はデータセット様式1から最大5項目採取しており、これらの情報から以下を収集した。

内視鏡下止血術、硬化療法、血管塞栓術、食道静脈瘤手術、脾臓摘出術、門脈体循環吻合術、手術なし他

更に重回帰分析のとき、

Opecat1：内視鏡下止血術

Opecat2：硬化療法

Opecat3：血管塞栓術

Opecat4：硬化療法+血管塞栓術

Opecat5：食道静脈瘤手術

を説明因子とした。

⑧処置

中心静脈栄養(ivhdum)

人工呼吸(ventidum)

人工透析(hddum)

リハビリ(rihadum)

以上の有無を分析した。

⑨入院時併存症 入院後併発症 (以下 CC^{vii}) :

Manitoba-Dartmouth Comorbidity Index の (以下MD指標) ^{viii}を用い、糖尿病(dcindm)

(合併症を有する糖尿病:dcinsdm^{ix}、有しないもの:dcinmdm^x)、痴呆(dcindem)^{xi}、慢性閉塞性肺疾患(dcincopd)^{xii}、末梢血管障害(dcinpvd)^{xiii}、慢性腎不全(dcincr)^{xiv}、心不全(dcinchf)^{xv}、自己免疫疾患(dcinctd)^{xvi}、肝障害(dcinld) (慢性肝障害:dcinmld^{xvii}、重症肝障害:dcinsld^{xviii})、悪性腫瘍(dcintum)^{xix}、転移性腫瘍(dcinnst)^{xx}、悪性新生物(dcinnma)^{xxi}、前立腺肥大(dcinbph)^{xxii}、入院後併発症として静脈血栓塞栓、肺梗塞(dccdvvt)^{xxiii}、手術続発症(dccccomp)^{xxiv}について、様式1の入院時併存症 (4つ併記) 入院後併発症 (3つ併記) から各々、該当 ICD10 コードを収集し、有無を検索した。

目的変数には、コストの代替変数として医療費関連指標 LOS, cALL, cDPC dDPC を選択した。また医療の質評価のために、退院時死亡確率 (入院 24 時間以内死亡例を除く) も目的変数とした。

解析方法：上記目的変数に影響すると思われる因子を抽出するために、各説明因子を強制投入し重回帰分析を行い、偏回帰係数や標準化係数 (図表C群の凡例の中で‘B’と表記) が大きくかつ統計的有意なものを検索した。

また施設因子 (施設地域、設立母体) の投入前後の重回帰分析^{xxv}も行い、決定係数の差を調べた。医療の質の評価については、退院時死亡 (入院 24 時間以内死亡患者を除く) に関するロジスチック回帰分析を行い、死亡確率に影響するリスク因子 (図表D群でオッズ比: 凡例・表の中で Exp(B) と表記) を分析した。

尚、前記分析の際の対照群は索引で示す。統計処理は SPSS for Win(Ver11.0)を用いた。統計学的有意差を 0.05 とした。

C.結果

年齢は 15 歳未満 110 件(10.8%)、15 歳以上 65 歳未満 490 件(48.3%)、65 歳以上 414 件(40.8%) で、ヒストグラムでは 2 峰性分布であった (図A群)。男性 600 件(59.2%)、女性 414 件(40.8%)、地域は北海道 20 件(2.0%)、東北 70 件(6.9%)、関東 384 件(37.9%)、中部 102 件(10.1%)、近畿 182 件(17.9%)、中国 53 件(5.2%)、四国 26 件(2.6%)、九州 177 件(17.9%) であった。施設母体は国立 422 件(41.6%)、公立 88 件(8.7%)、私立 504 件(57.7%) であった。救急車搬入は 153 件(15.1%)、入院後 24 時間以内死亡は 18 件(1.8%)、退院時死亡は 52 件(5.1%) であった。

部位病理の内訳は、食道静脈瘤破裂 179 件(17.7%)、食道静脈瘤 538 件(53.1%)、胃道静脈瘤 84 件(8.3%)、門脈血栓症 14 件(1.4%)、不明他は 199 件(19.6%) であった。入院時併存症では、合併症を有する糖尿病 25 件(2.5%)、合併症のない糖尿病 106 件(10.5%)、痴呆 1 件、慢性閉塞性肺疾患 6 件(0.6%)、末梢血管障害 5 件(0.5%)、慢性腎不全 10 件(1.0%)、心不全 1 件、自己

免疫疾患 3 件 (0.3%)、慢性肝障害 44 件 (4.3%)、重症肝障害 526 件 (51.9%)、悪性新生物 154 件(15.2%)、前立腺肥大 3 件 (0.3%)、入院後併発症の静脈血栓塞栓、肺梗塞は 2 件(0.2%)で、手術関連発症 1 件、DIC はなかった。

手術は、内視鏡下止血術 14 件(1.4%)、硬化療法 629 件(62.0%)、血管塞栓術 38 件(3.7%)、血管塞栓術+硬化療法 27 件(2.7%)、食道静脈瘤手術 18 件(1.8%)、脾臓摘出術 6 件(0.6%)、門脈体循環吻合術 4 件(0.4%)、手術なし他は 278 件(27.4%)であった。

中心静脈栄養 102 件 (10.1%)、人工呼吸 16 件 (1.6%)、人工透析 12 件 (1.2%)、リハビリは 6 件 (0.6%) であった。

医療費関連指標である LOS, cALL, cDPC に関して各説明因子毎の箱ひげ図を見ると、年齢は 15 歳未満の中央値が低かった。性別ではなく、部位病理では門脈血栓症の中央値が低かった。施設地域で中央値・ばらつきは関東が若干低く、公立では高い。入院時併存症についてみると、糖尿病、肝障害、それ以外の併存症合体群では合併症をする有病者の中央値が大きかった。手術に関しては、開腹非必要手術、必要手術とも侵襲度が高い手術ほど中央値とも高くなかった。補助療法は中心静脈栄養施行で高く、逆に人工透析施行では低かった。

一方 dDPC についてみると、救急車搬送、中心静脈栄養、人工呼吸、透析などの処置以外では、患者基本属性、各種病態、併存症に差はみられなかった（図B群）。

各目的変数の度数分布表は右に裾をひく分布であった。LOS,cALL,cDPC では右に裾をひく 1 峰性の分布、dDPC は対称な 1 峰性の分布であった（図 A 群）。

LOS, cALL, cDPC のそれぞれを目的変数とした重回帰分析では、決定係数は各々 0.195(施設因子投入後 0.245), 0.271(0.313), 0.238(0.286) であった。dDPC では決定係数は 0.237(0.246) であった。説明因子のうち、特に標準化係数が大きくかつ有意確率が 0.05 以下のものを順にみると、LOS (施設因子投入による分析) では硬化療法+血管塞栓術(標準化係数 0.172)、硬化療法 (0.169)、血管塞栓術(0.130) であった。cALL では中心静脈栄養(標準化係数 0.220)、硬化療法+血管塞栓術 (0.215)、血管塞栓術(0.189) であった。cDPC では中心静脈栄養(標準化係数 0.214)、人工呼吸(0.166)、硬化療法+血管塞栓術 (0.148) であった。dDPC では人工呼吸(標準化係数 0.205)、人工透析(0.193)、救急車搬送(0.188)、逆に手術の標準化係数が手術でマイナスであった（表 C 群）。

死亡退院のリスク因子では、オッズ比(odd ratio : 以下 OR)が内視鏡下止血術(OR=15.56 倍、95% 信頼区間 : 2.74-88.31)、中心静脈栄養(OR=10.93 倍、95% 信頼区間:5.04-23.71)、人工呼吸(OR=5.36 倍、95 % 信頼区間 : 1.23-23.26)で、施設地域、母体に差はなかった (Hosmer-Lemeshow の適合度検定、有意確率 : 0.928)。

D. 考察

診断群分類 (手術、処置、副傷病名、重症度) の臨床的妥当性を LOS,cALL,cDPC,dDPC から分析し、分類を精緻化していくことは急務の課題である。これにより、平成 14 年度の定義テーブルとデータを元に各施設への支払いが決定されているプロセスに正当性を与え、更にはより妥当な評価見直しを行うことが可能になる。DPC の精緻化に際して、本来

は LOS,cALL,cDPC,dDPC より、米国の RBRVS のように時間、物量、心理的負荷などの、より妥当な医療費関連指標を目的変数とし多軸的に分析すべきである。現在 DPC に対応した原価計算プロジェクトは開始されており、今後これを活用した精緻化作業が進んでいくことが期待される。現行の一日定額支払いのもとでは、各説明因子の決定係数は、一件当たり包括額など他の3つの医療費関連指標に比較し小さかった。しかし診療に関する施設間の標準化が進んでいない現状を考慮すると、日本の保険医療制度改正の出発点としては一日当たり包括評価が一番問題が生じにくいという、逆説的利点があるかもしれない。すなわち現支払い額は在院日数に強く依存するものであり、この在院日数は海外に比しても長いこともあり大きくばらついている。この在院日数のばらつきを収斂させてから、一件あたり定額支払いの可能性を議論することが望ましい。しかしどの評価指標にしろ、影響する因子を同定し、これらが妥当に評価されるべきであるのは急務である。

今回、特に『060120』門脈圧亢進症（食道、胃、消化管の静脈瘤を含む）の診断群分類において、中心静脈栄養・人工透析、などの処置は、患者属性や臨床情報（部位など）、すでに分類で考慮されている併存症・手術の因子に比較して、支払いに影響している。つまり処置もどれか一つでも出現した場合、『有無評

価』だけでいいかという問題を提起している（より正確にはこれら因子の交互作用を分析することも必要）。支払い評価の手順にもかかるが、症例数がある程度収集されているのなら、少なくともこれら処置が独自に評価されてしかるべきといえよう。一方、医療の質に関する死亡リスク因子分析では、内視鏡止血術、中心静脈栄養、人工呼吸が高いのは妥当であろう。施設地域・母体に差はなかった。

E.結論

DPC 分類の精緻化の試みを、MDC 6 『門脈圧亢進症（食道、胃、消化管の静脈瘤を含む）（DPC6 枝分類 060120）』を用いて行った。現行支払い制度(dDPC)は、cALL,cDPC に比較し、各因子の説明力が若干小さかったが、どの医療費関連指標においても、処置（中心静脈栄養、人工呼吸・透析など）が相対的に大きな影響を持つようである。

医療の質に関する死亡リスク因子分析では、施設地域・母体に差はなかった。

F.研究発表

平成 16 年 4 月現在未発表

G.知的所有権の取得状況

該当せず

ⁱ 階層化されていく分類で、最下層が症例数 20 以上、一日当たり包括範囲点数変動係数が 1 未満というルールで分類され、支払い点数が決定された

ⁱⁱ 入院基本料等加算、指導管理、リハビリテーション、精神科専門療法、手術・麻酔、放射線治療、心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査、診断穿刺・検体採取、1000 点以上の処置については、従来どおりの出来高評価である。それ以外の化学療法などの薬剤、画像検査、投薬などは包括範囲支払い評価となった

ⁱⁱⁱ 疾患群に対して行われる手術群、処置群、副傷病名群、重症度などを、学会（保険医療に詳しい専門医集団）から意見集約し、最大公約数として定義テーブルに表記している。このテーブルを基にして、症例数や変動係数に留意しながら樹形図や支払いが決定されることが望ましいが、データに基づいた臨床的妥当性の検証が更に行われることが望ましい。

^{iv} 臨床的概念を重視し、臨床病名とそれに対する手術、処置、更には副傷病や各重症度を階層的に樹形図として表記している

^v 部位病理を以下のように整理した。

食道静脈瘤破裂はI850、食道静脈瘤はI859、胃静脈瘤はI864、門脈血栓症はI810、不明他群K766,I982とした。

^{vi} 手術を以下のように手術の難度順に整理した。

内視鏡下止血術はK722、硬化療法はK533、血管塞栓術をK6121、食道静脈瘤手術をK532\$、脾臓摘出術をK711、門脈体循環吻合術をK621とした。複数手術の組み合わせを可能なかぎり抽出しようとしたが、最終的に説明因子として10例以上集積するようにまとめ、重回帰分析した。ここでは脾臓摘出術、門脈体循環吻合術を食道静脈瘤手術と合体して説明因子とした。

^{vii} C(Comorbidity),C(Complication)と称する。更に Complication を併発症（入院後発症した、手術・処置と直接因果関係のない疾患）と続発症（入院後行われた手術・処置に直接因果関係のあるもの）とに区別することがある。今回併発症は深部静脈血栓症や肺梗塞としている。また続発症は各MD C毎に、T81\$,T84 \$,T87\$から妥当なものを拾っている

^{viii} 今回副傷病として、MD指標を活用したのは、現行定義テーブルの副傷病が MDC 間 (D P C間ですら) 整合性がなく、未整理のままであり、これを整理する目的もかねて前述副傷病をリストアップし、これに前立腺肥大や深部静脈血栓、肺塞栓を追加した。肝障害のところにも妥当と思われる ICD10 コードをMD指標に追加している。更に慢性疾患疫学では、他の指標として Charlson Index,Tu index があるが、ICD10 コードで定義しているのはMD指標だけであるからである。悪性疾患の DPCにおいては、悪性腫瘍の MD 指標はカウントしなかった。

^{ix} ICD10 コードでは E102-8,E112-8,E122-8,E132-8,E142-8 とMD指標では定義している。

^x E100,E110,E120,E130,E140,E101,E111,E121,E131,E141,E109,E119,E129,E139,E149

^{xi} F00-F021,F03\$,G30\$-G311

^{xii} I260,I278-9,J41\$-47\$,J960,J961,J969

^{xiii} I70\$,I71\$,I72\$,I73,I771,R02

^{xiv} N18\$-N19\$,Z49\$,Z940,Z992

^{xv} I50\$

^{xvi} M05-M06,M08-M09,M32\$-M34\$,M35\$

^{xvii} K700,K701,K709,K710,K713-716,K718,K719,,K721,K729,K73\$,K748,K760-761,K768-769

^{xviii} I850,I859,K702-704,K711,K712,K717,K720,K740-746,K762-767

^{xix} C000-419,C450-768,C810-969,D890,Z854

^{xx} C770-80

^{xxi} 悪性腫瘍(dcintum)、転移性腫瘍(dcimnst)のいずれかが出現した場合をカウントした。


^{xxii} N40

^{xxiii} I260,I269,I80\$


^{xxiv} T81\$を手術関連続発症とした。創感染、出血、膿瘍形成などが該当する。

^{xxv} 対照は年齢では 15 歳以上 65 歳未満群、女性、地域では関東、私立とした。部位病理、手術などでは『不明他群』、『手術なし他群』を対照とした。他因子は無群を対照とした。入院時併存症は 10 例以下のものを合体した(dcincat)。説明因子が 10 症例以下の場合は、因子投入しなかった。


図A群




図B群(年齢)




図B群(性別)




図B群(施設地域)




図B群(施設母体)




図B群(救急車搬送)




図B群(門脈圧亢進症)




図B群(合併症のない糖尿病)




図B群(合併症のある糖尿病)




図B群(糖尿病)




図B群(呼吸器併存症)




図B群(血管障害)




図B群(腎不全)




図B群(膠原病)




図B群(慢性肝障害)




図B群(重症肝障害)




図B群(肝障害)




図B群(悪性新生物)




図B群(前立腺肥大)




図B群(併存症(糖尿病肝障害腫瘍除く))




図B群(静脈血栓肺梗塞)



図B群(手術)



図C群(dDPC分析)



図C群(dDPC分析)

