




図B群(心不全)




図B群(膠原病)




図B群(悪性新生物)




図B群(手術関連連続発症)




図B群(手術)




図B群(中心静脈)




図B群(人工呼吸)




図B群(人工透析)




図B群(リハビリ)




図B群(年齢)




図B群(救急車搬送)




図B群(肝硬変病態)




図B群(手術)




図B群(中心静脈)





図B群(人工呼吸)





図B群(人工透析)




図C群 (LOS分析)




図C群 (cALL分析)



図C群(cDPC分析)



図C群(dDPC分析)



図表D群(死亡リスク分析)


方程式中の変数

	B	標準誤差	Wald	自由度	有意確率	Exp(B)の95.0%信頼区間		
						下限	Exp(B)	上限
ステップ1								
AGE65	.378	.235	2.580	1	.108	.920	1.459	2.314
SEXDUM	.502	.241	4.328	1	.037	1.029	1.852	2.849
LC1	-.896	1.102	.661	1	.416	.047	.408	3.540
LC2	-1.021	.529	3.727	1	.054	.128	.360	1.016
AMBULC.	.544	.300	3.289	1	.070	.957	1.723	3.103
DCINMDM	-.386	.389	.987	1	.320	.317	.680	1.456
DCINSMD	.342	.605	.320	1	.572	.430	1.408	4.609
DCINCRF	-1.497	.988	2.294	1	.130	.032	.224	1.553
DCINCTD	1.341	.812	2.731	1	.098	.779	3.824	18.763
DCINMAL	.901	.258	12.212	1	.000	1.485	2.462	4.081
IVHDUM	2.631	.264	99.454	1	.000	8.283	13.892	23.300
VENTIDU	2.088	.650	10.305	1	.001	2.255	8.068	28.869
HDDUM	1.369	.692	3.911	1	.048	1.012	3.932	15.271
RHADUM	.310	.461	.453	1	.501	.552	1.384	3.368
OPECAT1	2.610	.940	7.705	1	.006	2.154	13.605	85.944
OPECAT2	1.153	.505	5.201	1	.023	1.176	3.166	8.525
OPECAT3	-.188	.851	.084	1	.772	.231	.828	2.966
OPECAT4	.243	.845	.083	1	.773	.244	1.276	6.680
OPECAT5	-2.509	1.373	3.341	1	.068	.006	.081	1.199
REGION1	-7.110	11.042	.415	1	.520	.000	.001	46728.4
REGION2	-2.045	.868	5.558	1	.018	.024	.129	.708
REGION4	.190	.334	.325	1	.569	.628	1.210	2.330
REGION5	.574	.316	3.293	1	.070	.955	1.775	3.299
REGION6	-2.009	.807	6.197	1	.013	.028	.134	.652
REGION7	.785	.643	1.417	1	.234	.610	2.149	7.574
REGION8	.237	.410	.332	1	.564	.567	1.267	2.831
INST1	-.046	.275	.027	1	.868	.557	.955	1.638
INST2	.056	.416	.018	1	.894	.468	1.057	2.390
定数	-3.221	.318	102.626	1	.000		.040	

※ステップ1: 投入された変数 AGE65, SEXDUM, LC1, LC2, AMBULCAT, DCINMDM, DCINS, DCINMAL, IVHDUM, VENTIDUM, HDDUM, RHADUM, OPECAT1, OPECAT2, OPECAT3, OPECAT4, OPECAT5, REGION1, REGION2, REGION4, REGION5, REGION6, REGION7, REGION8, INST1, INST2

死亡リスク分析

統計量



平成 15 年度厚生科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）

急性期入院医療試行診断群分類を活用した調査研究

研究報告書

診断群分類の精緻化（定義テーブルの修正のために）

MDC6『胆嚢水腫、胆嚢炎等（DPC6 桁分類 060335）』

報告者

桑原	一彰	京都大学大学院医学研究科	医療経済学分野	博士課程（協力研究者）
今中	雄一	京都大学大学院医学研究科	医療経済学分野	教授（分担研究者）
松田	晋哉	産業医科大学公衆衛生学教室		教授（主任研究者）

特定機能病院で平成 15 年 4 月から順次導入された診断群分類（DPC）の問題点を整理し、より妥当な評価体制につなげていくことは急務である。今回、DPC6 桁コード 060335『胆嚢水腫、胆嚢炎等』を選択し、その分類の妥当性検証を、平成 14 年度 7 月から 10 月にかけて収集されたデータをもとに行った。各医療費関連指標において、年齢、性別などの患者因子や施設因子、併存症よりも、胆嚢摘出手術を補助する各種手技（外瘻術やステント挿入術など）、処置（特に中心静脈栄養など）に配慮（別途独立評価）を要することが判明した。これら手技の別個の切り分け（現行手術欄から切り分けて、手術の組み合わせの考え方）が必要である。現行の診断群分類は、在院日数や一件支払い評価（包括範囲点数や総点数）で決定係数を上昇させた。

A. 研究背景と目的

平成 15 年度 4 月より特定機能病院において順次支払いに導入された診断群分類（DPC）は、臨床専門科別に組織された 21 のグループの意見をベースとして、資源投入量に影響をもたらすと示唆される臨床病名（ICD 対応）、その手術・処置（診療報酬点数上の K・J コード）、併存症併発症（ICD 対応）、それ以外の重症度から作成された。その『定義テーブル』は平成 14 年度 10 月以降、次々と改訂され、中央社会保険医療協議会の審議を経て、正式に平成 15 年 1 月に定義テーブル（β版）として公表された。支払い評価作成には、平成 14 年度 7 月から 10 月までの 4 ヶ月間で

集積された特定機能病院 29 万件余りのデータから、医療保険対象患者でかつレセプト情報が整備された約 26 万件を抽出・活用された。そして前述『定義テーブル』にある、入院目的、診断、手術手技、副傷病名、重症度を組み合わせた分類で、集積症例 20 件以上、変動係数 1 以下の基準を満たした 575 傷病数、1860 分類が確定し、1 日あたりの包括支払い額が決定された。しかしこの分類の妥当性を更に向上させるためには、継続的な評価が不可欠である。すなわち疾患群として異質なものはないか、手術・処置などが臨床的観点からみると、在院日数や支払いなどにどのような問題があるのか、副傷病や年齢などの重症

度において分類上配慮を要するものはないかなど、さまざまな観点から検証されるべき事項がある。今回、医療費関連指標として在院日数（以下 LOS）、診療報酬総点数(cALL)、包括範囲ⁱⁱⁱ一件点数(cDPC)、現行の『包括範囲一日点数(dDPC)』を目的変数として、前述の角度からいかなる問題点があるのか、平成14年度7月から10月まで特定機能病院で収集されたデータを活用し分析した。そしてそこで問題になった因子に関して、定義テーブル^{iv}や樹形図^vに反映させることで、より妥当な DPC 分類につなげることが大きな目的である。

研究目的：①定義テーブル上の疾患群や手術・処置、年齢の現状分析、②、医療費関連指標（LOS,cALL,cDPC,dDPC）を目的変数としてあげ、診断群分類上留意すべき説明因子を探り、定義テーブルに反映させ、より妥当なものにすること、③更に副傷病を同時に系統的整理し、かつ副傷病が上述医療費関連指標にいかなる問題をもっているのかを検討、④医療の質の評価として、退院時転帰（入院後24時間以内死亡を除く死亡退院）に影響をもつリスク因子（年齢なのか、疾患なのか、手術・処置なのか、地域や施設母体なのか）は何かの分析、である。

B.研究方法

対象

平成14年度7月から10月まで特定機能病院から収集した患者情報（臨床情報〈様式1〉、診療報酬点数情報〈様式2他〉）の内、MDC6『胆嚢水腫、胆嚢炎等（DPC6 桁分類060335）』の972件〔内入院後24時間以内死亡41件、退院時死亡患者2件〕である。ここで説明因子として分析したものは以下の

通りである。

なお、本 DPC の資源病名に、060335 の定義テーブルにないはずの ICD10 コード：D65(播種性血管内凝固症候群：DIC)が8例含まれており、これは除外した、964例の分析とした。

患者属性因子

① 年齢因子：

65歳未満、65歳以上の2カテゴリー

②性別

③施設地域：北海道(region1)、東北(region2)、関東、中部(region4)、近畿(region5)、中国(region6)、四国(region7)、九州(region8)

④施設母体：国立(inst1)、公立(inst2)、私立

⑤救急車搬送の有無(ambulcat)

臨床情報

⑥疾患群^v：ICD10 は胆嚢結石の病理を明示していないので、分析していない。

⑦手術手技^{vi}：

在院中の手術手技情報はデータセット様式1で最大5項目採取しており、これらの情報から以下を収集した。

外瘻術、胆道形成（ステント、拡張術など）、開腹下胆嚢摘出術、開腹下胆嚢摘出術（追加補助的手術処置）、腹腔鏡下胆嚢摘出術、腹腔鏡下胆嚢摘出術（追加補助的手術処置）、手術なし他

ここで、追加補助的手術処置は外瘻術または胆道形成（ステント、拡張術など）とした。

更に重回帰分析のとき、

ope0.01：外瘻術

ope0.1：胆道形成（ステント、拡張術など）

ope1：開腹下胆嚢摘出術

ope1.1：開腹下胆嚢摘出術（補助手術）

ope10：腹腔鏡下胆嚢摘出術

ope10.1：腹腔鏡下胆嚢摘出術（補助手術）を説明因子とし、『手術なし他』を対照とした。

⑧処置

中心静脈栄養(ivhdum)

人工呼吸(ventidum)

人工透析(hddum)

リハビリ(rihadum)

以上の有無を分析した。

⑨入院時併存症、入院後併発症（以下 CC^{vii}）：

Manitoba-Darhmouth Comorbidity Index の（以下MD指標）^{viii}を用い、糖尿病(dcindm)

（合併症を有する糖尿病:dcinsdm^{ix}、有しないもの:dcinmdm^x）、痴呆(dcindem)^{xi}、慢性閉塞性肺疾患(dcincopd)^{xii}、末梢血管障害(dcinpvd)^{xiii}、慢性腎不全(dcincrf)^{xiv}、心不全(dcinchf)^{xv}、自己免疫疾患(dcinctd)^{xvi}、肝障害(dcinld)（慢性肝障害:dcinmld^{xvii}、重症肝障害:dcinsld^{xviii}）、悪性腫瘍(dcintum)^{xix}、転移性腫瘍(dcinmst)^{xx}、悪性新生物(dcinmal)^{xxi}、前立腺肥大(dcinbph)^{xxii}、入院後併発症として静脈血栓塞栓、肺梗塞(dccdvt)^{xxiii}、手術続発症(dccccomp)^{xxiv}について、様式1の入院時併存症（4つ併記）入院後併発症（3つ併記）から各々、該当 ICD10 コードを収集し、有無を検索した。

目的変数には、コストの代替変数として医療費関連指標 LOS,cALL, cDPC dDPC を選択した。また医療の質評価のために、退院時死亡確率（入院 24 時間以内死亡例を除く）も目的変数とした。

解析方法：上記目的変数に影響すると思われる因子を抽出するために、各説明因子を強制投入し重回帰分析を行い、偏回帰係数や標準化係数（図表 C 群の凡例の中で‘B’と表記）

が大きくかつ統計的に有意なものを検索した。また施設因子（施設地域、設立母体）の投入前後の重回帰分析^{xxv}も行い、決定係数の差を調べた。医療の質の評価については、退院時死亡（入院 24 時間以内死亡患者を除く）に関してロジスティック回帰分析を行い、死亡確率に影響するリスク因子（図表 D 群でオッズ比：凡例・表の中で Exp(B)と表記）を分析した。

尚、前記分析の際の対照群は索引で示す。統計処理は SPSS for Win(Ver11.0)を用いた。統計学的有意差を 0.05 とした。

C.結果

年齢は 65 歳未満 574 件(59.5%)、65 歳以上 390 件 (40.5%) で、ヒストグラムではほぼ対称的な 1 峰性分布であった（図 A 群）。男性 532 件(55.3%)、女性 431 件 (44.7%)（欠損値 1 例）、地域は北海道 13 件(1.3%)、東北 59 件(6.1%)、関東 497 件(51.6%)、中部 144 件(14.9%)、近畿 130 件(13.5%)、中国 34 件 (3.5%)、四国 15 件 (1.6%)、九州 72 件 (7.5%) であった。施設母体は国立 243 件 (25.2%)、公立 84 件 (8.7%)、私立 637 件 (66.1%) であった。救急車搬入は 89 件 (9.2%)、入院後 24 時間以内死亡は 41 件 (4.3%)、退院時死亡は 2 件(0.2%)であった。入院時併存症では、合併症を有する糖尿病 13 件(1.3%)、合併症のない糖尿病 61 件(6.3%)、痴呆 2 件(0.2%)、慢性閉塞性肺疾患 20 件 (2.1%)、末梢血管障害 8 件 (0.8%)、慢性腎不全 12 件 (1.2%)、心不全 10 件(1.0%)、自己免疫疾患 10 件 (1.0%)、慢性肝障害 27 件(2.8%)、重症肝障害 18 件(1.9%)、悪性新生物 41 件(4.4%)、前立腺肥大 7 件(0.7%)、入院後併発症の静脈血栓塞栓、肺梗塞は 2 件で

あった。手術関連続発症 12 件(1.2%)であった。

手術は、外瘻術 25 件(2.6%)、胆道形成 13 件(1.3%)、開腹下胆嚢摘出術 112 件(11.6%)、開腹下胆嚢摘出術(補助手術) 47 件(4.9%)、腹腔鏡下胆嚢摘出術 424 件(44.0%)、腹腔鏡下胆嚢摘出術(補助手術) 42 件(4.4%)、手術なし他は 301 件(31.2%)であった。

中心静脈栄養 95 件(9.9%)、人工呼吸 37 件(3.8%)、人工透析 11 件(1.1%)、リハビリは 13 件(1.3%)であった。

医療費関連指標である LOS, cALL, cDPC に関して各説明因子毎の箱ひげ図を見ると、性別では差はなく、65 歳以上、救急車搬送では中央値が大きく、胆嚢病態では急性、慢性、不明の順で中央値が高かった。施設地域・母体で中国、中部の中央値・ばらつきが大きかった。入院時併存症についてみると、膠原病以外では、併存症を有ほうが中央値が高かった。手術に関しては、腹腔鏡手術ほど中央値が低かった。しかし追加処置(外瘻術他など)が施行された場合は中央値・ばらつきが大きかった。処置では中心静脈栄養、人工透析施行で高かった。

一方 dDPC についてみると、救急車搬送、人工透析以外では、患者基本属性、併存症、手術に差はみられなかった(図 B 群)。

各目的変数の度数分布表では、LOS, cALL, cDPC は右に裾をひく 1 峰性の分布、dDPC は対称な 1 峰性の分布であった(図 A 群)。

LOS, cALL, cDPC のそれぞれを目的変数とした重回帰分析では、決定係数は各々 0.397(施設因子投入後 0.414), 0.510(0.515), 0.459(0.465)であった。dDPC では決定係数は 0.144(0.188)であった。説明因子のうち、特に標準化係数が大きくかつ有意確率が

0.05 以下のものを順にみると、LOS(施設因子投入による分析)では中心静脈栄養(標準化係数 0.283)、開腹下胆嚢摘出術(補助手術)(0.239)、開腹下胆嚢摘出術(0.220)であった。cALL では開腹下胆嚢摘出術(標準化係数 0.368)、開腹下胆嚢摘出術(補助手術)(0.331)、中心静脈栄養(0.326)であった。cDPC では中心静脈栄養(標準化係数 0.344)、開腹下胆嚢摘出術(0.244)、開腹下胆嚢摘出術(補助手術)(0.195)であった。dDPC では救急車搬送(標準化係数 0.242)、人工透析(0.162)、中心静脈栄養(0.107)であった。手術の標準化係数がマイナスであった(表 C 群)。

退院時死亡が 2 例だったので、死亡リスク分析は行っていない。

D. 考察

診断群分類(手術、処置、副傷病名、重症度)の臨床的妥当性を LOS, cALL, cDPC, dDPC から分析し、分類を精緻化していくことは急務の課題である。これにより、平成 14 年度の定義テーブルとデータを元に各施設への支払いが決定されているプロセスに正当性を与え、更にはより妥当な評価見直しを行うことが可能になる。DPC の精緻化に際して、本来は LOS, cALL, cDPC, dDPC より、米国の RBRVS のように時間、物量、心理的負荷などの、より妥当な医療費関連指標を目的変数とし多軸的に分析すべきである。現在 DPC に対応した原価計算プロジェクトは開始されており、今後これを活用した精緻化作業が進んでいくことが期待される。現行の一日定額支払いのもとでは、各説明因子の決定係数は、一件当たり包括額など他の 3 つの医療費関連指標に比較し小さかった。しかし診療に関する施設間の標準化が進んでいない現状を考慮

すると、日本の保険医療制度改正の出発点としては一日当たり包括評価が一番問題が生じにくいという、逆説的利点があるかもしれない。すなわち現支払い額は在院日数に強く依存するものであり、この在院日数は海外に比しとても長いこともあり大きくばらついている。この在院日数のばらつきを収斂させてから、一件あたり定額支払いの可能性を議論することが望ましい。しかしどの評価指標にし、影響する因子を同定し、これらが妥当に評価されるべきであるのは急務である。今回、特に『060335』胆嚢水腫、胆嚢炎等の診断群分類において、中心静脈栄養は、患者属性や他の臨床情報、すでに分類で考慮されている併存症・手術の因子と比較して、支払いに影響している。つまり処置のどれか一つでも出現した場合、『有無評価』だけでいいかという問題を提起している（より正確にはこれら因子の交互作用を分析することも必要）。また外瘻術や内視鏡下ステント挿入術、拡張術などの胆嚢摘出手術を補助する手技もかなり症例数があるので、現行の定義テーブルのように組み合わせが考慮できないままでは、分類としての妥当性を大きく欠くことになり、整理つまり補助手術を独立させて別途評価対

象とすることが必要と思われる。評価の手順にもかかわるが、症例数がある程度収集されているのなら、少なくともこれら処置が独自に評価されてしかるべきといえよう。

E. 結論

DPC 分類の精緻化の試みを、MDC 6『胆嚢水腫、胆嚢炎等（DPC6 桁分類 060335）』を用いて行った。

現行支払い制度(dDPC)は cALL,cDPC に比較し、各因子の説明力が若干小さいようだが、どの医療費関連指標においても、補助手術や処置（中心静脈栄養など）が相対的に大きな影響を持つようである。症例数や変動係数が、支払い点数の決定過程の判断材料になりかつ集積数が多いなら、これら別個の切り分け（現行手術欄からの切り分けによる組み合わせの考え方）が必要である。

F. 研究発表

平成 16 年 4 月現在未発表

G. 知的所有権の取得状況

該当せず

i 階層化されていく分類で、最下層が症例数 20 以上、一日当たり包括範囲点数変動係数が 1 未満というルールで分類され、支払い点数が決定された

ii 入院基本料等加算、指導管理、リハビリテーション、精神科専門療法、手術・麻酔、放射線治療、心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査、診断穿刺・検体採取、1000 点以上の処置については、従来どおりの出来高評価である。それ以外の化学療法などの薬剤、画像検査、投薬などは包括範囲支払い評価となった

iii 疾患群に対して行われる手術群、処置群、副傷病名群、重症度などを、学会（保険医療に詳しい専門医集団）から意見集約し、最大公約数として定義テーブルに表記している。このテーブルを基にして、症例数や変動係数に留意しながら樹形図や支払いが決定されることが望ましいが、データに基づいた臨床的妥当性の検証が更に行われることが望ましい

iv 臨床的概念を重視し、臨床病名とそれに対する手術、処置、更には副傷病や各重症度を階層

的に樹形図として表記している

v 胆嚢炎、病態や部位の臨床的情報はICD10コード急性、慢性の区別が可能であり、以下のよ
うに整理した。

急性胆嚢炎はK800,K810,K829,K870、慢性胆嚢炎はK801,K821,K811,K818-9,K820-8,K835、
胆嚢不明他はD135,K824とした。

vi 手術を以下のように手術の難度順に整理した。

補助手術として外瘻術はK681,K682\$, 胆道形成はK685,K686,K687\$,K688とした。胆嚢摘出
手術として開腹下胆嚢摘出術はK672, K671\$, 腹腔鏡下胆嚢摘出術をK672-2,K671-2\$とした。
これら組み合わせで整理した。

vii C(Comorbidity),C(Complication)と称する。更に Complication を併発症(入院後発症した、
手術・処置と直接因果関係のない疾患)と続発症(入院後行われた手術・処置に直接因果関係
のあるもの)とに区別することがある。今回併発症は深部静脈血栓症や肺梗塞としている。ま
た続発症は各MD C毎に、T81\$,T84\$,T87\$から妥当なものを拾っている

viii 今回副傷病として、MD指標を活用したのは、現行定義テーブルの副傷病がMDC間(DP
C間ですら)整合性がなく、未整理のままであり、これを整理する目的もかねて前述副傷病を
リストアップし、これに前立腺肥大や深部静脈血栓、肺塞栓を追加した。肝障害のところにも
妥当と思われるICD10コードをMD指標に追加している。更に慢性疾患疫学では、他の指標
としてCharlson Index,Tu indexがあるが、ICD10コードで定義しているのはMD指標だけで
あるからである。悪性疾患のDPCにおいては、悪性腫瘍のMD指標はカウントしなかった。

ix ICD10コードではE102-8,E112-8,E122-8,E132-8,E142-8とMD指標では定義している。

x E100,E110,E120,E130,E140,E101,E111,E121,E131,E141,E109,E119,E129,E139,E149

xi F00-F021,F03\$,G30\$,G311

xii I260,I278-9,J41\$,47\$,J960,J961,J969

xiii I70\$,I71\$,I72\$,I73,I771,R02

xiv N18\$,N19\$,Z49\$,Z940,Z992

xv I50\$

xvi M05-M06,M08-M09,M32\$,M34\$,M35\$

xvii K700,K701,K709,K710,K713-716,K718,K719,,K721,K729,K73\$,K748,K760-761,K768-7
69

xviii I850,I859K702-704,K711,K712,K717,K720,K740-746,K762-767

xix C000-419,C450-768,C810-969,D890,Z854

xx C770-80

xxi 悪性腫瘍(dcintum)、転移性腫瘍(dcinmst)のいずれかが出現した場合をカウントした。


xxii N40

xxiii I260,I269,I80\$


xxiv T81\$を手術関連続発症とした。創感染、出血、膿瘍形成などが該当する。

xxv 対照は年齢では15歳以上65歳未満群、女性、地域では関東、私立とした。手術などでは『手
術なし他群』を対照とした。他因子は無群を対照とした。説明因子が10症例以下の場合は、
因子投入しなかった。


図A群




図B群(年齢)




図B群(性別)



図B群(施設地域)



図B群(施設母体)



図B群(救急車搬送)

