

て分析した。

肘関節手術では、肘遊離体除去、肘靭帯形成
肘関節形成に関して分析した。

膝肘手術をあわせた重回帰分析では、

opknel1：肘遊離体除去（肘靭帯縫合形成含む）

opknel 2：肘関節形成

opknel 3：膝肘同時手術（上記膝肘手術の組み合わせすべて）

opknel 4：膝遊離体除去

opknel 5：膝半月板切除縫合

opknel 6：膝靭帯縫合形成

opknel 7：膝関節形成

とし、『手術なし他』を対照とした。

また再建手術は別途

骨移植術(reconbon)

有茎遊離組織移植術(reconfsu)

遊離皮膚移植術(reconsum)

とし、無を対照とした。

⑧処置

中心静脈栄養(ivhdum)

人工呼吸(ventidum)

人工透析(hddum)

リハビリ(rihadum)

以上の有無を分析した。

⑨入院時併存症、入院後併発症（以下 CC^{vii}）：

Manitoba-Darthmouth Comorbidity Index の（以下MD指標）^{viii}を用い、糖尿病(dcindm)（合併症を有する糖尿病:dcinsdm^{ix}、有しないもの:dcinmdm^x）、痴呆(dcindem)^{xi}、慢性閉塞性肺疾患(dcincopd)^{xii}、末梢血管障害(dcinpvd)^{xiii}、慢性腎不全(dcincerf)^{xiv}、心不全(dcinchf)^{xv}、自己免疫疾患(dcinctd)^{xvi}、肝障害(dcinld)（慢性肝障害:dcinml^{xvii}、重症肝障害:dcinsld^{xviii}）、悪性新生物(dcinmal)（原

発性:dcintum^{xix}、転移性:dcinmst^{xx}）、前立腺肥大(dcinqph)^{xxi}、入院後併発症として静脈血栓塞栓、肺梗塞(dcqdvt)^{xxii}、手術続発症(dcqcomp)^{xxiii}について、様式1の入院時併存症（4つ併記）入院後併発症（3つ併記）から各々、該当 ICD10 コードを収集し、有無を検索した。

目的変数には、コストの代替変数として医療費関連指標 LOS, cALL, cDPC dDPC を選択した。また医療の質評価のために、退院時死亡確率（入院 24 時間以内死亡例を除く）も目的変数とした。

解析方法：上記目的変数に影響すると思われる因子を抽出するために、各説明因子を強制投入し重回帰分析を行い、偏回帰係数や標準化係数（図表C群の凡例の中で‘B’と表記）が大きくかつ統計的有意なものを検索した。また施設因子（施設地域、設立母体）の投入前後の重回帰分析^{xxiv}も行い、決定係数の差を調べた。医療の質の評価については、退院時死亡（入院 24 時間以内死亡患者を除く）に関するロジスチック回帰分析を行い、死亡確率に影響するリスク因子（図表D群でオッズ比：凡例・表の中で Exp(B)と表記）を分析した。

尚、前記分析の際の対照群は索引で示す。統計処理は SPSS for Win(Ver11.0)を用いた。統計学的有意差を 0.05 とした。

C.結果

年齢は 15 歳未満 98 件(8.7%)、15 歳以上 65 歳未満 1000 件(88.5%)、65 歳以上 32 件(2.8%) で、ヒストグラムでは右に裾をひく 1 峰性分布であった（図A群）。男性 574 件

(50.8%)、女性 556 件 (49.2%)、地域は北海道 38 件(3.4%)、東北 114 件(10.1%)、関東 419 件(37.1%)、中部 118 件(10.4%)、近畿 175 件(15.5%)、中国 86 件(7.6%)、四国 27 件(2.4%)、九州 153 件 (13.5%) であった。施設母体は国立 548 件 (48.5%)、公立 52 件 (4.6%)、私立 530 件 (46.9%) であった。救急車搬入は 8 件 (7%)、入院後 24 時間以内死亡は 16 件 (1.4%)、退院時死亡は 0 件あった。

部位の内訳は半月板損傷 427 件(37.8%)、膝靭帯損傷 577 件(51.1%)、膝不安定症 20 件(1.8%)、肘損傷 83 件(7.3%)、膝不明 23 件(2.0%)であった。入院時併存症では、合併症を有する糖尿病 1 件、合併症のない糖尿病 2 件 (0.2%)、痴呆 0 件、慢性閉塞性肺疾患 7 件 (0.6%)、末梢血管障害 0 件 (、慢性腎不全 0 件、心不全 0 件、自己免疫疾患 1 件、慢性肝障害 6 件(0.5%)、重症肝障害 0 件、悪性新生物 1 件、前立腺肥大 0 件、入院後併発症の静脈血栓塞栓、肺梗塞は 0 件、手術関連統発症 3 件(0.3%)であった。

手術は、肘関節形成 11 件(1.0%)、肘靭帯縫合形成 4 件(0.4%)、肘遊離体除去 60 件(5.3%)、膝肘同時手術 36 件(3.2%)、膝半月板手術 325 件(28.8%)、膝靭帯縫合形成 327 件(28.9%)、膝関節形成 20 件(1.8%)、手術なし他 347 件(30.7%)であった。再建手術では骨移植術 46 件(4.1%)、有茎遊離組織移植術 0 件、遊離皮膚移植術 0 件であった。施行処置は中心静脈栄養 0 件、人工呼吸 26 件 (3.3%)、人工透析 1 件、リハビリは 626 件 (55.4%) であった。

医療費関連指標である LOS, cALL, cDPC に関して各説明因子毎の箱ひげ図を見ると、年齢、性別で差はなかった。施設地域では北海道、中国、公立の中央値が高かった。部位で

は膝靭帯損傷の中央値が高かった。入院時併存症を有する例で中央値が大きかった。膝、肘関節手術に関しては侵襲度の順に高かった。肘関節手術だけでみると、遊離体除去手術の中央値が低かった。再建手術の骨移植術施行例で中央値が高かった。処置ではリハビリ施行例で高かった。

一方 dDPC についてみると、手術、処置では肘遊離体除去例で中央値が高かった。他の因子では差がなかった (図B群)。

各目的変数の度数分布表で LOS,cALL, cDPC では右に裾をひく一峰性の分布、dDPC は対称な一峰性の分布であった (図 A 群)。

LOS, cALL, cDPC のそれぞれを目的変数とした重回帰分析では、決定係数は各々 0.327(施設因子投入後 0.366), 0.528(0.549), 0.338 (0.379) であった。dDPC では決定係数は 0.168(0.188) であった。説明因子のうち、特に標準化係数が大きくかつ有意確率が 0.05 以下のものを順にみると、LOS (施設因子投入による分析) ではリハビリ (標準化係数 0.278)、骨移植術 (0.177) であった。cALL では膝靭帯縫合形成(標準化係数 0.301)、リハビリ (0.263) であった。cDPC ではリハビリ (標準化係数 0.280)、膝靭帯損傷(0.180) であった。dDPC では肘遊離体除去(標準化係数 0.128)、逆にリハビリ(-0.241)、であった。(表 C群)。退院時死亡が少ないので、死亡リスク分析は行っていない。

D.考察

診断群分類 (手術、処置、副傷病名、重症度) の臨床的妥当性を LOS,cALL,cDPC,dDPC から分析し、分類を精緻化していくことは急

務の課題である。これにより、平成 14 年度の定義テーブルとデータを元に各施設への支払いが決定されているプロセスに正当性を与える、更にはより妥当な評価見直しを行うことが可能になる。DPC の精緻化に際して、本来は LOS,cALL,cDPC,dDPC より、米国の RBRVS のように時間、物量、心理的負荷などの、より妥当な医療費関連指標を目的変数とし多軸的に分析すべきである。現在 DPC に対応した原価計算プロジェクトは開始されており、今後これを活用した精緻化作業が進んでいくことが期待される。現行の一日定額支払いのもとでは、各説明因子の決定係数は、一件当たり包括額など他の 3 つの医療費関連指標に比較し小さかった。しかし診療に関する施設間の標準化が進んでいない現状を考慮すると、日本の保険医療制度改正の出発点としては一日当たり包括評価が一番問題が生じにくいという、逆説的利点があるかもしれない。すなわち現支払い額は在院日数に強く依存するものであり、この在院日数は海外に比しとても長いこともあり大きくばらついている。この在院日数のばらつきを収斂させてから、一件あたり定額支払いの可能性を議論することが望ましい。しかしどの評価指標にしろ、影響する因子を同定し、これらが妥当に評価されるべきであるのは急務である。

今回、特に 160620 『膝、肘の外傷（スポーツ傷害等を含む）』の診断群分類において、手術やリハビリなどの処置は、患者属性や臨床情報（骨折部位形態など）、併存症、その他の

因子に比較し支払いに影響している。つまり処置がどれか一つでも出現した場合、『有無評価』だけでいいかという問題を提起している（より正確にはこれら因子の交互作用を分析することも必要）。支払い評価の手順にもかかるが、症例数がある程度収集されているのなら、少なくともこれら処置が独自に評価されてしかるべきといえよう。また膝靭帯損傷は各種医療費関連指標に影響は与えていることに注目すべきである。膝関節外傷は肘損傷と区別すべきかもしれない。

E.結論

DPC 分類の精緻化の試みを、160620 『膝、肘の外傷（スポーツ傷害等を含む）』を用いて行った。

現行支払い制度(dDPC)は、LOS,cALL,cDPC に比較し、各因子の説明力が小さいようだが、どの医療費関連指標においても、処置（リハビリなど）が相対的に大きな影響を持つようである。膝靭帯損傷は各種医療費関連指標に影響は与えており、膝関節外傷は肘損傷と区別すべきかもしれない。

F.研究発表

平成 16 年 4 月現在未発表

G.知的所有権の取得状況

該当せず

ⁱ 階層化されていく分類で、最下層が症例数 20 以上、一日当たり包括範囲点数変動係数が 1 未満というルールで分類され、支払い点数が決定された

ⁱⁱ 入院基本料等加算、指導管理、リハビリテーション、精神科専門療法、手術・麻酔、放射線

治療、心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査、診断穿刺・検体採取、1000点以上の処置については、従来どおりの出来高評価である。それ以外の化学療法などの薬剤、画像検査、投薬などは包括範囲支払い評価となった

iii 疾患群に対して行われる手術群、処置群、副傷病名群、重症度などを、学会（保険医療に詳しい専門医集団）から意見集約し、最大公約数として定義テーブルに表記している。このテーブルを基にして、症例数や変動係数に留意しながら樹形図や支払いが決定されることが望ましいが、データに基づいた臨床的妥当性の検証が更に行われることが望ましい

iv 臨床的概念を重視し、臨床病名とそれに対する手術、処置、更には副傷病や各重症度を階層的に樹形図として表記している

v 部位病態を以下のように整理した。

半月板損傷M2300-9,M2310-9,M2320-9,M2330-9,M2340-9,M8386,S832-3、

膝靭帯損傷M2360-9,S830-1,S834-5,S837、膝不安定症M2350-9,M2380-9、

肘損傷M932,S532-3、膝不明M2390-9とした。

vi 手術を以下のように整理した。

膝関節手術に関して、膝遊離体除去K0481,K0651,K0661,K0671、膝半月板切除縫合K068,K069、膝靭帯縫合形成K0741,K0791,K079-1、膝関節形成K0801,K0731とした。肘関節手術に関して、肘遊離体除去K0482,K0652,K0662,K0672、肘靭帯縫合形成K0742,K0792、

肘関節形成K0802,K0732とした。複数手術の組み合わせを可能なかぎり抽出しようとした。膝肘同時手術は上記手術の組み合わせが出現した場合とした。侵襲度の高いこの順に吸収されるように整理した。尚、肘靭帯縫合形成4例は膝遊離体除去と合体した(opknell)。

他に再建手術として、骨移植術はK059\$、有茎遊離組織移植はK015\$,K016,K017,K019, K020,K022、遊離皮膚移植術はK012\$,K013\$,K014とした。

最終的に10例以上集積するようにまとめた。

vii C(Comorbidity),C(Complication)と称する。更に Complication を併発症（入院後発症した、手術・処置と直接因果関係のない疾患）と続発症（入院後行われた手術・処置に直接因果関係のあるもの）とに区別することがある。今回併発症は深部静脈血栓症や肺梗塞としている。また続発症は各MD C毎に、T81\$,T84 \$,T87\$から妥当なものを拾っている

viii 今回副傷病として、MD指標を活用したのは、現行定義テーブルの副傷病が MDC 間 (D P C間ですら) 整合性がなく、未整理のままであり、これを整理する目的もかねて前述副傷病をリストアップし、これに前立腺肥大や深部静脈血栓、肺塞栓を追加した。肝障害のところにも妥当と思われる ICD10 コードを MD 指標に追加している。更に慢性疾患疫学では、他の指標として Charlson Index,Tu index があるが、ICD10 コードで定義しているのはMD指標だけであるからである。悪性疾患の DPCにおいては、悪性腫瘍の MD 指標はカウントしなかった。

ix ICD10 コードでは E102-8,E112-8,E122-8,E132-8,E142-8 と MD指標では定義している。

x E100,E110,E120,E130,E140,E101,E111,E121,E131,E141,E109,E119,E129,E139,E149

xi F00-F021,F03\$,G30\$-G311

xii I260,I278-9,J41\$-47\$,J960,J961,J969

xiii I70\$,I71\$,I72\$,I73,I771,R02

xiv N18\$-N19\$,Z49\$,Z940,Z992

xv I50\$

xvi M05-M06,M08-M09,M32\$-M34\$,M35\$

xvii K700,K701,K709,K710,K713-716,K718,K719,,K721,K729,K73\$,K748,K760-761,K768-7

69

xxviii I850,I859K702-704,K711,K712,K717,K720,K740-746,K762-767

xxix C00\$-41\$,C45\$-C76\$,C81\$-C96\$,D890,Z85\$

xx C77\$-C80


xxi N40

xxii I260,I269,I80\$


xxiii T81\$,T84\$,T857-9,T870-6 を手術関連続発症とした。創感染、出血、膿瘍形成、整形外科的体内挿入物関連の続発症などが該当する。

xxiv 対照は年齢では 15 歳以上 65 歳未満群、女性、地域では関東、私立とした。外傷病態、手術などでは『膝不明群』、『手術なし他群』を対照とした。他因子は無群を対照とした。入院時併存症は合体した(dcincatf)。他説明因子が 10 症例以下の場合は、因子投入しなかった。


図A群




図B群(年齢)




図B群(性別)




図B群(施設地域)




図B群(施設母体)




図B群(救急車搬送)




図B群(膝肘外傷)




図B群(併存症)




図B群(膝肘手術)




図B群(膝手術)




図B群(肘手術)




図B群(再建手術(骨移植術))




図B群(人工呼吸)




図B群(リハビリ)




図B群(年齢)




図B群(膝肘外傷)




図B群(膝肘手術)




図B群(膝手術)




図B群(肘手術)




図B群(人工呼吸)




図B群(図B群(リハビリ))




図C群(LOS分析)




図C群(cALL分析)



図C群(cDPC分析)



図C群(dDPC分析)



平成 15 年度厚生科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）

急性期入院医療試行診断群分類を活用した調査研究

研究報告書

診断群分類の精緻化（定義テーブルの修正のために）

MDC16

『股関節大腿骨折（脱臼含む）（DPC6 枠分類 160800）』

報告者

桑原 一彰	京都大学大学院医学研究科 医療経済学分野 博士課程（協力研究者）
今中 雄一	京都大学大学院医学研究科 医療経済学分野 教授（分担研究者）
松田 晋哉	産業医科大学公衆衛生学教室 教授（主任研究者）

特定機能病院で平成 15 年 4 月から順次導入された診断群分類（DPC）の問題点を整理し、より妥当な評価体制につなげていくことは急務である。今回、DPC6 枠コード 160800『股関節大腿近位側骨折』を選択し、その分類の妥当性検証を、平成 14 年度 7 月から 10 月にかけて収集されたデータをもとに行った。各医療費関連指標において、年齢、性別などの患者因子や施設因子、併存症よりも、処置（特に中心静脈栄養、リハビリなど）に配慮（別途独立評価）を要することが判明した。現行の診断群分類は、在院日数や一件支払い評価（包括範囲点数や総点数）で決定係数を上昇させた。骨折部位や形態は各医療費関連指標に大きな影響は与えないかった。

A. 研究背景と目的

平成 15 年度 4 月より特定機能病院において順次支払いに導入された診断群分類（DPC）は、臨床専門科別に組織された 21 のグループの意見をベースとして、資源投入量に影響をもたらすと示唆される臨床病名（ICD 対応）、その手術・処置（診療報酬点数上の K・J コード）、併存症併発症（ICD 対応）、それ以外の重症度から作成された。その『定義テーブル』は平成 14 年度 10 月以降、次々と改訂され、中央社会保険医療協議会の審議を経て、正式に平成 15 年 1 月に定義テーブル（β 版）として公表された。支払い評価作成には、

平成 14 年度 7 月から 10 月までの 4 ヶ月間で集積された特定機能病院 29 万件余りのデータから、医療保険対象患者でかつレセプト情報が整備された約 26 万件を抽出・活用された。そして前述『定義テーブル』にある、入院目的、診断、手術手技、副傷病名、重症度を組み合わせた分類で、集積症例 20 件以上、変動係数 1 以下の基準を満たした 575 傷病数、1860 分類が確定し、1 日あたりの包括支払い額が決定された。しかしこの分類の妥当性を更に向上させるためには、継続的な評価が不可欠である。すなわち疾患群として異質なものはないか、手術・処置などが臨床的観点か

らみると、在院日数や支払いなどにどのような問題があるのか、副傷病や年齢などの重症度において分類上配慮を要するものはないかななど、さまざまな観点から検証されるべき事項がある。今回、医療費関連指標として在院日数（以下 LOS）、診療報酬総点数(cALL)、包括範囲ⁱⁱ一件点数(cDPC)、現行の『包括範囲一日点数(dDPC)』を目的変数として、前述の角度からいかなる問題点があるのか、平成14年度7月から10月まで特定機能病院で収集されたデータを活用し分析した。そしてそこで問題になった因子に関して、定義テーブルⁱⁱⁱや樹形図^{iv}に反映させることで、より妥当な DPC 分類につなげることが大きな目的である。

研究目的：①定義テーブル上の疾患群や手術・処置、年齢の現状分析、②、医療費関連指標（LOS,cALL,cDPC,dDPC）を目的変数としてあげ、診断群分類上留意すべき説明因子を探り、定義テーブルに反映させ、より妥当なものにすること、③更に副傷病を同時に系統的整理し、かつ副傷病が上述医療費関連指標にいかなる問題をもっているのかを検討、④医療の質の評価として、退院時転帰（入院後24時間以内死亡を除く死亡退院）に影響をもつリスク因子（年齢なのか、疾患なのか、手術・処置なのか、地域や施設母体なのか）は何かの分析、である。

B.研究方法

対象

平成14年度7月から10月まで特定機能病院から収集した患者情報（臨床情報〈様式1〉、診療報酬点数情報〈様式2他〉）の内、MDC 16『股関節大腿近位側骨折（160800）』の651件〔内入院後24時間以内死亡 32件、

退院時死亡患者 8件〕である。ここで説明因子として分析したものは以下の通りである。

患者属性因子

①年齢因子：15歳未満、15歳以上65歳未満、65歳以上の3カテゴリー

②性別

③施設地域

region1：北海道

region2：東北

region3：関東

region4：中部

region5：近畿

region6：中国

region7：四国

region8：九州

④施設母体

inst1：国立

inst2：公立

inst3：私立

⑤救急車搬送の有無(ambulcat)

臨床情報

⑥疾患群^v：診断群分類や ICD10 は骨折部位や骨折病態（開放閉鎖）を明示しているので、ここでは ICD がもつ臨床情報で以下のようにカテゴリー化した。

骨折部位に関して、大腿骨骨頸部、転子間骨折、転子下骨折、骨幹部骨折、股関節脱臼に関して分析した。

重回帰分析では、

femoral1：大腿骨骨頸部

femoral 2：転子間骨折

femoral 3：転子下骨折

femoral 4：骨幹部骨折

とし、股関節脱臼を対照とした。

⑦手術手技^{vi}：

在院中の手術手技情報は最大5項目採取して