



Figure 2. Photographs of dopaminergic B65 cells treated with 5MeO-DIPT and/or MDMA (final concentration: 0, 500 μ M, 1 mM) for 24 hours.




Figure 3. Changes in released LDH from dopaminergic B65 cells or CATH.a cells after exposure to 5MeO-DIPT (Lot 1) and MDMA for 24 hours. Each value mean \pm SEM of released LDH expressed as percentage of Tween-20-treated positive control. * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$ vs. each control group without MDMA. # $p < 0.05$, ## $p < 0.01$ vs. MDMA-dose-matched control group without 5MeO-DIPT.




Figure 4. Nuclear staining of dopaminergic B65 cells treated with 5MeO-DIPT and/or MDMA (final concentration: 0, 500 μ M, 1 mM) for 24 hours. Nuclei were visualized by incubation with Hoechst33342 dye.




Figure 5. Photographs of dopaminergic B65 cells treated with 5MeO-DIPT and/or METH (final concentration: 0, 500 μ M, 1 mM) for 24 hours.




Figure 6. Effects of cotreatment with 5MeO-DIPT (Lot 1) on METH-induced LDH release from dopaminergic B65 cells or CATH.a cells after 24-hour exposure. Each value mean \pm SEM of released LDH expressed as percentage of Tween-20-treated positive control. * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$ vs. each control group without METH. # $p < 0.05$, ## $p < 0.01$ vs. METH-dose-matched control group without 5MeO-DIPT.




Figure 7. Nuclear staining by Hoechst33342 dye in dopaminergic B65 cells treated with 5MeO-DIPT and/or METH (final concentration: 0, 500 μM , 1 mM) for 24 hours

MDMA および 5-MeO-DIPT 使用経験者に対する聞き取り調査

研究担当者： 和田 清（国立精神・神経センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 部長）

研究協力者： 松原 新（Rainbow Ring）

【研究要旨】

この数年の MDMA の押収量の激増・巷での乱用ぶり、脱法ドラッグの氾濫・乱用ぶりの報道にも関わらず、これらの薬物に関する各種基礎データはほとんどないのが実情である。そこで、MDMA および脱法ドラッグの研究・評価の際の基礎資料を提供する目的で、MDMA および 5-MeO-DIPT 使用経験者に対する使用時の体験に関する聞き取り調査を実施した。結果は表の通りであるが、症例例数が MDMA で 6 例、5-MeO-DIPT で 15 例と少ないため、あえて解釈・論評は避けた。

今日、これまでは入手できなかった物質の入手が可能になったり、これまで存在すらしなかった物質が登場したりしているが、それらの物質の臨床作用を把握するためには、本調査研究のような ethnographic な質的調査が不可欠である。本研究はその意味で、わが国初の調査研究であろう。今後、必要に応じて、本調査研究のような作業が必要になろう。

A. 研究目的

この数年、MDMA の押収量の激増・巷での乱用ぶり、脱法ドラッグの氾濫・乱用ぶりが報じられている。MDMA は麻薬及び向精神薬取締法による「麻薬」であり、その薬理作用および臨床データは海外からそれなりに入手することができる。しかし、その薬理作用の全てが判明しているわけではない。また、わが国における臨床データは皆無に近い。一方、脱法ドラッグは正規販売ルート上の「商品」とは異なり、構造式上、既に「麻薬」に指定された物質に近い物から、そもそも、その成分さえ明かではない物さえあるのが実情である。当然、その臨床効果は不明と言わざるを得ない。

そこで、本研究者は、MDMA および脱法ドラッグの研究・評価の際の基礎資料を提供する目的で、それらの使用に関する臨床データの収集を試みた。

ただし、脱法ドラッグには多種多様な物が存在するが、本研究ではインターネット上、「人気」を博していると思われた 5-MeO-DIPT に対象を絞った。

B. 方法

対象は MDMA および 5-MeO-DIPT の使用経験者である。それらの経験者をスノーボウル・サンプリン

グで募った。対象症者には資料1に示した研究の主旨を説明した上で、本聞き取り調査への同意を得た。その上で、MDMA については自由に話してもらい、また、5-MeO-DIPT については半構造化された質問紙にも基づいて聞き取りを実施した。なお、情報提供者には1,000円のクオカードを提供することによってお礼とした。

調査期間は2004年1月26日～3月18日である。

C. 結果

結果を表にまとめた。表にあるように、本調査研究は一種の ethnographic research であるため、あえて、数量化していない。

D. 考察および結論

本調査研究による症例数は MDMA 6 例、5-MeO-DIPT 15 例と限られている。その背景には、調査期間の短さもあるが、そもそも、MDMA は麻薬及び向精神薬取締法による「麻薬」であり、その使用は犯罪であること、また、現在のところ 5-MeO-DIPT は法規制されていないが、その使用者自身に違法ないしは違法すれすれという認識があることが挙げられる。したがって、その使用を公然と公表するに

ははばかられる体験談であることが、症例数が少ない最大の要因であると考えられる。

本調査研究による結果は表に示したとおりであるが、それらをどのように解釈・評価するかは難しい。

今日、これまでは入手できなかった物質の入手が可能になったり、これまで存在すらしなかった物質が登場したりしているが、それらの物質の臨床作用を把握するためには、本調査研究のような ethnographic な質的調査が不可欠である。

本研究はその意味で、わが国初の調査研究であろう。今後、必要に応じて、本調査研究のような作業が必要になろう。

調査への協力お願い

現在、以前にはなかった新しい薬物が巷に出回っております。それらのほとんどは、どのような薬理作用があるのか、科学的には明らかにされていないのが実情です。

私たちは、そのような薬物の薬理作用を動物を用いて研究しようと試みております。しかし、動物実験を行うためには、そもそも、人間がその薬物を使った場合、どのような気分になり、どのような身体的状態になるのかを把握する必要があります。それらを把握してこそ、動物実験で何を調べればいいのか分かるわけです。

そのため、現在、私たちは「5-MeO-DIPT (通称5メオ)」または「MDMA (エクスタシー)」の使用体験者から、体験談を集めております。これらの情報は、薬物の薬理作用を明らかにするためには不可欠なものです。

調査にあたっては、氏名、住所など、個人が特定できそうな項目はお聞きしません。また、提供して頂いた情報は研究目的以外には使用しません。

また、国立精神・神経センターとは国立高度専門医療センターの一つであり、取締機関ではありません。

どうぞ、主旨にご理解をいただき、ご協力いただければ幸いです。

実施責任者：国立精神・神経センター
精神保健研究所
薬物依存研究部長
和田清

MDMA に関する聞き取り結果

情報提供者 NO.	年齢	性別	内容
MDMA-1	20	男	<ul style="list-style-type: none"> ・噛み砕いて食べると「うまにがいに」感じ。 ・30～60分すると無性に「ショワショワ」して、じっとしていられなくなった。 ・その結果、人と話したり、人に触りたくなったりした。いわれのない「愛」がどこからか湧いてくる感じ。 ・ただし、自分の求める物がなかったりすると、ダメモードに入って、困った感じで死にたくなったりする。この世の悪事は自分のせいだ・・・みたい。 ・場所がクラブなので、踊る人が多い。 ・尋常ではない汗をかいて、水飲む人が多い。 ・歯をこすり合わせ続けたり、口の中を噛みしめたりする。 ・セックスしたいと思ったことはない。 ・最中は食欲はない。 ・3～5時間して、効果が切れてくると眠くない。朝まで遊んでたわけだし、効いている間は踊りまくっていたわけだから、疲れがどっと出ても無理はない。 ・寝て起きてからは、疲労感があり、だらだらしがち。 ・よく使っていた時期に眼科に行ったら、眼圧がかなり上がっていた。眼圧を下げる薬を飲んだら落ち着いた。MDMA を使うと、眼圧が上がり、失明することもあるという噂を聞いたことがある。
MDMA-2	31	男	<ul style="list-style-type: none"> ・クラブで経口で、錠剤を一個使用。 ・30分～1時間ぐらいで効いてきた。 ・まず音が違って聞こえてきた。モノラルだったのがステレオに、みたいな。クリアになるというか、音に包まれるというか、まさに体感する、という感じで。 ・体の方はちょっと震えがくるというか、知らずに筋肉に力が入っちゃってる感じ。奥歯を噛み締めてたりもした。あとで気が付くと顎の関節のところが筋肉痛のように痛くなっていた。稀に力が入らなくなって立っていられなくなったりもした。 ・すごく喉、というか口の中が渇く。常に水分を飲んでいたい気持ち。すごく汗もかかし。 ・飴とかガムとかも美味しく感じる。甘さに敏感になっているのかもしれない。飲み物もお茶みたいな渋いのは美味しく感じないから。食欲は湧かない。 ・効き目の最中は気持ちがラブラリーになるというか。すごく楽しいし、幸せな気分みたいなものが増幅する感じ。 ・踊ってるのが楽しいし、踊っている人を見ているのも楽しいし。きれいなメロディーをきれいに感じれるし、かっこいい曲はさらにかっこよく、みたいな。その場にいる人たちとのいわゆる一体感、みたいなものを感じる。知らない人と目が合ってもニコリできるというか。日頃ありえないようなポジティブな感じになる。 ・踊りも止まらなくなる。喋り出すとそれも止まらなくなったり。なんとなく、そわそわしてる感じ。落ち着きがなくなるみたいな。常に自分が動いて何かアウトプットしたくなる。 ・視覚のほうもちょっと敏感になるかな。そもそもがクラブでの経験なので、眩しすぎる！ってというような状況はないので。色とか鮮やかにみえる気はする。照明の微妙な色合いがきれいに感じたり。逆に普段なら真っ白く明るく照らされると眩しい！って思うのがきれい！って感じたりするほうが多いかも。 ・性欲はあまり感じない。ラブラリーな気持ちになっているので、手を握りあったり、ハグしたりキスしたりはすごくする。気持ちはそれで満足、というか、勃起はしないと思う。 ・具体的な効き目は2～3時間で終わる。楽しい／幸せって思ってたのが急に思えなくなってくる。サーっとフェイドアウトする感じ。でも体はまだそわそわしてたりするので、そういうのがなくなるまでにはさらに6時間以上はかかる。散々動き回ったあとだったりするので思ったより疲れてたり。体調があからさまに悪くなっている、というような事はない。

MDMA-3	31	男	<ul style="list-style-type: none"> ・体格と摂取量との比率の問題かもしれないけれど、自分の場合はあまり効かないと思う。同じ量を同じ状況で摂取した人がよく効いていても、自分は少ししか効かなかった。 ・酒を飲んでいる時に摂取したことがあって、この時は効果を感じた。30分くらいしたら体がジンジンするというか、ムズムズしてきて、何ていうか気持ちよくなって、音とかも少しよく聞こえるというか、輪郭がハッキリする感じ？感覚が増す感じ。で、なんだかラブリーな気持ちになるというか、横にいた昔の恋人のことが愛しくてたまらないような感覚に今更なった。 ・けど何事も起こさず、思っただけ。効きにくい体質なのかも。量の問題かもしれないけど。なんか酒に持ち上げてもらった感じ。で、調子の上で酒飲んでたら、いつのまにか単に酒に酔っ払った感じになっていた。翌日二日酔いだった。
MDMA-4	33	男	<ul style="list-style-type: none"> ・自分は摂取してから変化が現れるまで時間がかかるようで、早い時で30分、遅い時で1時間くらいで変化が出てくる。 ・突然くら〜と目の前がゆがみ「おお！きたきた」っと。手から血の気が引いてきて、変な汗が出る感じ。手足とか冷たくなる感じ。場合によっては(摂取したのものによっては)ひざや口が、ガチガチと震えてしまう物もある。 ・明らかに緊張時にみられるガクガクですね。それにプラス、寒さによるブル！っと。立ってるのがやつの物もあつたり。「(混ぜ物に)シャブが多いんじゃないの！？」なんて思いつつ。…。ウウウっと一口ゲロが上がってくることもあつた。そういう変化は、最初の「来た！？」から10分くらい経ったあたりかな。で、最初のそういう「耐え」の時間をジ〜と耐えます。 ・自分の場合、MDMAを摂取するときは常に音楽がそばにあるので、後は音楽に支配されてしまいますが…。 ・催眠効果というか、精神的にも普段とは明らかに違った感覚が芽生える。感受性が高まるというか。 ・ただ、こういったものには、そのときの精神状態やまわりの環境、体調によってもぜんぜん異なる。体調悪くて疲れている時なんかは、気持ち良さはまったくなかったり、おなかいっぱいの時なんかは、2錠とつてもまったく効かなかったり…(モノが悪いのか？)。空腹時のほうが効きがいい。よく吸収する感じ。水に溶かして飲むと、とてもマイルドな効きになる。 ・食欲はまったくなし。 ・その他の感覚としては、感受性と共に身体も敏感になると思う。 ・自分は性欲はわからない。そういうシチュエーションになったことないからわからないけど。 ・瞳孔が開くって言うけど、自分はそんなにまぶしさをおぼえたことはない。むしろ、まぶしいはずの光がまともに見れてるかな。 ・たまに奥歯噛み締めて、次の日、口の中傷だらけなんてこともある。 ・ピークは摂取して45から60分くらいかな？ ・そこから効果が長続きする物から、あれ、もう終わり？なんて物もある。以前、半日くらい抜けなかった物もあつた。だんだん平常心に戻っていく感じなので、変化というよりは戻っていく感じ。 ・翌日は疲れてて、体に力が入っていたことがよくわかる。
MDMA-5	33	男	<ul style="list-style-type: none"> ・錠剤1錠を経口摂取。 ・20〜30分で体がジリジリと痺れるような感覚を覚える。同時に吐き気を感じる(吐き気はかならずしも感じない時もある)。動けなくなったりして、座り込んだりしている。 ・その後さらに30分ほどすると吐き気が治まり、ジリジリとしていた感覚が浮遊感に変化し、立ち上がって動き出したりできる。 ・そこからは、ずっと浮遊感が持続し、視覚・聴覚が敏感になる。 ・時間の経過と共に効果というか変化は薄れて行き、4〜5時間くらいで普通の感覚に戻る。 ・暫く頭の中で耳鳴りのような「ジーン」という感じが残る。

MDMA-6	35	男	<ul style="list-style-type: none"> ・MDMA の錠剤を9割方経口で。残り1割は砕いて鼻から。あぶったこともある、もったいない。(一度カプセルがあった。でも、名前が「ネクスス」と言っていた。) ・一回の摂取量は1錠だけど、一日ではトータルで1錠じゃ終わらないことの方が多い。追加して摂取する。予算の都合上、平均2錠。奮発すると3錠。足りない分はKでおぎなう。もしくは酒。 ・効いてくるのは、自分は人より遅くて40分くらいしてから。 まず、吐き気がする>ワナワナしてくる>精神的にもくるの順番。 ・集中力が増す。と言うか、一つのことに集中してしまう。 ・感覚が鋭敏になる。時間の感覚が早くなる。触覚が鋭敏になる。特に下半身に力が入らなくなる。汗が出る。たしかに変なところに力が入る。体温は自覚してないけど、汗が出るってことは上がるんでしょう。 ・ピークは1時間、余韻あわせて3時間といったところでしょうか…。精神的にラブリーになる。これがいいからみんな摂取するわけでしょ？一緒にとる相手が非常に左右すると思う。仕事中にとってもラブリーにはならない。 ・セックスの時に使ったことがある。気持ちいいけどハードにセックスってわけには行かない。どっちかっていうと、精神的な影響が大きいって感じ。 ・最近、質がおちたと思う。それとも、耐性？。混ぜ物多くなってきてるってのもあるかも。 ・MDMA の場合覚めるのがゆっくりだから、いまいち分かりづらいが、気分的なのが一番でしょう。翌日あたりから気分が高揚しないとか、やる気が起きないとか。ブルーな感じ。セロトニン欠乏症ってことでしょうかね。 ・MDMA はプラスの方向に解放されて、アンフェタミンとかはマイナスの方向に行くような気がしますね。どっちもセロトニンを限界まで放出するって機構は同じなのに……不思議。
--------	----	---	--

5-MeO-DIPT に関する聞き取り結果

情報提供者 No.	5MeO-1
年齢	30
性別	男
情報提供年月日	2004/3/18
初めて存在を知った時期	2002 夏
情報入手経路	セックスフレンド
初めて使用した時期	2002 秋
SEX 時の使用経験	はい
使用回数	1
使用した状況	自宅
入手経路	友人
摂取量	30mg
摂取方法	直腸
摂取時空腹だったか	空腹
アルコールを飲んでいたら	いいえ
他剤併用(5MeO 摂取前)	いいえ
他剤併用(5MeO 摂取後)	ラッシュ
最初に変化を感じた時間	20~30分
どのような変化か	体がブヨブヨした感覚
寒気/嘔吐感/震え	なし
視覚/聴覚の変化	意識を集中すると少し大袈裟に感じたように思う
手足や体の感覚	ブヨブヨした感じ
意識や精神の変化	なし
性欲への影響	なし
性行動への変化	アナル挿入時に痛みをあまり感じなかった
喉はかわいたか	いいえ
食欲について	あまりなかった
なにかに集中したか(ハマったか)	集中すればしたかも、自分ではなかった
ピークが来た時間	2時間くらい
ピークの持続時間	小1時間くらい
ピークのあとの余韻	小1時間くらい
余韻時の体の変化	腹痛が少々、下痢
余韻時の精神的な変化	なし
使用後の精神変化	なし
使用後の排泄時の変化	下痢
感想	話しにくいほど良い思いはしなかったため、一回こっきりで以降使用していない。初回にすごく気持ちがよければ使用回数がふえていたかも。
セイファーセックスへの影響	十分にあると思う
他のドラッグへの興味	興味はあるけれど、得体のしれないものは恐いので手を出さない
ラッシュの使用	使用する
話題になっているドラッグ	サンベンボウ(漢方薬、中国のパイアグラ)

情報提供者 No.	5MeO-2
年齢	36
性別	male
情報提供年月日	2004/1/30
初めて存在を知った時期	2003 夏
情報入手経路	知人
初めて使用した時期	2003秋
SEX 時の使用経験	ある
使用回数	6~10回
使用した状況	自宅
入手経路	友人
摂取量	10~15mg
摂取方法	カプセルで経口摂取
摂取時空腹だったか	はい
アルコールを飲んでいたら	いいえ
他剤併用(5MeO 摂取前)	いいえ
他剤併用(5Meo 摂取後)	いいえ
最初に変化を感じた時間	30分~1時間
どのような変化か	
寒気/嘔吐感/震え	震え
視覚/聴覚の変化	聴覚に変化、暗かったので視覚はわからない
手足や体の感覚	皮膚感覚が敏感に
意識や精神の変化	なし
性欲への影響	少し亢進してきた
性行動への変化	なし
喉はかわいたか	いいえ
食欲について	変化無し
なにかに集中したか(ハマったか)	音楽
ピークが来た時間	2時間
ピークの持続時間	3時間
ピークのあとの余韻	1時間
余韻時の体の変化	だるい感じ
余韻時の精神的な変化	なし
使用後の精神変化	なし
使用後の排泄時の変化	なし(普段から下痢)
感想	たまにやるのは楽しいかも
セイファーセックスへの影響	自分にはない
他のドラッグへの興味	得になし
ラッシュの使用	しない
話題になっているドラッグ	三便宝>パイアグラみたいなやつ

情報提供者 No.	5MeO-3
年齢	20
性別	男
情報提供年月日	2004/1/26
初めて存在を知った時期	2002 夏
情報入手経路	知人
初めて使用した時期	20024月
SEX 時の使用経験	ある
使用回数	2~5回
使用した状況	自宅/ハッテン場/海
入手経路	インターネット
摂取量	10mg 程度かと推測
摂取方法	水に溶かしてカプセルを直腸摂取
摂取時空腹だったか	
アルコールを飲んでいたら	一度酔ったときに使用
他剤併用 (5MeO 摂取前)	
他剤服用 (5MeO 摂取後)	ラッシュ
最初に変化を感じた時間	20分~30分
どのような変化か	ソワソワしてブルブルと寒い
寒気/嘔吐感/震え	全てあった。アルコール摂取時は吐き気のみずっとあった
視覚/聴覚の変化	なし
手足や体の感覚	だるくて動きたくなくなる、あと眠れない
意識や精神の変化	焦燥感
性欲への影響	焦燥感が強くてセックスどころではない
性行動への変化	体がだるくて「もうどうにでもして」みたいな気分になる。けど気持ち良くなったわけでは無い。
喉はかわいたか	多少かわいた
食欲について	あまりない
なにかに集中したか (ハマったか)	海では砂遊びにはまった
ピークが来た時間	一時間くらい
ピークの持続時間	2時間
ピークのあとの余韻	3時間以上。眠れなくなった。
余韻時の体の変化	だるい
余韻時の精神的な変化	焦燥感は薄れるが、だるさは持続
使用後の身体変化/違和感	力がいらない
使用後の精神変化/違和感	ボンヤリしていた
使用後の排泄時の変化	下痢
感想	周りの人が楽しんでいるほどには、楽しいと思わなかった
セイファーセックスへの影響	人によってはあるとおもう
他のドラッグへの興味	ある
ラッシュの使用	使用
話題になっているドラッグ	8MeO-dipt

情報提供者 No.	5MeO-4
年齢	21
性別	male
情報提供年月日	2004/1/30
初めて存在を知った時期	2003 夏
情報入手経路	インターネット
初めて使用した時期	2003 秋
SEX 時の使用経験	あり
使用回数	1
使用した状況	自宅
入手経路	友人
摂取量	耳かき1さじ分
摂取方法	粉末のままカプセルで直腸から
摂取時空腹だったか	空腹
アルコールを飲んでいたら	なし
他剤併用 (5MeO 摂取前)	なし
他剤併用 (5MeO 摂取後)	ラッシュ
最初に変化を感じた時間	20-30 分
どのような変化か	楽しくなって来た
寒気/嘔吐感/震え	とくになし
視覚/聴覚の変化	聴覚に変化。ヘッドホンで音を聞いた時に変だった
手足や体の感覚	とくになし
意識や精神の変化	必死で平静を保とうとしていた
性欲への影響	湧いてきた
性行動への変化	オナニーをした
喉はかわいたか	乾いていた
食欲について	食欲が途中で出てきた
なにかに集中したか (ハマったか)	集中できない。いろいろと気になってしまう。
ピークが来た時間	不明
ピークの持続時間	4時間くらい?
ピークのあとの余韻	
余韻時の体の変化	熱っぽくなって気持ち悪くなって来た
余韻時の精神的な変化	特になし
使用後の身体変化/違和感	風邪をひいたような感じ
使用後の精神変化/違和感	元気が薄れた。けだるかった。
使用後の排泄時の変化	とくになし
感想	好奇心で使って一人で居たけど、記憶が飛んでしまいあまり覚えてないので、使用は避けたいと思う。
セイファーセックスへの影響	かなりある
他のドラッグへの興味	ない
ラッシュの使用	たまに使用 (オナニーに)
話題になっているドラッグ	知らない

情報提供 No.	5MeO-5
年齢	28
性別	男
情報提供年月日	2004/3/14
初めて存在を知った時期	2003
情報入手経路	知人
初めて使用した時期	2003 秋
SEX 時の使用経験	はい
使用回数	2-5
使用した状況	相手の家
入手経路	友人
摂取量	不明
摂取方法	カプセルを直腸から
摂取時空腹だったか	空腹
アルコールを飲んでいたら	いいえ
他剤併用 (5MeO 摂取前)	いいえ
他剤併用 (5MeO 摂取後)	ラッシュ
最初に変化を感じた時間	10-15分
どのような変化か	軽く酒に酔った感じ
寒気/嘔吐感/震え	震え
視覚/聴覚の変化	いいえ
手足や体の感覚	いいえ
意識や精神の変化	いいえ
性欲への影響	いいえ
性行動への変化	いいえ
喉はかわいたか	あまり感じなかった
食欲について	効果が薄れてから空腹感を感じたくさん食べた
なにかに集中したか(ハマったか)	なし
ピークが来た時間	30分-40分
ピークの持続時間	1時間
ピークのあとの余韻	1時間-2時間
余韻時の体の変化	空腹感
余韻時の精神的な変化	特になし
使用後の身体変化/違和感	震え、だるい
使用後の精神変化/違和感	なし
使用後の排泄時の変化	なし
感想	使用後の震えが止まらないのがあまりにも不快。セックスのときに感度が良くなるわけでもないの、もう使いたくない。成分もよくわからないので怖いというのもある。
セイファーセックスへの影響	あると思う
他のドラッグへの興味	ケミカル以外なら興味がある
ラッシュの使用	あり
話題になっているドラッグ	なし

情報提供者 No.	5MeO-6
年齢	21
性別	男
情報提供年月日	2004/2/10
初めて存在を知った時期	2003年の1月
情報入手経路	知人
初めて使用した時期	2003年の1月
SEX 時の使用経験	あり
使用回数	6~10回
使用した状況	自宅
入手経路	友人/インターネット
摂取量	不明
摂取方法	経口/直腸
摂取時空腹だったか	いいえ
アルコールを飲んでいたら	はい
他剤併用(5MeO 摂取前)	いいえ
他剤併用(5MeO 摂取後)	ラッシュ
最初に変化を感じた時間	30分
どのような変化か	時間感覚が鈍くなる。妙な酩酊感
寒気/嘔吐感/震え	寒気
視覚/聴覚の変化	聴覚が狂う。聞こえた音が精神に強く影響する感じ
手足や体の感覚	多少手が震える
意識や精神の変化	はい
性欲への影響	衝動があれば亢進される程度
性行動への変化	時間が長くなる
喉はかわいたか	はい
食欲について	得になし
なにかに集中したか(ハマったか)	あつたりなかったり、ケースバイケース
ピークが来た時間	2時間
ピークの持続時間	1時間
ピークのあとの余韻	3~4時間
余韻時の体の変化	感覚が元にもどる感じ
余韻時の精神的な変化	感覚が元に戻る感じ
使用後の身体変化/違和感	だるくなる
使用後の精神変化/違和感	精神的に疲れている感じ
使用後の排泄時の変化	とくになし
感想	いろいろな意味で凄いとおもった。使う状況には注意が必要だと思う。
セーフターセックスへの影響	もともと強く意識している人には影響はないと思うが。。
他のドラッグへの興味	なし
ラッシュの使用	ある
話題になっているドラッグ	2CT

情報提供者 No.	5MeO-7
年齢	27
性別	男
情報提供年月日	2004/1/30
初めて存在を知った時期	2003 中頃
情報入手経路	インターネット
初めて使用した時期	2003 年 10 月
SEX 時の使用経験	はい
使用回数	1
使用した状況	ホテル
入手経路	知人より
摂取量	不明「ふつうよりやや少なめ」と言われた
摂取方法	カプセルを肛門から
摂取時空腹だったか	やや空腹
アルコールを飲んでいたら	少々ビールを
他剤併用(5MeO 摂取前)	なし
他剤併用(5MeO 摂取後)	ラッシュ
最初に変化を感じた時間	20分
どのような変化か	意識はしっかりしているが、少し熱っぽい感じ、じんじんと全身が。
寒気/嘔吐感/震え	ゲップが出そうな感じ。食後だったら吐いたかも
視覚/聴覚の変化	多少チカチカ
手足や体の感覚	得になし
意識や精神の変化	ずっとこの状態が続けば(アナルセックスをしている状態)いいな—と思った
性欲への影響	マグロになる。心身ともに。
性行動への変化	覚えていない
喉はかわいたか	とくになし
食欲について	変化なし
なにかに集中したか(ハマったか)	相手の体にしがみついていた
ピークが来た時間	40分
ピークの持続時間	15分
ピークのあとの余韻	2-3時間
余韻時の体の変化	酒に酔った感じ
余韻時の精神的な変化	とくになし
使用後の身体変化/違和感	とくになし
使用後の精神変化/違和感	とくになし
使用後の排泄時の変化	とくになし
感想	気分が悪くはならなかったが、かといって快感が増すわけでもなく、予想より結構つまらなかった。ゲップでそうなのがつうとうしくて、今後、自分は使わないと思った。
セイファーセックスへの影響	人によってはあるかも
他のドラッグへの興味	得になし
ラッシュの使用	使用
話題になっているドラッグ	なし

情報提供者 No.	5MeO-8
年齢	21
性別	男
情報提供年月日	2004/1/30
初めて存在を知った時期	2004/8/19
情報入手経路	バー
初めて使用した時期	2004/8/19
SEX 時の使用経験	あり
使用回数	28回
使用した状況	自宅／ハッテン場／路上
入手経路	友人／ショップ
摂取量	耳かき3杯
摂取方法	カプセルにだ液を入れて肛門から
摂取時空腹だったか	腹八分
アルコールを飲んでいたら	一杯だけ飲んでいただけがある
他剤併用(5MeO 摂取前)	ラッシュ
他剤併用(5MeO 摂取後)	ラッシュ
最初に変化を感じた時間	15～20分
どのような変化か	脱力感、のちにムラムラとしてきた
寒気／嘔吐感／震え	震え
視覚／聴覚の変化	多少まぶしい
手足や体の感覚	手の感覚がすこし定まらない感じ
意識や精神の変化	メールうつのが難しくなった
性欲への影響	性欲が湧いてきた
性行動への変化	とにかく誰かとセックスしたかったけど、相手は冷静に選んでいた気がする
喉はかわいたか	いいえ
食欲について	とてもすいていた
なにかに集中したか(ハマったか)	平常を維持しようと顔面を殴っていた
ピークが来た時間	30分
ピークの持続時間	5～6時間
ピークのあとの余韻	4時間
余韻時の体の変化	特になし
余韻時の精神的な変化	通行人をけとばしたくなった。ハイな状態で、気が大きくなる
使用後の身体変化／違和感	なし
使用後の精神変化／違和感	なし
使用後の排泄時の変化	なし
感想	量をあやまらなければ OK。路上では使わない方がよい。好きな人とは使いたくない(薬がメインになってしまうから)
セيفァーセックスへの影響	ある。脱力していて抵抗できずに不本意なセックスをした経験あり。
他のドラッグへの興味	なし
ラッシュの使用	あり
話題になっているドラッグ	エクスタシー