

・内分泌疾患の既往

[2]	以前の内分泌器官の切除	10	甲状腺疾患	5		
[3]	内分泌疾患、下垂体疾患、甲状腺疾患	20	不妊症	10	インスリンが必要な糖尿病	30
[5]	甲状腺疾患の既往	1	今回甲状腺疾患	7		
[6]	甲状腺疾患	2				
[10]	明らかな内分泌疾患	30	卵巣機能不全	10	不妊症2年以内	10 2年以上
[11]	なし	レベル1	脳下垂体機能不全、高プロラクチン血症、甲状腺疾患	レベル2		

・糖尿病

[1]	B、C、D?	2	Diabetes F	3		
[2]	クラスA-II以上の糖所	10	prediabetes(A-I)	5	糖尿病の家族歴	1
[3]	インスリンが必要	30				
[5]	妊娠糖尿病	3	糖尿病	7		
[6]	糖尿病	4				
[7]	糖尿病の存在	2				
[9]	なし	0	潜在性尿糖(+)2回まで	1	顕性尿ケトン体(+)	2
[10]	前症	20	顕性	30		
[11]	なし	レベル1	妊娠中食事療法でコントロール可能な症例	レベル2	インシュリン依存型／非インシュリン依存型(既往含)、妊娠中インシュリン療法が必要	レベル3

・慢性腎臓疾患

[1]	慢性腎臓疾患	1	腎機能減少を伴う	2	BUNの上昇を伴う	3
[2]	中等度～重症の腎疾患	10				
[6]	腎疾患	4				
[7]	腎疾患	2				
[11]	なし	レベル1	蛋白尿、腎盂腎炎、腎臓の異常／尿道・膀胱の逆流	レベル2	糸球体腎炎、腎不全	レベル3

・既往歴

[2]	腎盂腎炎の既往	5	急性腎盂腎炎		5	膀胱炎の既往		1	急性膀胱炎	1
[2]	てんかん	5								
[2]	子宮奇形	10								
[2]	頸管無力症	10								
[2]	子宮頸部細胞診異常	10								
[2]	鎌状赤血球症	10								
[2]	ウイルス感染症	5								
[2]	結核の既往	5								
[2]	インフルエンザ症候群	5								
[2]	感情的問題	1								

[3]	神経学的	10	整形外科的		10	呼吸器		10	慢性腎疾患	10	尿路感染	5
-----	------	----	-------	--	----	-----	--	----	-------	----	------	---

[4]	婦人科の手術の既往	1										
[4]	慢性腎疾患	2										
[4]	妊娠糖尿病	1										
[4]	糖尿病	3										
[4]	心疾患	3										
[4]	その他の疾患(慢性気管支炎、膠原病など)	程度に応じて1-3										

[5]	性病(淋病、梅毒)の既往	1	現在性病									5
[5]	子宮頸癌	3										
[5]	尿路感染の既往(発熱なし)	1	尿路感染の既往(発熱有り)									2
[5]	今回妊娠中に尿路感染(発熱なし)	3	発熱有り									5
[5]	精神医学的もしくは神経学的	1										
[5]	その他の疾患の既往	1	現在罹患									5
[5]	鎌状赤血球形成傾向	2	鎌状赤血球症									7

[6]	尿路感染症	1
[6]	呼吸器感染症	1
[6]	性器感染症	2
[6]	その他感染症	1
[6]	鎌状赤血球症	2
[6]	麻薬中毒	3
[6]	妊娠中の薬物療法	1

[7]	赤血球抗体	1
-----	-------	---

[8]	糖尿病	4
[8]	妊娠糖尿病	2
[8]	心疾患	4
[8]	慢性呼吸器疾患	4
[8]	慢性腎疾患	4
[8]	再発性尿路感染症	1
[8]	内分泌疾患	4
[8]	貧血 (Hb<10.0g/dl)	2
[8]	血液型抗体	2
[8]	子宮頸部円錐切除術	4

[9]	入院疾病なし	0	虫垂炎その他軽症歴	1	内外科的、婦人科的合併症あり	2
[9]	催奇要因なし、胸部X線1枚	0	疑 大量服用 X線2枚	1	有、薬物中毒、X線3枚以上	2
[9]	その他の異常なし	0	疑あり、軽症肥満	1	体格、精神異常など	2

[10]	全身疾患:急性(軽度)	5	急性(重症)	15	慢性(非消耗)	5	慢性(消耗)
[10]	精神状態(0~20)		分娩への恐怖心、態度、偏見、敵意の有無、行動パターン、管理を受けていない既往妊娠と登録期間、育児の責任の欠如、家族単位の夫婦関係、家族の精神病歴				

[11]	麻酔関連なし	レベル1	麻酔トラブル(既往・合併症など) 皮膚症状と関節障害の みで非急性 腎障害や高血圧合併 なし	レベル2	悪性高熱症候群、 主要臓器障害の合併	レベル3
[11]	SLEなし	レベル1		レベル2		レベル3
[11]	抗リン脂質症候群なし	レベル1	レベル3症状なし	レベル2	妊娠中の血栓症、 食道静脈瘤、胆汁うっ滞	レベル3
[11]	消化器疾患なし	レベル1	胆石症	レベル2	慢性転化	レベル3
[11]	肝炎なし	レベル1	急性/慢性	レベル2	急性、薬物療法中	レベル3
[11]	尿路感染症なし	レベル1	急性以外			
[11]	血液疾患なし	レベル1	貧血(Hb<9mg/dl)治療 に無反応)、サラセ ミア、 血小板減少症、 Von Willebrand症 梅毒、結核、風疹、水 痘/帯状疱疹	レベル2	溶血性貧血、	レベル3
[11]	日群溶連菌	レベル1		レベル2	HIV陽性、	レベル3
[11]	神経疾患なし	レベル1	多発性硬化症	レベル2	重症筋無力症、 数種の薬物投与	レベル3
[11]	てんかんなし	レベル1	コントロール可能	レベル2	アルコール・薬物依存	レベル3
[11]	精神的変調	レベル1	内服治療中/症状安定	レベル2		レベル3
[11]	なし	レベル1	明らかでない異常	レベル2		レベル3
[11]	軽度	レベル1	中等度(前年に2回以 上の発作または維持 療法、ステロイド内服)	レベル2	重症(過去2年内の入 院治療、FEIV<70%、 急性発作の予測、吸入 ステロイド剤・気管支 拡張剤を必要)	レベル3

・Rh

[1]	父親とhomozygous	2	胎児溶血性貧血(赤芽球症)の既往	3
[2]	前児交換輸血	10	Rh感作のみ	5

・栄養状態

[5]	20%肥満	1	高度の肥満	5	10%の瘰癧	2	低栄養状態	3
[5]	不適切な体重増加(12pound未満)	5	過度の体重増加(48pound以上)	3				
[10]	栄養不良	20	異常な肥満	30	不適当な栄養	10		

・嗜好

[2]	薬の乱用	5					
[2]	タバコ一日一箱以上	1					
[2]	アルコール常用	1					
[5]	タバコ一日一箱以上	1					
[5]	ドラッグ、アルコール乱用の既往	1	現在もドラッグ、アルコール乱用	2			
[6]	タバコ一日11~20本	1	21本以上	2			
[8]	タバコ一日5本以上	1	飲酒 二週間に一回以上	1			
[9]	なし	0	少量	1	中等量以上(1日1箱)	2	

3.産婦人科既往歴

[1]	常位胎盤早期剥離、 死産、新生児死亡、 早産、産褥出血、妊 娠中毒症、中位鉗子 分娩困難、既往帝王 切開、大奇形、巨大 児	1つで1	2つ以上で2
[2]	子癇の既往	5	中毒症の既往
[2]	死産の既往	10	
[2]	前回過期産	10	
[2]	前回未熟児	10	
[2]	前回新生児死亡	10	
[2]	前回帝切	5	
[2]	習慣性流産	5	
[2]	10pounds以上の児 体重	5	
[2]	前児に先天性奇形	1	
[2]	小さい骨盤	5	
[3]	流産1回	5	流産2回以上
[3]	早産1回	5	早産2回以上
[3]	死産1回	20	死産2回以上
[3]	新生児死亡1回	10	新生児死亡2回以上
[3]	先天性異常1つ	10	先天性異常2つ
[3]	前児2500g以下	20	前児3800g以上
[3]	PET既往(妊娠性高 血圧?)	10	
[3]	本態性高血圧の既往	10	
[3]	帝王切開術の既往	20	
[3]	突発的な出血の既往	20	
[3]	胎位(胎向)異常既 往	10	
[3]	鉗子分娩の既往	5	
[3]	産後出血の既往	10	
[3]	胎盤遺残の既往	10	

[4]	習慣性流産・不妊症	1			
[4]	PPH(manual removal)	1			
[4]	前児4082g以上	1	前児2500g以下		1
[4]	PEI/高血圧	1			
[4]	既往帝王切開	2			
[4]	死産もしくは新生児死亡	3			
[4]	分娩遅延もしくは難産	1			

[5]	二年未満の不妊	1	二年以上の不妊	2	
[5]	流産1回	1	流産2回以上	2	
[5]	低出生体重児もしくは早産の既往一回	1	二回以上	5	今回
[5]	巨大児一回	1	巨大児2回以上	2	
[5]	周産期死亡の既往	5	二回以上の周産期死亡の既往	7	
[5]	既往帝王切開	5			
[5]	前児に先天性奇形	1			
[5]	頸管無力症	7			
[5]	子宮奇形	5			
[5]	狭骨盤	2			
[5]	既往の胎位胎向異常	1			
[5]	中等度の子癇前症の既往	1	重症子癇前症の既往	2	
[5]	多胎妊娠の既往				

[6]	前回流産	1			
[6]	前回周産期死亡	2			
[6]	前回Rh因子感作	3			
[6]	前回帝王切	1			

[7]	流産歴一回	1	二回以上	2	
[7]	周産期死亡	1	二回以上	2	
[7]	既往帝王切	1			

[8]	死産	4
[8]	新生児死亡	4
[8]	早産 (<34週)	2
[8]	低出生体重児 (<2500g)	2
[8]	2回以上の中絶	2
[8]	帝王切開術の既往	4
[8]	分娩前出血	4
[8]	分娩後出血	4

[9]	全例経産自然分娩	0	早産(≦37W)遅産(≧42W)吸引分娩(3回牽引まで)	1	遷延分娩(24時間以上)吸引分娩(4回以上)鉗子分娩、帝切	2
[9]	出産児全員健康	0	やや虚弱児あり 異常の疑	1	低出生体重児 (<2500g)SFD、CP、奇形、周産期死亡	2
[9]	整順2相性(25~34日型)	0	やや不順黄体不全35~40日型20~24日型	1	全く不順、無排卵、無月経 無排卵、無月経 不妊の既往	2
[9]	異常妊娠歴なし	0	自然流産1~2回、人工流産2~4回、ごく軽症中毒症	1	同左3回以上、子宮内死亡、外妊、中毒症などの既往	2
[10]	流産1回	5	2回	15	3回以上	30
[10]	早期産1回	10	2回以上	20		
[10]	胎児死亡1回	10	2回以上	30		
[10]	新生児死亡1回	10	2回以上	30		
[10]	先天奇形1回	10	2回以上	20		
[10]	障害児:身体的	10	神経的	20		
[10]	既往に胎位異常	10	既往に帝王切開	30	性器奇形又は子宮頸管無力症	20
[10]	境界型狭骨盤	10	絶対的狭骨盤	30	卵巣腫瘍 6cm以上	20
					子宮筋腫 5cm以上	5
					子宮筋腫 20cm以上	20
					粘膜炎 30	30
					子宮内膿症	5

[11]	子宮手術歴なし	レベル1	子宮筋腫摘出後、 子宮破裂・穿孔術後、 子宮手術後、 子宮脱手術後、 膈隔壁	レベル2	
[11]	子宮頸部術後：経膈 分娩の既往有	レベル1	経膈分娩の既往無	レベル2	
[11]	先天性の子宮異常： 経膈分娩の既往有	レベル1	経膈分娩の既往無	レベル2	
[11]	不妊症：クロミッド・AIH	レベル1	IVF・GIFT	レベル2	
[11]	4500g以上の巨大児	レベル1	3回以上の習慣性流 産、3回以上の妊娠継 続中止、35週以前の早 産、胎盤早期剥離、帝 王切開、肩甲難産、1L 以上の分娩時出血、癒 着胎盤用手剥離、5 パーセントタイル以下 のIUGR、周産期死亡	レベル2	子宮頸管無力症、自己 免疫性胎児血小板減 少症 レベル3
[11]	正常妊娠既往有	レベル1	正常妊娠既往無	レベル2	
[11]	子癇前症	レベル1	IUGRを伴う、34週以前 の分娩を必要、多臓器 合併症	レベル2	

4.現在の妊娠について

初期

[9]	遺伝子、染色体異常なし	0	疑、可能性あり	1	異常確定	2
[9]	卵胞、卵子 排卵の異常なし	0	治療中の自然排卵、産褥妊娠、予定日不明妊娠	1	人工排卵、多発排卵、多胎 卵巣切除後排卵	2
[9]	受精、分割 着床の異常なし	0	予定月経時少量出血		人工受精、体外受精、一卵性双胎 IUD挿入	2
[9]	胎児(芽)発生発育異常なし	0	25%以下のSFD 75%以上のLFD	1	10%以下のSFD 90%以上のLFD 奇形	2

感染症

[9]	感染症(梅毒、トキソプラズマ症など)なし	0	感染の疑あり	1	要治療	2
-----	----------------------	---	--------	---	-----	---

・切迫流産

[2]	点状出血	5				
[6]	切迫流産	3				
[8]	13週以降の性器出血	2				
[9]	なし	0	1-2回の出血 収縮痛 時に自覚	1	3回以上持続的出血、収縮強度、縫縮術施行	2

・20週以前の出血

[1]	出血のみ	1	疼痛を伴う	1		
[4]	20週以前の出血	1				

・20週以後の出血

[1]	一時的	1	持続的	2	疼痛を伴う	3
[4]	20週以後の出血	3				
[6]	妊娠中の出血	2				
[7]	妊娠中の出血(少量)	1	妊娠中の出血(大量)	2		

・前期破水

[1]	前期破水	1	24時間以上経過	3	
[4]	前期破水	2			
[7]	24時間以上経過した 前期破水	2			
[9]	正期破水(児頭固定 後)	0	早期破水、高位破水、 一過性の発熱<37.5°C	2	前期破水、子宮内感染 発熱≥37.5°C

・貧血

[1]	Hb8-10g/dl	1	Hb8g/dl以下	1	
[2]	Hb9g/dl未満	5	9~10.9g/dl		
[4]	Hb10g/dl以下	1			
[5]	Hb8-10g/dl	1	Hb8g/dl以下	2	
[6]	Hb10未満	2		1	
[7]	Hb8-10g/dl	1	Hb8g/dl以下		
[9]	なし Hb≥12g以上	0	Hb=10~11.9g	2	Hb<10g以下 出血傾向 増悪
[10]	Hb10~11g	5	9~10g	10	<9g

・妊婦健診

[1]	3回未満	1	0回	2	
[5]	27週以後初診	2	5回以下の受診	1	
[6]	妊婦健診未受診もし	2		2	
[7]	分娩予約なし	2		2	

・妊娠中毒症

[1]	Toxemia I	1	Toxemia II	2	子癇発作	3
[2]	toxemia(中等度~重症)	10	toxemia(軽症)	5		
[5]	中等度子癇前症	3	重症子癇前症	5		
[6]	子癇前症	1	重症子癇前症	3		
[7]	PIH	1	蛋白尿を伴う	2	子癇	3
[9]	なし	0	軽症	1	重症	2

・羊水量

[1]	羊水過多	3				
[2]	羊水過多	10				
[4]	羊水過多	2				
[5]	羊水過多	7				
[6]	羊水過小	1	羊水過多			
[7]	羊水過多	3				
[9]	羊水の異常なし、透明白濁	0	発色	1	羊水過多、過少、混濁 (緑色、褐色)	2
[11]	羊水過少なし	レベル1	羊水腔2cm以上	レベル2	羊水腔2cm未満	レベル3

・多胎妊娠

[1]	多胎妊娠	2
[2]	多胎妊娠	10
[4]	多胎妊娠	3
[5]	多胎妊娠	7
[6]	多胎妊娠	2
[7]	多胎妊娠	2
[8]	多胎妊娠	4

・糖尿病

[1]	耐糖能異常	1	インスリンを必要とする	2	母体アシドーシス	3
[7]	妊娠糖尿病	1	インスリンを必要とする	2		

・発熱

[1]	母体発熱	1	母体発熱、心拍数160以上	2
-----	------	---	---------------	---

・Rh陰性

[1]	力価の上昇	2	Liley zone III	2	
[3]	Rh不適合	10	影響を受けた前児	5	
[4]	Rh isoinmunization	3			
[5]	感作されたRh陰性	7		3	
[9]	血液型不適合なし	0	不適合(+)症状(-) 間接クームス(-) × 16	20	間接クームス × 32(+) Δ ODDにピークあり胎児食 血、水腫あり 感染(+)
[10]	Rh感作	30	溶血黄疸児	30	ABO型不適合

・低出生体重児

[4]	SFD児	3			
-----	------	---	--	--	--

・胎位胎向

[2]	胎位異常	10			
[4]	骨盤位、胎位胎向異	3			
[5]	今回胎位胎向異常	7			
[6]	骨盤位	2	横位	3	
[8]	34週以降の骨盤位	4			
[9]	胎位、胎勢異常なし	0	一時骨盤位 横位	1	骨盤位、横位 反屈位
[9]	CPD、難産徴候なし	0	ガイツ(±)、CPD境界 例、軟産道強韌(+)	1	ガイツ(+)、肩甲難産、 軟産道強韌(++)
[9]	進入回旋 下降定位	0	同右一過性(矯正可)	1	反屈位、回旋異常、不 正軸定位、高在縦定 位、低在横定位

胎盤

[9]	胎盤附着の異常なし (主として対側高位)	0	一時、中低位(好転す るもの)	1	低位持続、前置胎盤、 早期剥離、癒着胎盤
[9]	胎盤機能異常なし	0	境界域	1	異常低値または降下
[9]	臍帯の異常なし	0	やや同右	1	過長、過短、単一臍動 脈、臍帯脱出

[11]	母の低体重 (BMI<17) 胎動の減少	レベル1	予定日が確定できない 急激な腹痛 腹部外傷 分娩前の出血 子宮ガン 尿路感染症再発 性器ヘルペス(急性進行中の病巣) RH(-)などの血液型不適合 妊娠蛋白尿(>0.3mg/24時間) 妊娠高血圧 早産の前駆水(陣痛のないもの) 満期の前期破水の 過期産(41週以上) 胎児異常 Large for dates(90%タイル以上) 36週以降の胎位の異常 CTGの異常	レベル2	悪性腫瘍 病的な肥満 多胎 前置胎盤(32週以降) 子宮内胎児死亡 羊水過多(ポケット10cm以上) 子癇前症 (BP>140/90、30/15の上昇) ①蛋白尿 >0.3g/24時間 ②血小板 <150×10 ⁹ /l ③腎・肝機能の異常 ④切迫子癇/子癇	レベル3
[11]	IUGR(5%タイル以下)なし	レベル1	羊水異常なし	レベル2	羊水過多、臍帯の異常所見	レベル3
[11]	切迫早産なし	レベル1	34週~36週	レベル2	<34週	レベル3

・妊娠週数

[1]	28週以下	4	29-32週	3	33-35週	2	36-37週	1	42週以上	1	43週以上	2
[4]	過期妊娠(42週以上)	1										
[5]	過期妊娠(42週以上)	7										
[7]	28週以下	4	29-32週	3	33-35週	2	36-37週	1	42週以上	1	43週以上	2