


●居間・食卓-2

- 18. 子どもの多く手には、電源コードをばねさしようにしてありますか。
- 19. コンセントには、カバーをえていますか。
- 20. 床に置くスツールは、安全帽で覆って使用していますか。
- 21. アイロンは、子どもの手の届かないところに置いてありますか。
- 22. マットやライナーは、子どもの手の届かないところにしていますか。
- 23. テレビの裏や、ビデオテープの入口はカバーで覆い、指が入らないようにしてありますか。
- 24. ドアを開閉するときは、子どもの手の位置を確認していますか。




●寝室・子ども部屋-2

- 75. 寝ている子どもの上に、物が落ちてこないようにしてありますか。
- 76. スロープ・ビーターの角が鋭いなら、丸くして、蓋をしていますか。
- 77. クーハン(かご)の網の安全を確認していますか。
- 78. タンスの引き出しを開け放して、蓋がないように注意していますか。
- 79. おもちゃは、季節に合ったものを使用していますか。
- 80. 遊び終わったおもちゃは、片づけていますか。
- 81. 子どもの側では、タバコを吸わないようにしていますか。




●居間・食卓-4

- 32. はたきかき器などの刃物は、使用したあき片づけていますか。
- 33. 鋭いフック・歯ブラシなどをくわえて、飛び出しにないようにしてありますか。
- 34. テーブルクロスは、使用しないようにしてありますか。
- 35. 鋭い食べ器や飲み物は、テーブルの中央に置いてありますか。
- 36. テーブルや椅子の上の食器や、鋭いピン・帯などは、手の届かないところに置いてありますか。
- 37. ポットや炊飯器は、子どもの手の届かないところに置いてありますか。
- 38. 電源コードは、子どもが引けられないようにして使用していますか。
- 39. 豆乳やプリンなどの入った容器は、子どもの手の届かないところに置いてありますか。




●トイレ

- 65. 使用しない時、トイレのドアは必ず閉めていますか。
- 66. トイレのドアは、外壁から自動に開けられますか。
- 67. トイレ用洗剤は、子どもの手の届かないところに置いてありますか。




●台所-2

- 46. 包丁は、使用後は必ず片づけていますか。
- 47. 台所の洗剤は、子どもの手の届かないところに置いてありますか。
- 48. 湯沸かす電熱ポットは、子どもが触れないところに置いてありますか。
- 49. ジュースと間違えるようなアルコール飲料は、冷蔵庫の中に入れていないようにしてありますか。
- 50. 冷蔵庫の中の蓋は、子どもが取り出せないようにしてありますか。
- 51. ドニール蓋やラップは、子どもの手の届かないところに片づけていますか。



●浴室・洗面所-1

- 62. 子どもが一人で浴室に入れないように、ドアには外鍵をつけていますか。
- 63. 子どもだけで、入浴させないようにしてありますか。
- 64. 足湯の蓋を日までは、湯桶のお湯は蓋をしていますか。
- 65. お風呂の蓋は、子どもが入浴する前に確認していますか。
- 66. 形質のふたは、湯でたまりやすいものを使用していますか。
- 67. 排水口は、鋭い爪のすくい蓋を設置してありますか。
- 68. 浴室の床やタイルは、滑りにくくしてありますか。





保健医療・保育関係者用トップページ

[トップ](#) > [保健医療・保育関係者用トップ](#) > [応急手当法](#)

イザという時に役立つ子どもの応急手当



- ・[応急手当パンフレット/表1\(385KB\)](#) ・[応急手当パンフレット/表2\(385KB\)](#)
- ・[応急手当パンフレット/裏1\(385KB\)](#) ・[応急手当パンフレット/裏2\(385KB\)](#)

パンフレットを閲覧・印刷される際には、Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方はダウンロードしてください。




Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

もしも…のときにも
慌てないで!

イザという時に役立つ

子どもの 応急手当



私の家の緊急電話番号

- 救急・火災……119番
- 警 察……110番

救急病院	小児科	外科
小児科	眼科	産科
皮膚科	耳鼻科	
薬局		
お父さんの勤務先		
お母さんの勤務先		
保育園・幼稚園		
タクシー		



著者：国立保健医療科学研究所 田中 智 郎

異物を飲み込んだとき

何をどれ位飲んだか確認しましょう。原則は吐かせる。

飲み込んだ物	応急手当
タバコ	喉の奥を刺激して吐かせる
薬	水や牛乳を飲ませて吐かせる → 病院へ (小児科)
衣類用防虫剤	牛乳はダメで水を飲ませ吐かせる
強い酸やアルカリ性の洗剤・漂白剤	牛乳・卵白を飲ませるが吐かせない → 至急病院へ
灯油や揮発性の物質	吐かせない → 至急病院へ

●少量の誤飲のとき

普通と様子が違うなら、病院に連絡しましょう。



少量の誤飲 (1歳未満・1cm以下) ではほとんど無害ですが、念のため注意深く様子を見ましょう。普通と様子が違うなどの際は医師に連絡をしましょう。

食前油、薬、消毒液、洗剤、漂白剤、マツコの虫歯、ろうもく、インク、クレヨン、絵の具、殺菌剤、歯ブラシ、歯粉、歯垢、歯石、おしぼり、口紅、クリーム、化粧水、香水、ベビーオイル、乳液、ベビーパウダー、歯磨き粉、シャンプー、ヘアートニック、シリカゲル、綿管、乾草マット、火花、乾草、体温計の水銀

●応急手当がわからない場合は、主治医へ連絡…または
中島112番(有料)へ相談 つくば: 0990-52-9839
大 阪: 0990-50-2499

けがで出血したとき

症 状	応 急 手 当
出血	ガーゼや清潔な布で、傷口を閉じるように押えて止血
出血がひどいとき	圧迫して止血と同時に手足なら心臓に近い部分をしばる → 至急病院へ
ガラスやくずがささった	深い場合は無理に抜かない → 病院へ (外科)
トゲがささった	トゲ抜きや消毒した針でほじくりながら取る
すり傷	
切り傷	泥や砂は良く洗い流し消毒

鼻血が出たとき



子どもを抱っこするか座らせ顔を少し前に曲げるような姿勢で鼻をつまむように押さえる。または、綿球などを鼻に詰めるのもよいでしょう。



鼻血の時はあおむけに寝かせると血がノドに流れ込み吐くことがあるので、座らせて鼻を圧迫するのがよいでしょう。

まず、助けると同時に救急車の要請を。

気道確保 人工呼吸 心マッサージ

溺れたり、気道、すなわち空気の通り道に物がつまった際には一刻も早い処置が必要です。普段から心肺蘇生法や気道異物を取る方法を知っておきましょう。

人間の脳細胞は数分間血液が流れず酸素が不足すると、その後どんなに病院で治療を行っても回復することはありません。ですから、事故が起きた場所での応急手当が大切です。救急車が来るにはどんなに早くても5~8分かかってしまいます。

こんなとき、命を守るための気道確保、人工呼吸、心臓マッサージなどの心肺蘇生法を救急隊が来るまで行ってください。心肺蘇生法の原則は普通にしている呼吸や心臓の動きを前と同じように補助してあげることです。

心肺蘇生法 意識がないとき

気道確保



大きな事故や重傷になると意識がなくなります。意識がない時は強制的にと開けようとする必要はありません。必ず、呼吸が止まると同時に顔を倒さず、鼻を倒さず、舌を倒さず、舌がノドの奥の方に落ち込み、気道をふさいでいる。




▲舌がのどの奥の方に落ち込み、気道をふさいでいる。



▲あごに手をかけ、上に持ち上げるようにすると同時に、頭を使う方へそらせることで、気道が開きます。

のどに物がつまったとき

気道異物



▲左の腕に子どもをうつむせて顔を45度位下向きにし、背中の肩甲骨の間を異物が出るように強く4~5回叩きます。(背部叩打法)

呼吸していないとき

人工呼吸

子どもに顔を近づけて、胸の動きや呼吸音・空気の流れを確認し、呼吸が止まっていたら人工呼吸をしましょう。



▲乳児の場合
口と鼻を一緒に覆い、強くなり過ぎないように息を吹き込みましょう (1分間に20回(3秒に1回)程度の早さで胸が上がるように行う)

▲幼児の場合
子どもの鼻をつまみ、口と口を付けて息を吹き込みましょう (1分間に20回(3秒に1回)程度の早さで行う)

●少し大きな子どもの場合…



▲両腕を子どもの体に回し、こぶしをおへその上の臍のあたりに充て、上の方へ素早く数回押し上げます。(ハイムリック法)

心臓が動いていないとき

心臓マッサージ





心臓が動いているかどうかは、自分で呼吸しているか、喉がみられるか、体を動かすかを確認し、これらがなければすぐに心臓マッサージを開始しましょう。

▲乳児の場合



左右の乳頭を結んだ線の中央より指1本分(約1~1.5cm)を下指2~3本で重なり胸の厚さが1/3くらい沈み過ぎで押す。(1分間に100回より少し多め)

溺れたとき

症状	応急手当
意識がない	気道確保 →  心肺蘇生法
呼吸していない	人工呼吸 →  人工呼吸
脈がない	心臓マッサージ →  心臓マッサージ
意識がある	あたたかくして →  病院へ (小児科)

●水にもぐった程度なら様子を見る

動物などに噛まれたとき

子どもは動物に対しても警戒心がほとんどないので噛まれることがあります。現在、日本では狂犬病はありませんが、細菌感染の危険があります。

- 犬に深く噛まれた
- 猫にひどく引っ掻かれた場合

(応急手当) よく洗い消毒します。
(細菌感染などの危険があるため)







<家庭で>



▲深い噛み傷は、爪を石鹸などでよく洗い、消毒し、きれいなガーゼで覆っておきましょう。

やけどをしたとき

すぐに水道水やシャワーで直接、または服の上から冷やすことが大切です。

症状	応急手当
片足、片腕以上の広範囲	冷やす →  至急病院へ
手のひら以上の範囲	冷やす →  病院へ (外科) (皮膚科)
500円玉より大きい水ぶくれ	つぶさないようにする → 
赤くなった程度	流水で十分冷やしガーゼでおおう → 

500円玉より大きい水ぶくれの場合は一度病院へ

頭を打ったとき

症状	応急手当
意識がない	気道確保 →  至急病院へ
出血がひどい	傷口をガーゼ(清潔な布)で押さえて止血 →  至急病院へ
くり返し嘔吐がある	吐いたものが気管やのどにつまらないよう横向きに寝かせる → 
顔色が悪くいつまでも元気がない	 病院へ (小児科) (脳外科)
意識はある	元気なときでも24時間安静にして様子を見る
こぶができた	安静にして冷たいタオルで冷やす → 


人工呼吸と心臓マッサージ

●人工呼吸と心臓マッサージの関係


まず2回人工呼吸をし、5回心臓マッサージを行い、その後、人工呼吸1回に心臓マッサージ5回の割合で続けましょう。

人工呼吸や心臓マッサージは普段の呼吸や心臓の動きを補ってあげるものです。我々成人の呼吸は1分間に13~15回、心拍数は1分間に70~80回です。

子どもは新陳代謝が大人に比べ活発ですからそれよりも呼吸数、心拍数が多くなっています。このことを知っておくと、回数などを忘れても容易に思い出せます。






▲幼児の場合







胸骨の下端より上で乳頭ををむすんだ横より下を、片手の掌の付け根の部分で胸が1/3くらい沈む強さで叩く。(1分間に約100回)

目にゴミが入ったとき

目をこすらないことが大切です

症状	応急手当
化学薬品などが入った	大量の水で十分洗い流す →  病院へ (眼科)
ゴミが入った	目薬をさしたり水にぬらした清潔なガーゼで取り除く → 
砂が入った	水道水ややかんの水で洗い流す → 

虫に刺されたとき

症状	応急手当
呼吸が苦しい	気道確保 →  至急病院へ
スズメバチ・クマンバチなど大きいハチに刺された	毒を出す針が残っていたらトゲぬきで取る → 
小さいハチに刺された	毒を出す針が残っていたらトゲぬきで取る → 
毛虫に刺された	毛をぬく水を強く出して洗い流す → 


よく水で洗い、虫刺され用の軟膏を塗っておく

骨折・捻挫・脱臼したとき

子どもの腕はちよつと引っ張っただけでも脱臼したり、転んで骨折や捻挫をすることがあります。痛み部位を動かさないように安静にすることが大切です。

●転んで激しく痛み

(応急手当) 骨折や脱臼の可能性があれば添え木などで固定し、その部分を動かさないようにする



<家庭で>



子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト



事故は子どもの健全育成を妨げる最大の要因となっています。特にわが国の子どもの事故による死亡率は先進国の中では高いことが明らかになっています。

このため、厚生労働省の「健やか親子21」では全ての家庭および市町村が事故防止対策を実施すべきとしております。このサイトでは子どもの事故を防ぐための情報と教材の提供をすることにしました。

『子ども達に安全をプレゼント』することのお手伝いができれば幸いです。

国立保健医療科学院 生涯保健部長
田中 哲郎

保健医療・保育関係者用

→ 保健医療・保育関係者はこちらから
(登録が必要です)

→ 一般の方はこちらから
(健診用安全チェックテストができます)


子どもの事故防止支援サイト: 一般用

1/1 ページ

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

0

[トップ](#) > [一般用トップ](#)



- 年齢別に多い事故
 - 0～1歳
 - 1～2歳
 - 3～6歳
- 応急手当

年齢別にチェックできますので、お子様の発育に合わせて定期的にチェックしてくださいね。
(お誕生～3歳児以降)



子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

[トップ](#) > [一般用トップ](#) > [事故についての一般情報](#) > [年齢別に多い事故\(0~1歳\)](#)

[0~1歳](#) [1~2歳](#) [3~6歳](#)


わが国では、1歳未満の子どもが事故のために毎年300人近くが死亡しています。死亡事故1件に対して死亡に至らない事故は19万件発生していると推定されています。これらのうち1/2~2/3は子どもの回りにいる人々のちょっとした注意で防ぐことが可能です。

赤ちゃんは自分の回りのもの全てに興味を示しますが、危険を予知することは全くできません。赤ちゃんの事故を防ぐためには、お母さんなど子どもの回りにいる人々の気配りと家族全員が事故防止の認識を深めることが必要です。

この時期に多い事故は、窒息、異物誤飲、やけど、転落や転倒による外傷と水の事故です。赤ちゃんにとって家庭内での危険なものは何でしょうか？放置されたタバコや医薬品、テーブルやベッド、階段、風呂場、ドア、ストーブやポット、ベビーカーや歩行器などです。

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1) 転落(ソファ・ベッド) | 2) 窒息(ふかふかの寝具) | 3) 誤飲(タバコ) |
| 4) やけど(アイロン) | 5) やけど(テーブルクロス) | 6) やけど(台所) |
| 7) やけど(ストーブ) | 8) やけど(ポット) | 9) 溺水(浴槽) |
| 10) 転落(階段) | 11) 交通事故(自動車) | 12) 切傷(カミソリ) |
| 13) 窒息(ビニール) | | |


1) 転落(ソファ・ベッド)



赤ちゃんは成長するにつれて突然寝返りをうち、どこからでも転落するようになります。ベビーベッド、ソファ、テーブルなどの高い所に一人にしておいては危険です。

▲ [このページのトップに戻る](#) ▲

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

[トップ](#) > [一般用トップ](#)  [事故についての一般情報](#) > [年齢別に多い事故\(1~2歳\)](#)


[0~1歳](#) [1~2歳](#) [3~6歳](#)

わが国では、1~2歳の子どもが事故のために毎年300人近くが死亡しています。死亡事故1件に対して死亡に至らないものの医療機関を受診するような事故はその2000~3000倍発生していると推定されています。これらのうち1/2~2/3は保護者のちょっとした注意で防ぐことが可能です。

自分の子どもの発育を知り、現在どれくらいのことのできるのかをよく知らないことから事故は起こります。この年齢になると子どもは歩きはじめ、走り、よじ登り、飛び上がり、全てのものに興味を持つようになります。この年齢は一生のうちでも、最も怪我の多い時期です。しかし、この年齢はまだ自分で身を守ることはできません。あなたが守ってあげなければ、いつでも事故が起こりうることを肝に命じておいてください。同時に、何が危険か安全かについて少しづつ話してあげてください。

1) [転落\(階段\)](#)

2) [転落\(ベビーチェア\)](#)

3) [溺水\(浴槽\)](#) 

4) [誤飲\(タバコ\)](#)


5) [誤飲\(薬品\)](#)

6) [やけど\(食事\)](#)

7) [やけど\(ストーブ\)](#)

8) [交通事故\(自動車同乗中\)](#)

3) 溺水(浴槽)



子どもは水遊びが大好き。しかし、浴槽、バケツの水、浅いプールなどでも、子どもだけで遊ばせておくのは大変危険です。たった数センチほどの水深でもおぼれることがあります。風呂場には必ず外鍵をかけ、また、浴槽に残し湯をしないようにしましょう。

▲ [このページのトップに戻る](#) ▲

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

[トップ](#) > [一般用トップ](#) > [事故についての一般情報](#) > [年齢別に多い事故\(3~6歳\)](#)


[0~1歳](#) [1~2歳](#) [3~6歳](#) ←

わが国では、3~6歳の子どもが事故のために毎年300人近くが死亡しています。死亡事故1件に対して死亡に至らない事故はその2000~3000倍位発生していると推定されています。これらのうち1/2~2/3はちょっとした注意で防ぐことが可能です。

3歳以上になると、子どもの行動は益々活発になり、行動範囲も広がり、転落、やけど、溺水、自動車事故などに合う危険が高くなります。子どもはまだ何が危ないか十分に分かっていません。危険と安全について十分に教えてあげてください。

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1) やけど(火遊び) | 2) 転落(ベランダ) | 3) 転倒(歯みがき) |
| 4) 交通事故(自動車同乗中) | 5) 交通事故(歩行中) | 6) 交通事故(道路遊び) |
| 7) 転落(スベリ台) ← | 8) 転倒(ブランコ) | 9) 溺水(川、池、プール) |

7) 転落(スベリ台)



楽しい遊具も正しく使わなければ、事故のもとになります。自分だけでなく、他の子どもにも怪我をさせることのないよう、安全な遊び方を教えてあげましょう。

▲ [このページのトップに戻る](#) ▲

8) 転倒(ブランコ)

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

[トップ](#) > [一般用トップ](#) > [事故についての一般情報](#)

・ [年齢別に多い事故](#)

[0～1歳](#)

[1～2歳](#)

[3～6歳](#)

・ [応急手当](#)




わが国では戦後、衛生状態、栄養状態の改善、医療の進歩により、病気で死亡する子どもは著しく減少しました。しかしそれに比べて事故で死亡する子どもはあまり減少せず、現在では子どもの死亡原因の第一位は「事故」となっています。このため、厚生労働省の「健やか親子21」という子ども達の健康を守る国民運動において、事故対策を重要な柱としています。

子どもの事故は、「ほんの少しの気配りで防止可能」と事故を経験した保護者の80%以上が答えています。子どもの事故防止は決して難しいことではなく、子どもの発達を知り、それに対して少し早めに的確な対応をすることで可能です。

そこで、このホームページで子どもの事故防止のポイントを知って頂くお手伝いをしたいと思っています。

今回の情報だけでは十分ではないかもしれませんが、みんなで子どもの事故について考えてみましょう。

皆さんと「子どもに安全をプレゼント」したいと思います。



子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

[トップ](#) > [一般用トップ](#) > [事故についての一般情報](#) > [応急手当](#)

わが国では、0～5歳の子どもが事故のために毎年600人近くが死亡しています。死亡事故1件に対して死亡に至らないものの医療機関を受診するような事故はその数千倍発生していると推定されています。これらのうち1/2～2/3は保護者のちょっとした注意で防ぐことが可能です。

自分の子どもの発育を知り、現在どれくらいのことのできるのかをよく知らないことから事故は起こります。子どもはあっという間に大きくなり、歩きはじめ、走り、よじ登り、飛び上がり、全てのものに興味を持つようになります。このころは一生のうちでも、最も怪我の多い時期です。しかし、まだ自分で身を守ることはできません。あなたが守ってあげなければ、いつでも事故が起こりうることを肝に命じておいてください。同時に、何が危険か安全かについて少しづつ話してあげてください。

- [家庭でできる応急手当1－窒息したり、溺れたら・・・](#)
- [家庭でできる応急手当2－異物を飲みこんでしまったら・・・](#)
- [家庭でできる応急手当3－やけどをしたら・・・](#)
- [家庭でできる応急手当4－頭を打ったり、打撲をしたら・・・](#)
- [家庭でできる応急手当5－出血したり、骨折したら・・・](#)

●気道確保

意識がない時には、のどの奥の筋肉が後ろに落ちて気道(空気の通り道)をふさいでしまうので、あお向けにして首にケガをしていないか確認したうえで、頭を後ろにそらし、同時にあごの先を持ち上げるようにすると、気道が開きます。



乳児(1歳未満)



1歳以上の小児

写真は「へるす出版」1997年7月号より引用

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

0

[トップ](#) > [一般用トップ](#)



年齢別に多い事故

0～1歳 1～2歳 3～6歳

応急手当







年齢別にチェックできますので、お子様の発育に合わせて定期的にチェックしてくださいね。
(お誕生日～3歳児以降)



子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

[トップ](#) > [一般用トップ](#) > [安全チェックテスト](#)

年齢別にチェックできますので、お子様の発育に合わせて定期的にチェックしてくださいね。




子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

トップ > 一般用トップ > 安全チェックテスト > 9ヶ月児(以降)用チェックテスト

4. 階段の上下階の両側に転落防止用の柵を取り付けていますか。

はい いいえ
(階段なし)



Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

トップ > 一般用トップ > 安全チェックテスト > 9ヶ月児(以降)用チェックテスト

正解！

柵は階段の上と下(1階部分と2階部分)の両側2カ所に取り付け、閉め忘れのないようにする。

これからも事故防止につとめましょう。

次のチェック項目へ



Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

トップ > 一般用トップ > 安全チェックテスト > 9ヶ月児(以降)用チェックテスト

心配です！

柵は階段の上と下(1階部分と2階部分)の両側2カ所に取り付け、閉め忘れのないようにする。
大人の目が離れることがあっても安全なように、階段の上下階に柵をつけ、閉め忘れのないようにすることで、階段からの転落事故を防ぐことができます。



次のチェック項目へ



Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

トップ > 一般用トップ > 安全チェックテスト > 9ヶ月児(以降)用チェックテスト

3. 赤ちゃんがつかまり立ちをしたり、つたい歩きをするときは、傍について見ていますか。

はい いいえ

1ヶ月児用 3~4ヶ月児用 6ヶ月児用 9ヶ月児用 1歳児用 1歳6ヶ月児用 3歳児用 幼児生後期用

Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

トップ > 一般用トップ > 安全チェックテスト > 9ヶ月児(以降)用チェックテスト

正解！

赤ちゃんがつかまり立ちをしたり、つたい歩きをするときは、そばについて見ている。
角のすどい家具やテーブルは安全グッズでカバーする。

これからも事故防止につとめましょう。

次のチェック項目へ

1ヶ月児用 3~4ヶ月児用 6ヶ月児用 9ヶ月児用 1歳児用 1歳6ヶ月児用 3歳児用 幼児生後期用

Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

トップ > 一般用トップ > 安全チェックテスト > 9ヶ月児(以降)用チェックテスト

心配です！

赤ちゃんがつかまり立ちをしたり、つたい歩きをするときは、そばについて見ている。角のすどい家具やテーブルは安全グッズでカバーする。

お座りしていたのに、いつも間にかつかまり立ちをする赤ちゃん。テレビやこたつにつかまり立ちをして後ろにひっくり返ったり、よちよち歩きでつまづいてテーブルにあごをぶつけたり、まだまだ大人が側についていないと不安定です。



次のチェック項目へ

1ヶ月児用 3~4ヶ月児用 6ヶ月児用 9ヶ月児用 1歳児用 1歳6ヶ月児用 3歳児用 幼児生後期用


Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

[トップ](#) > [一般用トップ](#) > [安全チェックテスト](#) > [9ヶ月児\(以降\)用チェックテスト](#)

2. ボタン型電池や硬貨、ピアスなどの小物を机の上
に置いてありますか。

はい いいえ



Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

[トップ](#) > [一般用トップ](#) > [安全チェックテスト](#) > [9ヶ月児\(以降\)用チェックテスト](#)

心配です！

ボタン電池や硬貨、ピアスなどの小物はテーブルの上に置いたままにしない。自分の家だけでなく、外出したときも注意をする。おもちゃを口に入れていて電池のふたが開いてボタン電池を誤飲してしまったり、赤ちゃんは何気なくテーブルの上に置いた小物をつまんで口の中に入れてしまうので、床・畳・じゅうたんやテーブルの上には口に入れると危ないものは置いておけません。異物を飲みこんでしまった場合、普通48時間以内に便と一緒に排泄されますが、ボタン電池の場合は食道や胃で電気分解を起こして壊れることがあるので、すぐに医師の診断が必要です。



[次のチェック項目へ](#)



Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト


[トップ](#) > [一般用トップ](#) > [安全チェックテスト](#) > [9ヶ月児\(以降\)用チェックテスト](#)

正解！

ボタン電池や硬貨、ピアスなどの小物はテーブルの上に置いたままにしない。自分の家だけでなく、外出したときも注意をする。

これからも事故防止につとめましょう。

[次のチェック項目へ](#)



Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

[トップ](#) > [一般用トップ](#) > [安全チェックテスト](#) > [9ヶ月児\(以降\)用チェックテスト](#)

1. タバコや灰皿はいつも赤ちゃんの手の届かない所に置いていますか。

はい いいえ

[1ヶ月児用](#) [3~4ヶ月児用](#) [6ヶ月児用](#) [9ヶ月児用](#) [1歳児用](#) [1歳6ヶ月児用](#) [3歳児用](#) [6歳生児用](#)

Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health, Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

[トップ](#) > [一般用トップ](#) > [安全チェックテスト](#) > [9ヶ月児\(以降\)用チェックテスト](#)

正解!

タバコや灰皿はいつも赤ちゃんの手の届かない所に置く。
ジュースの缶を灰皿がわりにしない。

これからも事故防止につとめましょう。

[次のチェック項目へ](#)

[1ヶ月児用](#) [3~4ヶ月児用](#) [6ヶ月児用](#) [9ヶ月児用](#) [1歳児用](#) [1歳6ヶ月児用](#) [3歳児用](#) [6歳生児用](#)

Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health, Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

[トップ](#) > [一般用トップ](#) > [安全チェックテスト](#) > [9ヶ月児\(以降\)用チェックテスト](#)

心配です!

タバコや灰皿はいつも赤ちゃんの手の届かない所に置く。
ジュースの缶を灰皿がわりにしない。
大人が口にくわえるタバコに赤ちゃんは興味津々で、タバコの誤飲事故が多く、タバコや灰皿をテーブルの上に置いておくのは危険です。
また、液体に溶けたニコチンは吸収が早く、ひと口飲んだだけでも危険なので、飲み残しのジュースの缶を灰皿がわりに使うのはやめます。



[次のチェック項目へ](#)

[1ヶ月児用](#) [3~4ヶ月児用](#) [6ヶ月児用](#) [9ヶ月児用](#) [1歳児用](#) [1歳6ヶ月児用](#) [3歳児用](#) [6歳生児用](#)

Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health, Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

[トップ](#) > [一般用トップ](#) > [安全チェックテスト](#) > [9ヶ月児\(以降\)用チェックテスト](#)

5. 子ども用の椅子は安定のよいものを使用していますか。

はい いいえ

[11ヶ月児用](#) [9~10ヶ月児用](#) [8ヶ月児用](#) [7ヶ月児用](#) [6ヶ月児用](#) [5ヶ月児用](#) [4ヶ月児用](#) [3ヶ月児用](#) [2ヶ月児用](#) [1ヶ月児用](#) [0歳6ヶ月児用](#) [3歳児用](#) [幼児生後用](#)

Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

[トップ](#) > [一般用トップ](#) > [安全チェックテスト](#) > [9ヶ月児\(以降\)用チェックテスト](#)

正解!

子ども用の椅子は安定のよい、倒れにくいものを選ぶ。
ハイチエアに座らせたら必ず安全ベルトをしめ、乗り降り
するときは大人が行うようにする。

これからも事故防止につとめましょう。

[次のチェック項目へ](#)

[11ヶ月児用](#) [9~10ヶ月児用](#) [8ヶ月児用](#) [7ヶ月児用](#) [6ヶ月児用](#) [5ヶ月児用](#) [4ヶ月児用](#) [3ヶ月児用](#) [2ヶ月児用](#) [1ヶ月児用](#) [0歳6ヶ月児用](#) [3歳児用](#) [幼児生後用](#)

Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

[トップ](#) > [一般用トップ](#) > [安全チェックテスト](#) > [9ヶ月児\(以降\)用チェックテスト](#)

心配です!

子ども用の椅子は安定のよい、倒れにくいものを選ぶ。
ハイチエアに座らせたら必ず安全ベルトをしめ、乗り降りするときは
大人が行うようにする。
椅子に座っているときテーブルを足で蹴った
勢いで椅子が倒れたり、椅子に自分で
よじ登ったり急に立ち上がって転落する
事故があります。頭が重く不安定な幼児は、
椅子などの高いところから落ちやすいので、
子ども用の椅子を選ぶときには注意が必要です。



[次のチェック項目へ](#)

[11ヶ月児用](#) [9~10ヶ月児用](#) [8ヶ月児用](#) [7ヶ月児用](#) [6ヶ月児用](#) [5ヶ月児用](#) [4ヶ月児用](#) [3ヶ月児用](#) [2ヶ月児用](#) [1ヶ月児用](#) [0歳6ヶ月児用](#) [3歳児用](#) [幼児生後用](#)


Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

トップ > 一般用トップ > 安全チェックテスト > 9ヶ月児(以降)用チェックテスト

6. ストープやヒーターなどは安全柵で囲って使用して
いますか。

はい いいえ
(使用しない)



Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.


子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

トップ > 一般用トップ > 安全チェックテスト > 9ヶ月児(以降)用チェックテスト

正解!

床に置くストーブやヒーターは必ず安全柵で囲う。
ストーブの上にやかんは置かない。
これからも事故防止につとめましょう。

次のチェック項目へ




Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト


トップ > 一般用トップ > 安全チェックテスト > 9ヶ月児(以降)用チェックテスト

心配です!

床に置くストーブやヒーターは必ず安全柵で囲う。
ストーブの上にやかんは置かない。
冬やけどの多い季節です。ストーブの近くに
寝かせて寝返りをして手があたり、
ヒーターの出口に指を付けたり、特に暖房
器具によるやけどが多くなります。
最近のストーブ、ファンヒーターなど直接
熱源が出ているものが少なくなってきて
いますが、熱源が直接出ているものは
必ず安全柵で囲い、直接子どもが触れないようにします。



次のチェック項目へ



Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

トップ > 一般用トップ > 安全チェックテスト > 9ヶ月児(以降)用チェックテスト

7. テーブルクロスを使用していますか。

はい いいえ

0歳児用 3ヶ月児用 6ヶ月児用 9ヶ月児用 1歳児用 1歳6ヶ月児用 3歳児用 お誕生会用

Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

トップ > 一般用トップ > 安全チェックテスト > 9ヶ月児(以降)用チェックテスト

正解！

テーブルクロスは使用しない。

これからも事故防止につとめましょう。

次のチェック項目へ

0歳児用 3ヶ月児用 6ヶ月児用 9ヶ月児用 1歳児用 1歳6ヶ月児用 3歳児用 お誕生会用

Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

トップ > 一般用トップ > 安全チェックテスト > 9ヶ月児(以降)用チェックテスト

心配です！

テーブルクロスは使用しない。
食卓にテーブルクロスをかけていると、赤ちゃんが
つかまり立ちをするときに引っ張って、熱い食べ物
や飲み物が置いてあるとこぼれてやけどを
してしまいます。



次のチェック項目へ

0歳児用 3ヶ月児用 6ヶ月児用 9ヶ月児用 1歳児用 1歳6ヶ月児用 3歳児用 お誕生会用


Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

[トップ](#) > [一般用トップ](#) > [安全チェックテスト](#) > [9ヶ月児\(以降\)用チェックテスト](#)

8. 家具などの角の鋭い部分には、クッションなどでガードがしてありますか。

はい いいえ



Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト


[トップ](#) > [一般用トップ](#) > [安全チェックテスト](#) > [9ヶ月児\(以降\)用チェックテスト](#)

正解!

家具などの角のするどい部分には、クッションテープ等でガードしておく。

これからも事故防止につとめましょう。

[次のチェック項目へ](#)



Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

[トップ](#) > [一般用トップ](#) > [安全チェックテスト](#) > [9ヶ月児\(以降\)用チェックテスト](#)

心配です!


家具などの角のするどい部分には、クッションテープ等でガードをしておく。

つかまり立ちや伝い歩きの赤ちゃんに転倒はつきもので、目の高さにある家具や柱の角に、頭やおでこをぶつけてしまいます。

家具類はなるべく丸みのあるものを選び、角にはクッションテープ等を取りつけ、ぶつかったときの衝撃を和らげる工夫をしておきます。



[次のチェック項目へ](#)




Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health , Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト

トップ > 一般用トップ > 安全チェックテスト > 9ヶ月児(以降)用チェックテスト

9. テーブルや棚の上にある食器やビン、缶などは、
赤ちゃんが自由に触れないようにしてありますか。

はい いいえ



Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health, Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト


トップ > 一般用トップ > 安全チェックテスト > 9ヶ月児(以降)用チェックテスト

正解!

テーブルや棚の上にある食器や重いビン・缶などは、赤ちゃん
が自由に触れないようにしておく。

これからも事故防止につとめましょう。

次のチェック項目へ



Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health, Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.

子どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト


トップ > 一般用トップ > 安全チェックテスト > 9ヶ月児(以降)用チェックテスト

心配です!

テーブルや棚の上にある食器や重いビン・缶などは、赤ちゃんが
自由に触れないようにしておく。
テーブルの上に置いてあるコップを落として、割れた
破片を踏んでしまったり、缶詰やジャムのビン
を足に落としてしまったり、手の届くところにあるものに
興味をもち、触ったり、引っ張ったり、
押しつぶすなどのかわりから、外傷や打撲
事故がみられます。



次のチェック項目へ



Copyright (c) 2004 National Institute of Public Health, Tetsuro TANAKA All Rights Reserved.