

僕も、コンドームってあんまり使う習慣を身に付けるのも難しかったけれど、〇〇って結構トライしてみたらうまく行ったし、気持ち良かったですよ～！！もっとバリエーションを増やして、セックスライフを探求します！

■MC

すごい宣言ですね～！ また報告楽しみにしていますよ。

生だけが最高！ってわけでもないようだし、ホットでスケベなエッチはできそうですね。

最後に、この LIFEGUARD の感想のアンケートの記入もお願いします。始まる前に協力していただいたものと似ていますが、終わったあとの、この心の状態で書いていただけますようお願いします。

■MC

あと、今回お世話になった〇〇のマスター、〇〇さんにお礼を申し上げたいと思います。いつもコンドームを配ってくれたり、今回もイベントにご協力いただいて、出ありがとうございます！

■MC

それでは、これで LIFEGUARD を終了いたします。本日は、イベントへのご参加どうもありがとうございました。

## エンディング

(5分)

<BGM チェンジ>

Tr17: Chante Moore [This Moment Is Mine]

Tr18: Phil Collins [Can't Stop Loving You]

■MC

はい、約2時間のプログラムでしたが、参加していただいて、みなさんがセイファーセックスのバリエーションやテクニックを今まで以上に知れたと思ってもらえたら何よりです。最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。

今日のプログラムをここで振り返ってみますと、ミニ・レクチャーによるエイズ予防とセイファーセックスの基礎知識、皆さんのタイプ・性感帯といった身近な話からセイファーセックスのバリエーション、パネルゲームでのセイファーセックス実行のためのテクニック、コンドーム練習などをこなしてきました。

特に、テクニックという点では、去年に引き続き珍しい試みですが、楽しくできたのではないかと思います。終了後もスタッフと交流できるパーティータイムとして楽しんでいって下さいね。プログラム以外でも知りたいことなどがあれば、スタッフに質問してみてください。

ぜひ、今日のプログラムで感じたことを、実践のエッチのときに役立ててもらえれば、と思います。

▲アシスタント

No,

## イベント前・アンケート

【イベントがはじまる前にご記入をお願いします】

LIFEGUARD2003-2004をエイズや性感染症の予防に役立つよりよいプログラムにしていくため、みなさんに、参加前、参加後のアンケートをお願いしています。回答は無記名で、プライバシーは厳守されます。回答者の統一番号(右上)は、統計的に処理するためのものであり、個人を特定することはありませんので、ご了承くださいますようお願いいたします。 NPO法人アカー

1/今回のイベントは何で知りましたか? あてはまるものすべてにレをつけてください。

・チラシ・フライヤー

バーやショップで→どこの: \_\_\_\_\_

ダイレクトメールで→どこの: \_\_\_\_\_

・インターネット

ホームページ→どこの: \_\_\_\_\_

検索エンジン→どこの: \_\_\_\_\_

メールマガジン→どこの: \_\_\_\_\_

・ゲイ雑誌

バディ  薔薇族  G-men  サムソン

・その他

バーのマスターや客から聞いた  
→どこの: \_\_\_\_\_

友人から聞いた

その他 \_\_\_\_\_

2/今回のイベントに参加しようと思ったのは、どうしてですか? あてはまるものすべてにレをつけてください。

エイズについて知りたい

セックスについて知りたい

出会いのチャンスがあると思ったから

その他 \_\_\_\_\_

3/HIV感染の可能性のある体液はどれだと思いますか? あてはまるものすべてにレをつけてください。

血液  汗  膣分泌液  だ液

精液  涙  先走り液

4/HIV感染の可能性のある体の部分はどれだと思いますか? あてはまるものすべてにレをつけてください。

肛門の中  へそ  口の中

龟头  尿道口(おしっこの出る穴)

5/HIV感染の可能性のある行為はどれだと思いますか? あてはまるものすべてにレをつけてください。

舌をからめるキス(ディープ・キス) ※だ液だけ

コンドームなしで口内射精されたら

コンドームなしのペニスをなめたら(口内射精なし)

コンドームなしでペニスをなめられたら

コンドームなしで中出し(アナル=肛門の中で射精)されたら

コンドームなしでアナルにペニスを入れたら

★★★★★エイズの予防のとりくみに具体的に役立てるため、みなさんのセックスについてお聞きします。(ここでいうセックスとは、相互マスターベーション、フェラチオ=オーラルセックス、アナルセックス、膣(ちつ)性交のすべてを含みます。)★★★★★

6/これまでにセックスをしたことがありますか?

はい  いいえ(→14番へ)

↓

7/その相手の性別はつぎのどれですか?

すべて男性  どちらかというとな男性が多い

男女半々  どちらかというとな女性が多い

すべて女性(→14へ)

★★★これまでの男性とのセックスについてお聞きします★★★

8/これまでペニスをしゃぶったり、しゃぶられたりしたことはありますか?

はい  いいえ(→11番へ)

↓

9/ペニスをしゃぶられる時、コンドームなしで相手の口の中に出すことは、どれくらいありますか?

よくある  いつもコンドームを使う

ときどきある  その他

あまりない

まったくない

10/ペニスをしゃぶってあげる時、コンドームなしで相手から口内射精されることは、どれくらいありますか?

よくある  いつもコンドームを使う

ときどきある  その他

あまりない

まったくない

11 / これまでアナルセックスをしたことはありますか？

- はい                       いいえ (→14番へ)  
↓

12 / アナルセックスでタチのとき (=アナルにペニスを入れるとき) コンドームを使いますか？


- よく使う                       まったく使わない  
 ときどき使う                   タチの行為をしない  
 あまり使わない

13 / アナルセックスでネコ/ウケのとき (=アナルにペニスを入れられるとき) コンドームを使いますか？


- いつも使う  
 ときどき使う  
 あまり使わない  
 まったく使わない  
 ネコ/ウケの行為をしない

14 / あなたは、「コンドーム」や「セイファーセックス」についてどんなイメージを持っていますか。あてはまる★のところに○をつけてください。(セイファーセックスとはエイズを含む性感染症を予防するための安全なセックスを指します。)


①『コンドーム』を使ったセックスは…？



②『セイファーセックス』は…？



③『セイファーセックス』は？



15 / コンドームをつけずにフェラチオをするばあい、HIV感染をさけるテクニックを知っていますか？

- かなり知っている                   あまり知らない  
 ある程度知っている               まったく知らない

16 / 相手がコンドームを使わないで、アナルセックスをしようとしたら、それを止めるテクニックを知っていますか？

- かなり知っている  
 ある程度知っている  
 あまり知らない  
 まったく知らない

17 / あなたがコンドームなしでペニスをしゃぶってあげている時、相手に口内射精されるのをさけることができますか？

- いつもできると思う  
 ときどきできると思う  
 あまりできないと思う  
 絶対できないと思う

18 / あなたは、アナルセックスのときに、コンドームを使うことができますか？

- いつもできると思う  
 ときどきできると思う  
 あまりできないと思う  
 絶対できないと思う

19 / LIFEGUARDのチラシを見ましたか？

- はい                       いいえ (→21番へ)  
↓

20 / チラシの裏面 (マンガなど) を読みましたか？

- ほとんど読んだ                   あまり読んでいない  
 ある程度読んだ                   まったく読んでいない

21 / あなたの年齢はおいくつですか？

歳
---

22 / あなたの住んでいる都道府県はどちらですか？

都・道・府・県
---------

ご協力ありがとうございました

# イベント後・アンケート

No, \_\_\_\_\_

【イベントが終わってからご記入をお願いします】

1/今回のイベントで提供されたエイズの情報の量は？

- 多かった
- ちょうどよかった
- 少なかった

2/今回のイベントで提供されたエイズの情報の内容は？

- ほとんど知っていた
- 知っているものと知らないものがあった
- 初めて知るものが多かった

3/イベントの長さは？

- 長かった
- ちょうどよかった
- 短かった

4/このイベントは、エイズや性感染症の予防に役立つと思いましたが？

- かなり役に立つと思う
- ある程度役に立つと思う
- あまり役に立たないと思う
- まったく役に立たないと思う

5/イベントの中で、役に立ちそうなテクニックはありましたか？

- はい
- いいえ (→6番へ)



それは何ですか？

① \_\_\_\_\_

② \_\_\_\_\_

6/参加者の工夫や経験を聞いて参考になることはありましたか？

- かなりあった
- ある程度あった
- あまりなかった
- まったくなかった

7/今回のイベントでとりあげられたエイズについての話題を、友だちにも知らせてあげたいと思いましたが？

- はい
- いいえ
- その他(\_\_\_\_\_)

★このイベントが役立っているかどうかを知るために、以下では、イベント前のアンケートと同じことを質問していますが、どうぞご協力をお願いします。

8/HIV感染の可能性のある体液はどれだと思いますか？  
あてはまるものすべてにレをつけてください。

- 血液
- 汗
- 膣分泌液
- だ液
- 精液
- 涙
- 先走り液

9/HIV感染の可能性のある体の部分はどれだと思いますか？  
あてはまるものすべてにレをつけてください。


- 肛門の中
- ヘソ
- 口の中
- 亀頭
- 尿道口 (おしっこが出る穴)

10/HIV感染の可能性のある行為はどれだと思いますか？  
あてはまるものすべてにレをつけてください。


- 舌をからめるキス (ディープ・キス) ※だ液だけ
- コンドームなしで口内射精されたら
- コンドームなしのペニスをなめたら (口内射精なし)
- コンドームなしでペニスをなめられたら
- コンドームなしで中出し (アナル=肛門の中で射精) されたら
- コンドームなしでアナルにペニスを入れたら

11/あなたは、イベントに参加して「コンドーム」や「セイファーセックス」について、どんなイメージを持つようになりましたか？ あてはまる★のところに○をつけてください。(セイファーセックスとはエイズを含む性感染症を予防するための安全なセックスを指します。)


①『コンドーム』を使ったセックスは…？



②『セイファーセックス』は…？



③『セイファーセックス』は？



12/コンドームをつけずにフェラチオをするばあい、HIV感染をさけるテクニックを知っていますか？

- かなり知っている
- ある程度知っている
- あまり知らない
- まったく知らない

13/相手がコンドームを使わないで、アナルセックスをしようとしたら、それを止めるテクニックを知っていますか？

- かなり知っている
- ある程度知っている
- あまり知らない
- まったく知らない

14/あなたがコンドームなしでペニスをしゃぶってあげている時、相手に口内射精されるのをさけることができますか？

- いつもできると思う
- ときどきできると思う
- あまりできないと思う
- 絶対できないと思う

15/あなたは、アナルセックスのときに、コンドームを使うことができますか？

- いつもできると思う
- ときどきできると思う
- あまりできないと思う
- 絶対できないと思う

となりにつづく ↗

16/LIFEGUARDでは、将来的に、プログラムを改善するために、1ヵ月後にEメール（ない方は郵送/ファックス）でのアンケートをお願いしています（分量は今回と同じくらいです）。ご協力いただいた方には、500円の図書券または会場となったバーのワンドリンクチケットを謝礼としてさしあげます。

①1ヵ月後のアンケートにぜひご協力をお願いします。

- はい
- いいえ



②以下にご記入をお願いします。

お名前（ハンドルネーム可） [ ]

Eメールアドレス（ない方はFAX番号か郵送先ご住所） [ ]

→郵送の場合＝差出人名（封筒の裏書）を選んで下さい。

- NPO法人アカー
- 永田雅司
- 無記名

→FAXの場合＝何か配慮が必要でしたらご記入ください。

③どのような条件だったら協力しやすくなりますか？あてはまるものにレをつけてください。（レは3つまで）

- 簡単に答えられる質問であること
- 回答するのに時間がかからないこと  
→（\_\_\_\_\_）分以内なら答えやすい
- もっと魅力的な謝礼であること  
→金額（\_\_\_\_\_）円以上なら答えてもよい  
→お金以外で何がよい（\_\_\_\_\_）
- 個人情報がしっかり守られること
- 口頭（電話やインタビュー等）で答えられること
- その他（\_\_\_\_\_）

17/本日のLIFEGUARDについての感想やスタッフへのメッセージなどありましたら、ご記入ください。

# 1ヶ月後・アンケート

No. 

★このイベントが役立っているかどうかを知るために、以下では、前のアンケートと同じことを質問しています。ご協力をお願いします。

## 1 HIV感染の可能性のある体液はどれだと思いますか？ (いくつでも)

- 血液      汗      膣分泌液  
だ液      精液      涙  
先走り液

## 2 HIV感染の可能性のある体の部分は何だと思いますか？ (いくつでも)

- 肛門の中      へそ      口の中  
亀頭      尿道口(おしっこが出る穴)

## 3 HIV感染の可能性のある行為は何だと思いますか？ (いくつでも)

- 舌をからめるキス(ディーブ・キス)※だ液だけ  
コンドームなしで口内射精されたら  
コンドームなしでペニスをなめたら  
     (口内射精なし)  
コンドームなしでペニスをなめられたら  
コンドームなしで中出し(アナル(=肛門)の中で射精)されたら  
コンドームなしでアナルにペニスを入れたら

★エイズの予防のとりくみに具体的に役立つため、みなさんの性行為(セックス)についてお聞きします。(ここでいうセックスとは、相互マスターベーション、フェラチオ(オーラルセックス)、アナルセックス、膣(ちつ)性交のすべてを含みます。)

## 4 過去1ヶ月間にセックスをしましたか？

- はい(→5へ)      いいえ(→12へ)

↓

## 5 その相手の性別はつぎのどれですか？

- すべて男性  
どちらかというとな男性が多い  
男女半々  
どちらかというとな女性が多い  
すべて女性(→12へ)

★これからは、過去1ヶ月間の男性とのセックスについてお聞きします。

## 6 過去1ヶ月間に、ペニスをしゃぶったり、しゃぶられたりしたことはありましたか？

- はい      いいえ(→9へ)

↓

## 7 過去1ヶ月間に、ペニスをしゃぶられる時、コンドームなしで相手の口の中に出すことは、どれくらいありましたか？

- よくある  
ときどきある  
あまりない  
まったくない  
いつもコンドームを使う  
その他

## 8 過去1ヶ月間に、ペニスをしゃぶってあげる時、コンドームなしで相手から口内射精されることは、どれくらいありましたか？

- よくある  
ときどきある  
あまりない  
まったくない  
いつもコンドームを使う  
その他

## 9 過去1ヶ月間に、アナルセックスをしましたか？

- はい      いいえ(→12へ)

↓

## 10 過去1ヶ月間に、アナルセックスでタチのとき(=アナルにペニスを入れるとき)コンドームを使いましたか？

- よく使う  
ときどき使う  
あまり使わない  
まったく使わない  
タチの行為をしない

## 11 過去1ヶ月間に、アナルセックスでネコ/ウケのとき(=アナルにペニスを入れられるとき)コンドームを使いましたか？

- いつも使う  
ときどき使う  
あまり使わない  
まったく使わない  
ネコ/ウケの行為をしない

(→裏へ)

**12** あなたは、「コンドーム」や「セィファーセックス」について、LIFEGUARD に参加して、どんなイメージを持つようになりましたか？どんなイメージを持っていますか？ あてはまる★のところに○をつけてください。（セィファーセックスとは、エイズをきむ性感染症を予防するための安全なセックスを指します。）

①コンドームを使ったセックスは？

とてもHな 感じがする						まったくHな 感じがしない
★	★	★	★	★	★	★
1	2	3	4	5	6	

②セィファーセックスは？

とても 気持ちよい						まったく 気持ちよくない
★	★	★	★	★	★	★
1	2	3	4	5	6	

③セィファーセックスは？

いろいろな やりかたがある						やりかたが 決まっている
★	★	★	★	★	★	★
1	2	3	4	5	6	

**13** コンドームをつけずにフェラチオするばあい、HIV感染をさけるテクニックを知っていますか？

- かなり知っている  
 ある程度知っている  
 あまり知らない  
 まったく知らない

**14** 相手がコンドームを使わないで、アナルセックスをしようとしたら、それを止めるテクニックを知っていますか？

- かなり知っている  
 ある程度知っている  
 あまり知らない  
 まったく知らない

**15** あなたがコンドームなしでペニスをしやぶってあげている時、相手に口内射精されるのをさけることができますか？

- いつもできると思う  
 ときどきできると思う  
 あまりできないと思う  
 絶対できないと思う

**16** あなたは、アナルセックスのときに、コンドームを使うことができますか？

- いつもできると思う  
 ときどきできると思う  
 あまりできないと思う  
 絶対できないと思う

**17** このイベントは、エイズや性感染症の予防に役立ちましたか？

- かなり役に立った  
 ある程度役に立った  
 あまり役に立たなかった  
 まったく役に立たなかった

**18** このイベントのどんなところが、役に立ちましたか？また役に立たなかったのはどんなところですか？

①役に立ったところ

②役に立たなかったところ

## 同性愛者等のHIV感染リスク要因に 基づく予防介入プログラムの開発 および効果に関する研究

研究成果発表会(H15年度報告)

主任研究者 大石敏寛

(特定非営利活動法人 動くゲイとレズビアンの会)



### 背景

1. 男性同性間性的接触の占める割合が高い  
平成14年度 HIV感染者 53.6%  
エイズ患者 27.3%
2. 大都市圏以外でも感染が増加傾向
3. 同性愛者を対象とした施策を実施している自治体は1割に満たない(平成12年、前研究班)

同性間感染は増加しているにもかかわらず  
介入未実施地域はいまだに多い



## 本研究班の目的

介入未実施地域を含めた全国各地に  
予防啓発を実施・普及する

- 1. 同性愛者の集まる商業施設等を利用したHIV予防啓発手法の開発・実施・効果評価を行う**  
⇒全国の小中規模都市においても存在する商業施設(バー等)を、第一段階の介入空間として着目した。  
(研究1:予防啓発手法の開発に関する研究、研究2:予防啓発手法の評価に関する研究)
- 2. NGO・行政連携により同性間個別施策を全国各地で推進する**  
⇒同性間個別施策を推進するためにNGOと行政が連携するうえでのモデルを複数つくる。  
(研究3 NGO-行政連携についての研究)

## 本年度の成果

**研究1 予防啓発手法の開発に関する研究**

## 研究1 予防啓発手法の開発についての研究～概要～

- ①小グループレベル（小規模な集団への働きかけ）
  - ・バー空間に適したワークショップ型プログラム「ライフガード」を開発
  - ・札幌、東京近郊、松山の3地域（バー14店舗、公共施設1会場）でプレ介入を実施（307名参加・2月22日現在13回実施）
- ②コミュニティレベル（共通の経験を有する大規模な集団への働きかけ）
  - ・マンガを活用した啓発資材を開発し、プレ介入として全国各地の商業施設等で配布（約190箇所・30,000部）
- ③個人レベル（1対1への働きかけ）
  - ・フリーダイヤルの電話相談を用いた介入「STD情報ライン」の実施
  - ・インターネットを活用した介入「STD情報ページ」の実施

### ①小グループレベル啓発手法の開発

#### 1 バーを介入空間として選んだ理由（先行研究）

- ①リスク行動の減少には、HIV予防に関するコミュニティ（＝友人や周囲の人）の規範が重要
- ↓
- ②新しいコミュニティ規範の導入のために、小都市におけるゲイ・バーにおいてオピニオンリーダー型の介入を実施
- ↓
- ③リスク行動の減少

～介入の効果は普及理論diffusion theoryにもとづき革新的な行動を採用した流行発信者によって可能になったと考えられる～

【J.Kelly（1992）】

## ①小グループレベル啓発手法の開発

### 2 日本においてバーを介入空間として選んだ理由

- ① 介入未実施地域を含めた全国各地に分布していること（全国43都道府県に約1200軒）
- ② 介入に曝された顧客を通じて、コミュニティ規範が広く普及していくこと（普及理論diffusion theory）
- ③ 同性愛者等のプライバシーが守られやすい空間であること
- ④ 介入を通じて経営者や従業員が啓発されることにより、その後も継続的に啓発や情報の発信拠点として機能しうること

小中都市においても介入が実施できる可能性をもつ空間である  
＝ 介入未実施地域での手がかりとなりうる

## ①小グループレベル啓発手法の開発

### 3 バーにおける協力関係の構築


- ① 訪問、電話・メールによる定期的なコミュニケーション
- ② エイズにとどまらない同性愛者のライフスタイルの問題を扱うプログラムとして理解してもらう
- ③ 経営者に加え顧客との関係性づくり
- ④ バーのネットワークによる紹介  
～店舗から店舗への紹介⇒協力店舗の拡大～



バーでの開催  
前年度 5店舗  
今年度 14店舗（2.8倍増）

### ①小グループレベル啓発手法の開発

#### 4 プログラムの開発 リスクアセスメントの結果を反映して開発



### ①小グループレベル啓発手法の開発

#### 4 プログラムの開発

介入領域		プログラム	時間
●プレ・テスト			
知識	変容意図	ミニ・レクチャー（感染経路、予防方法の解説）	20分
魅力・快感	周囲規範	GAY SEXバリエーション（セックスのバリエーションを出し合い、予防方法を検討）	30分
主張スキル	周囲規範	スキル・シェアリング（12の場面設定を用意し、対処方法を出し合う。アドバイス紹介）	30分
魅力・快感		コンドーム・装着ゲーム（手と口によってコンドームの装着を実演）	5分
魅力・快感		コンドーム展示（9種類のコンドームを展示）	展示
●ポスト・テスト + フォロー・テスト登録（1ヵ月後）			

- ポイント
- ①顧客同士の会話を前提とする空間のため相互作用を生みやすい
  - ②出会いの場であるため、リアリティのあるストーリー／シナリオが可能

①小グループレベル啓発手法の開発

5 ワークショップ型プログラム  
「ライフガード」の開催



- ①開催地：札幌（n=52）  
東京近郊（n=179）  
松山（n=76）
- ②実施回数：計15回（13回まで）
- ③参加総数：307名  
（前年比120%超）
- ④行政と連携：東京都、川崎市

①小グループレベル啓発手法の開発


5 ワークショップ「ライフガード」の開催一覧

実施日	会場	人数	実施日	会場	人数
11/23	松山・バーA	36	1/18	東京・バーD	27
11/24	松山・バーB	21	1/25	浦和・バーA	33
12/6	札幌・バーA	23	2/1	東京・バーE	32
12/7	札幌・バーB	29	2/11	松山・バーC	19
12/13	東京・バーA	9	2/21	東京・バーF	33
12/21	東京・バーB	10	2/28	川崎・公共施設	未
12/23	東京・バーC	12	3/14	札幌・バーC	未
1/17	八王子・バーA	23	計（13回まで）		307

## 本年度の成果

### 研究2 予防啓発手法の評価に関する研究

#### 研究2 予防啓発手法の効果評価～小グループレベル～




フォローテスト：終了後1ヵ月後のアンケート協力を依頼（E-mailや郵送）  
回収率上昇のためのアンケート調査も実施  
解析：3群間の平均の差の検定

### 効果評価①～知識 感染体液


(\*\*\* p<.001, \*\* p<.01, \* p<.05, † p<0.1)

(1=正答, 0=誤答)



### 効果評価②～魅力・快感 セイファーセックスへの態度・イメージ


(6点式リカートスケール 6=とてもそう思う ~ 1=まったくそう思わない)



### 効果評価③～主張スキル：効果評価④～自己効力感


(4=かなり知っている～1=まったく知らない 4点式リカートスケール 4=いつもできると思う～1=絶対できないと思う)

リスクを避ける



オーラルセックス アナルセックス


リスクを避けられる



口内射精避けられる アナルセックスでコンドーム使用


### 効果評価⑤～満足度：効果評価⑥～効果の普及

エイズの予防に役立つと思いますか



□かなり役に立つ ■ある程度役立つ  
□あまり役立たない

イベントで知ったエイズ的话题を  
友達に知らせたい




□はい ■いいえ □その他



## 研究2 予防啓発手法の効果評価～コミュニティレベル～

★評価手法～バー実施のアンケートからチラシ読了群/非読了群にわけ、2群間の平均の差を検定

(4=かなり知っている～1=まったく知らない 4点式リカートスケール 4=いつもできると思う～1=絶対できないと思う)



## 研究2 予防啓発手法の効果評価～個人レベル～

### 1 「STD情報ライン」の評価(N=249)

- (1)方法 相談記録をコード化し分析
- (2)属性 20～34歳 65.1%
- (3)相談主訴(%)

1	ペニスに症状	16.7
2	感染経路・方法	15.7
3	病院の選び方・紹介	13.6

#### (4)相談疾病(%)

1	HIV/AIDS	26.9
2	尖圭コンジローマ	13.7
3	梅毒	6.4

- ★介入におけるHIV以外の情報提供の必要性
- ★35歳以上へのアクセス向上の必要性

### 2 「STD情報ページ」の評価(N=1002)

- (1)方法 WEB上でのアンケートをもとに分析
- (2)属性 20～34歳 64.9%
- (3)相談主訴(%)

1	症状を知りたい	55.6
2	感染行為を知りたい	41.8
3	感染回避方法	41.8

#### (4)相談疾病(%)

1	HIV/AIDS	62.3
2	梅毒	28.1
3	B型肝炎	21.8

- (5)利用評価  
ページを開いた目的を達成した 85.5%

## 本年度の成果

### 研究3 NGO－行政連携に関する研究

#### 研究3 NGO－行政連携～目的・方法～

##### ①目的

前研究班における成果、研究1、研究2で開発した予防介入プログラムおよびその他の同性間対策を、各地の自治体に普及する

NGO－行政連携により、同性間個別施策を全国各地で普及・推進するモデルを複数構築する

##### ②方法

予防啓発介入プログラム等を各地の自治体に普及し、自治体と連携して実施する試みを通じ、そのプロセスを記録化・分析し、提言する

⇒施策の推進状況、実施の阻害要因、当事者やNGOとの連携に関する状況や課題など

### 研究3 NGO－行政連携～結果～

#### ①自治体の同性間個別施策およびNGO連携に関する調査実施 同性間施策推進におけるNGO連携の阻害要因や課題（分析中）

- ・セクシュアリティや同性愛についての理解や知識の不足
  - ・地域の同性愛者とアクセスするための方法論の不足 など
- ⇒課題：分析結果を反映した行政・専門家向けの研修プログラムを開発する

#### 研修プログラムのプレ実施

愛知県－名古屋市、静岡県、松山市、札幌市、広島県

### 研究3 NGO－行政連携～結果～

#### ②予防啓発事業の連携の試み（のべ19自治体）

- ・ワークショップ型介入～ソフト提供、運営協力、後援、共同実施  
札幌市、東京都、川崎市
- ・自治体保健医療サービス情報の提供～ワークショップ等での地域の保健医療検査情報や資料配布  
松山市・札幌市・東京都・川崎市
- ・啓発資材～提供、開発・作成のための情報提供や共同制作  
鹿児島、静岡県、神戸市、神奈川県、埼玉県、札幌市
- ・研修会等～同性間予防啓発介入に関する研修、検討等の機会を共同実施  
愛知県－名古屋市、静岡県、松山市、札幌市、広島県

同性間個別施策～普及・啓発・介入の共同実施などについて  
これまで以上に幅広い連携の試みに取組み、そのプロセスを  
記録化した

## 本年度のまとめ

- ① 介入未実施地域を含めた全国各地に予防啓発を普及する方途を研究するため、全国の小中規模都市においても存在する商業施設(バー等)を、第一段階の介入空間として着目した
- ② Kellyらの「普及理論」にもとづきバーの空間に適したワークショップを開発し、14店舗でプレ介入及び効果評価を実施した
- ③ 効果評価の結果、介入の効果が有意に認められた。また、普及理論に基づき、小中規模都市においても広く普及できる可能性が明らかになった
- ④ NGO－行政連携ではのべ19自治体と連携して介入を試み、新規の自治体を含めて今後の介入プログラムの実施に向けて、研修の共同実施やニーズ調査、啓発方法論についての協議や意見交換を行った

## 3年間の研究計画

	研究1 啓発手法の開発	研究2 啓発手法の効果評価	研究3 NGO－行政連携
1年目	① インターネット／フリーダイヤル ② マンガ啓発資料の開発 ③ ワークショップの開催プレ介入3地域・15ヶ所	効果評価の実施	① 同性間施策およびNGO連携に関する調査実施 ② 予防啓発事業連携
2年目	① 1年目のプレ介入の分析 ② 普及理論にもとづいたオピニオンリーダー型介入の開発およびプレ実施 ③ 3地域以外のバーとの関係性づくり		効果評価の実施 普及理論の評価
3年目	① 7都市で本介入を実施(ワークショップ、オピニオンリーダー、マンガ啓発資料)	効果評価の実施	NGO－行政連携のプロセス記録を元に、個別施策層対策における複数のNGO－行政連携モデルを提示