

## 児童早期の発達

### L2 中枢神経系の早期疾患

なし 内分泌性 発作 その他の脳障害 慢性身体疾患 不詳/不明

### L3 妊娠/分娩の病歴異常

なし あり 不詳/不明

### L4 姿勢運動または言語発達遅滞

なし あり 不詳/不明

### L5 神経性習癖の有無

なし あり 不詳/不明

## 児童期の行動異常

### a) AD/HD

#### L6 不注意

なし あり 不詳/不明

#### L7 多動

なし あり 不詳/不明

#### L8 衝動性

なし あり 不詳/不明

### b) 自閉性障害

#### L9 社会性の障害（他者との交流における特異性）

なし あり 不詳/不明

#### L10 コミュニケーションの障害（言語的、非言語的表現における特異性）

なし あり 不詳/不明

#### L11 想像力の障害（こだわりの有無）

なし あり 不詳/不明

## 小児期の虐待とその種類

### L12 Neglect

なし あり 不詳/不明

### L13 心理的虐待

なし あり 不詳/不明

### L14 身体的虐待

なし あり 不詳/不明

### L16 性的虐待

なし あり 不詳/不明

## 家庭環境

### L17 生育家庭の経済状況

上 中 下

### L18 両親との死別

母親の死 父親の死 なし 不詳

### L19 15歳までの生物学的父親/母親の欠損（死別を除く）

なし あり 不詳/不明

### L20 15歳までの主な養育者

両親 片親 片親、継親 祖父母、親族 里親 親族  
施設 不詳/不明

### L21 両親の離別（1年以上）

なし 0～5歳 5～15歳 2つの期間 不詳/不明

### L22 両親からの分離（1年以上）

なし 0～5歳 5～15歳 2つの期間 不詳/不明

### L23, 家庭内暴力

なし あり 不詳/不明

### L24 家庭内の暴力を伴わない敵意

なし あり 不詳/不明

### L25 児童相談所の介入

なし あり 不詳/不明

**L26 児童相談所での保護**

なし  0～5歳  5～15歳  2つの期間  不詳/不明

**学歴と成績**

**L27 入院前最終到達学歴**

就学なし  小学校卒業なし  小学校卒業  中学校卒業  高校卒業  
 専門/職業学校  大学卒業  大学院修了  その他  不詳/不明

**L28 小学校での成績**

上  中  下  不詳/不明

**L29 中学校での成績**

上  中  下  不詳/不明

**L30 高校での成績**

上  中  下  不詳/不明

**職歴**

**L31 就業歴**

該当なし  フルタイム職業  パートタイム職業  季節職業  家業  
 主婦/夫  専門教育中/再訓練中  保護雇用  無職  就業不能  その他  
 不詳/不明

**結婚歴**

**L32 結婚歴**

未婚  結婚 離別 ( 死別  離婚  その他)  再婚

**社会生活**

**L33 小学校での不適応**

なし  あり  不詳/不明

**L34 中学校での不適応**

なし  あり  不詳/不明

**L35 15歳までの非行**

なし  あり  不詳/不明

**L36 15歳までの学校内での問題行動**

なし  軽度あり  中等度あり  重度あり  不詳/不明

**L37 20歳前のアルコール乱用**

なし  あり  不詳/不明

**L38 20歳前の薬物乱用**

なし  あり  不詳/不明

**L39 所属宗教**

あり  無信仰 (無申告)  不詳/不明

**③[現在の社会環境の情報]**

**S1 犯行前の住居**

なし(ホームレス)  持ち家、単身  持ち家、同居人あり  借家、単身  
 借家、同居人あり  精神科病院  一般病院  救護施設  その他の施設  
 不詳/不明

**S2 犯行前の同居人**

なし  配偶者  内縁関係  父親  父親  母親  同胞  祖父  祖母  
 子  知人  その他  不詳/不明

**S3 入院/移送/逮捕前職業**

該当なし  フルタイム職業  パートタイム職業  季節職業  家業  
 主婦/夫  専門教育中/再訓練中  保護雇用  無職  就業不能  その他  
 不詳/不明

**S4 犯行前の収入**

なし  自身の収入  年金等  親族に依存  知人に依存  生活保護  
 その他  不詳/不明

**S5 労働能力の判断**

- 労働なし 問題なし 恒常的な労働なし、頻回の転職 十分な稼働能なし  
十分な稼働動機なし 不詳/不明

**S6 ケースワーカーの介入**

- なし あり 不詳/不明

**S7 保健師の介入**

- なし あり 不詳/不明

**S8 社会復帰調整官の介入**

- なし あり 不詳/不明

**S9 民生委員の介入**

- なし あり 不詳/不明

**④[犯罪歴・矯正処遇歴]**

**当該犯行**

**C1 主犯罪**

- 殺人、謀殺 傷害 強姦 強盗 放火 恐喝、誘拐  
窃盗 詐欺 その他 その他性犯罪

**C2 第2犯罪**

- 殺人、謀殺 傷害 強姦 強盗 放火 恐喝、誘拐  
窃盗 詐欺 その他 その他性犯罪

**C3 第3犯罪**

- 殺人、謀殺 傷害 強姦 強盗 放火 恐喝、誘拐  
窃盗 詐欺 その他 その他性犯罪

**C2 被害者数**

- \_\_\_\_\_人 不詳/不明

**C3 被害者の性別**

- 男 女 不詳/不明

**C4 主要被害者**

- 母親 父親 同胞 配偶者 子 ほかの親族 内縁関係のパートナー  
一時的パートナー 知人/友人 未知の 会社、組織、国家 不詳/不明

**C5 傷害程度**

- 殺人 致命的 重傷 軽傷 傷害なし 不詳/不明

**C5 被害額**

- なし/該当なし 10万円まで 10万～50万円 50万～100万円  
100万円以上 不詳/不明

**C6 初犯か累犯か**

- 初犯 累犯 不詳/不明

**C7 単独犯か共犯か**

- 単独犯 共犯 不詳/不明

**犯行時の心理社会的ストレス**

**C9 配偶者**

- なし 軽度 中等度 重度

**C10 親子**

- なし 軽度 中等度 重度

**C11 他の対人事件**

- なし 軽度 中等度 重度

**C12 職業**

- なし 軽度 中等度 重度

**C13 家計**

- なし 軽度 中等度 重度

**C14 法律関係（たとえば係争、切迫した拘留）**

- なし 軽度 中等度 重度

**C15 発達（たとえば思春期、閉経）**

- なし 軽度 中等度 重度

**C16 身体病、事故**

- なし 軽度 中等度 重度

**C17 社会的孤立**

- なし 軽度 中等度 重度

**C18 犯行時アルコール（BAK測定濃度）**

- 0.5以下 0.5～1 1～2 2～3 3～4 4以上  
不詳/不明

**C19 犯行時薬物/医薬品**

- なし ヘロイン 幻覚剤 覚せい剤 コカイン 鎮痛剤  
鎮静剤/睡眠薬 ほか 不詳/不明

**C20 犯罪の実行**

- 突発的 計画的 不詳/不明

**C21 GAF(犯行時)**

**犯罪歴**

**前科前歴**

**C22 前科前歴**

- なし あり

**C23 成人刑法**

- 拘留なし 拘留、起訴なし 拘留、起訴あり 拘留、起訴あり有罪

**C24 少年法**

- 補導歴なし 拘留、審判あり有罪 不詳/不明

**C25 初回非行の年齢**

\_\_\_\_才

**C26 これまでの犯罪回数**

- なし 1回 2~5回 6~10回 10回以上 不詳/不明

**C27 これまでの犯罪の内容**

- なし 殺人、謀殺 傷害 強姦 強盗 誘拐 強盗(銀行、商店) 強盗(スリ)  
放火(教会、家、倉庫) 放火(ゴミ箱) 武器を使った脅迫 脅迫(言葉での脅し)  
大窃盗\*(車尼棒、盗品の所有を含む) 重大な器物破損\*(公共および私有物)  
不法侵入(押し入り強盗) 不法侵入 小窃盗\*(盗品の所有を含む) 軽微な器物破損\*(公共物を含む)  
詐欺(強要、横領) 詐欺(小切手偽造、姓名詐称) 武器の不法所持 売春の斡旋、美人局 麻薬をやって運転する 危険な運転、飲酒運転 公務執行妨害(逮捕への抵抗を含む) 騒乱罪 犯意を装う 公然猥褻 その他性犯罪 不詳/不明

**C28 刑務所収監通算期間**

- 0~1月 1~6月 6月~1年 1~2年 3~5年 5年以上  
不詳/不明

**C29 矯正処遇歴**

- 0~1月 1~6月 6月~1年 1~2年 3~5年 5年以上  
不詳/不明

**保護観察歴**

**C30 仮釈放での遵守事項違反等**

- 該当なし なし あり(義務違反 新たな犯行) 不詳/不明

**犯罪に関連した精神疾患病歴**

**C31 犯罪に関連した入院歴**

- なし 1回 2回 3回以上 不詳/不明

**C32 入院時診断**

- 不詳/不明 人格障害 統合失調症 躁うつ病 物質乱用  
精神遅滞 器質性精神病 その他

ICD-10

DSM-IV

**⑤[薬物及びアルコール歴(物質使用歴)]**

**D1 薬物問題**

- なし 不詳/不明 あり

**D2 使用薬物1**

- 覚せい剤 コカイン ヘロイン 有機溶剤 鎮静剤/睡眠薬  
鎮痛剤 ほか

使用薬物1について

- D3 初回使用 \_\_\_\_\_才  
D4 乱用 \_\_\_\_\_才  
D5 急性中毒状態 \_\_\_\_\_才  
D6 依存 \_\_\_\_\_才  
D7 精神病状態 \_\_\_\_\_才  
D8 薬物関連問題 \_\_\_\_\_才

D9 使用薬物2

- 覚せい剤 コカイン ヘロイン 有機溶剤 鎮静剤/睡眠薬  
鎮痛剤 ほか

使用薬物2について

- D10 初回使用 \_\_\_\_\_才  
D11 乱用 \_\_\_\_\_才  
D12 急性中毒状態 \_\_\_\_\_才  
D13 依存 \_\_\_\_\_才  
D14 精神病状態 \_\_\_\_\_才  
D15 薬物関連問題 \_\_\_\_\_才

アルコール(初飲 乱用 酩酊 依存 身体依存 精神病状態 関連問題)

D16 アルコール問題

- なし乃至心理社会的悪結果を伴わぬ正常摂取 心理社会的悪結果を伴う定期的乱用  
依存症 病的酩酊で禁酒できず 不詳/不明

- D17 初飲 \_\_\_\_\_才  
D18 乱用 \_\_\_\_\_才  
D19 ブラックアウト \_\_\_\_\_才  
D20 急性中毒状態 \_\_\_\_\_才  
D21 依存 \_\_\_\_\_才  
D22 精神病状態 \_\_\_\_\_才  
D23 アルコール関連問題 \_\_\_\_\_才

アルコール犯罪

D24 開始年

- なし 16以下 16-20 不詳

D25 消費期間(年)

- なし 2年まで 5年まで 5年以上 不詳

D26 1日消費量(g)

- なし 40以下 40-60 60以上 不詳

D27 前科前歴時のアルコール使用

- なし あり 不詳

D28 当該犯行時のアルコール使用

- なし あり 不詳

⑥ [性的発達歴 sexual history]

P1 性交のパートナー

- なし あり(安定的) あり(不特定) 不詳/不明

P2 同性愛

- なし あり(安定的) あり(不特定) 不詳/不明

P3 売淫

- なし あり 不詳/不明

P4 パラフィリア

- なし あり 不詳/不明

P5 性機能障害

- なし あり 不詳/不明

P6 児童期の性的虐待

- なし あり 不詳/不明

⑦[身体疾患の病歴]

P1 頭蓋-脳外傷

なし あり 不詳/不明

P2 妊娠/分娩

なし乃至流産 現在妊娠中(またはその疑い) 最近半年以内の分娩(または流産)  
不詳/不明

P3 その他の身体障害

なし 軽度 中等度 重度 不詳/不明

⑧[精神科現病歴関連]

精神科現病歴関連(現病歴、治療歴)

法廷提出の精神医学的診断

M1 法廷提出の精神医学的診断

なし  
あり

入院時精神医学的診断(ICD-10)

入院時身体的/神経学的診断(ICD-10)

入院時精神医学的診断(DSM-IV)

M2 入院前の主要な状態

精神科疾患の初回発現 長期間持続的な状態 慢性状態の悪化  
以前の類似病像の再発 以前の類似病像からの明白な逸脱 不詳/不明

M3 判定

なし  
あり

1 軸 判決時精神病理

1a 急性異常

1b 人格的異常

2 軸 病歴

11a 精神医学的疾患

11b 身体的/神経学的疾患

3 軸 生活発達上の深刻な被害

4 軸 早期の非行

5 軸 犯罪状況

Va 客観的精神病理学的異常

Vb 他の影響因子(アルコール、葛藤)

Vc 精神機能異常

M4 判決された精神障害

病的精神障害 深刻な意識障害 精神薄弱 他の重大な精神変質

M5 重要な付加要因

該当なし アルコール 薬物/医薬品 際立った性格 痴呆  
児童期の脳外傷 発達障害 消耗、過労、低血糖

M6 弁識能力

正常 軽度障害 著しく障害 完全に喪失 判定なし

M7 制御能力

正常 軽度障害 著しく障害 完全に喪失 判定なし

M8 責任能力

心神耗弱 心神喪失

精神科的病歴

M9 早期の精神科的/精神身体的入院治療(Pubic 前)

なし 1~2回 3~5回 6~10回 10回以上 不詳/不明

M10 主な入院理由

統合失調症 躁うつ病 物質乱用 行為障害 人格障害 精神遅滞  
器質性精神病 てんかん 自殺企図 発達障害 その他 ADHD 不詳/不明

M11 早期(Pubic 前)の精神科的外来治療

なし あり 不詳/不明

**M12 早期(Pubic 前)の外來精神科治療の理由**

統合失調症 躁うつ病 物質乱用 行為障害 人格障害 精神遅滞  
器質性精神病 てんかん 自殺企図 発達障害 その他 ADHD 不詳/不明

**M13 後期の精神科入院治療(Pubic 後)**

なし 1~2回 3~5回 6~10回 10回以上 不詳/不明

**M14 後期(Pubic 後)の主な入院理由**

統合失調症 躁うつ病 物質乱用 行為障害 人格障害 精神遅滞  
器質性精神病 てんかん 自殺企図 発達障害 その他 ADHD 不詳/不明

**M15 後期(Pubic 後)の精神科的外來治療**

なし あり 不詳/不明

**M16 後期(Pubic 後)の外來精神科治療の理由**

統合失調症 躁うつ病 物質乱用 行為障害 人格障害 精神遅滞  
器質性精神病 てんかん 自殺企図 発達障害 その他 ADHD 不詳/不明

**M17 最後の精神科入院治療**

なし  
あり

**M18 最終退院時の方法**

脱走  
医師の助言に反する退院  
不十分な協力/動機付けのまま早期退院  
計画的退院  
その他

**M19 精神科退院から犯行までの期間**

1週間まで 1~4週 4週~3月 3~6月 6月~1年 1~5年  
5年以上 不明/不詳

**M20 今回の発病/再発の開始から犯行までの期間**

2日以内 2日~1週 1~4週 4週~3月 3~6月 6月~1年  
1年以上 不明/不詳

**M21 心理教育を含む精神療法的前治療**

なし あり

**M22 期間**

1週間まで 1~4週 4週~3月 3~6月 6月~1年 1~5年  
5年以上 不明/不詳

**M23 方法**

心理教育 （認知）行動療法 分析的治療 カウンセリング  
その他の心理療法 不明 不詳/不明

**M24 今回の発病/再発の前治療（場所）**

なし あり  
外来  
入院

**M25 これまでの医療保護入院歴**

なし 1回 2回 3回以上 不詳/不明

**M26 主な診断**

不詳/不明 人格障害 統合失調症 躁うつ病 物質乱用  
精神遅滞 器質性精神病 その他

ICD-10

DSM-IV

**M27 これまでの措置入院歴**

なし 1回 2回 3回以上 不詳/不明

**M28 主な診断**

不詳/不明 人格障害 統合失調症 躁うつ病 物質乱用  
精神遅滞 器質性精神病 その他

ICD-10

DSM-IV

診察時現症

精神医学的所見

M29 意識障害	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 軽度	<input type="checkbox"/> 中等度	<input type="checkbox"/> 重度
M30 見当識障害	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 軽度	<input type="checkbox"/> 中等度	<input type="checkbox"/> 重度
M31 注意障害	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 軽度	<input type="checkbox"/> 中等度	<input type="checkbox"/> 重度
M32 思考形式の障害	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 軽度	<input type="checkbox"/> 中等度	<input type="checkbox"/> 重度
M33 奔逸と心迫	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 軽度	<input type="checkbox"/> 中等度	<input type="checkbox"/> 重度
M34 妄想	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 軽度	<input type="checkbox"/> 中等度	<input type="checkbox"/> 重度
M35 異常知覚	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 軽度	<input type="checkbox"/> 中等度	<input type="checkbox"/> 重度
M36 自我障害	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 軽度	<input type="checkbox"/> 中等度	<input type="checkbox"/> 重度
M37 感情障害	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 軽度	<input type="checkbox"/> 中等度	<input type="checkbox"/> 重度
M38 欲動・精神運動障害	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 軽度	<input type="checkbox"/> 中等度	<input type="checkbox"/> 重度
M39 自殺傾向	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 軽度	<input type="checkbox"/> 中等度	<input type="checkbox"/> 重度
M40 自律神経障害	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 軽度	<input type="checkbox"/> 中等度	<input type="checkbox"/> 重度



確実ないし強く疑われる場合チェックすること

- 1 感覚 知覚
- 1) 感覚の変容
- ①  知覚過敏
  - ②  知覚不全
  - ③  小視症 大視症
  - ④  疎隔 現実感喪失 離人感
  - ⑤  既視感 未視感
  - ⑥  その他
- 2) 錯覚
- ①  不注意錯覚
  - ②  感情錯覚
  - ③  パレイトリ
  - ④  その他
- 3) 幻覚
- ①  幻視
  - ②  幻聴
  - ③  幻味
  - ④  幻臭
  - ⑤  体感幻覚  
特殊な幻覚（入眠時幻覚など）
  - ⑥  その他
- 4)  偽幻覚（仮性幻覚）
- 2 時間感覚
- 1)  うつ病による時間感覚異常
  - 2)  分裂病による時間感覚異常
  - 3)  その他
- 3 思考
- 1) 思考の流れの障害
- ①  観念奔逸
  - ②  思考制止（抑制）
  - ③  迂遠
  - ④  保続
  - ⑤  思考途絶
- 2) 思考内容の障害
- ①  強迫観念
  - ②  支配観念
- ③  妄想（妄想）
- ④  恐怖症（単一 社会 空間 恐怖）
- ⑤  空想虚言
- 3) 思考形式（思路）の障害
- ①  思考の貧困
  - ②  連合弛緩
- 4 会話
- 1)  言語新作
  - 2)  語唱
  - 3)  独語
  - 4)  空笑
  - 5)  無言症（緘黙）
  - 6)  反響言語
  - 7)  多弁
  - 8)  的はずれ（てまかせ）応答
  - 9)  吃音
  - 10)  作話
  - 11)  保続
  - 12)  言語蹉跌 語間代
  - 13)  迂遠
  - 14)  失声
  - 15)  失語
  - 16)  構音障害
- 5 記憶
- 1) 記銘障害
- ①  記銘減退
  - ②  コルサコフ症候群
  - ③  作話
  - ④  保続
- 2) 追想障害
- ①  記憶増進
  - ②  記憶減退
  - ③  健忘
  - ④  誤記憶
  - ⑤  偽記憶
  - ⑥  その他

## 6 自我機能

### 1) 能動性意識の異常

- ①  離人症
- ②  作為体験（考想吹入 奪取 伝播を含む）

### 2) 単一性意識の異常

- ①  二重自我
- ②  憑き物妄想

### 3) 同一性意識の異常

- ①  交代人格（二重人格 多重人格）

### 4) 限界性意識の異常

- ①  二重見当識
- ②  太古思想

## 7 意識

### 1) 意識の混濁

### 2) 睡眠性の意識障害

- ①  不眠
- ②  過眠
- ③  ナルコレプシー
- ④  悪夢
- ⑤  夜驚症 夢中遊行
- ⑥  覚醒昂進

### 3) 特殊な意識障害

- ①  せん妄
- ②  もうろう状態
- ③  夢幻様状態
- ④  自動症
- ⑤  酩酊
- ⑥  昏迷
- ⑦  錯乱

### 4) 無意識

## 8 注意

### 1) 集中困難

### 2) 転導性亢進

### 3) 催眠

### 4) 感応現象

### 5) 解離

## 9 欲動と意志

### 1) 意欲の量的異常

- ①  精神運動制止
- ②  精神運動興奮
- ③  意欲減退・無為

### 2) 意欲の質的異常と調節障害

- ①  カタレプシー
- ②  反響症状
- ③  命令自動
- ④  拒絶症
- ⑤  両立傾向（二面欲求）
- ⑥  常同症
- ⑦  術奇症
- ⑧  語新作（造語症）
- ⑨  強迫行為
- ⑩  心迫
- ⑪  衝動行為
- ⑫  被暗示性
- ⑬  させられ行為

### 3) 食欲 問題あり

### 4) 排世 問題あり

### 5) 物質使用（飲酒、薬物） 問題あり

### 6) 自己破壊 問題あり

### 7) 衝動的癖 問題あり

### 8) 攻撃性と暴力 問題あり

## 10 感情

### 1) 感情の量的障害

- ①  爽快（高揚）気分
- ②  多幸症（上機嫌）
- ③  モリア
- ④  おとけ症
- ⑤  病的抑うつ
- ⑥  気分変調
- ⑦  二重抑うつ
- ⑧  病的不安
- ⑨  不安発作
- ⑩  恐怖感
- ⑪  能力感
- ⑫  罪業（罪責）感
- ⑬  快感喪失

- ⑭  情動麻痺 emotional numbness
- ⑮  感情麻痺（情動麻痺） emotional blunting
- ⑯  アレキサミア（失感情言語症） alexithymia

- 3)  体感症
- 4)  自己臭
- 5)  心身症
- 6)  身体化障害
- 7)  心気症
- 8)  身体像の異常  
（肥満 醜形恐怖など）

2) 感情の調節障害

- ①  感情不安定
- ②  感情失禁
- ③  強制（強迫）立き
- ④  刺激性 焦燥感・易怒性
- ⑤  両価性（両面感情）
- ⑥  気分倒錯
- ⑦  怒り

1 4 疾患への態度

1) 病態の捏造

- ①  詐病
- ②  賠償神経症
- ③  虚偽性障害（-代理人による-ミュンヒハウゼン症候群）

2) 病態の否定

- ①  疾病隠蔽
- ②  症状転嫁
- ③  病態失認
- ④  疾病否認

3) 病態の理解

- ① 病識  問題あり
- ② 服薬遵守 compliance  問題あり

4) 周囲との交流

- ① 疎通性  問題あり
- ② 接触性  問題あり

1 1 人格

1) DSM-IVの分類（ICD-10の分類）

① A群

- 妄想性（同じ）
- 分裂病質（同じ）
- 分裂病型（同じ）

② B群

- 反社会性（非社会性）
- 境界性（情緒不安定性 衝動型境界型）
- 演技性（同じ）
- 自己愛性（その他の人格障害）

③ C群

- 回避性（不安性）
- 依存性（同じ）
- 強迫性（同じ）

1 5 特殊な症状群

- 1)  緊張病症状候群
- 2)  シュナイダーの1級症状
- 3)  陽性症状群
- 4)  陰性症状群

1 2 知能

- 1)  精神遅滞
- 2)  痴呆
- 3)  一過性の知能障害
- 4)  仮性痴呆 幼稚症

1 3 非器質性身体症状と心身症

- 1)  転換症状
- 2)  心因性疼痛

**コンプライアンス**

**M42 会話における主要内容**

- なし 病院日常 履歴 犯罪 疾病/障害の克服 薬物コンプライアンス  
将来展望/生活計画 その他 不詳/不明

**M43 心理療法上の問題**

- 該当なし 治療の中断 悪化 コンプライアンス不良 その他 不詳/不明  
言葉で記述

**M44 服用中の向精神薬**

- なし  
 あり  
抗精神病薬  
抗鬱薬  
気分調整薬  
安定剤  
抗パーキンソン薬  
その他

**M45 特別な危険/心理薬物療法の禁忌**

- なし  
あり ICD-10 の身体的診断でコードせよ。  
 (脚注)読みやすい字で  
不詳/不明

<b>M46 GAS 得点</b>	点
-------------------	---

<b>M47 B P R S</b>	各項目の当てはまる点数にチェックを入れてください。						
	0 症状なし、1 ごく軽度、2 軽度、3 中等度、4 やや高度、5 高度、6 非常に高度						
1 心氣的訴え	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
2 不安	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
3 感情的引きこもり	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
4 思考解体	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
5 罪業感	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
6 緊張	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
7 奇異な行動や姿勢	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
8 誇大性	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
9 抑うつ気分	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
10 敵意	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
11 疑惑	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6

12 幻覚	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
13 運動減退	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
14 非協調性	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
15 思考内容の異常	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
16 情意鈍麻	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
17 興奮	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
18 見当識障害	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6

### 1 総合評価尺度

#### Global Assessment Scale (GAS)

GAS では精神的健康と障害の間に仮説的な連続量を想定した上で、被検者の機能を表す最も低い範囲を選ぶことによって、最近1週間の被検者の機能の最低水準を評価する。例えば、「その行動が妄想によって著しく影響されている」(21~30 範囲)ならば、たとえ「数領域における著明な障害」(31~40 範囲)を持つにせよ、21~30 範囲で評価する。中間の水準も適宜使用する(例 35, 38, 62)。また被検者が受けている投薬あるいはその他の治療の有無やその内容に関わりなく、実際の機能を評価する。

GAS のアンカー・ポイント	
100 ~ 91	広範囲の活動で優秀な機能。生活上の問題がない。暖かさや誠実さのため人望がある。症状はなし。
90 ~ 81	すべての領域で良好な機能。多くのことに興味を持ち、社交上も活発。全般的に人生に満足。一過性の症状や時に手に余る「日常」の心配事があることもある。
80 ~ 71	機能上の障害がわずかにあり、いろいろな程度の日常の心配事や問題かときに手におえなくなる。ごくわずかの症状が存在することもある。
70 ~ 61	いくつかの軽度の症状(例 抑うつ感情や軽い不眠といった)もしくは数領域において機能上の困難があるが、一般的にはかなり良好な機能で、良い対人関係も持ち、精神医学的訓練を受けていないたいてい人は「病氣」とは思わない。
60 ~ 51	中等度の症状もしくは全般的に機能しているがいくつかの困難(例 友人がほとんどいなく情動が平板、抑うつ気分と病的な自己不確実感、多幸気分と言語促迫、中程度に重大な反社会的行為)。
50 ~ 41	たいていの臨床医が明らかに治療もしくは観察の必要かあると考えるような重大な症状あるいは機能障害(例 死ぬことばかりに気持が向いたり自殺の意志表示をする、重症の強迫行為、頻回の不安発作、重大な反社会的行為、強迫的飲酒、軽度ではあるか明らかな躁症状群)。
40 ~ 31	仕事、家庭関係、判断、思考、あるいは気分といった数領域における重大な障害(例 ゆうつな女性が友人を避け、家族を無視し、家事かてきない)、もしくは現実検討力や意志伝達上の何らかの障害(例 言語が時に不明瞭、非論理的、または無関係になる)、もしくは1回の自殺企図。
30 ~ 21	ほとんどすべての領域で機能することができない(例 終日横臥)、もしくは妄想か幻覚によって行動が著しく影響されている、もしくは意志伝達上(例 時折の支離滅裂もしくは無反応)、あるいは判断上(例 行動がひとく場にそくわない)の重大な障害。
20 ~ 11	自傷他害から防ぎ、最低の個人の衛生を維持するために何らかの監視が必要(例 自殺企図の反復、頻回の暴力、躁性興奮、大便をこすりつける)、もしくは意志伝達上の極度の障害(例 極端な支離滅裂もしくは緘黙)。
10 ~ 1	自傷他害からまもるために数日にわたり持続的な監視が必要、あるいは最低の個人の衛生を保とうとしない(例 職員による特別の観察を行う集中管理病棟への入院を必要とする)、あるいは明らかな意志をもった死の可能性のある真剣な自殺行動。

## 2 簡便精神症状評価尺度

### Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)

#### 1 心氣的訴え

身体の健康状態についての関心の程度。身体の状態に関する訴えに相当する臨床所見の有無に関わらず評価する。身体的原因があれば欄外に記入する。

0) 症状なし。	
1) ごく軽度。	身体の状態について直接問われたときのみ軽度の訴え。
2) 軽度。	自発的な軽度の訴え。身体の状態についての過度の懸念。
3) 中等度。	身体の状態への没頭（心氣的態度）。身体症状が主訴であり、面接の最初に出てくる話題である。
4) やや高度。	身体症状に集中。たえまなく訴え、援助を求める。いわゆるカン恐怖、梅毒恐怖等。
5) 高度。	心気妄想があり、通常奇異な訴えと顕著な不安を呈する。それ以外の事柄を忘れるほど心気妄想に没頭。
6) 非常に高度。	持続性の心気妄想で（恐怖や絶望といった）感情面の負担があり、今にも死ぬのではないかと、思い障害になるのではないかとという予期を示す。

#### 2 不安

心配、過度の懸念、不安、恐怖といった主観的体験。言語的訴えのみにもとづいて評価し、身体的徴候からは推論しない。（後者は緊張の項で評価する。）

0) 症状なし。	
1) ごく軽度。	質問されたときのみ。軽度かつごく稀な不快感や懸念。
2) 軽度。	軽度で一過性のイライラ、緊張。些細な事柄への過度の懸念。もしくは特定の状況に関連した軽度の不安。
3) 中等度。	たいていの間出現するイライラ感、緊張、不安感、動揺、もしくは特定の状況に関連した急性の不安発作。
4) やや高度。	たいていの間出現する「ふるえ」、「こわさ」、もしくは頻回の急性の不安発作。
5) 高度。	それ以外の心的事柄を忘れるほどに、喪失、みはなされ、障害を予期するための持続的恐怖感やおびえ。
6) 非常に高度。	恐慌状態。

#### 3 感情的引きこもり

面接状況に関する関与の欠如。感情的接触を評価する。観察にもとづいてのみ評価する。（ここでは抑うつ、不安やその他の感情の表出に由来する接触障害は評価しない。）

0) 症状なし。	
1) ごく軽度。	冷たい。打ちとけない。
2) 軽度。	興味を示さない。飽きやすい。自発性かない。
3) 中等度。	返答が短い。形式的。声が平板。感情の変化が少ししかない。
4) やや高度。	いくつかの質問に答えるのみ。視線を合わせることを避ける。感情的反応が欠如もしくは不適切。
5) 高度。	緘黙もしくは言語による返答が不適切。しかし表情やジェスチャーにいくらかの反応を認める。
6) 非常に高度。	全く反応を欠く。

#### 4 思考解体

思考形式の障害。主に観察にもとづいての評価。

0) 症状なし。	
1) ごく軽度。	主観的なもののみ、もしくは多少の不明瞭、注意散漫、迂遠。
2) 軽度。	1) と同様、しかし面接中明らかに出現。
3) 中等度。	多少の無関係、連合弛緩、言語新作、途絶、筋道を失う。返答に理解困難なものもある。

4) やや高度。	3) と同様。しかし意思の疎通が困難。
5) 高度。	会話のうちごく限られた断片のみ理解可能。
6) 非常に高度。	会話が理解不能。(言葉のサラダ、分裂言語、支離滅裂)。

5 罪業感 過去の行為についての呵責、自責、自己批難。罰を受けて当然と思う。

0) 症状なし。	
1) ごく軽度。	質問されたときのみ。過去の行為について多少の軽度の後悔。内容の発展はない。
2) 軽度。	過去の行為についての後悔。些細なことについての自責傾向。
3) 中等度。	良心の呵責および自責的思いめくらし。
4) やや高度。	うまくゆかないことすべてについての自己卑下と自己批難を示す広範囲にわたる罪業感。
5) 高度。	罪業妄想、罪責妄想。
6) 非常に高度。	

6 緊張

不安(激越にまでおよぶ)、緊張、過敏性燥の身体的および運動機能における徴候。観察にもとづいての評価。

0) 症状なし。	
1) ごく軽度。	過度に注意深い。多少に緊張した姿勢。ときとき紅潮。ときとき不必要な小さな動き。
2) 軽度。	
3) 中等度。	多少の不安の自律神経症状。頻回の不必要な小さな動き。落ち着きのなさ。緊張した姿勢。
4) やや高度。	不安の自律神経症状。振戦。落ち着きがなく、姿勢を変えたり立ち上がったたりする。もみ手。歩きまわる。
5) 高度。	運動機能の激越、歩きまわり、頭を叩きつけ、筋のトーンスがあがっているための緊張で動かないなどの症状を示す。多少の接触は可能。
6) 非常に高度。	5) と同じ。しかしコントロール不能。接触不可能。

7 衝動的な行動や姿勢 風変わり、常同的、不適切、奇妙な行動および態度。

0) 症状なし。	
1) ごく軽度。	多少の風変わりな姿勢。ときときの小さな不必要で反復性の運動(手をのそきこむ、頭を搔くなど)。
2) 軽度。	
3) 中等度。	頻回の常同的運動。ときときの粗大な常同的運動(体を揺り動かす、敬礼する、魔術的な運動、奇異な姿勢)、しかめまゆ。
4) やや高度。	しかめまゆ。常同的運動。たいていの間、粗大な常同的あるいは奇異な姿勢。
5) 高度。	持続的な常同的運動、しかめまゆ、あるいは奇異な姿勢。やめさせることは可能。
6) 非常に高度。	たえまのない常同的な不自然な運動および態度で、コントロール不可能。

8 誇大性 過大な自己評価、優越感、異常な才能、重要性、力量、富、使命。

0) 症状なし。	
1) ごく軽度。	自己評価の誇張。
2) 軽度。	優越感、重要性、才能、能力があると感じる。自慢。特別扱いされることを望む。
3) 中等度。	自己の稀な能力、特別な責任、重大な役割、偉大な業績を確信する。
4) やや高度。	力量、超自然的な能力。使命についての妄想的確信。
5) 高度。	誇大妄想(偉大な指導者、予言者等)。行動のほとんどを支配している。
6) 非常に高度。	強度の誇大妄想と全能感に全く没頭している。

9 抑うつ気分

悲哀、絶望、無力、悲観といった感情を訴える。重症度を評価する際には被験者の表情や泣く様子を考慮に入れる。しかし罪業感、運動減退、心氣的訴えは考慮にいれない。

0) 症状なし。	
1) ごく軽度。	一過性の悲哀感。外見上抑うつ徴候なし。
2) 軽度。	気力喪失の訴え。沈んでいる。くよくよする。悲しい。

3) 中等度。	外見上ゆううつ。悲しい。とうしようもない。
4) やや高度。	抑うつの身体的徴候（通常はいくらかの制止もしくは激越を示す）。絶望感、希望喪失。抑うつ的内容が前景。自殺念慮。
5) 高度。	抑うつの身体的徴候を示す広範囲で重篤な抑うつ。抑うつ性妄想。死や自殺への没頭。
6) 非常に高度。	抑うつ性混沌もしくは激越。はなばなしい抑うつ性妄想。自己破壊行為。

#### 10 敵意

他者に対する敵意、軽へつ、憎悪の表現。面接場面以外のイライラした、敵対的、攻撃的行為で患者自身により報告され、最近の病歴から知られているもの。面接者に対する敵意は非協調性の項で評価する。

0) 症状なし。	
1) ごく軽度。	他人への過度の批難。
2) 軽度。	嫌悪。あらさがし、憤り、焦燥。
3) 中等度。	顕著な焦燥。敵対的態度。告発、侮辱、言語的脅迫を呈する怒りの爆発。
4) やや高度。	頻回の言語的攻撃性。ときどきの身体的攻撃性。
5) 高度。	全般性の言語的攻撃性、頻回の身体攻撃性、破壊行為を呈する持続性の緊張した敵対的態度。
6) 非常に高度。	無差別の持続性の言語的および身体的攻撃性（怒鳴り声での侮辱と脅迫。家具をこわす。近づく人をなくる）。

#### 11 疑惑

患者に対し他者からの悪意や妨害または差別待遇があるという確信。自意識の増加や軽度の疑惑から関係念慮や迫害妄想まで含める。ここには妄想気分も含める。

0) 症状なし。	
1) ごく軽度。	自意識。他者への信頼の欠如。
2) 軽度。	漠然とした関係念慮。自分のことを笑っている、些細なことて反対されているなどと疑う傾向。
3) 中等度。	被害的態度。関係もしくは迫害念慮。しかしその内容は漠然として、弱くて、体系化されてはおらず、残遺的である。
4) やや高度。	活発で感情面の負担のある被害妄想。いくらかの体系化あるいは妄想気分。
5) 高度。	はなばなしく活発に仕上げられた被害妄想体系、もしくは強力な妄想気分。
6) 非常に高度。	すべてを包括するはなばなしい被害妄想体系もしくは圧倒的な妄想気分。

#### 12 幻覚

外界からの刺激のない知覚。錯覚や明瞭な精神表象からは区別する。

0) 症状なし。	
1) ごく軽度。	患者の報告する体験の質が幻覚と言えるか疑わしい。入眠幻覚。
2) 軽度。	孤立した断片的幻覚体験（光、自分の名前が呼ばれる）。
3) 中等度。	言語幻覚もしくは完全に発展した他の感覚の幻覚で、明らかに存在するか出現頻度の稀なもの。行動に影響しない。いくらかの洞察。
4) やや高度。	頻回の幻覚、患者がそれに反応する。洞察なし。
5) 高度。	持続性で強度の幻覚。患者の行動を決定する。
6) 非常に高度。	強大な幻覚。幻覚状態（急性せん妄や急性幻覚症のときのような）。患者は幻覚体験に完全に没頭。接触不可能。

#### 13 運動減退

運動および会話の速度の量的低下。患者の行動観察のみから評価する。

0) 症状なし。	
1) ごく軽度。	主観のみ。自発性欠如。会話もしくは運動におけるわずかな躊躇。
2) 軽度。	1)と同様でかつ会話に間がある。返答はおくれて、かつ短い。しかし文章は完成している。
3) 中等度。	運動の減退。会話の自発性がない。声は低い。返答はおくれ、短く、あるいは不完全。
4) やや高度。	表情の変化が少しもない。運動は遅く、躊躇しかちで、不完全。会話は単語のみで、ささやくような発語であり、質問されたときのみのものである。
5) 高度。	亜混沌



6) 非常に高度。	
-----------	--

14 非協調性 面接者および面接状況に対する敵意と抵抗。観察にもとづく評価。

0) 症状なし。	
1) ごく軽度。	会話と行動が過度に形式的。
2) 軽度。	ある質問には答えたからない。面接に対してのいらだちを示す。返答が短い。
3) 中等度。	ある質問には反対する。返答は短いか不明瞭で回避的。面接に対して明らかないらだちを示す。面接を最後まで遂行するのが困難。
4) やや高度。	面接者に対する表立った敵対的態度。面接室を出ようとする。面接を最後まで遂行するのが不可能。
5) 高度。	診察を受けたり面接室に入るのを拒否する。返答は不適切もしくは緘黙、あるいは口ぎたない。面接は不可能だが多少の接触はもてる。
6) 非常に高度。	面接不可能。面接室にはいたり、そこにいることを拒否する。質問や命令に対して従わない。あるいは持続的に攻撃的。

15 思考内容の異常

通常では見られない、奇妙、奇怪な思考内容、すなわち強迫観念、優格観念、風変わりな確信や理論、妄想性の曲解、すべての妄想。この項では内容の非通常性についてのみ評価し、思考過程の解体の程度は評価しない。本面接中の非指示的部分および指示的部分で得られた通常では見られないような思考内容は、たとえ他の項（例、心氣的訴え、罪責感、誇大性、疑惑等）ですでに評価されていてもここで再び評価する。またここでは離人症（妄想性のもも非妄想性のもも含める）、病的嫉妬、妊娠妄想、性的妄想、空想的妄想、破局妄想、影響妄想、思考吹入等の内容も評価する。

0) 症状なし。	
1) ごく軽度。	孤立した優格観念もしくは通常では見られない信念。稀な強迫観念。
2) 軽度。	優格観念。通常では見られない信念。風変わりな理論。強迫観念。
3) 中等度。	患者にとって相当に重大な意味を持つ奇怪な理論や信念。
4) やや高度。	奇怪な理論への没頭、もしくは妄想が他の活動を制限し思考内容の前景に立つ。
5) 高度。	奇怪な理論もしくは妄想が思考内容および行動の大部分を決定する。
6) 非常に高度。	すべてを包括する奇怪な理論もしくは圧倒的な妄想が行動と思考内容のすべてを決定する。

16 情動鈍麻もしくは不適切な情動

感情緊張の低下もしくは不適切、ならびに正常の感受性や興味、関心の明らかな欠如。無関心、無欲症。表現された感情がその状況や思考内容に対して不適切。観察にもとづく評価。

0) 症状なし。	
1) ごく軽度。	感情反応に自発性を欠く。
2) 軽度。	感情反応が稀で固い。もしくはときに文脈からはずれたものである。
3) 中等度。	無欲的。情動が平板。家族、友人、環境、自分の将来について少しも興味を示さない。妄想のある場合は、その妄想がまだ感情の変化を伴う。不適切に歯をむき出して笑う。
4) やや高度。	無欲と引きこもり。自分の置かれている状況に無関心。妄想や幻覚が情動的色づけを欠く。不適切な情動。
5) 高度。	顕著な無欲と引きこもり。興味欠如。情動の表出が欠如、もしくは非常に不適切。身なりや行動に注意を払わない。
6) 非常に高度。	完全な無欲と引きこもりに加えて自分に関する基本的な事柄にもついても注意を払わない。情動は、仮に表出されたとしても非常に不適切。

17 高揚気分 健康感の増大から、多幸症と軽躁、更には躁状態と恍惚状態まで。

0) 症状なし。	
1) ごく軽度。	健康感の増大。
2) 軽度。	幸福で力が充実した感じ。過度に楽天的。多弁。目的ある活動が増加。
3) 中等度。	調子が高い、興奮している、いつも幸福だ、自分は強いなとを感じる。落ち着かない。イライラ。言語促迫。転動性亢進。多動だが目的ある活動が障害される。

4) やや高度。	歓喜と怒りが交互に現れる。会話は大声で早い。連合は（音や韻によって）表面的。混乱した多動。
5) 高度。	恍惚もしくは歓喜と怒りが交互に現れる。持続的にしゃべり、怒鳴り、歌う。観念奔逸し。意味のある会話が限られている。つねに動いている。
6) 非常に高度。	5) と同じだが、その程度が極端。意味のある接触が不可能。

18 精神運動興奮 会話と行動の出現率の増大。観察にもとづく評価。

0) 症状なし。	
1) ごく軽度。	多弁。
2) 軽度。	多弁かつ多動。
3) 中等度。	会話が大声で早い。落ち着かない。運動が早い。目的ある活動が障害される。
4) やや高度。	会話がとぎれない。頻回の叫び声。つねに動いている（徘徊、踊り）。活動が混乱している。
5) 高度。	混乱した会話がとぎれない（言葉のサラダ、叫んで脅迫する、卑わいな内容、断片的な言葉）。破壊的な行動興奮。
6) 非常に高度。	持続的で制御不可能な混乱した運動興奮および言語興奮で、極度の疲労に至るもの（たとえば緊張病性興奮、せん妄、急性躁病等に見られる）。

### ⑨ [性格傾向]

性格傾向

- C1 拒否的かつ猜疑的 なし 軽度 中等度 重度
- C2 操作的 なし 軽度 中等度 重度
- C3 攻撃的 なし 軽度 中等度 重度
- C4 協力的 なし 軽度 中等度 重度
- C5 誇張的 なし 軽度 中等度 重度

性格と結びついて顕著な像

- C6 奇妙な、エキセントリックな なし 軽度 中等度 重度
- C7 演技的 感情的 気まぐれな なし 軽度 中等度 重度
- C8 不安な 臆病な なし 軽度 中等度 重度

### ⑩ [心理テスト]

知能

WAIS-R 言語性IQ \_\_\_\_\_ 動作性IQ \_\_\_\_\_ トータルIQ \_\_\_\_\_

人格

### ⑪ [精神神経学的所見]

N1 神経学的障害

- なし 軽度 中等度 重度 不詳/不明

### ⑫ [危険に関する情報]

自殺歴

B1 今回入院以前の自殺傾向

- なし あり 不詳/不明

**B2 今回入院以前の自殺企図/自傷**

- なし  本気の乃至危険な自殺企図  その他の自殺企図  自殺企図のない自傷  
 不詳/不明

**B3 今回入院以前早期の自殺企図**

- なし  あり  不詳/不明

**B4 最後の自殺企図から**

- なし  1月  6月  1年  5年  5年以上  不詳

**B5 これまでの自殺企図の総数**

- なし  あり、申告数\_\_回  あり、回数不明  不詳

**B6 以前の自傷の回数**

- なし  あり、申告数\_\_回  あり、回数不明  不詳

怒り

**B7 怒り (Novaco)** \_\_\_\_\_ 点

衝動性

**B8 Barrett BIS11** \_\_\_\_\_ 点

**B9 ICL** \_\_\_\_\_ 点

**B10 Hare PCL-R**

- 総点 \_\_\_\_\_ 点

	PCL-R	
1	軽薄さ／上辺だけの魅力	
2	誇張化した自己価値観	
3	刺激を求める／飽きっぽい	
4	病的虚言（虚言癖）	
5	騙す／誤魔化す／操る	
6	良心の呵責や罪責感がない	
7	感情の平板化	
8	冷淡／共感性の欠如	
9	寄生的生活様式	
10	行動のコントロールが下手	
11	不特定の性的関係	
12	幼児期の行動上の問題	
13	現実的目標 長期的展望の欠如	
14	衝動性	
15	無責任さ	
16	自分の行動の責任が取れない	

17	複数の短期間の婚姻関係	
18	少年非行	
19	仮釈放での遵守事項違反等	
20	多種方向犯罪	