

表1 自殺既遂者数と自殺未遂者数

n = 497 (%)

既遂者数 28 (5.6)

未遂者数 469 (94.4)

表2 ハイリスク群とローリスク群

n = 497 (%)

ハイリスク群 110 (22.1)

ローリスク群 387 (77.9)

表3 身体的重症度

	n = 497	(%)
ICU入院	110	(22.1)
ICU以外の入院	316	(63.6)
入院なし	71	(14.3)

表4 年齢とリスク

	HIGH	LOW	n
39歳以下	48	273	321
40歳以上	62	113	175
n	110	386	496

P<0.01

表5 性差とリスク

	HIGH	LOW	n
男性	68	118	196
女性	42	269	311
n	110	387	497

$P < 0.01$

表6 教育年数とリヌク

	HIGH	LOW	n
9年以下	24	81	105
12年	38	216	254
14年以上	23	51	74
n	85	348	433

P<0.01

表7 同居者とリスク

	HIGH	LOW	n
あり	85	316	401
なし	19	67	86
n	104	383	487

P<0.01

表8 婚姻状況とリスク

	HIGH	LOW	n
既 婚	54	146	200
未 婚	38	181	219
その他	12	54	66
n	104	381	485

P<0.01

表9 家族の精神科疾患の既往とリスク

	HIGH	LOW	n
あり	23	98	121
なし	71	276	347
n	94	374	468

P<0.01

表10 家族の自殺企図歴とリスク

	HIGH	LOW	n
あり	16	70	86
なし	76	296	372
n	92	366	458

P<0.01

表11 精神科通院状況とリスク

	HIGH	LOW	n
現在通院あり	52	250	302
現在通院なし	52	135	187
n	104	385	489

P<0.01

表12 自殺企図回数とリスク

	HIGH	LOW	n
初回	61	178	239
2~4回	28	101	129
5回以上	6	80	86
n	95	359	454

P<0.01

表13 全体の自殺企図手段

手段	n = 582 (複数回答可)	(%)
医師処方薬 286(向精神薬258 その他28)		(49.1)
市販薬物 56		(9.6)
毒物 40(農薬21 その他19)		(6.9)
刃器 97(手首59 腹部13 その他25)		(16.7)
ガス 22(排気ガス12 その他10)		(3.8)
飛び込み 2		(0.3)
飛び降り 33		(5.7)
焼身 9		(1.5)
縊首 22		(3.8)
入水 6		(1.0)
その他 9		(1.6)

表14 ハイリスク群の自殺企図手段

手段	n = 131 (複数回答可)	(%)
医師処方薬の薬物	36(向精神薬32 その他4)	(27.5)
市販薬物	0	(0.0)
毒物	19(農薬14 その他5)	(14.5)
刃器	26(手首5 腹部8 その他13)	(19.8)
ガス	11(排気ガス3 その他8)	(8.4)
飛び込み	1	(0.8)
飛び降り	19	(14.5)
焼身	6	(4.6)
縊首	11	(8.4)
入水	0	(0.0)
その他	2	(1.5)

表15 自殺企図前の相談とリスク

	HIGH	LOW	n
相談あり	25	109	134
相談なし	66	255	321
n	91	364	455

P<0.01

表16 自殺企図前の相談者の内訳

	n = 146	(%)
家族	79	(54.1)
友人	43	(29.5)
精神科関係者	20	(13.7)
身体科関係者	1	(0.6)
その他	3	(2.1)

(複数回答可)

表17 自殺企図契機とリスク

	HIGH	LOW	n
24時間以内にあり	16	126	142
1週間以内にあり	12	76	88
1週間以上前からあり	58	144	202
n	86	346	432

P<0.01

表18 希死念慮の強さとリスク

	HIGH	LOW	n
1~5	11	149	160
6~10	68	203	271
n	79	352	431

P<0.01

表19 自殺企図時の飲酒とリスク

	HIGH	LOW	n
あり	12	92	104
なし	78	281	359
n	90	373	463

P<0.01

表20 転帰

	n = 488	(%)
精神科へ入院	77	(15.8)
非精神科へ入院	55	(11.3)
退院・精神科外来	272	(55.7)
退院・再診なし	56	(11.5)
死亡	28	(5.7)