

疾患	重症度	内容
前立腺肥大症	前立腺容積	前立腺容積 20ml 未満 前立腺容積 50ml 未満 前立腺容積 50ml 以上
白内障	処置眼数	1眼(処置対象のもの) 2眼(処置対象のもの)
痔核		第一度(出血のみ) 第二度(還納可能) 第三度(脱肛)
子宮筋腫		貧血あり(Hb 10g/dl 未満) 貧血なし(Hb 10g/dl 以上)
狭心症	重症度なし	
腎結石および尿路結石	水腎・水尿管	水腎・水尿管あり 水腎・水尿管なし
乳房の悪性新生物	ステージ分類	ステージ I ステージ II A ステージ II B ステージ III A ステージ III B ステージ IV
膝関節症	骨移植	骨移植あり 骨移植なし
そけいヘルニア	重症度なし	

1)肺炎の重症度分類

胸部エックス線および身体所見により重症度を判定する。検査成績による分類は、あくまで参考である。

胸部エックス線および身体所見による

判定項目	軽症	中等症	重症
	5項目中3項目以上	軽症・重症のいずれにも該当しない	5項目中3項目以上
胸部エックス線写真での陰影の拡がり	1側肺の1/3まで陰影が2カ所以上のものは陰影の合計により判定する		1側肺の2/3以上
体温	<37.5		=>38.6
脈拍	<100		=>130
呼吸数	<20		=>30
脱水	(-)	(-) or (+)	(+)

チアノーゼや意識レベルの低下を認める症例、およびショック状態(収縮期血圧 90mmHg以下または拡張期血圧 60mmHg以下)にある症例は上記判定項目とは関係なく重症と判定する。

検査成績による

	軽症	中等症	重症
判定項目	3項目中2項目以上	軽症と重症のいずれにも該当しない	3項目中2項目以上
白血球	<10000		=>20000 or <4000
CRP	<10		=>20
PaO2	>70		=<60、SpO2=<90

2)喘息の重症度分類

	症状の特徴	日常生活	検査値 (PEF、FEV1.0)
1:軽症間欠型	<ul style="list-style-type: none"> ・喘鳴、咳嗽、呼吸困難は週に1~2回(呼吸困難を伴わないものでは週3回まで) ・症状は間欠的で短い ・夜間症状は月に1~2回 	普通	<ul style="list-style-type: none"> ・予測値/自己最良値 80%< ・変動は 20%>
2:軽症持続型	<ul style="list-style-type: none"> ・週2回以上の発作 ・日常生活や睡眠が妨げられることがある。月に2回以上 ・夜間発作が月に2回以上 	しばしば障害	<ul style="list-style-type: none"> ・予測値/自己最良値の 70~80% ・変動は 20~30%
3:中等症持続型	<ul style="list-style-type: none"> ・慢性的に症状がある ・吸入β2刺激薬屯用がほとんど毎日必要 ・日常生活や睡眠が妨げられることがある。週に1回以上 ・夜間発作が週1回以上 	かなりの障害	<ul style="list-style-type: none"> ・予測値/自己最良値 60~70% ・変動は 30%<
4:重症持続型	<ul style="list-style-type: none"> ・(治療下でも)しばしば増悪する ・症状が持続 ・日常生活に制限 ・しばしば夜間発作 	困難	<ul style="list-style-type: none"> ・予測値/自己最良値 60%> ・変動は 30%<

3)糖尿病の重症度分類

	代謝異常	網膜症	腎障	神経障害
軽症		単純性まで	早期腎症まで(尿アルブミン増加または尿タンパク出沒)	自覚症状なし
中等症		増殖性 視力>0.1	顕性腎症から腎不全(Cr<6.0)まで	自覚症状あり QOL不変
重症	<ul style="list-style-type: none"> ・ケトアシドーシスおよび糖尿病性昏睡 ・非ケトン性高浸透圧昏睡 	増殖性 視力<0.1	腎不全 透析期(Cr>=6.0)	自覚症状あり QOL低下

4項目の指標のいずれか1つが中等症あるいは重症であれば、それぞれ中等症、重症と判定する。

インポート時のファイル仕様

※数字は列番号

1	2	3	4	5	6	7
患者ID	診療録入力状況	医療費入力状況	整理番号	名前	生年月日	年齢
1	完了	未了	aaaaaa	ccccccc	1960/7/31	40
2	未了	未了	ddddddd	病院太郎	1955/9/20	44
8	9	10	11	12	13	14
性別	男性	女性	入院年月日	退院年月日	入院期間	主病名
女性	FALSE	TRUE	2000/8/30	2000/9/30	31	気管支および肺の腫
男性	TRUE	FALSE	2000/4/5	2000/5/20	45	脳梗塞
15	16	17	18	19	20	21
主病分類1	主病分類2	ICDコード	重症度	合併症有無	合併症有り	合併症無し
気管支および肺の腫	中葉、気管支または肺	C34.2	ステージII	無	FALSE	TRUE
脳梗塞	脳実質外動脈の血栓	I63.0	JCS 0-1	無	FALSE	TRUE
22	23	24	25	26	27	28
合併症1	合併症2	併発症有無	併発症有り	併発症無し	併発症1	併発症2
		無	FALSE	TRUE		
		無	FALSE	TRUE		
29	30	31	32	33	34	35
入院前の場所	施設名(入院前)	入院の種類	再入院有無	再入院有り	再入院無し	再入院の種類
他の病院・診療所入院			有	TRUE	FALSE	
家庭				FALSE	FALSE	
36	37	38	39	40	41	42
退院後の行き先	施設名(退院後)	介助の状況(入院時)	介助の状況(入院時)	介助の状況(入院時)	介助の状況(退院時)	介助の状況(退院時)
家庭		自立	一部介助	一部介助	自立	自立
家庭		全面介助	一部介助	一部介助	一部介助	一部介助
43	44	45	46	47	48	49
介助の状況(退院時)	転倒	手術有無	手術有り	手術無し	手術1回目年月日	手術1回目種類
自立	治療	無	FALSE	TRUE		
自立	経快	有	TRUE	FALSE	2000/4/20	冠動脈閉塞の除去及
50	51	52	53	54	55	56
手術分類	輸血有無	輸血有り	輸血無し	手術1ICD	手術2回目年月日	手術2回目種類
	無	FALSE	TRUE			
	血栓溶解剤の冠動脈	TRUE	FALSE	36.04		
57	58	59	60	61	62	63
手術分類2	手術2ICD	診療費支払方法	医療費総額	医療費入院時食事費	医療費細目診療料	医療費細目投薬料
		保険のみ	9		0	0
		保険のみ	300000		50000	10000
64	65	66	67	68	69	70
医療費細目注射料	医療費細目処置料	医療費細目手術料	医療費細目検査料	医療費細目画像診断	医療費細目その他	医療費細目入院料
0	0	0	0	0	0	0
10000	20000	30000	20000	30000	30000	100000