

化学療法を受けている間は、感染しやすくなります。これは、抗がん剤が骨髄に作用して、白血球を減少させ、抵抗力が弱ってしまうからです。白血球は、感染と戦うとても大切な血液成分なのです。感染は口の中、皮膚、肺、直腸、泌尿生殖器などいろいろな場所におきやすくなります。患者様の状態を把握するために、主治医は頻繁に白血球の数を調べます。白血球数が非常に少なくなると、治療するための抵抗力をつけるために、薬の量を少なくしたりします。 数が正常範囲以下になった状態を、好中球減少症といいます。

白血球数を極度に減少させことが多い抗がん剤を服用している場合、医師は白血球が急速に回復するのを促進するコロニー刺激因子の注射を処方することができます。G-CSF製剤（顆粒球コロニー刺激因子：グラン、ノイトロジン）やM-CSF製剤（ロイコプロール）は、ほとんどの種類の化学療法で一般的に使用されています。（Marilyn,J.D.,1998／大西和子, 1998）

以下にあげたことが感染を防いだり、早期発見に役立つでしょう。

1) 白血球が少ないと言われた場合の留意点

- (1) 手洗いを十分に行いましょう。特にトイレの前後や食事の前など。まことに石鹼とぬるま湯で洗ってください。よく泡立てて、こすりあわせてください。手と手を重ねて前後によくこするときれいに洗えます。爪床や指の間もきれいに洗います。
- (2) 出来るだけ人ごみは避けて外出しましょう。
- (3) 外出から帰ったらうがいをしましょう。
- (4) 排便後は、肛門周囲を清潔にしましょう。
- (5) 直腸体温計や直腸座薬の使用は、肛門部位に小さな裂傷を作り血流中に感染物質が入り込むおそれがあるため、避けましょう。
- (6) 性交の際には、壁に小さな傷ができるのを避けるため、やさしくまた十分な潤滑油を使って行う必要があります。
- (7) 傷を作らないように、指のささくれをむしったり、にきびをひっかいたり、つぶしたり、はさみ・包丁・ナイフなどで怪我をしないようにしましょう。（手袋の使用）
- (8) 切り傷、擦り傷は、すぐにぬるま湯で洗い、石鹼できれいにして、傷が深くなれば、オキシドールで消毒し無菌包帯で覆っておきましょう。詳しくは主治医に聞いてください。
- (9) 髪を剃る場合は、皮膚を傷つけないように電気かみそりを使いましょう。

う。

- (10) 口腔内の清潔は大切ですので、歯肉を痛めないように軟らかい歯ブラシを使いましょう。
- (11) まわりに、風邪をひいたり、はしか、水痘にかかっている人がいたら近づかないようにしましょう。また、人ごみは避けるようにしましょう
- (12) 入浴の際は熱いお湯に入らず、程よい温度で、毎日入りましょう。お風呂から上がったときは皮膚はゴシゴシ擦らずに、押し拭きをして乾かしましょう。
- (13) 足がカサカサしたりしているときは、ローションやオイルで手入れをしておきましょう。
- (14) 庭仕事をしたり、動物の世話をする場合は、必ず手袋をして手を保護しましょう。
- (15) 主治医に相談しないで予防注射をうけないように気を付けましょう。
- (16) 発汗抑制剤は汗腺を塞いで感染を促す場合があるため、どうしても必要ならデオドラント（液化消臭剤）を使用しましょう。
- (17) 疲れたときには日中でも休息時間を取りるようにしましょう。
- (18) 日焼け止めを使用しできるだけ日光は避けましょう。
- (19) 爪のあま皮は、つまみ取ったり刃物で切り除かず、あま皮落としクリームを使用しましょう。
- (20) 感染症の危険を減らすため、女性はタンポンよりも生理用ナプキンを使用しましょう。
- (21) 肺炎のリスクを減らすため、目覚めている間は肺を十分に拡張させて、頻回に数回ずつ深呼吸をしましょう。

2) 感染の徴候

- (1) 発熱 (37.8°C以上の発熱)、寒気、発汗
- (2) 一日に3回以上の軟便、下痢（化学療法の副作用としても）
- (3) 排尿時のやけるような感じ、頻尿、血尿
- (4) 激しい咳や喉の痛み。
- (5) 異常なオリモノの増加、陰部のかゆみ
- (6) 傷口、吹き出物の周囲の発赤、または腫れ
- (7) 目の充血、目やに
- (8) 口内炎（口腔内の発赤、痛み）



何か感染徴候があるときは、自覚している間は4時間毎に体温を測定してください。

感染症にかかったら、1日に約1,800~2,800mlの水分を摂取する必要があります。心臓や腎臓に障害のある人は、医師と相談をしてから飲用を進めてください。

この様な兆候がでたときはむやみに鎮痛解熱剤を使わずにすぐに主治医に連絡を取りましょう。白血球数が少ない患者さんに感染がおこった場合は、一般的には入院して、抗生物質で治療します。




図2：外来化学療法患者の発熱時の対応（安藤正志ら, 2002）

3. 血小板減少症

血小板減少症とは、血液のもとを造る骨髓が抗がん剤によって影響を受け、血液を造る機能が低下（骨髓抑制）した状態をいいます。そうなると、血小板が造られず、通常 20～25 万／μl ある血小板が減少してしまい、出血が起きやすくなります。（一般に正常値を下回ると出血しやすくなりますが、3 万／μl 未満になると、鼻血が出やすい、血が止まりにくい、皮下出血（皮下に点状の出血斑さらに進行するとあざ状の出血斑）など目に見える出血を起こしやすくなります。

一般に、抗がん剤の治療は 1～2 度ではなく、何度も繰り返して行なわれるため、骨髓の回復する能力が衰え、場合によっては激しい骨髓抑制を来すことになります。

また、まれに抗がん剤による肝機能障害で、肝臓で造られている凝固に関わる因子（凝固因子）が造られなくなり出血しやすくなることがあります。

日常生活においても、体をほんの少しうつけたり、皮膚を強くこすることにより皮下出血することがあります。また、鼻を強くかむと鼻から出血したり、歯ブラシで強く歯肉をこすると歯肉から出血したり、硬い便をすると肛門から出血したりすることもあります。その他、血小板が更に減少した場合には、脳や消化管に出血することもあります。特に化学療法の後では口腔や消化管にただれが起こり、口腔から出血し唾液などに血液が混入したり、消化管から出血すると血便になり、黒い便がでることがありますので、出血傾向が見られたら受診することが大切です。



鼻を強くかむと、
出血する可能性
があるので注意
しましょう

1) 出血の症状

- (1) 小さな傷でも血が止まらなくなる。
- (2) 食後や歯磨き後歯間から出血する。
- (3) 小さな、針で突ついたような出血（点状出血斑）が口の中や身体の表面に見られる。腕や脚にも見られます。また、打撲時にできる内出血班（あざ）が、ちょっとしたことでも、できやすくなる。
- (4) 鼻血が出やすく、止まりにくい。
- (5) 尿が赤みを帯びたり、便が黒ずんだりする。



2) 出血しやすくなっている時に注意すること

- (1) 歯ブラシは柔らかい物を使用する。血球数が正常範囲になるまでは、デンタルフロスの使用は避けましょう。
- (2) 歯茎への刺激を減らすために入れ歯はきちんとあったものを装着してください。
- (3) 入れ歯をはずしたあとは、アルコール含有量の少ない口内洗浄剤を使ってすぎ、口の中が乾燥して、出血の機会を増やすことのないようにしましょう。
- (4) 歯の治療を受ける場合は、事前に担当医に相談しましょう。
- (5) 鼻をかむ時は、静かにかむ。
- (6) 重いものを持ち上げたり、腰から体をかがめたりするような負担のかかる動きは避けましょう。
- (7) 排便時、強くりきみ過ぎない。排便コントロールをしましょう。便を柔らかく保ち、無理に（固いまま）排便しないようにすることが大事です。無理に出そうとすると、直腸のあたりの毛細血管が裂けて、痔になることがあります。りきめば、脳の周りの血圧があがり、他の出血の危険性まで高めてしまします。日頃より消化の良い食事を心がけたり、便を柔らかくして定期的に排便があるように、下剤を使うのもよいでしょう。
- (8) 絶対に必要な注射を除いて、あらゆる注射を避けましょう。注射をしてもらう場合も、血小板が減少していることを、注射する看護師や医師に必ず伝えましょう。
- (9) 採血や静脈注射をしてもらう必要がある場合には、注射針が抜かれ



た後の出血を抑えるため、針を刺した箇所を少なくとも5分間圧迫しましょう。採血をしてもらう際には、駆血帯（腕をしばるゴム）を使わないように伝えましょう。

- (10) アスピリンやアスピリン成分を含む製品の使用は避けましょう。処方されたステロイド剤を服用するときには、必ず牛乳、食べ物、または制酸剤（例、マーロックス）と一緒に取りましょう。



- (11) 高蛋白食品と飲み物を取り、生野菜は避けましょう。
- (12) ビールやワインも含めて、アルコール飲料は血液を固まりにくくするため、飲用を避けましょう。
- (13) 皮膚に怪我をしないように十分に気をつける（過激な運動、刃物や工具の使用、電気かみそりや爪切りの使用、庭いじり等を避ける）
- (14) 体をぶつけたり、転倒したりしないように注意しましょう。
- (15) 皮膚を強く搔いたり、こすったりしないようにしましょう。また、衣服やベルト、下着を着用する場合、きつく体を締め付けないようにしましょう。
- (16) むやみに薬を内服しないようにしましょう。
(鎮痛、解熱剤などには血小板の凝集機能を抑制する作用のあるものもあります)



- (17) アイロンや調理の際に火傷をしないように気を付けましょう。オーブンの中に手を入れる際は保護手袋を着用しましょう。
- (18) けがをしそうなスポーツは止めましょう。
- (19) 庭仕事や、とげのある植物のそばで仕事をするときは厚めの手袋をしましょう。
- (20) 感染症の危険を減らすため、女性はタンポンよりも生理用ナプキンを使用しましょう。
- (21) 性交の際には適切な潤滑油を使用し、激しく突くような動きは避けましょう。

3) 止血の方法

化学療法後は止血が簡単に止まらないこともあるので、出血傾向が続く場合には医師や看護師に早めに相談して下さい。

例) 鼻出血、歯肉出血、外傷

(1) 心身を安静にします。

体を動かすことにより、全身への血流量が増加し出血を助長します。なるべく静かに横になり心身の安静に努めましょう。

(2) 冷却して止血します。

アイスノンや、氷水を入れたビニール袋で、その部分を冷やすことにより、血管を収縮させ止血をする方法です。



(3) 圧迫法により止血します。

出血している部位をしっかりと圧迫して止血します。これは、出血している部位への血流を減少させると同時に、血液が凝固する作用を促進させ止血する方法です。同時に、出血部位を心臓より少し上に持ち上げるとより効果的です。

出血の原因や状況で異なりますが、通常では5～15分で止血されます。圧迫する場合は、いつから圧迫し始めたのか覚えておきましょう。例えば指の付け根をゴム等で強くまいて圧迫したままで長時間放置すると、血流が途絶え、出血部位やその周辺に不可逆な変化（壊死：細胞が死んでしまうこと）が生じことがあります。

また、手足の外傷の場合には出血部位から見て、心臓に近い部位を圧迫しましょう。例えば、指の先から出血した場合は、指の付け根を圧迫します。また、手の平や甲から止血した場合は手首を圧迫します。

(4) 出血部位は直接手で触れたりせず、清潔に保ちます。

(5) 鼻出血では止血してもしばらくは、強く鼻をかんだり、激しく咳をしたりしないようにし、刺激になることは避けます。

(6) 出血したら速やかに止血を行いましょう。止血しない場合は自己判断せず、すぐに医療機関に相談することが大切です。

4. 貧血

貧血の目安になる、ヘモグロビンという血液成分の値は成人の正常値で10~15g/dlといわれています。治療中は10g/dl以上あれば良いとされています。

血液細胞を作っている骨髄の正常な細胞は抗がん剤の影響を受けやすく、そのため、血球を作る能力が低下します。しかし、赤血球の寿命は120日と長い為、すぐには影響を受けません。貧血の症状は抗がん剤による化学療法開始後、1~2週間後より徐々に出現してきます。

赤血球は酸素を身体中に運ぶ作用がありますので、これが減少すると身体の組織が十分に酸素の供給を得られなくなります。このような状態を貧血と呼びます。

＜貧血になつたら起こる症状＞

ヘモグロビンが正常の70%以下の貧血 (Hb 9~10 g / dl)	必ずしも症状は現れません。また、慢性の貧血は徐々に進行するため、自覚症状のない場合もあります。一般的には顔色が悪く、まぶたの裏が白くなったり、口の中全体の赤みが減ったりします。
ヘモグロビンが正常の59%以下の貧血 (Hb 8 g / dl)	不足した体内の酸素を補うために、多くの血液を送らなければならず、心拍数が増加したり、少しの運動をしても、胸がどきどきしたり、息が切れたりします。また、微熱が見られることがあります。
ヘモグロビンが正常の40%以下の貧血 (Hb 7 g / dl)	頭痛や、めまい、耳鳴り、集中力の低下、不眠になります。また、体のすみすみまで酸素がまわらないため、疲れやすくなったり、手や足が冷えたりします。また、集中力がなくなることもあります。
ヘモグロビンが正常の30%以下の貧血 (Hb 5~6 g / dl)	食欲がなくなったり、はきけやむかつき、便秘等があらわれます。

ここにあげた貧血の程度と症状はあくまでも目安であり、年齢や性別、貧血の原因や健康状態などにより個人差があります。

1) 貧血の症状

- ・疲労感 ・顔色不良
- ・息切れ ・口の中全体の赤みが減る
- ・冷え性 ・瞼の裏が白くなる
- ・胸痛 ・頭痛
- ・めまい



血液検査によってヘモグロビンやヘマトクリット値(血液中に占める血球の容積比)が落ちているのがわかります。貧血は輸血を受けたり、血球数が回復してくると改善されます。

上のような症状が現れてきたら、医師に知らせたり、救急室に行きましょう。輸血が必要な場合もあります。


2) 貧血になつたら注意する事

(1) 日常生活について

- ① 十分な休養と睡眠をとり、無理をしない。(できるなら昼寝もとる)
- ② 重要な活動は、体力のあるうちに、最初にすませるようにしましょう。
- ③ 1日にする仕事を制限しましょう(買い物、育児、家事、運転などは、家族に手伝ってもらう)。必要なことだけをするようにし、余り忙しくしないようにしましょう。
- ④ 決して無理をしないように、お子さんの世話や、買い物、家事、車の運転など、他の人に頼める場合は頼んでしまいましょう。
- ⑤ 座っていたり、横になっているときに、急に立ったり、起き上がると眩暈を起こすので、ゆっくりとしましょう。
- ⑥ 急激な運動は避ける。(走る・階段をかけ上るなど)
- ⑦ 鼻血が出たときは、身体を起こした状態で鼻腔を鼻の上から押さえます。必要なら氷で冷やしてください。10分経っても止まらないときは、救急室へ行ってください。
- ⑧ 出血は、膀胱や直腸にも起きて、血尿や血便となってあらわれます。そのときはただちに医師に連絡してください。体のすみすみまで酸素がまわらないため、新陳代謝が低下していますので保温に心がけてください。

- ⑨ 体のすみずみまで酸素と一緒に栄養分もゆきとどかないため、抵抗力が低下していますので、手洗いやうがいを行ってください。

(2) 食事について



- ① 一日三食規則正しく食べる。
- ② 胃腸に負担をかけないような消化の良い食事をする。
- ③ たんぱく質を多く含む食品をとる。
- ④ 毎日の食事で、卵 肉類 魚介類 牛乳・乳製品 大豆および大豆製品の五種類を組み合わせて取る。
- ⑤ 鉄欠乏性貧血の人は鉄分を多く含む食品を取るようにこころがける。

[鉄を多く含む食品例]

レバー、かき、干しそば、かつお、春菊、ほうれんそう
パセリ、そば、ひじき、シジミ、ブルーン、レーズン等

- ⑥ 鉄分はビタミンCと一緒に摂取すると、体内での吸収率が良くなる。
したがって、毎日必ず食する必要があります。

[ビタミンCを多く含む食品例]

ブロッコリー、れんこん、さつまいも、小松菜、カリフラワー、キャベツ、キーウィフルーツ、レモン、オレンジ、いちご、柿

- ⑦ ビタミンB12は正常な赤血球を作るためになくてはならないものです。

[ビタミンB12を多く含む食品例]

ブロッコリー、ほうれんそう、グリーンアスパラガス、トマト
カリフラワー、レタス、キャベツ、玉ねぎ、にんじん、バナナ
ピーナッツ、いちじく、くるみ

⑧ よくかんで食べましょう。

食品中の鉄やたんぱく質など、血液の材料になる栄養素が効果的に利用されるために胃酸は大切な役割を果たしています。胃酸は胃液の中に含まれていますが、胃酸の分泌が少ないと食欲も減退して、必要な栄養量も消化吸収されにくくなります。よくかんで食べると胃酸の分泌がよくなります。

(3) 鉄剤について

鉄欠乏性貧血の場合、足りない鉄を補給するために鉄剤を服用することになります。経口剤としてはスローフィー、フェルム、フェロミアなどがあります。人によっては、鉄剤を服用すると鉄が胃の粘膜を刺激するため、はきけ、むかつき、下痢などを起こしてしまう場合があります。このような症状が現れ、指示された通りの服用ができない場合は主治医に報告しましょう。

貧血は、鉄剤がきちんと服用されれば、約6週間で改善されますが、例え貧血が改善されたからといって、すぐに鉄剤の服用をやめてはいけません。なぜならば、貧血の人は、体の中の鉄の蓄えをすべて使い果たしていますので、体内に鉄を蓄えておくため、貧血が改善しても医師の指示があるまでは鉄剤の服用を続けてください。また、定期的に検査をうけましょう。

経口的に服用ができない場合、服薬による効果がない場合は注射による方法もあります。なお鉄剤を服用しているときは、内服後1時間すぎまでは緑茶やコーヒーなど飲まないでください。それは鉄剤の吸収には30分程かかり、これらの飲み物はタンニンを含んでいるので、せっかく服用した鉄剤の吸収を悪くするからです。便の色が暗緑色か黒色になりますが、鉄剤によるものですので心配しないでください。



引用文献

安藤正志, 藤坂保仁, 山中康弘, 薬師寺聰美, 今滝修, 喜多川亮, 安井久晃, 中口智博, 清水千佳子, 堀明子, 向井博文, 川内伸哉, 松本光史, 河野勤, 大西康, 高橋秀徳, 徳永伸也(2002). 患者の「なぜ」に答えるがん化学療法Q&A, 渡辺亨, 飯野京子(編), 医学書院

清水美津江, 岡崎志保(2000). 骨髓抑制とその対策～重篤状態に陥る感染症, 出血, 貧血の予防と対策～, がん看護 5(6), 460-466

Marilyn, J. D., (1998) /大西和子(1998). がん化学療法の副作用対策－化学療法と放射線療法の副作用対策, パート1 第二章 感染症：白血球数の減少(p87-90)、血小板数の減少(p101-103)、貧血(p159-160), 照林社

参考文献

赤沢修吾, 有吉寛, 石谷邦彦、栗原稔, 桜井雅温, 佐々木恒雄, 塚越茂(1996). がん化学療法の副作用対策・改定版, 吉田清一(監), 先端医学社

足利幸乃(2002). 消化器外科ナーシング 2002年秋季増刊 正しく知りたいナースのための消化器がん化学療法と看護, 第4章5骨髓抑制とそれに伴う症状(p152-158), メディカ出版

Arno mark, Hans van der Lelie, (2003). Is there still an indication for nursing patients with prolonged neutropenia in protective isolation? Anevidence-based nursing and medical study of 4 years experience for nursing patients with neutropenia without isolation, European Journal of Oncology Nursing 7(1), 17-23

Shelton, B.K., (2003). Evidence-Based Care for The Neutropenic Patient With Leukemia, Seminars in Oncology Nursing 19(2), 133-141

Smith, L.H., Besser, S.G., (2000). Dietary Restrictions for Patients With Neutropenia:A Survey of Institutional Practices, Oncology Nursng Forum 27(3), 515-520

Hood, L. E., (2003). Chemotherapy in the Elderly:Supportive Measures for Chemotherapy-Induced Myelotoxicity, Clinical Journal of Oncology Nursing7(2), 185-190

Bedell, C., (2003). pegfilgrastim for Chemotherapy-Induced Neutropenia, Clinical Journal of Oncology Nursing7(1), 55-56, 63

山本昇(1998). がん化学療法の副作用と対策, 西條長宏(監), 中外医学社

Rust, D. M., Simpson, J. K., Lister, J., (2000). Nutritional Issues in Patients With Severe Neutropenia, Seminars in Oncology Nursing16(2), 152-162

Linc, L. G., Campbell, J. M., Kinion, E. S., (2001). Infections in Patients Receiving Cytotoxic Chemotherapy, MEDSURG nursing10(2), 61-68

渡辺隆(2003). 新しい有害事象対策 骨髄抑制-G-CSF適正使用ガイドラインを含む-, 癌と化学療法, 30(6), 755-759

外来化学療法を受けるがん患者のサポートプログラムの開発研究班


代表：内布敦子

連絡先：〒673-8588 明石市北王子町 13-71 兵庫県立看護大学内

電話・fax : 078-925-9435


e-mail: atsuko_uchinuno@cnas-hyogo.ac.jp

外来で化学療法を受ける患者様のための資料シリーズ5




緩和ケア

緩和ケアは、あなたの症状をやわらげ、あなたらしい生活をおくるための看護です。このパンフレットでは、緩和ケアについての正しい知識と、どのような看護をうけることができるのかをわかりやすくご説明いたします。ここに書かれているケアのうちいくつかは、緩和ケア病棟(ホスピス)と言われる施設で提供されているもので、全ての病院で行われているとは限りません。現在困っておられる問題が少しでも解決することを期待しています。



もくじ

I. 緩和ケアとは？	p.1
II. 緩和ケアは、治療と並行して行われています。	p.2
III. 緩和ケアについて考える時期が「早すぎ・遅すぎ」ことはありません。	p.3
IV. どのような看護ケアを受けることができますか？	p.4
1. 自分の病気を知り、治療法の選択についてのサポートを受ける	p.5
2. 痛みなどの苦痛な症状を取り除くケアを受ける.....	p.6
① 痛みを取り除く	
② 痛み以外の様々な症状を取り除く	
3. 日常生活を取り戻すケアを受ける.....	p.9
① お食事を楽しむケア	
② 苦痛や不快感を最低限にするように努力した排泄のケア	
③ 夜にぐっすり眠れるようにするためのケア	
④ 好きな姿勢をとったり、自然な体位や寝返りをうつケア	
⑤ からだをきれいに保つケア	
⑥ あなたにとって心地よい環境を提供するケア	
4. こころのふれあいを大切にし、元気になるケア.....	p.13
5. ご家族へのケア.....	p.14
6. ケアを家でも受けられるようにする.....	p.14
V. 緩和ケアにはどのくらいの費用がかかりますか？	p.15
VI. 緩和ケアをうけるシステム.....	p.16
VII. 情報.....	p.17
インターネット	
参考書籍	



I. 緩和ケアとは？

病気の治癒を目的としたものではなく、患者様の苦痛を取り除き、患者様とご家族にとって、可能な限りその人らしく快適な生活を送れるようにするケアです。

*ケア：世話という意味。語源は、「他者を気づかう」から来ている。

わたしたちは、WHOで定められた緩和ケアの定義を基本にして、看護ケアを提供します。


緩和ケアは、

- ・生きることを尊重し、誰にも例外なく訪れることとして死に行く過程にも敬意を払う。
- ・死を早めることにも死を遅らせることにも手を貸さない。
- ・痛みのコントロールと同時に、痛み以外の苦しい諸症状のコントロールを行う。
- ・心理面のケアや靈的な(spiritual)面のケアも行う。
- ・死が訪れるまで患者が積極的に生きていけるよう支援する体制をとる。
- ・患者が病気に苦しんでいる間も、患者と死別した後も、家族の苦難への対処を支援する体制をとる。

(世界保健機関編,武田文和訳,1990.がんの痛みからの解放とパリアティブ・ケア,がん患者の生命へのよき支援のために,金原出版,p5-6.より)


看護師は、患者様とご家族が心身ともに苦痛のない生活を送っていただけるよう援助を行い、患者様が望む生き方を実現できるようになることを目指しています。





II. 緩和ケアは治療と並行して行われています

これまでの緩和ケアは、一般に治癒ができなくなった末期がんの患者様のためのものというものでした。しかし、現在の緩和ケアは、治癒を目的とした方から末期の患者様まで全ての方に適応されています。治癒ができないから緩和ケアが始まるわけではありません。がんと闘うときも、治癒を望めなくなっていても緩和ケアは必要です。がんに立ち向かう体力と精神力を養うために心身の苦痛を取り除くことが必要となります。また、治癒を望めなくなっていても最期まで自分らしい生活をするために心身の苦痛を取り除く緩和ケアは必要となります。緩和ケアは、治療とともにスタートし、治療と並行して行われ、病状進行に伴い、徐々に緩和ケアの占める割合は増えていくというものです。



緩和ケアは、チームでおこないます。施設によって配置状況に差がありますが、医師・看護師・看護助手・ソーシャルワーカー（医療社会福祉士）・宗教家・カウンセラー（臨床心理士）・薬剤師・栄養士・理学療法士・作業療法士・音楽療法士・ボランティアがチームとなって患者様のニーズに対応していきます。





III. 緩和ケアについて考える時期が

「早すぎ・遅すぎ」ことはありません

まだ早いのではないか、もう遅すぎるのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません、緩和ケアの時期が遅いとか早いとかということはありません。あなたの今の状況にあった情報やケアが必要です。今考えたくないというときには、考えなくてもよいものです。

- * あなたの身体は今どんな状態ですか？
- * こころが苦しいと感じておられますか？
- * 今どのようなケアを受けておられますか？
- * 今後どのような緩和ケアを受けたいと考えていますか？
- * どんな日常生活のケア(お風呂やトイレ、食事のお手伝いなど)を受けたいですか？
- * 心配していることはありますか？

これらは、あなたが考えていかなければいけないのですが、決して一人で考える必要はありません。その時その時で、あなたが納得して選択できるように支援していくことが緩和ケアです。エネルギーがないときには、もちろん考えることはできません。考えたくないときにはもちろん考えなくてもいいのです。一人で抱え込まずに、周囲の医療スタッフやご家族に相談することがとても大切です。家族、看護師やその他の医療スタッフと相談しながらすすめていくことが大切です。





IV. どのような看護ケアを受けることが

できますか？

緩和ケアでは、患者様とご家族の生活を支えるためのケアを行います。具体的に、下の表のようなケアを受けることができます。

1. 自分の病気を知り、治療法の選択についてのサポートを受ける
2. 痛みなどの苦痛な症状を取り除くケアを受ける
 - ① 痛みを取り除く
 - ② 痛み以外の様々な症状を取り除く
3. 日常生活を取り戻すケアを受ける
 - ① お食事を楽しむケア
 - ② 苦痛や不快感を最低限にするように努力した排泄のケア
 - ③ 夜にぐっすり眠れるようにするためのケア
 - ④ 好きな姿勢をとったり、自然な体位や寝返りをうつケア
 - ⑤ からだをきれいに保つケア
 - ⑥ あなたにとって心地よい環境を提供するケア
4. こころのふれあいを大切にし、元気になるケア
5. ご家族へのケア
6. ケアを家でも受けられるようにする

