

No.	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実績名		患者背景 投与量・剤型・投与経路
				安全性/有効性 用法・用量/総合コメント		
309	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻		
	安全性:					
	有効性:					
	用 法:					
	総 合:					
310	国立F	麻酔科	適応外使用 潜在性二分脊椎、脊椎脂肪腫切除術	全麻		
	安全性:					
	有効性:					
	用 法:					
	総 合:					
311	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻		
	安全性:					
	有効性:					
	用 法:					
	総 合:					
312	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻		
	安全性:					
	有効性:					
	用 法:					
	総 合:					
313	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻		
	安全性:					
	有効性:					
	用 法:					
	総 合:					
314	国立F	麻酔科	適応外使用 心内膜床欠損症	全麻		
	安全性:					
	有効性:					
	用 法:					
	総 合:					
315	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻		
	安全性:					
	有効性:					
	用 法:					
	総 合:					
316	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻		
	安全性:					
	有効性:					
	用 法:					
	総 合:					
317	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻		
	安全性:					
	有効性:					
	用 法:					
	総 合:					
318	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻		
	安全性:					
	有効性:					
	用 法:					
	総 合:					
319	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻		
	安全性:					
	有効性:					
	用 法:					
	総 合:					

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
					投与量・剤型・投与経路
320	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	男 0歳 11ヶ月 (2002/11/18生) H: 77.2cm W: 9.9kg 入院・投与終了 2003/11/19 ~ 2003/11/19 (1日間) 0.05mg/日 (1x) → 注射 注射
321	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	男 0歳 11ヶ月 (2002/12/01生) H: 73.4cm W: 9.4kg 入院・投与終了 2003/11/21 ~ 2003/11/21 (1日間) 0.05mg/日 (1x) → 注射 注射
322	国立F	麻酔科	適応外使用 Rastelli手術	全麻	男 1歳 0ヶ月 (2002/11/18生) H: 77.2cm W: 9.9kg 入院・投与終了 2003/11/27 ~ 2003/11/27 (1日間) 1.60mg/日 (1x) → 注射 注射
323	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	男 1歳 0ヶ月 (2002/11/22生) H: 71.2cm W: 10.0kg 入院・投与終了 2003/11/05 ~ 2003/11/05 (1日間) 0.05mg/日 (1x) → 注射 注射
324	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	男 1歳 0ヶ月 (2002/10/31生) H: 78.0cm W: 10.9kg 入院・投与終了 2003/11/07 ~ 2003/11/07 (1日間) 0.03mg/日 (1x) → 注射 注射
325	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	男 1歳 0ヶ月 (2002/11/08生) H: 73.0cm W: 9.2kg 入院・投与終了 2003/11/10 ~ 2003/11/10 (1日間) 0.03mg/日 (1x) → 注射 注射
326	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	女 1歳 0ヶ月 (2002/11/12生) H: 72.4cm W: 8.3kg 入院・投与終了 2003/11/26 ~ 2003/11/26 (1日間) 0.09mg/日 (1x) → 注射 注射
327	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	女 1歳 0ヶ月 (2002/11/22生) H: 63.0cm W: 7.4kg 入院・投与終了 2003/11/28 ~ 2003/11/28 (1日間) 0.02mg/日 (1x) → 注射 注射
328	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	女 1歳 0ヶ月 (2002/11/07生) H: 76.0cm W: 8.3kg 入院・投与終了 2003/11/20 ~ 2003/11/20 (1日間) 0.01mg/日 (1x) → 注射 注射
329	国立F	麻酔科	適応外使用 Fallot四徴症根治術	全麻	女 1歳 1ヶ月 (2002/10/03生) H: 76.0cm W: 8.7kg 入院・投与終了 2003/11/18 ~ 2003/11/18 (1日間) 1.30mg/日 (1x) → 注射 注射
330	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	女 1歳 1ヶ月 (2003/10/28生) H: 72.2cm W: 8.3kg 入院・投与終了 2003/11/05 ~ 2003/11/05 (1日間) 0.85mg/日 (1x) → 注射 注射

No.	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実績名	
				患者背景 投与量・剤型・投与経路	
331	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:			男 1歳 1ヶ月 (2002/10/14生)	
	有効性:			H: 78.0cm W: 10.5kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/28 ~ 2003/11/28 (1日間)	
	総合:			0.18mg/H (1x) → 注射 注射	
332	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:			女 1歳 2ヶ月 (2002/07/18生)	
	有効性:			H: 76.5cm W: 9.4kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/26 ~ 2003/11/26 (1日間)	
	総合:			0.04mg/H (1x) → 注射 注射	
333	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:			男 1歳 3ヶ月 (2002/08/10生)	
	有効性:			H: 78.0cm W: 10.2kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/04 ~ 2003/11/04 (1日間)	
	総合:			1.60mg/H (1x) → 注射 注射	
334	国立F	麻酔科	適応外使用 類:口唇裂形成手術	全麻	
	安全性:			女 1歳 3ヶ月 (2002/06/25生)	
	有効性:			H: 79.4cm W: 10.5kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/18 ~ 2003/11/18 (1日間)	
	総合:			0.15mg/H (1x) → 注射 注射	
335	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:			男 1歳 3ヶ月 (2002/08/03生)	
	有効性:			H: 72.3cm W: 6.9kg 入院・	
	用法:			2003/11/27 ~ 0.03mg/H (1x) → 注射 注射	
	総合:				
336	国立F	麻酔科	適応外使用 拔管チューブ挿入術	全麻	
	安全性:			女 1歳 4ヶ月 (2002/07/12生)	
	有効性:			H: 80.0cm W: 10.0kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/20 ~ 2003/11/20 (1日間)	
	総合:			0.10mg/H (1x) → 注射 注射	
337	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:			男 1歳 7ヶ月 (2002/03/16生)	
	有効性:			H: 84.0cm W: 12.2kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/18 ~ 2003/11/18 (1日間)	
	総合:			0.08mg/H (1x) → 注射 注射	
338	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:			男 1歳 8ヶ月 (2002/03/10生)	
	有効性:			H: 80.4cm W: 11.2kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/12 ~ 2003/11/12 (1日間)	
	総合:			0.04mg/H (1x) → 注射 注射	
339	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:			女 1歳 8ヶ月 (2002/03/29生)	
	有効性:			H: 80.0cm W: 10.9kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/06 ~ 2003/11/06 (1日間)	
	総合:			0.02mg/H (1x) → 注射 注射	
340	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:			女 1歳 9ヶ月 (2002/01/05生)	
	有効性:			H: 79.0cm W: 9.4kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/04 ~ 2003/11/04 (1日間)	
	総合:			0.04mg/H (1x) → 注射 注射	
341	国立F	麻酔科	適応外使用 尿管保管吻合術	全麻	
	安全性:			女 1歳 9ヶ月 (2002/02/04生)	
	有効性:			H: 83.1cm W: 12.3kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/19 ~ 2003/11/19 (1日間)	
	総合:			0.13mg/H (1x) → 注射 注射	

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実績名	患者背景	
					投与量・経路	
342	国立F	麻酔科	適応外使用 頸・口蓋裂形成手術	全麻	男 1歳 11ヶ月 (2001/12/06生) H: 87.7cm W: 12.7kg 入院・投与終了 2003/11/27 ~ 2003/11/27 (1日間) 0.20mg/日 (1x) → 注射 注射	
343	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	女 2歳 0ヶ月 (2001/10/17生) H: 86.3cm W: 12.8kg 外来・投与終了 2003/11/11 ~ 2003/11/11 (1日間) 0.02mg/日 (1x) → 注射 注射	
344	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	男 2歳 4ヶ月 (2001/05/18生) H: 88.2cm W: 12.1kg 入院・投与終了 2003/11/25 ~ 2003/11/25 (1日間) 0.05mg/日 (1x) → 注射 注射	
345	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	男 2歳 7ヶ月 (2001/04/11生) H: 91.0cm W: 13.0kg 入院・投与終了 2003/11/12 ~ 2003/11/12 (1日間) 0.07mg/日 (1x) → 注射 注射	
346	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	女 2歳 8ヶ月 (2001/03/23生) H: 87.0cm W: 11.6kg 入院・投与終了 2003/11/05 ~ 2003/11/05 (1日間) 0.06mg/日 (1x) → 注射 注射	
347	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	女 2歳 8ヶ月 (2001/02/02生) H: 92.7cm W: 12.7kg 入院・投与終了 2003/11/26 ~ 2003/11/26 (1日間) 0.07mg/日 (1x) → 注射 注射	
348	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	男 2歳 8ヶ月 (2001/02/20生) H: 93.3cm W: 16.8kg 入院・投与終了 2003/11/07 ~ 2003/11/07 (1日間) 0.07mg/日 (1x) → 注射 注射	
349	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	男 2歳 9ヶ月 (2001/01/12生) H: 88.6cm W: 10.9kg 入院・投与終了 2003/11/04 ~ 2003/11/04 (1日間) 0.03mg/日 (1x) → 注射 注射	
350	国立F	麻酔科	適応外使用 側頭弁置換	全麻	女 2歳 10ヶ月 (2000/11/24生) H: 81.0cm W: 7.2kg 入院・投与終了 2003/11/13 ~ 2003/11/13 (1日間) 1.70mg/日 (1x) → 注射 注射	
351	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	女 2歳 11ヶ月 (2000/11/24生) H: 81.0cm W: 7.2kg 入院・投与終了 2003/11/25 ~ 2003/11/25 (1日間) 0.10mg/日 (1x) → 注射 注射	
352	国立F	麻酔科	適応外使用 心房中隔欠損直接閉鎖	全麻	女 2歳 11ヶ月 (2000/11/24生) H: 81.0cm W: 7.2kg 入院・投与終了 2003/11/21 ~ 2003/11/21 (1日間) 0.70mg/日 (1x) → 注射 注射	

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・類型・投与経路
353	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				女 2歳 1ヶ月 (2000/11/24生) H: 81.0cm W: 7.2kg 入院・投与終了 2003/11/13 ~ 2003/11/13 (1日間) 1.70mg/日 (1x) → 注射 注射
354	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				女 2歳 1ヶ月 (2000/10/26生) H: 96.1cm W: 16.4kg 入院・投与終了 2003/11/18 ~ 2003/11/18 (1日間) 0.02mg/日 (1x) → 注射 注射
355	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				女 2歳 1ヶ月 (2000/11/15生) H: 91.0cm W: 12.5kg 入院・投与終了 2003/11/19 ~ 2003/11/19 (1日間) 0.03mg/日 (1x) → 注射 注射
356	国立F	麻酔科	適応外使用 下茎切除…左側	全麻	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				女 2歳 1ヶ月 (2000/10/23生) H: 87.8cm W: 13.4kg 入院・投与終了 2003/11/17 ~ 2003/11/17 (1日間) 0.18mg/日 (1x) → 注射 注射
357	国立F	麻酔科	適応外使用 僧帽弁置換	全麻	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				女 3歳 0ヶ月 (2000/11/24生) H: 81.0cm W: 7.2kg 入院・投与終了 2003/11/13 ~ 2003/11/13 (1日間) 1.70mg/日 (1x) → 注射 注射
358	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				男 3歳 0ヶ月 (2000/11/02生) H: 92.3cm W: 12.1kg 入院・投与終了 2003/11/28 ~ 2003/11/28 (1日間) 0.07mg/日 (1x) → 注射 注射
359	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				女 3歳 0ヶ月 (2000/10/06生) H: 94.8cm W: 15.6kg 入院・投与終了 2003/11/21 ~ 2003/11/21 (1日間) 0.05mg/日 (1x) → 注射 注射
360	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				男 3歳 1ヶ月 (2000/10/27生) H: 100.4cm W: 14.8kg 入院・ 2003/11/27 ~ 0.09mg/日 (1x) → 注射 注射
361	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				女 3歳 2ヶ月 (2000/09/21生) H: 92.7cm W: 12.7kg 入院・投与終了 2003/11/12 ~ 2003/11/12 (1日間) 0.13mg/日 (1x) → 注射 注射
362	国立F	麻酔科	適応外使用 機能的介椎後根切除術	全麻	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				女 3歳 2ヶ月 (2000/07/29生) H: 96.0cm W: 12.9kg 入院・投与終了 2003/11/17 ~ 2003/11/17 (1日間) 1.40mg/日 (1x) → 注射 注射
363	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				女 3歳 2ヶ月 (2000/09/20生) H: 91.2cm W: 12.4kg 入院・投与終了 2003/11/20 ~ 2003/11/20 (1日間) 0.06mg/日 (1x) → 注射 注射

## WEB調査 実績データ

## フェンタニール注

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路
364	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性: 有効性: 用 法: 總 合:			女 3歳 2ヶ月 (2000/08/18生) H: 93.1cm W: 15.0kg 入院・投与終了 2003/11/10 ~ 2003/11/10 (1日間) 0.08mg/日 (1x) → 注射 注射	
365	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性: 有効性: 用 法: 總 合:			男 3歳 2ヶ月 (2000/08/20生) H: 96.9cm W: 14.0kg 入院・投与終了 2003/11/19 ~ 2003/11/19 (1日間) 0.03mg/日 (1x) → 注射 注射	
366	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性: 有効性: 用 法: 總 合:			男 3歳 3ヶ月 (2000/08/24生) H: 82.0cm W: 9.5kg 入院・投与終了 2003/11/06 ~ 2003/11/06 (1日間) 0.02mg/日 (1x) → 注射 注射	
367	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性: 有効性: 用 法: 總 合:			女 3歳 3ヶ月 (2000/08/12生) H: 90.0cm W: 8.5kg 入院・投与終了 2003/11/25 ~ 2003/11/25 (1日間) 0.03mg/日 (1x) → 注射 注射	
368	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性: 有効性: 用 法: 總 合:			男 3歳 4ヶ月 (2000/07/25生) H: 95.9cm W: 15.6kg 入院・投与終了 2003/11/18 ~ 2003/11/18 (1日間) 0.05mg/日 (1x) → 注射 注射	
369	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性: 有効性: 用 法: 總 合:			男 3歳 4ヶ月 (2000/06/19生) H: 93.0cm W: 13.9kg 入院・投与終了 2003/11/07 ~ 2003/11/07 (1日間) 0.00mg/日 (1x) → 注射 注射	
370	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性: 有効性: 用 法: 總 合:			男 3歳 6ヶ月 (2000/04/11生) H: 92.5cm W: 12.2kg 入院・投与終了 2003/11/11 ~ 2003/11/11 (1日間) 0.06mg/日 (1x) → 注射 注射	
371	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性: 有効性: 用 法: 總 合:			男 3歳 6ヶ月 (2000/03/24生) H: 96.6cm W: 14.9kg 入院・投与終了 2003/11/17 ~ 2003/11/17 (1日間) 0.01mg/日 (1x) → 注射 注射	
372	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性: 有効性: 用 法: 總 合:			男 3歳 7ヶ月 (2000/04/10生) H: 98.0cm W: 16.0kg 入院・投与終了 2003/11/13 ~ 2003/11/13 (1日間) 0.08mg/日 (1x) → 注射 注射	
373	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性: 有効性: 用 法: 總 合:			女 3歳 8ヶ月 (2000/03/24生) H: 101.3cm W: 15.7kg 入院・投与終了 2003/11/20 ~ 2003/11/20 (1日間) 0.03mg/日 (1x) → 注射 注射	
374	国立F	麻酔科	適応外使用 陰核形成術	全麻	
	安全性: 有効性: 用 法: 總 合:			女 3歳 9ヶ月 (1999/12/21生) H: 93.8cm W: 13.3kg 入院・投与終了 2003/11/17 ~ 2003/11/17 (1日間) 0.02mg/日 (1x) → 注射 注射	

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
			安全性/有効性 用法・用量/ 総合コメント		投与量・剤型・投与経路
375	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				女 3歳 9ヶ月 (2000/01/18生)
	有効性:				H: 98.3cm W: 15.4kg 入院・投与終了
	用 法:				2003/11/21 ~ 2003/11/21 (1日間)
	総 合:				0.02mg/日 (1x) → 注射 注射
376	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				女 3歳 9ヶ月 (2000/01/31生)
	有効性:				H: 100.5cm W: 14.6kg 入院・投与終了
	用 法:				2003/11/07 ~ 2003/11/07 (1日間)
	総 合:				0.08mg/日 (1x) → 注射 注射
377	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				男 3歳 10ヶ月 (1999/11/10生)
	有効性:				H: 100.7cm W: 16.8kg 入院・投与終了
	用 法:				2003/11/26 ~ 2003/11/26 (1日間)
	総 合:				0.01mg/日 (1x) → 注射 注射
378	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				男 3歳 11ヶ月 (1999/12/17生)
	有効性:				H: 100.5cm W: 15.4kg 入院・投与終了
	用 法:				2003/11/05 ~ 2003/11/05 (1日間)
	総 合:				0.03mg/日 (1x) → 注射 注射
379	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				男 4歳 1ヶ月 (1999/10/07生)
	有効性:				H: 92.4cm W: 140.3kg 入院・投与終了
	用 法:				2003/11/28 ~ 2003/11/28 (1日間)
	総 合:				0.11mg/日 (1x) → 注射 注射
380	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				女 4歳 4ヶ月 (1999/07/23生)
	有効性:				H: 101.3cm W: 17.5kg 入院・
	用 法:				2003/11/27 ~ 0.07mg/日 (1x) → 注射 注射
	総 合:				
381	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				女 4歳 6ヶ月 (1999/05/22生)
	有効性:				H: 100.5cm W: 15.2kg 入院・投与終了
	用 法:				2003/11/05 ~ 2003/11/05 (1日間)
	総 合:				0.05mg/日 (1x) → 注射 注射
382	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				男 4歳 7ヶ月 (1999/04/22生)
	有効性:				H: 102.8cm W: 15.2kg 入院・投与終了
	用 法:				2003/11/14 ~ 2003/11/14 (1日間)
	総 合:				0.05mg/日 (1x) → 注射 注射
383	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				女 4歳 7ヶ月 (1999/03/26生)
	有効性:				H: 103.7cm W: 16.0kg 入院・投与終了
	用 法:				2003/11/07 ~ 2003/11/07 (1日間)
	総 合:				0.05mg/日 (1x) → 注射 注射
384	国立F	歯科	適応外使用	全麻	
	安全性:				男 4歳 8ヶ月 (1999/02/20生)
	有効性:				H: 108.1cm W: 16.1kg 外来・投与終了
	用 法:				2003/11/19 ~ 2003/11/19 (1日間)
	総 合:				0.03mg/日 (1x) → 注射 注射
385	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				女 4歳 8ヶ月 (1999/02/07生)
	有効性:				H: 96.5cm W: 10.3kg 入院・投与終了
	用 法:				2003/11/11 ~ 2003/11/11 (1日間)
	総 合:				0.07mg/日 (1x) → 注射 注射

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			投与量・剤型・投与経路	
386	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	男 4歳 9ヶ月 (1999/02/03生) H: 109.7cm W: 20.7kg 入院・投与終了 2003/11/28 ~ 2003/11/28 (1日間) 0.06mg/H (ix) → 注射 注射
387	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	男 4歳 10ヶ月 (1999/01/05生) H: 106.4cm W: 18.6kg 入院・投与終了 2003/11/20 ~ 2003/11/20 (1日間) 0.06mg/H (ix) → 注射 注射
388	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	女 4歳 10ヶ月 (1999/12/24生) H: 101.5cm W: 18.2kg 入院・投与終了 2003/11/12 ~ 2003/11/12 (1日間) 0.03mg/H (ix) → 注射 注射
389	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	女 5歳 3ヶ月 (1998/08/18生) H: 110.0cm W: 19.9kg 入院・投与終了 2003/11/13 ~ 2003/11/13 (1日間) 0.22mg/H (ix) → 注射 注射
390	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	女 5歳 3ヶ月 (1998/08/10生) H: 109.5cm W: 18.8kg 入院・投与終了 2003/11/04 ~ 2003/11/04 (1日間) 0.08mg/H (ix) → 注射 注射
391	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	男 5歳 8ヶ月 (1998/01/31生) H: 112.0cm W: 19.8kg 入院・投与終了 2003/11/26 ~ 2003/11/26 (1日間) 0.10mg/H (ix) → 注射 注射
392	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	女 5歳 8ヶ月 (1998/02/19生) H: 116.4cm W: 20.0kg 入院・投与終了 2003/11/07 ~ 2003/11/07 (1日間) 0.04mg/H (ix) → 注射 注射
393	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	女 5歳 9ヶ月 (1998/02/12生) H: 104.5cm W: 13.2kg 入院・ 2003/11/27 ~ 0.04mg/H (ix) → 注射 注射
394	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	男 5歳 9ヶ月 (1998/01/03生) H: 115.2cm W: 25.0kg 入院・投与終了 2003/11/14 ~ 2003/11/14 (1日間) 0.10mg/H (ix) → 注射 注射
395	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	女 5歳 10ヶ月 (1997/12/27生) H: 118.0cm W: 21.0kg 入院・投与終了 2003/11/28 ~ 2003/11/28 (1日間) 0.06mg/H (ix) →
396	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	男 5歳 10ヶ月 (1997/11/11生) H: 115.0cm W: 28.5kg 入院・投与終了 2003/11/14 ~ 2003/11/14 (1日間) 0.09mg/H (ix) → 注射 注射

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実績名	
				患者背景 投与量・剤型・投与経路	
397	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:			男 6歳 0ヶ月 (1997/10/31生)	
	有効性:			H: 113.4cm W: 20.7kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/25 ~ 2003/11/25 (1日間)	
	総合:			0.10mg/日 (1x) → 注射 注射	
398	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:			男 6歳 3ヶ月 (1997/08/28生)	
	有効性:			H: 115.4cm W: 20.3kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/05 ~ 2003/11/05 (1日間)	
	総合:			0.06mg/日 (1x) → 注射 注射	
399	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:			男 6歳 4ヶ月 (1997/07/28生)	
	有効性:			H: 119.6cm W: 19.4kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/05 ~ 2003/11/05 (1日間)	
	総合:			0.08mg/日 (1x) → 注射 注射	
400	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:			女 6歳 5ヶ月 (1997/05/23生)	
	有効性:			H: 111.9cm W: 16.1kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/19 ~ 2003/11/19 (1日間)	
	総合:			0.08mg/日 (1x) → 注射 注射	
401	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:			女 6歳 5ヶ月 (1997/05/23生)	
	有効性:			H: 115.8cm W: 16.9kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/19 ~ 2003/11/19 (1日間)	
	総合:			0.03mg/日 (1x) → 注射 注射	
402	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:			男 6歳 5ヶ月 (1997/05/03生)	
	有効性:			H: 128.9cm W: 26.5kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/14 ~ 2003/11/14 (1日間)	
	総合:			0.05mg/日 (1x) → 注射 注射	
403	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:			男 6歳 6ヶ月 (1997/05/27生)	
	有効性:			H: 114.0cm W: 22.0kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/27 ~ 2003/11/27 (1日間)	
	総合:			0.08mg/日 (1x) → 注射 注射	
404	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:			男 6歳 6ヶ月 (1997/04/12生)	
	有効性:			H: 117.5cm W: 23.4kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/10 ~ 2003/11/10 (1日間)	
	総合:			0.10mg/日 (1x) → 注射 注射	
405	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:			男 6歳 6ヶ月 (1997/04/12生)	
	有効性:			H: 114.5cm W: 21.1kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/07 ~ 2003/11/07 (1日間)	
	総合:			0.06mg/日 (1x) → 注射 注射	
406	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:			男 6歳 8ヶ月 (1997/02/17生)	
	有効性:			H: 124.6cm W: 25.5kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/11 ~ 2003/11/11 (1日間)	
	総合:			0.06mg/日 (1x) → 注射 注射	
407	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:			男 6歳 11ヶ月 (1996/11/26生)	
	有効性:			H: 103.0cm W: 13.0kg 入院・投与終了	
	用法:			2003/11/10 ~ 2003/11/10 (1日間)	
	総合:			0.07mg/日 (1x) → 注射 注射	

## WEB調査 実績データ

## フェンタニール注

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
					投与量・経路
408	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	男 7歳 2ヶ月 (1996/09/04生) H: 117.0cm W: 26.0kg 入院・投与終了 2003/11/21 ~ 2003/11/21 (1日間) 0.08mg/日 (ix) → 注射 注射
409	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	男 7歳 4ヶ月 (1996/06/21生) H: 125.4cm W: 22.6kg 入院・投与終了 2003/11/21 ~ 2003/11/21 (1日間) 0.05mg/日 (ix) → 注射 注射
410	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	女 7歳 11ヶ月 (1995/12/27生) H: 119.0cm W: 19.0kg 入院・投与終了 2003/11/18 ~ 2003/11/18 (1日間) 0.10mg/日 (ix) → 注射 注射
411	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	女 8歳 8ヶ月 (2003/03/09生) W: 5.1kg 入院・投与終了 2003/11/12 ~ 2003/11/12 (1日間) 0.01mg/日 (ix) → 注射 注射
412	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	女 9歳 1ヶ月 (1994/10/31生) H: 109.0cm W: 19.3kg 入院・投与終了 2003/11/05 ~ 2003/11/05 (1日間) 0.10mg/日 (ix) → 注射 注射
413	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	女 9歳 4ヶ月 (1994/06/01生) H: 129.2cm W: 26.8kg 入院・投与終了 2003/11/25 ~ 2003/11/25 (1日間) 0.10mg/日 (ix) → 注射 注射
414	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	男 9歳 6ヶ月 (1994/03/06生) 入院・投与終了 2003/11/14 ~ (1日間) 0.13mg/日 (ix) → 注射 注射
415	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	女 10歳 0ヶ月 (1993/10/17生) H: 122.1cm W: 23.4kg 入院・投与終了 2003/11/11 ~ 2003/11/11 (1日間) 0.02mg/日 (ix) → 注射 注射
416	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	男 11歳 0ヶ月 (1992/11/07生) H: 142.1cm W: 36.5kg 入院・投与終了 2003/11/28 ~ 2003/11/28 (1日間) 0.10mg/日 (ix) → 注射 注射
417	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	男 11歳 1ヶ月 (1992/11/01生) H: 145.0cm W: 37.0kg 入院・投与終了 2003/11/13 ~ 2003/11/13 (1日間) 0.10mg/日 (ix) → 注射 注射
418	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	女 11歳 4ヶ月 (1992/07/11生) H: 147.3cm W: 54.2kg 入院・ 2003/11/26 ~ 0.18mg/日 (ix) → 注射 注射

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
					投与量・用量・投与経路
419	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				男 11歳 6ヶ月 (1992/05/26生)
	有効性:				Ht: 143.2cm W: 44.5kg 入院・投与終了
	用 法:				2003/11/06 ~ 2003/11/06 (1日間)
	総 合:				0.12mg/日 (1x) → 注射 注射
420	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				男 11歳 7ヶ月 (1992/03/04生)
	有効性:				Ht: 152.0cm W: 46.7kg 入院・投与終了
	用 法:				2003/11/26 ~ 2003/11/26 (1日間)
	総 合:				0.30mg/日 (1x) → 注射 注射
421	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				男 11歳 8ヶ月 (1992/01/09生)
	有効性:				Ht: 159.6cm W: 46.6kg 入院・投与終了
	用 法:				2003/11/18 ~ 2003/11/18 (1日間)
	総 合:				0.10mg/日 (1x) → 注射 注射
422	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				男 11歳 9ヶ月 (1992/01/30生)
	有効性:				Ht: 158.0cm W: 47.2kg 入院・投与終了
	用 法:				2003/11/28 ~ 2003/11/28 (1日間)
	総 合:				0.25mg/日 (1x) → 注射 注射
423	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				男 11歳 10ヶ月 (1991/12/19生)
	有効性:				Ht: 147.2cm W: 33.2kg 入院・投与終了
	用 法:				2003/11/10 ~ 2003/11/10 (1日間)
	総 合:				0.20mg/日 (1x) → 注射 注射
424	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				女 12歳 3ヶ月 (1991/07/30生)
	有効性:				Ht: 157.7cm W: 51.0kg 入院・
	用 法:				2003/11/27 ~ 2003/11/27 (1日間)
	総 合:				0.20mg/日 (1x) → 注射 注射
425	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				男 12歳 6ヶ月 (1991/05/09生)
	有効性:				Ht: 156.0cm W: 55.0kg 入院・投与終了
	用 法:				2003/11/12 ~ 2003/11/12 (1日間)
	総 合:				0.30mg/日 (1x) → 注射 注射
426	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				女 12歳 6ヶ月 (1991/04/27生)
	有効性:				Ht: 125.5cm W: 28.9kg 入院・投与終了
	用 法:				2003/11/20 ~ 2003/11/20 (1日間)
	総 合:				0.06mg/日 (1x) → 注射 注射
427	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				男 12歳 8ヶ月 (1991/02/15生)
	有効性:				Ht: 162.2cm W: 45.3kg 入院・投与終了
	用 法:				2003/10/31 ~ 2003/10/31 (1日間)
	総 合:				0.20mg/日 (1x) → 注射 注射
428	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				女 12歳 11ヶ月 (1991/12/25生)
	有効性:				Ht: 158.7cm W: 50.0kg 入院・投与終了
	用 法:				2003/11/26 ~ 2003/11/26 (1日間)
	総 合:				0.30mg/日 (1x) → 注射 注射
429	国立F	麻酔科	適応外使用	全麻	
	安全性:				男 13歳 4ヶ月 (1990/05/29生)
	有効性:				Ht: 145.9cm W: 45.7kg 入院・投与終了
	用 法:				2003/11/14 ~ 2003/11/14 (1日間)
	総 合:				0.20mg/日 (1x) → 注射 注射

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
430	安全性/有効性 用法・用量/總合コメント	国立F 麻酔科	適応外使用	全麻	投与量・剤型・投与経路
	安全性: 有効性: 用 法: 總 合:				男 13歳 6ヶ月 (1990/05/16生) H: 167.0cm W: 57.0kg 入院・投与終了 2003/11/13 ~ 2003/11/13 (1日間) 0.30mg/H (1x) → 注射 注射
431	安全性/有効性 用 法: 總 合:	国立F 麻酔科	適応外使用	全麻	男 14歳 5ヶ月 (1989/05/24生) H: 168.1cm W: 42.5kg 入院・投与終了 2003/11/07 ~ 2003/11/07 (1日間) 0.10mg/H (1x) → 注射 注射
432	安全性/有効性 用 法: 總 合:	国立F 麻酔科	適応外使用	全麻	男 15歳 1ヶ月 (1988/09/22生) H: 160.0cm W: 72.9kg 入院・投与終了 2003/11/21 ~ 2003/11/21 (1日間) 0.20mg/H (1x) → 注射 注射
433	安全性/有効性 用 法: 總 合:	国立F 麻酔科	適応外使用	全麻	男 16歳 0ヶ月 (1987/09/15生) H: 173.2cm W: 40.1kg 入院・投与終了 2003/11/14 ~ 2003/11/14 (1日間) 0.60mg/H (1x) → 注射 注射
434	安全性/有効性 用 法: 總 合:	国立F 麻酔科	適応外使用	全麻	男 16歳 1ヶ月 (1987/09/23生) H: 174.4cm W: 68.6kg 入院・投与終了 2003/11/28 ~ 2003/11/28 (1日間) 0.75mg/H (1x) → 注射 注射
435	安全性/有効性 用 法: 總 合:	国立F 麻酔科	適応外使用	全麻	男 16歳 2ヶ月 (1987/08/10生) H: 161.6cm W: 60.2kg 入院・投与終了 2003/11/11 ~ 2003/11/11 (1日間) (1x) → 注射 注射
436	安全性/有効性 用 法: 總 合:	国立F 麻酔科	適応外使用 右室流出路形成術+人工心肺	全麻	男 16歳 2ヶ月 (1987/08/10生) H: 161.6cm W: 60.2kg 入院・投与終了 2003/11/11 ~ 2003/11/11 (1日間) 6.30mg/H (1x) → 注射 注射
437	安全性/有効性 用 法: 總 合:	国立F 麻酔科	適応外使用	全麻	男 16歳 2ヶ月 (1987/08/12生) 入院・投与終了 2003/11/22 ~ 2003/11/22 (1日間) 0.10mg/H (1x) → 注射 注射
438	安全性/有効性 用 法: 總 合:	国立F 麻酔科	適応外使用	全麻	女 16歳 4ヶ月 (1987/06/22生) H: 161.5cm W: 47.2kg 入院・投与終了 2003/11/04 ~ 2003/11/04 (1日間) 0.20mg/H (1x) → 注射 注射
439	安全性:特になし 有効性:著効 用 法: 總 合:	大学A 小児科	適応外使用	手術後の鎮痛	男 0歳 1ヶ月 (2003/11/01生) 入院・投与終了 2003/11/01 ~ 2003/11/01 (1日間) 0.10mg/H (1x) → 注射 注射
440	安全性/有効性 用 法: 總 合:	大学B 小児科	適応外使用	鎮痛・鎮静・麻酔	女 0歳 0ヶ月 (2003/11/23生) 入院・ ~ 0.20mg → 0.40mg 注射 注射

No	施設名	静 廉 科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
					投与量・剤型・投与経路
441	大学B (周産母子センター)	適応外使用		鎮痛・鎮静・麻酔	男 0歳 0ヶ月 (2003/11/21生) 入院・ ~ 0.20mg → 0.40mg 注射 注射
442	大学B (周産母子センター)	適応外使用	null	鎮痛・鎮静・麻酔	男 0歳 3ヶ月 (2003/09/08生) 入院・ ~ 0.20mg → 0.30mg 注射 注射
443	大学B (脳神経外科)	適応外使用	null	麻酔	女 1歳 1ヶ月 (2002/11/08生) 入院・ ~ 0.03mg/日 注射 注射
444	大学B 形成外科	適応外使用	null	麻酔	男 1歳 6ヶ月 (2002/06/06生) 入院・ ~ 0.05mg/日 注射 注射
445	大学B 皮膚科	適応外使用	null	麻酔	男 1歳 7ヶ月 (2002/05/02生) 入院・ ~ 0.10mg/日 注射 注射
446	大学B 泌尿器科	適応外使用	null	麻酔	男 1歳 8ヶ月 (2002/04/10生) 入院・ ~ 0.63mg/日 注射 注射
447	大学B 心臓血管外科	適応外使用	null	麻酔	男 2歳 0ヶ月 (2001/12/07生) 入院・ ~ 0.10mg/日 注射 注射
448	大学B 心臓血管外科	適応外使用	null	麻酔	男 2歳 2ヶ月 (2001/10/06生) 入院・ ~ 1.00mg/日 注射 注射
449	大学B 心臓血管外科	適応外使用	null	麻酔	男 2歳 6ヶ月 (2001/05/25生) 入院・ ~ 0.30mg → 0.40mg 注射 注射
450	大学B 皮膚科	適応外使用		麻酔	女 4歳 9ヶ月 (1999/02/20生) 入院・ ~ 0.03mg/日 注射 注射
451	大学B 小児科 (小児外科)	適応外使用		麻酔	男 6歳 3ヶ月 (1997/09/10生) 入院・ ~ 0.60mg/日 注射 注射

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実績名	
				安全性/有効性 用法・用量/総合コメント	患者背景 投与量・剤型・投与経路
452	大学B	小児科	適応外使用	鎮痛・鎮静・麻酔	女 6歳 7ヶ月 (1997/04/17生) 入院・ ~ 0.15mg/日 注射 注射
453	大学B	眼科	適応外使用	鎮痛・鎮静・麻酔	男 8歳 7ヶ月 (1995/05/11生) 入院・ ~ 注射 注射
454	大学B	皮膚科	適応外使用	麻酔	女 8歳 10ヶ月 (1995/01/27生) 入院・ ~ 0.10mg/日 注射 注射
455	大学B	整形外科	適応外使用	麻酔	女 9歳 3ヶ月 (1994/08/27生) 入院・ ~ 0.10mg/日 注射 注射
456	大学B	小児科	適応外使用	麻酔	男 9歳 3ヶ月 (1994/09/07生) 入院・ ~ 0.15mg/日 注射 注射
457	大学B	耳鼻咽喉科 (耳鼻咽喉・頭頸部外科)	適応外使用	麻酔	男 10歳 6ヶ月 (1993/05/18生) 入院・ ~ 0.08mg/日 注射 注射
458	大学B	形成外科	適応外使用	麻酔	男 11歳 5ヶ月 (2002/07/01生) 入院・ ~ 1.20mg/日 注射 注射
459	大学B	整形外科	適応外使用	麻酔	女 12歳 4ヶ月 (1991/07/18生) 入院・ ~ 0.05mg/日 注射 注射
460	大学B	整形外科	適応外使用	麻酔	女 12歳 5ヶ月 (1991/07/06生) 入院・ ~ 0.10mg/日 注射 注射
461	大学B	形成外科	適応外使用	麻酔	女 12歳 7ヶ月 (1991/04/25生) 入院・ ~ 0.50mg/日 注射 注射
462	大学B	眼科	適応外使用	麻酔	男 13歳 3ヶ月 (1990/09/13生) 入院・ ~ 0.20mg/日 注射 注射

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
					投与量・剤型・投与経路
463	大学B	形成外科	適応外使用	麻酔	
	安全性:				女 14歳 2ヶ月 (1989/10/11生)
	有効性:				入院・
	用法:				
	総合:				0.20mg/日 → 注射 注射
464	大学B	小児科 (小児外科)	適応外使用	鎮痛、鎮静、麻酔	
	安全性:				男 14歳 4ヶ月 (1989/08/03生)
	有効性:				入院・
	用法:				
	総合:				→ 注射 注射
465	大学B	婦人科	適応外使用	麻酔	
	安全性:				女 15歳 7ヶ月 (1988/05/07生)
	有効性:				入院・
	用法:				
	総合:				0.10mg/日 → 注射 注射
466	大学C	形成外科	適応外使用	手術時の全身麻酔の補助	
	安全性:特になし				男 0歳 4ヶ月 (2003/07/03生)
	有効性:有効				H: 59.0cm W: 6.0kg 入院・投与終了
	用法:				2003/11/12 ~ 2003/11/12 (1日間)
	総合:				0.01mg/日 → 注射 注射
467	大学C	外科 (小児外科)	適応外使用	手術時の全身麻酔の補助	
	安全性:特になし				女 0歳 9ヶ月 (2003/02/05生)
	有効性:有効				H: 68.0cm W: 8.0kg 入院・投与終了
	用法:				2003/11/06 ~ 2003/11/06 (1日間)
	総合:				0.01mg/日 → 注射 注射
468	大学C	外科 (小児外科)	適応外使用	手術時の全身麻酔の補助	
	安全性:特になし				男 1歳 0ヶ月 (2002/10/30生)
	有効性:有効				H: 70.0cm W: 8.8kg 入院・投与終了
	用法:				2003/11/11 ~ 2003/11/11 (1日間)
	総合:				0.02mg/日 → 注射 注射
469	大学C	形成外科	適応外使用	手術時の全身麻酔の補助	
	安全性:特になし				女 1歳 1ヶ月 (2002/09/10生)
	有効性:有効				H: 73.8cm W: 9.4kg 入院・投与終了
	用法:				2003/11/07 ~ 2003/11/07 (1日間)
	総合:				0.04mg/日 → 注射 注射
470	大学C	外科 (小児外科)	適応外使用	手術時の全身麻酔の補助	
	安全性:特になし				男 1歳 4ヶ月 (2002/06/22生)
	有効性:有効				W: 10.0kg 入院・投与終了
	用法:				2003/11/18 ~ 2003/11/18 (1日間)
	総合:				0.01mg/日 → 注射 注射
471	大学C	形成外科	適応外使用	手術時の全身麻酔の補助	
	安全性:特になし				男 1歳 7ヶ月 (2002/04/12生)
	有効性:有効				H: 83.9cm W: 9.2kg 入院・投与終了
	用法:				2003/11/21 ~ 2003/11/21 (1日間)
	総合:				0.02mg/日 → 注射 注射
472	大学C	形成外科	適応外使用	手術時の全身麻酔の補助	
	安全性:特になし				女 1歳 8ヶ月 (2002/02/24生)
	有効性:有効				H: 80.0cm W: 6.1kg 入院・投与終了
	用法:				2003/11/12 ~ 2003/11/12 (1日間)
	総合:				0.01mg/日 → 注射 注射
473	大学C	外科 (小児外科)	適応外使用	手術時の全身麻酔の補助	
	安全性:特になし				男 2歳 6ヶ月 (2001/04/26生)
	有効性:有効				H: 75.0cm W: 6.6kg 入院・投与終了
	用法:				2003/11/04 ~ 2003/11/04 (1日間)
	総合:				0.01mg/日 → 注射 注射

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実績名		患者背景 投与量・剂型・投与経路
				安全性/有効性 用法・用量/総合コメント		
474	大学C	外科 (小児外科)	適応外使用	手術時の全身麻酔の補助		女 2歳 8ヶ月 (2001/02/28生) H: 89.0cm W: 12.0kg 入院・投与終了 2003/11/13 ~ 2003/11/13 (1日間) 0.01mg/日 → 注射 注射
475	大学C	外科 (小児外科)	適応外使用	手術時の全身麻酔の補助		女 2歳 11ヶ月 (2000/11/28生) H: 93.0cm W: 13.5kg 入院・投与終了 2003/11/27 ~ 2003/11/27 (1日間) 0.03mg/日 → 注射 注射
476	大学C	外科 (小児外科)	適応外使用	手術時の全身麻酔の補助		女 2歳 11ヶ月 (2000/12/18生) H: 92.0cm W: 14.0kg 入院・投与終了 2003/11/25 ~ 2003/11/25 (1日間) 0.40mg/日 → 注射 注射
477	大学C	外科 (小児外科)	適応外使用	手術時の全身麻酔の補助		女 3歳 5ヶ月 (2000/06/07生) H: 94.5cm W: 12.6kg 入院・投与終了 2003/11/11 ~ 2003/11/11 (1日間) 0.02mg/日 → 注射 注射
478	大学C	外科 (小児外科)	適応外使用	手術時の全身麻酔の補助		男 4歳 6ヶ月 (1999/04/09生) W: 14.0kg 入院・投与終了 2003/11/06 ~ 2003/11/06 (1日間) 0.02mg/日 → 注射 注射
479	大学C	麻酔科 (集中治療部)	適応外使用	手術時の全身麻酔の補助		男 5歳 6ヶ月 (1998/05/28生) H: 111.1cm W: 20.7kg 入院・投与終了 2003/11/28 ~ 2003/11/28 (1日間) 0.03mg/日 → 注射 注射
480	大学C	眼科	適応外使用	手術時の全身麻酔の補助		女 5歳 10ヶ月 (1997/12/22生) H: 109.0cm W: 17.5kg 入院・投与終了 2003/11/12 ~ 2003/11/12 (1日間) 0.05mg/日 → 注射 注射
481	大学C	外科 (小児外科)	適応外使用	手術時の全身麻酔の補助		女 5歳 10ヶ月 (1998/01/12生) H: 105.0cm W: 16.0kg 入院・投与終了 2003/11/18 ~ 2003/11/18 (1日間) 0.03mg/日 → 注射 注射
482	大学C	形成外科	適応外使用	手術時の全身麻酔の補助		女 6歳 4ヶ月 (1997/07/09生) H: 112.0cm W: 19.9kg 入院・投与終了 2003/11/14 ~ 2003/11/14 (1日間) 0.02mg/日 → 注射 注射
483	大学C	眼科	適応外使用	手術時の全身麻酔の補助		男 7歳 2ヶ月 (1996/09/11生) H: 125.0cm W: 23.5kg 入院・投与終了 2003/11/14 ~ 2003/11/14 (1日間) 0.05mg/日 → 注射 注射
484	大学C	整形外科	適応外使用	手術時の全身麻酔の補助		男 7歳 9ヶ月 (1996/02/07生) H: 140.0cm W: 35.0kg 入院・投与終了 2003/11/13 ~ 2003/11/13 (1日間) 0.10mg/日 → 注射 注射

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実績名		患者背景 投与量・剤型・投与経路
				安全性/有効性 用法・用量/総合コメント		
485	大学C	耳鼻咽喉科	適応外使用		手術時の全身麻酔の補助	
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:					女 8歳 10ヶ月 (1995/01/12生) H: 120.0cm W: 26.0kg 入院・投与終了 2003/11/25 ~ 2003/11/25 (1日間) 0.03mg/日 → 注射 注射
	総合:					
486	大学C	眼科	適応外使用		手術時の全身麻酔の補助	
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:					男 13歳 7ヶ月 (1990/03/15生) H: 163.1cm W: 51.4kg 入院・投与終了 2003/11/05 ~ 2003/11/05 (1日間) 0.40mg/日 → 注射 注射
	総合:					
487	大学C	形成外科	適応外使用		手術時の全身麻酔の補助	
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:					男 15歳 8ヶ月 (1988/03/06生) H: 169.5cm W: 50.0kg 入院・投与終了 2003/11/05 ~ 2003/11/05 (1日間) 0.10mg/日 → 注射 注射
	総合:					
488	大学C	循環器科 (第二内科)	適応外使用		心臓カテーテル時の麻酔の補助	
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:					女 15歳 9ヶ月 (1988/02/01生) H: 157.0cm W: 44.0kg 入院・投与終了 2003/11/05 ~ 2003/11/05 (1日間) 0.12mg/日 → 注射 注射
	総合:					
489	大学C	外科 (第一外科)	適応外使用		手術時の全身麻酔の補助	
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:					男 16歳 4ヶ月 (1987/07/06生) H: 168.0cm W: 70.0kg 入院・投与終了 2003/11/11 ~ 2003/11/11 (1日間) 0.80mg/日 → 注射 注射
	総合:					
490	大学C	外科 (小児外科)	適応外使用		手術時の全身麻酔の補助	
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:					男 16歳 11ヶ月 (1986/11/07生) H: 150.0cm W: 23.0kg 入院・投与終了 2003/11/04 ~ 2003/11/04 (1日間) 0.20mg/日 → 注射 注射
	総合:					

## WEB調査 実績データ

## 塩酸メチルフェニデート錠・散

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実績名		患者背景 投与量・剤型・投与経路
				安全性/有効性 用法・用量/総合コメント		
1	公立こどもB	神経科	適応外使用	ADHD		
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 散剤の採用がないため、錠剤を粉砕して散剤とした 総 合:				男 4歳 6ヶ月 (1999/04/28生) H: 130.8cm W: 16.8kg 外来・継続中 2003/11/19 ~ 5.00mg/日 (1x) → 散 内用	
2	公立こどもB	神経科	適応外使用	ADHD		
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 以前は断続的に服用、現在休日は、休業しています 総 合:				女 8歳 5ヶ月 (1995/05/21生) H: 130.8cm W: 30.3kg 外来・継続中 2002/12/04 ~ 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
3	公立こどもB	神経科	適応外使用	ADHD		
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 1日2回朝食後:昼食後=2:1で服用 総 合: 身長・体重は2003.8.14測定値です。				男 10歳 7ヶ月 (1993/04/02生) H: 138.8cm W: 43.9kg 外来・継続中 2003/08/20 ~ 15.00mg/日 (2x) 10.00mg → 錠・カプセル 内用	
4	公立こどもB	神経科	適応外使用	ADHD		
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 1日2回朝食後:昼食後=2:1で服用 総 合: 身長・体重は2003.5.13測定値です。散剤を採用薬品としていないので、錠剤を粉砕しています。				男 14歳 11ヶ月 (1988/11/28生) H: 136.1cm W: 35.6kg 外来・継続中 2001/06/29 ~ 10.00mg/日 (1x) 5.00mg → 15.00mg 散 内用	
5	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害		
	安全性:特になし 有効性:やや有効 用 法: 幼稚園に行く日の朝服用。 総 合:				男 5歳 9ヶ月 (1998/02/22生) H: 120.2cm W: 29.8kg 外来・継続中 2003/04/30 ~ 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
6	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害		
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 1日1回幼稚園に行く朝に服用。 総 合:				男 6歳 7ヶ月 (1997/05/01生) H: 120.2cm W: 29.8kg 外来・継続中 2003/05/07 ~ 20.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
7	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害		
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 幼稚園に行く日の朝服用。 総 合:				男 6歳 7ヶ月 (1997/05/04生) H: 120.2cm W: 29.8kg 外来・継続中 2003/07/29 ~ 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
8	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害		
	安全性:副作用あり:概要を記載 有効性:有効 用 法: 学校行く日、1日2回朝1錠15mgずつ服用。 総 合:				男 6歳 9ヶ月 (1997/02/24生) H: 120.6cm W: 28.2kg 外来・継続中 2003/05/07 ~ 30.00mg/日 (2x) → その他(錠剤を粉砕) 内用	
9	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害		
	安全性:不明または未判定 有効性:不明または未判定 用 法: 朝1錠→朝1錠、昼0.5錠→朝1錠、昼1錠(又は朝1錠、昼0.5錠、下校時0.5錠)2週間ごとに様子を見ながら漸増していく。 総 合:				男 7歳 0ヶ月 (1996/11/27生) H: 125.3cm W: 34.6kg 外来・継続中 2003/11/11 ~ 錠・カプセル 内用	
10	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害		
	安全性:不明または未判定 有効性:不明または未判定 用 法: 学校に行く日の朝服用。 総 合:				男 7歳 4ヶ月 (1996/08/12生) H: 130.3cm W: 34.2kg 外来・継続中 2003/11/17 ~ 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
11	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害		
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 学校に行く日の朝服用。 総 合:				男 7歳 4ヶ月 (1996/08/04生) H: 119.5cm W: 21.8kg 外来・継続中 2003/11/17 ~ 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実績	
				患者背景 投与量・剤型・投与経路	
12	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 不明または未判定 有効性: 不明または未判定 用法: 学校に行く日の朝1錠服用。			男 7歳 5ヶ月 (1996/06/17生) H: 127.2cm W: 23.6kg 外来・ 離続中 2003/11/27 ~ 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
13	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 副作用あり: 概要を記載 有効性: 著効 用法: 行事等に落ち着いて参加させたいときの朝のみ1錠服用する。			男 7歳 6ヶ月 (1996/06/04生) H: 121.9cm W: 20.6kg 外来・ 離続中 2003/10/31 ~ 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
14	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 副作用あり: 概要を記載 有効性: 有効 用法: 朝1錠、昼0.5錠服用。			男 7歳 6ヶ月 (1996/05/28生) 外來・ 離続中 2002/07/18 ~ 15.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	
15	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 1日2回朝晩服用			男 7歳 10ヶ月 (1996/02/07生) H: 117.3cm W: 18.6kg 外来・ 離続中 2003/10/20 ~ 5.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	
16	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 朝1錠ずつ服用。			男 7歳 10ヶ月 (1996/01/01生) H: 127.1cm W: 23.8kg 入院・ 離続中 2000/10/26 ~ 20.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	
17	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 有効性: 有効 用法: 学校に行く朝服用			男 7歳 11ヶ月 (1995/12/16生) H: 123.0cm W: 29.6kg 外来・ 離続中 2001/01/22 ~ 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
18	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 学校に行くときの朝、昼に服用			男 8歳 0ヶ月 (1995/12/04生) H: 123.5cm W: 23.8kg 外来・ 離続中 2003/01/08 ~ 20.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	
19	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 副作用あり: 概要を記載 有効性: 有効 用法: 学校へ行く日の朝服用			男 8歳 1ヶ月 (1995/11/19生) H: 113.8cm W: 20.2kg 外来・ 離続中 2003/10/14 ~ 10.00mg/日 (1x) 5.00mg → 10.00mg 錠・カプセル 内用	
20	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 朝1錠、昼0.5錠服用			男 8歳 8ヶ月 (1995/03/27生) H: 121.2cm W: 23.2kg 外来・ 離続中 2002/11/07 ~ 15.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	
21	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 特になし 有効性: やや有効 用法: 1日3回朝晩下校時に1錠ずつ服用。			女 8歳 10ヶ月 (1995/01/31生) 外来・ 離続中 2003/01/06 ~ 30.00mg/日 (3x) → 錠・カプセル 内用	
22	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 朝1錠ずつ服用。			男 8歳 11ヶ月 (1995/01/10生) H: 119.7cm W: 20.6kg 外来・ 離続中 2002/08/02 ~ 20.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
23	安全性/有効性 用法・用量/總合コメント	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	投与量・剤型・投与経路
24	安全性:特になし 有効性:やや有効 用 法: 総 合:	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	男 9歳 5ヶ月 (1994/06/27生) H: 126.4cm W: 27.0kg 外来・ 緊縛中 2002/01/29 ~ 10.00mg/日 (1x) 5.00mg → 10.00mg 錠・カプセル 内用
25	安全性:特になし 有効性:有効 用 法:朝昼午後4時に2錠ずつ服用。 総 合:	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	男 9歳 6ヶ月 (1994/05/23生) H: 126.4cm W: 27.0kg 院・ 緊縛中 2003/07/29 ~ 60.00mg/日 (3x) → 錠・カプセル 内用
26	安全性:特になし 有効性:有効 用 法:朝昼1錠ずつ服用。頓服として1日0.5錠処方されている。 総 合:	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	男 9歳 8ヶ月 (1994/03/22生) H: 134.6cm W: 34.6kg 外来・ 緊縛中 2001/05/31 ~ 20.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
27	安全性:特になし 有効性:やや有効 用 法:1日1回朝服用 総 合:	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	女 10歳 0ヶ月 (1993/12/12生) H: 128.4cm W: 25.6kg 外来・ 緊縛中 2001/12/04 ~ 20.00mg/日 (1x) → その他(錠剤を粉砕) 内用
28	安全性:特になし 有効性:有効 用 法:朝2錠昼1錠服用。 総 合:	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	男 10歳 1ヶ月 (1993/11/04生) H: 127.8cm W: 24.0kg 外来・ 緊縛中 2003/07/24 ~ 30.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
29	安全性:特になし 有効性:有効 用 法:朝1錠昼0.5錠服用。 総 合:	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	女 10歳 5ヶ月 (1993/07/12生) H: 131.7cm W: 32.4kg 外来・ 緊縛中 2003/05/29 ~ 15.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
30	安全性:特になし 有効性:有効 用 法:朝1.5錠、昼0.5錠、下校時0.25錠服用。 総 合:	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	男 10歳 6ヶ月 (1993/06/08生) H: 128.5cm W: 27.0kg 外来・ 緊縛中 2000/07/25 ~ 22.50mg/日 (3x) → 錠・カプセル 内用
31	安全性:特になし 有効性:有効 用 法:1日1回学校に行く日の朝に服用。 総 合:	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	男 10歳 6ヶ月 (1993/05/26生) H: 128.5cm W: 27.0kg 外来・ 緊縛中 1998/12/07 ~ 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
32	安全性:不明または未判定 有効性:不明または未判定 用 法:朝1錠→朝1錠、昼0.5錠→朝1錠、昼1錠 2週間毎に漸増 総 合:	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	男 10歳 9ヶ月 (1993/03/02生) H: 141.5cm W: 42.0kg 外来・ 緊縛中 2003/11/11 ~ → 錠・カプセル 内用
33	安全性:特になし 有効性:有効 用 法:朝昼1錠ずつ服用。 総 合:	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	女 10歳 10ヶ月 (1993/02/08生) H: 140.7cm W: 31.4kg 外来・ 緊縛中 2001/03/14 ~ 20.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用