

No.	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実績名	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路
34	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用 法: 朝のみ2錠服用。				男 11歳 1ヶ月 (1992/10/18生) H: 110cm W: 30kg 外来・継続中 2001/02/01 ~ 20.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
	総 合:				
35	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 副作用あり:概要を記載 有効性: やや有効 用 法: 朝1錠として1回2.5mg(1/4錠)処方あり。基本は朝14mg、夜5mg服用。状況に応じて2.5mg(1/4錠)追加して服用				男 11歳 1ヶ月 (1992/10/27生) H: 150.1cm W: 43.6kg 外来・継続中 2000/04/13 ~ 19.00mg/日 (2x) 19.00mg → 21.50mg 錠・カプセル 内用
	総 合: リタリンを休薬する日がないため効果が低下しているように見える。				
36	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用 法: 朝1錠及び0.5錠服用。				男 11歳 2ヶ月 (1992/10/06生) H: 139.8cm W: 34.8kg 外来・継続中 2000/12/26 ~ 15.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
	総 合:				
37	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用 法: 朝1錠及び1.5錠ずつ服用				男 11歳 4ヶ月 (1992/07/18生) H: 134.0cm W: 29.6kg 外来・継続中 2002/04/25 ~ 30.00mg/日 (2x) 20.00mg → 30.00mg 錠・カプセル 内用
	総 合:				
38	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 特になし 有効性: やや有効 用 法: 朝1錠15mgずつ服用、夕方5mg服用。				男 11歳 5ヶ月 (1992/07/09生) W: 38.0kg 外来・継続中 1999/04/21 ~ 35.00mg/日 (3x) → その他(錠剤を砕き散剤にして服用) 内用
	総 合:				
39	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用 法: 朝1錠15mgずつ服用。朝服として週間に2日のみ0.5錠追加服用。				男 11歳 8ヶ月 (1992/04/09生) H: 142.4cm W: 41.4kg 外来・継続中 2003/09/05 ~ 20.00mg/日 (2x) 20.00mg → 25.00mg 錠・カプセル 内用
	総 合:				
40	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用 法: 朝1錠服用。				男 11歳 9ヶ月 (1992/02/22生) 外来・継続中 1999/05/25 ~ 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
	総 合:				
41	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用 法: 朝1錠及び0.5錠服用。				男 11歳 10ヶ月 (1992/01/31生) H: 141.6cm W: 33.6kg 外来・継続中 1999/11/26 ~ 15.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
	総 合:				
42	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用 法: 朝1錠15mgずつ服用。				男 12歳 1ヶ月 (1991/10/26生) 入院・継続中 ~ 20.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
	総 合:				
43	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用 法: 朝1錠及び0.5錠服用。				男 12歳 3ヶ月 (1991/08/25生) H: 140.3cm W: 32.0kg 外来・継続中 2000/02/08 ~ 15.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
	総 合:				
44	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 不明または未判定 有効性: 不明または未判定 用 法: 整に行く日の30分前に服用(週に2~3回)				男 12歳 8ヶ月 (1991/03/20生) H: 145.6cm W: 32.2kg 外来・継続中 2003/11/20 ~ 5.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
	総 合:				

## WEB調査 実績データ

## 塩酸メチルフェニデート錠・散

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実績名	患者背景
					投与量・剤型・投与経路
45	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
			安全性: 不明または未判定 有効性: 不明または未判定 用法: 朝1錠ずつ服用。 総合:		男 13歳 4ヶ月 (1990/07/20生) H: 164.5cm W: 48.8kg 外来・継続中 2003/11/07 ~ 20.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
46	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
			安全性: 特になし 有効性: 著効 用法: 1日2回朝1錠、計0.5錠服用している。日によっては朝1錠のみの日もある。 総合:		男 13歳 6ヶ月 (1990/06/08生) H: 158.1cm W: 48.4kg 外来・継続中 2000/01/04 ~ 15.00mg/日 (2x) 10.00mg → 15.00mg 錠・カプセル 内用
47	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
			安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 朝1錠ずつ服用。 総合:		男 13歳 9ヶ月 (1990/02/23生) H: 156.1cm W: 52.0kg 外来・継続中 2003/10/31 ~ 20.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
48	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
			安全性: 特になし 有効性: やや有効 用法: 現在1日2錠 朝晩服用 総合: 服用直後は著効が見られたがその後多動回数が増え増悪となる。現在は2錠服用で症状が落ち着いている。		男 13歳 9ヶ月 (1990/02/13生) H: 162.5cm W: 48.4kg 外来・継続中 2000/05/10 ~ 20.00mg/日 (2x) 10.00mg → 20.00mg 錠・カプセル 内用
49	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
			安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 朝晩2錠ずつ服用。夕は状態を見て1錠でも可。 総合:		男 13歳 11ヶ月 (1989/12/18生) H: 151.5cm W: 52.6kg 外来・継続中 1996/11/08 ~ 60.00mg/日 (3x) 50.00mg → 60.00mg 錠・カプセル 内用
50	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
			安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 入院時朝1錠ずつ服用。外泊時朝1錠ずつ服用。 総合:		男 14歳 10ヶ月 (1989/02/07生) H: 159.4cm W: 63.8kg 入院・継続中 ~ (2x) 10.00mg → 20.00mg 錠・カプセル 内用
51	公立こどもC	精神科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
			安全性: 副作用あり: 暫要を記載 有効性: 有効 用法: 学校へ行く日の朝服用。 総合:		男 14歳 10ヶ月 (1989/02/18生) 外来・継続中 2001/08/02 ~ 10.00mg/日 (1x) 10.00mg → 20.00mg 錠・カプセル 内用
52	公立こどもD	心療内科 (心療科)	適応外使用	注意欠陥多動障害	
			安全性: 有効性: 用法: 総合:		男 6歳 0ヶ月 (1997/11/12生) H: 107.0cm W: 20.5kg 外来・継続中 2003/11/27 ~ 5.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル、散 内用
53	公立こどもD	心療内科 (心療科)	適応外使用	心因反応	
			安全性: 有効性: 用法: 総合:		男 6歳 7ヶ月 (1997/04/02生) H: 108.3cm W: 17.7kg 外来・継続中 2003/09/20 ~ 5.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル、散 内用
54	公立こどもD	心療内科 (心療科)	適応外使用	注意欠陥多動障害	
			安全性: 有効性: 用法: 総合:		男 7歳 5ヶ月 (1996/05/13生) H: 116.2cm W: 20.0kg 外来・継続中 2003/07/08 ~ 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
55	公立こどもD	心療内科 (心療科)	適応外使用	アスペルガー症候群	
			安全性: 有効性: 用法: 総合:		男 7歳 6ヶ月 (1996/05/03生) H: 124.4cm W: 27.2kg 外来・継続中 2003/06/20 ~ 7.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用

No.	施設名 安全性/ 有効性/ 用法、量/ 総合コメント	診療科 対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景 投与量・剤型・投与経路
56	公立こどもD 安全性: 有効性: 用法: 総合:	心療内科 (心療科) 適応外使用	注意欠陥多動障害	男 7歳 8ヶ月 (1996/03/12生) H: 113.3cm W: 22.2kg 外来・継続中 ~ 7.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル、散 内用
57	公立こどもD 安全性: 有効性:不明または未判定 用法: 総合:	心療内科 (心療科) 適応外使用	非定型自閉症	女 7歳 10ヶ月 (1996/01/07生) H: 113.3cm W: 22.2kg 外来・継続中 ~ 7.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル、散 内用
58	公立こどもD 安全性: 有効性: 用法: 総合:	心療内科 (心療科) 適応外使用	注意欠陥多動障害	男 8歳 6ヶ月 (1995/04/15生) H: 112.7cm W: 19.3kg 外来・継続中 ~ 20.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル、散 内用
59	公立こどもD 安全性: 有効性: 用法: 総合:	心療内科 (心療科) 適応外使用	注意欠陥多動障害	男 8歳 8ヶ月 (1995/03/08生) H: 132.3cm W: 27.0kg 外来・継続中 2003/08/30 ~ 15.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル、散 内用
60	公立こどもD 安全性: 有効性: 用法: 総合:	心療内科 (心療科) 適応外使用	注意欠陥多動障害	男 8歳 10ヶ月 (1995/01/03生) H: 121.3cm W: 22.6kg 外来・継続中 ~ 7.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル、散 内用
61	公立こどもD 安全性: 有効性: 用法: 総合:	心療内科 (心療科) 適応外使用	自閉症・うつ病	女 9歳 5ヶ月 (1994/05/20生) H: 114.9cm W: 31.5kg 外来・継続中 ~ 0.35mg/日 (1x) → 錠・カプセル、散 内用
62	公立こどもD 安全性: 有効性: 用法: 総合:	心療内科 (心療科) 適応外使用	注意欠陥多動障害	男 9歳 10ヶ月 (1993/12/19生) H: 125.0cm W: 26.8kg 外来・継続中 ~ 15.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル、散 内用
63	公立こどもD 安全性: 有効性: 用法: 総合:	心療内科 (心療科) 適応外使用	注意欠陥多動障害	男 10歳 2ヶ月 (1993/09/12生) H: 147.3cm W: 49.8kg 外来・継続中 2003/08/30 ~ 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル、散 内用
64	公立こどもD 安全性: 有効性: 用法: 総合:	心療内科 (心療科) 適応外使用	アスペルガー症候群	男 11歳 0ヶ月 (1992/10/22生) H: 136.2cm W: 26.4kg 外来・継続中 ~ 9.00mg/日 (1x) → 散 内用
65	公立こどもD 安全性: 有効性: 用法: 総合:	心療内科 (心療科) 適応外使用	注意欠陥多動障害	女 11歳 1ヶ月 (1992/09/13生) H: 127.5cm W: 25.3kg 外来・継続中 ~ 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル、散 内用
66	公立こどもD 安全性: 有効性: 用法: 総合:	心療内科 (心療科) 適応外使用	選延性うつ状態	男 11歳 2ヶ月 (1992/08/22生) H: 159.5cm W: 45.0kg 外来・継続中 2003/11/27 ~ 5.00mg/日 (1x) → 散 内用

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
					投与量・剤型・投与経路
67	安全性/有効性 用法・用量/總合コメント	公立こどもD (心療科)	心療内科 適応外使用	後頭葉症候群・心因反応	男 11歳 10ヶ月 (1991/12/21生) H: 133.9cm W: 25.9kg 外来・ 離絶中 9.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
68	安全性: 有効性: 用法: 総合:	公立こどもE 神経科	適応外使用	アスペルガー障害	女 5歳 1ヶ月 (1998/10/15生) 外來・ 離絶中 ~ → 錠・カプセル 内用
69	安全性: 有効性: 有効 用法: 総合:	公立こどもE 神経科	適応外使用	自閉症+精神遲滞	男 8歳 0ヶ月 (1995/11/18生) 外来・ 離絶中 ~ → 錠・カプセル 内用
70	安全性: 特になし 有効性: 著効 用法: 総合:	公立こどもE 精神科	適応外使用	ADHD+アスペルガー障害	女 8歳 10ヶ月 (1995/01/02生) 外來・ 離絶中 ~ → 錠・カプセル 内用
71	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 総合:	公立こどもE 神経科	適応外使用	広汎性発達障害+精神遅滞	男 9歳 0ヶ月 (1994/11/15生) 外来・ 離絶中 ~ → 錠・カプセル 内用
72	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 総合:	公立こどもE 精神科	適応外使用	ADHD	男 10歳 4ヶ月 (1993/07/05生) 外来・ 離絶中 ~ → 錠・カプセル 内用
73	安全性: 有効性: 有効 用法: 総合:	公立こどもE 精神科	適応外使用	ADHD	女 10歳 6ヶ月 (1993/05/18生) 外来・ 離絶中 ~ → 錠・カプセル 内用
74	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 総合:	公立こどもE 神経科	適応外使用	ADHD	男 10歳 11ヶ月 (1992/12/08生) 外来・ 離絶中 ~ → 錠・カプセル 内用
75	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 総合:	公立こどもE 神経科	適応外使用	広汎性発達障害+精神遅滞	男 11歳 0ヶ月 (1992/11/19生) 外来・ 離絶中 ~ → 錠・カプセル 内用
76	安全性: 特になし 有効性: やや有効 用法: 総合:	公立こどもE 精神科	適応外使用	ADHD+反応性愛着障害+うつ状態	男 11歳 7ヶ月 (1992/03/30生) 外来・ 離絶中 ~ → 錠・カプセル 内用
77	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 総合:	公立こどもE 精神科	適応外使用	ADHD	男 11歳 8ヶ月 (1992/03/04生) 外来・ 離絶中 ~ → 錠・カプセル 内用

No	施設名 安全性／有効性 用法・用量／總合コメント	診療科 対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景 投与量・剤型・投与経路
78	公立こどもE 安全性: 有効性: 用法: 総合:	精神科 適応外使用	自閉症+精神発達遅滞	男 12歳 3ヶ月 (1991/08/13生) 外来・継続中 ～ 錠・カプセル 内用
79	公立こどもE 安全性: 有効性: 用法: 総合:	精神科 適応外使用	ADHD	男 12歳 7ヶ月 (1991/04/04生) 外来・継続中 ～ 錠・カプセル 内用
80	公立こどもE 安全性: 有効性: 用法: 総合:	精神科 適応外使用	多動傾向	男 15歳 0ヶ月 (1988/11/18生) 外来・継続中 ～ 錠・カプセル 内用
81	公立こどもF (小児神経科) 安全性: 有効性: 用法: 総合:	神経科 適応外使用	ADHD	男 6歳 7ヶ月 (1995/12/02生) H: 115.8cm W: 21.8kg 外来・継続中 2002/07/26～ (450日間) 7.00mg/日 (1x) 5.00mg → 7.00mg 散 内用
82	公立こどもF 安全性: 有効性: 用法: 総合:	精神科 適応外使用 多動、落ち着きなさに関して効果ありと判断し、使用した。	ADHD	女 7歳 2ヶ月 (1994/12/13生) W: 22.0kg 外来・継続中 2002/02/15～ (653日間) 20.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
83	公立こどもF (小児神経科) 安全性: 有効性: 用法: 総合:	神経科 適応外使用	ADHD	男 7歳 8ヶ月 (1994/08/11生) H: 107.5cm W: 15.7kg 外来・継続中 2002/04/24～ (365日間) 15.00mg/日 (2x) 10.00mg → 15.00mg 錠・カプセル、散 内用
84	公立こどもF 安全性: 有効性: 用法: 総合:	精神科 適応外使用 多動、集中力低下に対して効果あり。	ADHD	男 8歳 2ヶ月 (1994/04/03生) 外来・継続中 2002/06/28～ (520日間) 10.00mg/日 (1x) 10.00mg → 15.00mg 錠・カプセル 内用
85	公立こどもF (小児神経科) 安全性: 有効性: 用法: 総合:	神経科 適応外使用	ADHD	男 8歳 2ヶ月 (1995/05/19生) H: 126.1cm W: 25.0kg 外来・継続中 2003/07/15～ (90日間) 15.00mg/日 (2x) → 散 内用
86	公立こどもF 安全性: 有効性: 用法: 総合:	精神科 適応外使用	ADHD	男 8歳 9ヶ月 (1994/11/17生) W: 31.0kg 外来・継続中 2003/09/25～ 2003/11/10 (106日間) 5.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
87	公立こどもF 安全性: 有効性: 用法: 総合:	精神科 適応外使用	ADHD	男 8歳 10ヶ月 (1995/01/21生) W: 20.0kg 外来・継続中 2003/03/03～ 10.00mg/日 (2x) 5.00mg → 10.00mg 散 内用
88	公立こどもF 安全性: 有効性: 用法: 総合:	精神科 適応外使用	ADHD	男 9歳 11ヶ月 (1993/11/08生) W: 27.0kg 外来・継続中 2003/10/14～ 2003/11/18 (56日間) 10.00mg/日 (1x) 5.00mg → 10.00mg 散 内用

## WEB調査 実績データ

## 塩酸メチルフェニデート錠・散

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の疾患名		患者背景 投与量・類型・投与経路
				安全性/有効性 用法・用量/総合コメント		
89	公立こどもF	精神科	適応外使用	ADHD		
	安全性:				男 12歳 5ヶ月 (1991/05/17生)	
	有効性:やや有効				外来・継続中	
	用法:				2000/04/03 ~	
	総 合:				20.00mg/日(2x) →	
					散 内用	
90	公立こどもF	精神科	適応外使用	ADHD,強迫性障害		
	安全性:特になし				男 12歳 6ヶ月 (1991/05/21生)	
	有効性:有効				外来・継続中	
	用法:				2000/12/21 ~	(28日間)
	総 合:				20.00mg/日(2x) →	
					錠・カプセル	
					内用	
91	公立こどもF	精神科	適応外使用	ADHD		
	安全性:				男 14歳 2ヶ月 (1989/08/25生)	
	有効性:やや有効				外来・継続中	
	用法:				2003/04/03 ~	
	総 合:				28.00mg/日(2x) →	
					散 内用	
92	公立こどもF	精神科	適応外使用	ADHD		
	安全性:副作用あり:概要を記載		食思不振		男 14歳 8ヶ月 (1989/03/29生)	
	有効性:有効				外来・継続中	
	用法:				2003/10/07 ~	
	総 合:				6.00mg/日(1x) 6.00mg → 7.00mg	
					散 内用	
93	公立こどもF	精神科	適応外使用	ADHD		
	安全性:特になし				男 15歳 0ヶ月 (1988/10/09生)	
	有効性:有効				外来・継続中	
	用法:				2000/10/19 ~	(28日間)
	総 合:				20.00mg/日(2x) →	
					錠・カプセル	
					内用	
94	公立こどもF	精神科	適応外使用	ADHD		
	安全性:特になし				男 15歳 3ヶ月 (1988/07/25生)	
	有効性:有効				外来・継続中	
	用法:				2003/06/01 ~	(30日間)
	総 合:				15.00mg/日(2x) →	
					散 内用	
95	公立こどもF	精神科	適応外使用	ADHD		
	安全性:特になし				男 18歳 0ヶ月 (1985/11/08生)	
	有効性:有効				入院・継続中	
	用法:				1998/09/24 ~	(28日間)
	総 合:				20.00mg/日(2x) →	
					散 内用	
96	公立こどもG	精神科	適応外使用	小児神経症		
	安全性:特になし				女 4歳 3ヶ月 (1988/04/30生)	
	有効性:不明または未判定				H: 153.6cm W: 43.2kg 外来・継続中	
	用法:朝食後				2002/08/16 ~	
	総 合:				10.00mg/日(1x) →	
					錠・カプセル	
					内用	
97	公立こどもG	精神科	適応外使用	ADHD		
	安全性:特になし				男 6歳 1ヶ月 (1996/11/12生)	
	有効性:不明または未判定				H: 112.8cm W: 18.9kg 外来・継続中	
	用法:朝夕食後				2003/01/10 ~	
	総 合:				10.00mg/日(2x) →	
					錠・カプセル	
					内用	
98	公立こどもG	精神科	適応外使用	ADHD		
	安全性:特になし				男 6歳 11ヶ月 (1995/12/05生)	
	有効性:有効				H: 120.5cm W: 23.4kg 外来・継続中	
	用法:朝晩食後				2002/11/15 ~	
	総 合:				30.00mg/日(2x) →	
					錠・カプセル	
					内用	
99	公立こどもG	精神科	適応外使用	ADHD		
	安全性:特になし				男 7歳 6ヶ月 (1996/06/01生)	
	有効性:不明または未判定				H: 122.2cm W: 26.9kg 外来・継続中	
	用法:朝食後				2003/05/22 ~	
	総 合:				10.00mg/日(1x) →	
					錠・カプセル	
					内用	

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実績名	患者背景
					投与量・剤型・投与経路
100	公立こどもG	精神科	適応外使用	小児神経症、ADHD	男 7歳 8ヶ月 (1995/09/15生) H: 120.6cm W: 22.8kg 外来・継続中 2003/06/05～ 15.00mg/日 (3x) → 錠・カプセル 内用
			安全性: 特になし 有効性: やや有効 用法: 毎食後 総合:		
101	公立こどもG	精神科	適応外使用	小児神経症、ADHD	男 7歳 10ヶ月 (1996/01/25生) H: 118.1cm W: 21.5kg 外来・継続中 2003/10/08～ 10.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
			安全性: 特になし 有効性: やや有効 用法: 朝夕食後 総合:		
102	公立こどもG	精神科	適応外使用	ADHD	男 8歳 0ヶ月 (1993/01/15生) H: 126.1cm W: 24.6kg 外来・継続中 2001/01/19～ 20.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
			安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法: 分3食後 1-0.5-0.5 総合:		
103	公立こどもG	精神科	適応外使用	小児神経症、ADHD	男 8歳 6ヶ月 (1994/09/24生) H: 123.9cm W: 25.0kg 外来・継続中 2003/03/25～ 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
			安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 1回朝食後 総合:		
104	公立こどもG	精神科	適応外使用	小児神経症、学習障害	男 8歳 8ヶ月 (1995/02/01生) H: 132.0cm W: 32.0kg 外来・継続中 2003/10/17～ 20.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
			安全性: 不明または未判定 有効性: 有効 用法: 朝食後 総合:		
105	公立こどもG	精神科	適応外使用	小児神経症、ADHD	男 9歳 1ヶ月 (1994/10/23生) H: 123.3cm W: 24.1kg 外来・継続中 2003/11/04～ 10.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
			安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法: 朝食後 総合:		
106	公立こどもG	精神科	適応外使用	LD, ADHD	男 9歳 3ヶ月 (1994/06/11生) H: 136.5cm W: 44.6kg 外来・継続中 2003/09/30～ 20.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
			安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 朝食後 総合:		
107	公立こどもG	精神科	適応外使用	小児神経症、ADHD、心因性視覚障害	男 9歳 9ヶ月 (1994/02/22生) H: 129.9cm W: 26.1kg 外来・継続中 2002/09/06～ 20.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
			安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法: 朝夕食後 総合:		
108	公立こどもG	精神科	適応外使用	小児神経症、頭痛、うつ状態	男 10歳 0ヶ月 (1993/12/09生) H: 121.3cm W: 27.0kg 外来・継続中 2000/11/07～ 30.00mg/日 (3x) → 錠・カプセル 内用
			安全性: 特になし 有効性: やや有効 用法: 毎食後 総合:		
109	公立こどもG	精神科	適応外使用	小児神経症、学習パニック障害	男 12歳 4ヶ月 (1991/06/11生) H: 167.2cm W: 64.0kg 外来・継続中 2003/11/05～ 20.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
			安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法: 朝食後 総合:		
110	公立こどもG	精神科	適応外使用	不登校	女 14歳 2ヶ月 (1989/09/30生) H: 154.8cm W: 46.6kg 外来・継続中 2002/06/07～ 20.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
			安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法: 朝食後 総合:		

## WEB調査 実績データ

## 塩酸メチルフェニデート錠・散

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路
111	公立こどもG	精神科	適応外使用	小児神経症、ADHD	女 14歳 6ヶ月 (1989/02/05生) H: 158.3cm W: 57.5kg 外来・継続中
	安全性:特になし 有効性:不明または未判定 用 法:朝食後 総 合:				1999/10/08 ~ 20.00mg/H (2x) → 錠・カプセル 内用
112	公立こどもG	精神科	適応外使用	LD疑い、不登校	女 15歳 4ヶ月 (1988/06/08生) H: 158.3cm W: 57.5kg 外来・継続中
	安全性:特になし 有効性:不明または未判定 用 法:朝食後 総 合:				2002/08/13 ~ 20.00mg/H (2x) → 錠・カプセル 内用
113	公立こどもG	精神科	適応外使用	小児神経症、ADHD	男 15歳 7ヶ月 (1988/04/26生) H: 158.3cm W: 57.5kg 外来・継続中
	安全性:特になし 有効性:やや有効 用 法:朝食後 総 合:				10.00mg/H (1x) → 錠・カプセル 内用
114	公立こどもH	神経科	適応外使用	LD,ADHD	男 8歳 7ヶ月 (1995/03/13生) H: 128.3cm W: 32.1kg 外来・継続中
	安全性: 有効性:無効 用 法: 総 合:				~ 15.00mg/H (1x) → 錠・カプセル 内用
115	公立こどもH (発達小児)		適応外使用	多動性障害、小児期脱抑制愛着障害	女 8歳 9ヶ月 (1995/01/19生) H: 128.8cm W: 28.2kg 外来・継続中
	安全性:特になし 有効性:やや有効 用 法: 総 合:				30.00mg/H (2x) → 錠・カプセル 内用
116	公立こどもH	神経科	適応外使用	ADHD	男 8歳 11ヶ月 (1994/11/17生) H: 128.3cm W: 32.1kg 外来・
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:				2002/08/07 ~ 25.00mg/H (2x) → 錠・カプセル 内用
117	公立こどもH	神経科	適応外使用	ADHDによる多動、LD	男 9歳 0ヶ月 (1994/11/07生) H: 133.3cm W: 42.3kg 外来・継続中
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:				2002/08/07 ~ 20.00mg/H (4x) → 錠・カプセル 内用
118	公立こどもH	神経科	適応外使用	多動、MR、チック	男 9歳 1ヶ月 (1994/09/20生) H: 133.3cm W: 42.3kg 外来・継続中
	安全性:特になし 有効性:やや有効 用 法: 総 合:				~ 10.00mg/H (1x) → 錠・カプセル 内用
119	公立こどもH	神経科	適応外使用	注意欠陥多動障害	男 9歳 11ヶ月 (1994/12/25生) H: 133.3cm W: 42.3kg 外来・継続中
	安全性:特になし 有効性:やや有効 用 法: 総 合: 注意注中の改善は一部見られたが、継続使用については今後検討中である。				2003/07/29 ~ 10.00mg/H (1x) → 錠・カプセル 内用
120	公立こどもH (発達小児)		適応外使用	ADHD	女 10歳 9ヶ月 (1993/03/03生) H: 144.9cm W: 40.6kg 外来・継続中
	安全性:特になし 有効性:やや有効 用 法: 総 合: 熱に行く前に効かせないと、夕方に内服されることがある。				2003/04/01 ~ 13.00mg/H (1x) 10.00mg → 13.00mg 錠・カプセル 内用
121	公立こどもH	神経科	適応外使用	多動、MR	男 10歳 11ヶ月 (1992/12/23生) H: 144.9cm W: 40.6kg 外来・継続中
	安全性:特になし 有効性:著効 用 法: 総 合:				~ 錠・カプセル 内用

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
			安全性/有効性 用法・用量/総合コメント		投与量・剤型・投与経路
122	公立こどもH		適応外使用 安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:	多動、狭頭症	男 11歳 0ヶ月 (1992/10/23生) H: 150.0cm W: 47.4kg 外来・継続中 ～ 10.00mg/日(2x) → 錠・カプセル 内用
123	公立こどもH	神経科	適応外使用 安全性:特になし 有効性:やや有効 用法: 総合:	多動、MR,てんかん	男 11歳 4ヶ月 (1992/06/14生) H: 150.0cm W: 47.4kg 外来・継続中 ～ 20.00mg/日(2x) → 錠・カプセル 内用
124	公立こどもH		適応外使用 (発達小児) 安全性:特になし 有効性:著効 用法: 総合:	多動性障害、Maltreatmentの疑い	男 13歳 2ヶ月 (1990/08/10生) H: 139.5cm W: 31.6kg 外来・継続中 ～ 20.00mg/日(4x) → 錠・カプセル 内用
125	公立こどもH	神経科	適応外使用 安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:	ADHD	男 14歳 0ヶ月 (1989/11/07生) 外來・継続中 ～ 40.00mg/日(2x) → 錠・カプセル 内用
126	公立こどもH		適応外使用 (発達小児) 安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:	多動性障害、脳炎症後てんかん	男 14歳 1ヶ月 (1989/10/10生) 外來・ ～ 30.00mg/日(3x) → 錠・カプセル 内用
127	公立こどもI		適応外使用 (心理発達相談科) 注意欠陥多動性障害の保険適応が待たれる。海外でも多数、使用されている。	注意欠陥多動性障害	男 6歳 8ヶ月 (1997/03/10生) H: 109.8cm W: 17.2kg 外來・継続中 2003/07/16～ 15.00mg/日(2x) → 錠・カプセル 内用
128	公立こどもI		適応外使用 (心理発達相談科) 注意欠陥多動性障害の保険適応をお願いします。	注意欠陥多動性障害	男 7歳 3ヶ月 (1996/08/29生) 外來・継続中 2003/09/18～ 10.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用
129	公立こどもI		適応外使用 (心理発達相談) 海外でも、よく使用されている。注意欠陥多動性障害を保険適応に認可してほしい。(早急に) 安全性:特になし 有効性:著効 用法:身長・体重によらずに、症状により投与量を決めている 総合:	注意欠陥多動性障害	男 10歳 7ヶ月 (1993/04/20生) H: 103.0cm W: 18.1kg 外來・継続中 2003/11/26～ 10.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用
130	公立こどもI	神経科 (小児神経科)	適応外使用 安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:	注意欠陥多動症候群	女 11歳 6ヶ月 (1992/05/05生) H: 132.0cm W: 26.0kg 外來・継続中 2002/10/23～ 10.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用
131	公立こどもM	神経科	適応外使用 安全性:特になし 有効性:有効 用法:朝1回(食後) 総合:	注意欠陥／多動性傷害	男 6歳 3ヶ月 (1997/07/25生) H: 118.0cm W: 22.5kg 外來・継続中 2003/10/14～2003/12/16 (90日間) 10.00mg/日(1x) 8.50mg → 10.00mg 錠・カプセル 内用
132	公立こどもM	神経科	適応外使用 安全性:特になし 有効性:やや有効 用法:朝食後 総合:	注意欠陥／多動性障害	男 6歳 4ヶ月 (1997/07/24生) H: 115.8cm W: 22.1kg 外來・継続中 2003/09/19～2003/12/25 (98日間) 10.00mg/日(1x) 7.00mg → 10.00mg 錠・カプセル 内用

## WEB調査 実績データ

## 塩酸メチルフェニデート錠・散

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
					投与量・剤型・投与経路
133	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性:特になし 有効性:不明または未判定 用法:朝食後1回 総合:		女 6歳 8ヶ月 (1997/03/08生) H: 118.8cm W: 22.5kg 外来・継続中 2003/11/26 ~ 2003/12/25 (30日間) 7.00mg/日 (1x) → 散 内用
134	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性:特になし 有効性:有効 用法:朝食後1回 総合:		男 6歳 11ヶ月 (1996/11/14生) H: 121.5cm W: 26.2kg 外来・継続中 2003/11/07 ~ 2003/12/06 (30日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
135	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性:特になし 有効性:有効 用法:朝食後1回 総合:		男 6歳 11ヶ月 (1996/12/31生) H: 123.5cm W: 29.9kg 外来・継続中 2003/11/17 ~ 2003/12/18 (44日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
136	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性:特になし 有効性:やや有効 用法: 総合:		男 7歳 0ヶ月 (1996/10/19生) H: 121.1cm W: 22.3kg 外来・継続中 2003/08/25 ~ 2003/12/04 (102日間) 10.00mg/日 (1x) 7.00mg → 10.00mg 散 内用
137	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性:特になし 有効性:有効 用法:朝食後1回 総合:		男 7歳 3ヶ月 (1996/07/31生) H: 118.2cm W: 20.3kg 外来・継続中 2003/06/17 ~ 2003/12/27 (194日間) 8.00mg/日 (1x) → 散 内用
138	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性:特になし 有効性:有効 用法:朝食後1回 総合:精神遅滞(WPPSI-CFIQ<45)を併存		男 7歳 8ヶ月 (1996/02/19生) H: 126.8cm W: 27.0kg 外来・継続中 2002/11/05 ~ 2003/12/05 (300日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
139	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:		男 7歳 10ヶ月 (1996/01/14生) H: 136.3cm W: 45.2kg 外来・継続中 2002/05/10 ~ 2003/12/17 (510日間) 15.00mg/日 (2x) 10.00mg → 20.00mg 錠・カプセル 内用
140	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性:特になし 有効性:有効 用法:朝食後10mg、昼食後5mg 総合:		女 7歳 11ヶ月 (1995/11/29生) H: 116.7cm W: 22.1kg 外来・継続中 2002/08/07 ~ 2003/12/26 (390日間) 15.00mg/日 (2x) 8.00mg → 15.00mg 錠・カプセル 内用
141	公立こどもM	小児科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性:副作用あり:概要を記載 内服後しばらくして嘔気→ 有効性:有効 用法:朝食後10mg、昼食後5mg 総合:		男 7歳 11ヶ月 (1995/12/02生) H: 115.2cm W: 24.2kg 外来・継続中 2003/10/10 ~ 2003/12/15 (67日間) 15.00mg/日 (2x) 10.00mg → 15.00mg 錠・カプセル 内用
142	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性:特になし 有効性:有効 用法:朝食後 総合:		男 8歳 0ヶ月 (1995/11/02生) H: 126.1cm W: 25.2kg 外来・継続中 2002/08/14 ~ 2003/12/09 (370日間) 10.00mg/日 (1x) 8.50mg → 10.00mg 錠・カプセル 内用
143	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性:因果関係は不明だが有害事象あり 有害事象:頭痛 MPHをいったん中止しても頭痛はあり、アスピリンで軽減する。 有効性:有効 用法:朝食後8mg、昼食後4mg 総合:てんかんの併存あり カルバマゼピンも併用中		男 8歳 0ヶ月 (1995/11/07生) H: 123.0cm W: 25.9kg 外来・継続中 2003/09/16 ~ 2003/12/11 (87日間) 12.00mg/日 (2x) → 散 内用

## WEB調査 実績データ

## 塩酸メチルフェニデート錠・散

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実績名	患者背景
					投与量・剤型・投与経路
144	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性：特になし 有効性：有効 用法：朝食後		男 8歳 1ヶ月 (1995/10/10生) H: 128.7cm W: 30.8kg 外来・継続中 2003/05/06 ~ 2003/12/10 (174日間) 9.00mg/H (1x) → 錠・カプセル 内用
			総合：		
145	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性：特になし 有効性：有効 用法：朝食後10mg、昼食後5mg		男 8歳 3ヶ月 (1995/08/05生) H: 125.3cm W: 27.1kg 外来・継続中 2001/09/14 ~ 2003/12/16 (682日間) 15.00mg/H (2x) 10.00mg → 15.00mg 錠・カプセル 内用
			総合：		
146	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性：特になし 有効性：有効 用法：朝食後10mg、昼食後5mg		男 8歳 4ヶ月 (1995/06/21生) H: 128.6cm W: 30.4kg 外来・継続中 2002/10/16 ~ 2003/12/20 (300日間) 15.00mg/H (2x) 10.00mg → 15.00mg 錠・カプセル 内用
			総合：		
147	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性：特になし 有効性：有効 用法：朝食後8mg、昼食後4mg		男 8歳 6ヶ月 (1995/04/21生) H: 122.0cm W: 22.5kg 外来・継続中 2002/05/07 ~ 2001/01/07 (390日間) 12.00mg/H (2x) 8.00mg → 12.00mg 錠・カプセル 内用
			総合：		
148	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性：特になし 有効性：有効 用法：朝食後10mg、昼食後5mg		男 8歳 9ヶ月 (1995/02/02生) H: 127.8cm W: 33.9kg 外来・継続中 2002/12/19 ~ 2003/12/25 (270日間) 15.00mg/H (2x) 10.00mg → 15.00mg 錠・カプセル 内用
			総合：		
149	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性：特になし 有効性：有効 用法：朝食後		男 8歳 11ヶ月 (1994/11/07生) H: 132.7cm W: 27.9kg 外来・継続中 2003/02/04 ~ 2003/12/03 (150日間) 10.00mg/H (1x) → 錠・カプセル 内用
			総合：		
150	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性：特になし 有効性：有効 用法：朝食後8mg、昼食後4mg		男 9歳 0ヶ月 (1994/10/11生) H: 131.2cm W: 26.8kg 外来・継続中 2002/02/22 ~ 2003/12/10 (478日間) 12.00mg/H (2x) 12.00mg → 16.00mg 錠・カプセル 内用
			総合：広汎性発達障害を併存		
151	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性：特になし 有効性：有効 用法：朝食後10mg、5mg、5mg		男 9歳 3ヶ月 (1994/07/26生) H: 128.7cm W: 26.2kg 外来・継続中 2003/04/15 ~ 2003/12/06 (90日間) 20.00mg/H (3x) 10.00mg → 20.00mg 錠・カプセル 内用
			総合：		
152	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性：特になし 有効性：有効 用法：朝食後		男 9歳 4ヶ月 (1994/06/30生) H: 138.4cm W: 32.3kg 外来・継続中 2003/08/26 ~ 2003/12/24 (121日間) 15.00mg/H (1x) 10.00mg → 15.00mg 錠・カプセル 内用
			総合：脳腫瘍術後(AD/HID症状が、解脲薬あるいはその治療によるものか、以前からあったものか明らかでない)		
153	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性：特になし 有効性：有効 用法：朝食後		男 9歳 5ヶ月 (1994/05/28生) H: 128.9cm W: 27.5kg 外来・継続中 2003/10/22 ~ 2003/12/25 (65日間) 10.00mg/H (1x) → 錠・カプセル 内用
			総合：		
154	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性：特になし 有効性：有効 用法：朝食後10mg、昼食後5mg		男 9歳 5ヶ月 (1994/05/26生) H: 134.8cm W: 31.5kg 外来・継続中 2002/04/15 ~ 2003/12/17 (420日間) 15.00mg/H (2x) 10.00mg → 15.00mg 錠・カプセル 内用
			総合：		

## WEB調査 実績データ

## 塩酸メチルフェニデート錠・散

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実績名	
				患者背景 投与量・剤型・投与経路	
	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
155	安全性:特になし 有効性:有効 用法:朝食後1回 総合:			男 9歳 6ヶ月 (1994/04/10生) H: 126.3cm W: 25.0kg 外来・継続中 2000/05/15 ~ 2003/12/09 (586日間) 8.00mg/日 (1x) 6.50mg → 8.00mg 散 内用	
156	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
	安全性:副作用あり:概要を記載 有効性:有効 用法:朝食後10mg、昼食後5mg 総合:			男 9歳 6ヶ月 (1994/05/10生) H: 134.2cm W: 31.9kg 外来・継続中 2003/02/03 ~ 2003/12/18 (240日間) 15.00mg/日 (2x) 13.00mg → 15.00mg 錠・カプセル 内用	
157	公立こどもM	神経科	適応外使用	広汎性発達障害(PDD)	
	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:かんしゃく、パニックがデプロメールで減少した。→			男 9歳 7ヶ月 (1994/04/15生) H: 142.2cm W: 52.1kg 外来・継続中 2003/03/14 ~ 2003/12/10 (210日間) 50.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	
158	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:先天眼瞼を作らう。一衝動性も強くカルバマゼピンも併用。→			男 9歳 7ヶ月 (1994/04/27生) H: 130.5cm W: 28.1kg 外来・継続中 2001/06/29 ~ 2004/12/26 (660日間) 20.00mg/日 (3x) 8.00mg → 20.00mg 錠・カプセル 内用	
159	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:てんかんの合併があり、バルプロ酸を併用			男 9歳 10ヶ月 (1994/01/25生) H: 137.2cm W: 30.9kg 外来・継続中 2001/09/17 ~ 2004/12/17 (1710日間) 15.00mg/日 (2x) 10.00mg → 15.00mg 錠・カプセル 内用	
160	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
	安全性:特になし 有効性:やや有効 用法:朝食後7mg、昼食後6mg、夕食後5mg 総合:自閉性障害の併存あり。行動異常に対しリスペリドンを最近より併用			女 10歳 0ヶ月 (1993/11/05生) H: 129.4cm W: 25.8kg 外来・継続中 1999/12/27 ~ 2003/12/25 (540日間) 18.00mg/日 (3x) 7.00mg → 18.00mg 散 内用	
161	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:アスペルガー症候群を併存する。→			男 10歳 2ヶ月 (1993/09/25生) H: 132.7cm W: 27.0kg 外来・継続中 2002/06/13 ~ 2004/12/24 (926日間) 10.00mg/日 (1x) 8.00mg → 10.00mg 錠・カプセル 内用	
162	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:朝食後 総合:先天性筋のう胞症、筋低形成あり。WISC-III;VIQ85, PIQ64, PIQ72			男 10歳 4ヶ月 (1993/07/02生) H: 131.4cm W: 28.0kg 外来・継続中 2003/11/05 ~ 2003/12/04 (30日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
163	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:朝1回(食後) 総合:てんかんの合併あり。カルバマゼピンを併用。知的障害も併存。			男 10歳 11ヶ月 (1992/12/22生) H: 124.2cm W: 29.0kg 外来・継続中 1999/07/30 ~ 2003/12/08 (1112日間) 10.00mg/日 (1x) 8.00mg → 10.00mg 錠・カプセル 内用	
164	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:朝食後1回 総合:			男 11歳 0ヶ月 (1992/11/23生) H: 144.2cm W: 36.0kg 外来・継続中 2001/09/17 ~ 2003/12/16 (722日間) 10.00mg/日 (1x) 10.00mg → 20.00mg 錠・カプセル 内用	
165	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:朝食後10mg、昼食後5mg 総合:			男 11歳 2ヶ月 (1992/08/26生) H: 144.6cm W: 38.2kg 外来・継続中 2002/07/04 ~ 2003/12/17 (532日間) 15.00mg/日 (2x) 10.00mg → 15.00mg 錠・カプセル 内用	

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
					投与量・剤型・投与経路
166	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性傷害	
			安全性:特になし 有効性:有効 用法:		女 11歳 2ヶ月 (1992/09/03生) H: 140.6cm W: 32.1kg 外来・継続中 2002/04/26 ~ 2004/11/18 (938日間) 10.00mg/日 (1x) 10.00mg → 15.00mg 錠・カプセル 内用
			総合:		
167	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性:特になし 有効性:有効 用法:朝食後		男 11歳 2ヶ月 (1992/08/31生) H: 137.3cm W: 33.0kg 外来・継続中 2002/02/28 ~ 2003/12/19 (210日間) 20.00mg/日 (2x) 10.00mg → 20.00mg 錠・カプセル 内用
			総合:		
168	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性:特になし 有効性:有効 用法:朝食後		男 11歳 3ヶ月 (1992/08/09生) H: 150.1cm W: 37.8kg 外来・継続中 2001/12/18 ~ 2003/12/13 (360日間) 20.00mg/日 (2x) 15.00mg → 20.00mg 錠・カプセル 内用
			総合:パニック障害あり バロキセチンを併用		
169	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性:特になし 有効性:有効 用法:朝、昼食後各10mg		男 11歳 6ヶ月 (1992/04/16生) H: 139.5cm W: 31.0kg 外来・継続中 2003/03/31 ~ 2003/12/05 (90日間) 20.00mg/日 (2x) 10.00mg → 20.00mg 錠・カプセル 内用
			総合:		
170	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性傷害	
			安全性:特になし 有効性:有効 用法:		男 11歳 7ヶ月 (1992/03/25生) H: 142.5cm W: 40.0kg 外来・継続中 1998/01/07 ~ 2004/11/18 (2508日間) 20.00mg/日 (2x) 10.00mg → 20.00mg 錠・カプセル 内用
			総合:		
171	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性:特になし 有効性:有効 用法:		男 11歳 10ヶ月 (1992/01/12生) H: 139.2cm W: 27.9kg 外来・継続中 2000/06/28 ~ 2003/11/28 (1249日間) 15.00mg/日 (2x) 10.00mg → 15.00mg 錠・カプセル 内用
			総合:反抗・挑戦性障害を併存		
172	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性傷害	
			安全性:特になし 有効性:有効 用法:		男 12歳 2ヶ月 (1991/09/20生) H: 147.8cm W: 55.1kg 外来・継続中 1997/09/06 ~ 2003/12/25 (2200日間) 25.00mg/日 (5x) 7.50mg → 25.00mg 錠・カプセル 内用
			総合:		
173	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性:特になし 有効性:有効 用法:朝食後10mg、昼食後5mg		男 12歳 4ヶ月 (1991/07/06生) H: 159.8cm W: 65.0kg 外来・継続中 2000/04/28 ~ 2003/12/15 (990日間) 15.00mg/日 (2x) 10.00mg → 15.00mg 錠・カプセル 内用
			総合:		
174	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性:特になし 有効性:有効 用法:朝食後10mg、昼食後5mg		男 13歳 0ヶ月 (1990/11/12生) H: 137.0cm W: 33.9kg 外来・継続中 2003/11/26 ~ 2003/12/25 (30日間) 15.00mg/日 (2x) 10.00mg → 15.00mg 錠・カプセル 内用
			総合:		
175	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性:副作用あり:概要を記載 有効性:有効 用法:朝15mg、11時10mg、昼食後5mg		男 13歳 2ヶ月 (1990/08/22生) H: 154.1cm W: 61.0kg 外来・継続中 2003/09/24 ~ 2003/12/18 (86日間) 30.00mg/日 (3x) 25.00mg → 30.00mg 錠・カプセル 内用
			総合:		
176	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
			安全性:特になし 有効性:有効 用法:		男 14歳 0ヶ月 (1989/11/21生) H: 165.0cm W: 51.1kg 外来・継続中 2001/03/05 ~ 2003/12/25 (1026日間) 20.00mg/日 (2x) 15.00mg → 20.00mg 錠・カプセル 内用
			総合:		

## WEB調査 実績データ

## 塩酸メチルフェニデート錠・散

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実験名	患者背景
	安全性／有効性 用法・用量／総合コメント				投与量・剤型・投与経路
177	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性障害	
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:				男 15歳 1ヶ月 (1988/10/15生) H: 161.5cm W: 45.0kg 外来・継続中 1999/09/28 ~ 2003/12/18(1140日間) 15.00mg/日(2x) 10.00mg → 25.00mg 錠・カプセル 内用
178	公立こどもM	神経科	適応外使用	注意欠陥／多動性傷害	
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:				男 18歳 1ヶ月 (1985/09/12生) H: 164.4cm W: 53.8kg 外来・継続中 2000/06/14 ~ 2004/12/09(1610日間) 20.00mg/日(2x) 15.00mg → 25.00mg 錠・カプセル 内用
179	国立A	小児科	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 2000.7.10より5mg開始。2000.8.16より10mg。2002.2.14より15mg。2002.6.13より20mg。現在に至る。 総 合:				男 11歳 2ヶ月 (1992/09/12生) H: 122.2cm W: 19.4kg 外来・継続中 2000/07/10 ~ 20.00mg/日(2x) → 錠・カプセル 内用
180	国立F	(発達心)	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 有効性: 用法:				女 6歳 6ヶ月 (1997/03/04生) W: 17.5kg 外来・継続中 2003/11/13 ~ 40.00mg/日(3x) → 錠・カプセル 内用
181	国立F	(発達心)	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 有効性: 用法:				男 6歳 7ヶ月 (1997/02/10生) H: 108.8cm W: 21.0kg 外来・継続中 2003/11/10 ~ 7.50mg/日(1x) → 散 内用
182	国立F	(発達心)	適応外使用 感覚統合障害・療法	発達遅延	
	安全性: 有効性: 用法:				女 6歳 10ヶ月 (1997/01/12生) 外来・継続中 2003/11/06 ~ 5.00mg/日(1x) → 散 内用
183	国立F	(発達心)	適応外使用 昼夜逆転	多動症	
	安全性: 有効性: 用法:				男 7歳 6ヶ月 (1996/03/28生) 外来・ 2003/11/27 ~ 30.00mg/日(3x) → 錠・カプセル 内用
184	国立F	(発達心理科)	適応外使用	ADHD	
	安全性: 有効性: 用法:				男 7歳 11ヶ月 (1995/10/25生) 外来・継続中 2003/11/05 ~ 15.00mg/日(2x) → 散 内用
185	国立F	(発達心)	適応外使用 多動	オブソクロヌス・ミオクロヌス症候群	
	安全性: 有効性: 用法:				男 8歳 2ヶ月 (1995/07/21生) 外来・ 2003/11/17 ~ 2.00mg/日(4x) → 散 内用
186	国立F	(発達心理科)	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 有効性: 用法:				男 8歳 4ヶ月 (1995/05/10生) 外来・継続中 2003/11/07 ~ 30.00mg/日(2x) → 錠・カプセル 内用
187	国立F	(発達心)	適応外使用	注意欠陥多動障害 自閉傾向	
	安全性: 有効性: 用法:				男 8歳 6ヶ月 (1995/03/27生) 外来・継続中 2003/11/07 ~ 10.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用

## WEB調査 実績データ

## 塩酸メチルフェニデート錠・散

No	施設名 安全性/ 有効性/ 用法・用量/ 総合コメント	診療科 対象疾患	適応外使用の実績名	
			患者背景 投与量・剤型・投与経路	
188	国立F (発達心理科)	適応外使用	ADHDかADDの傾向	
	安全性: 有効性: 用法:		男 8歳 8ヶ月 (1995/01/29生) 外来・継続中	
	総合:		2003/11/05 ~ 7.00mg/日 (1x) → 散 内用	
189	国立F (発達心)	適応外使用	注意欠陥多動障害 学習障害	
	安全性: 有効性: 用法:		男 8歳 11ヶ月 (1994/10/06生) 外来・継続中	
	総合:		2003/11/11 ~ 30.00mg/日 (3x) → 錠・カプセル 内用	
190	国立F (思春心)	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 有効性: 用法:		男 9歳 2ヶ月 (1994/09/11生) 外来・継続中	
	総合: 学校のある日は飲んでいる		2003/11/20 ~ 7.00mg/日 (1x) → 散 内用	
191	国立F (発達心)	適応外使用	アスペルガー症候群	
	安全性: 有効性: 用法:		男 9歳 3ヶ月 (1994/06/28生) 外来・継続中	
	総合:		2003/11/11 ~ 30.00mg/日 (3x) → 錠・カプセル 内用	
192	国立F (発達心)	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 有効性: 用法:		男 9歳 7ヶ月 (1994/02/14生) H: 139.4cm W: 35.8kg 外来・継続中	
	総合:		2003/11/13 ~ 10.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	
193	国立F (発達心)	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 有効性: 用法:		男 9歳 8ヶ月 (1994/01/08生) H: 130.0cm W: 21.0kg 外来・継続中	
	総合:		2003/11/27 ~ 30.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	
194	国立F (発達心)	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 有効性: 用法:		女 9歳 9ヶ月 (1993/12/20生) H: 136.8cm W: 27.7kg 外来・継続中	
	総合:		2003/11/06 ~ 20.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	
195	国立F (発達心)	適応外使用	アスペルガー症候群 不眠・恐怖不安障害	
	安全性: 有効性: 用法:		女 9歳 10ヶ月 (1993/11/19生) 外来・継続中	
	総合:		2003/11/12 ~ 5.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
196	国立F (発達心)	適応外使用	精神遅滞	
	安全性: 有効性: 用法:		女 10歳 3ヶ月 (1993/08/09生) H: 122.5cm W: 18.9kg 外来・継続中	
	総合:		2003/11/10 ~ 5.00mg/日 (1x) → 散 内用	
197	国立F (発達心)	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 有効性: 用法: 学校で不定期に飲んでいると足りなくなる		女 10歳 8ヶ月 (1993/03/17生) H: 145.0cm W: 37.7kg 外来・継続中	
	総合: 茶を飲んでいると調子がいい		2003/11/20 ~ 15.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
198	国立F (思春心)	適応外使用	注意欠陥多動障害	
	安全性: 有効性: 善 用法:		男 11歳 2ヶ月 (1992/10/03生) 外来・継続中	
	総合: リタリンを飲まないと、わざわざしてくる。		2003/11/18 ~ 15.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	

No	施設名 安全性/ 有効性 用法・用量/ 総合コメント	診察科 対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景 投与量・剤型・投与経路
199	国立F (発達心)	適応外使用	注意欠陥多動障害	女 11歳 2ヶ月 (1992/09/24生) H: 141.7cm W: 38.8kg 外来・継続中 2003/11/06～ 60.00mg/日(3x) → 錠・カプセル 内用
200	国立F (発達心)	適応外使用	注意欠陥多動障害	男 11歳 3ヶ月 (1992/08/11生) H: 141.7cm W: 38.8kg 外来・継続中 2003/11/17～ 30.00mg/日(2x) → 錠・カプセル 内用
201	国立F (発達心)	適応外使用	注意欠陥多動障害の疑い	男 11歳 3ヶ月 (1992/08/24生) 外米・継続中 2003/11/06～ 20.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用
202	国立F (発達心)	適応外使用	注意欠陥多動障害	女 11歳 4ヶ月 (1992/07/08生) 外米・継続中 2003/11/26～ 30.00mg/日(3x) → 錠・カプセル 内用
203	国立F (神経内)	適応外使用	精神神経症	女 11歳 5ヶ月 (1992/06/26生) 外米・継続中 2003/11/06～ 8.00mg/日(2x) → 散 内用
204	国立F (発達心)	適応外使用	注意欠陥多動障害	男 11歳 9ヶ月 (1992/02/07生) 外米・継続中 2003/11/06～ 30.00mg/日(3x) → 錠・カプセル 内用
205	国立F (発達心)	適応外使用	注意欠陥多動障害	男 11歳 11ヶ月 (1991/12/12生) H: 144.5cm W: 30.0kg 外来・継続中 2003/11/26～ 10.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用 総 合: リタリンを使っておしゃべりになった
206	国立F (発達心)	適応外使用	読字障害	女 11歳 11ヶ月 (1991/11/02生) 外米・継続中 2003/11/05～ 5.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用
207	国立F (発達心)	適応外使用	記憶障害	女 12歳 8ヶ月 (1991/04/01生) 外米・継続中 2003/11/12～ 10.00mg/日(2x) → 錠・カプセル 内用
208	国立F (発達心)	適応外使用	アスペルガー症候群	男 13歳 2ヶ月 (1990/09/23生) H: 156.7cm W: 46.7kg 外来・継続中 2003/11/13～ 20.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用 総 合: 急性リンパ性白血病(2002.12?)の患者。
209	国立F (総合診)	適応外使用	心身症	男 13歳 5ヶ月 (1990/06/06生) H: 154.0cm W: 41.8kg 外来・投与終了 2003/11/28～ 25.00mg/日(2x) → 錠・カプセル 内用 総 合: 食欲不振の為リタリン中止。必要な時、屯用で。アトピー性皮膚炎・喘息の患者。

## WEB調査 実績データ

## 塩酸メチルフェニデート錠・散

No	施設名 安全性/ 有効性 用法・用 量/ 総合コメント	診療科 対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景	
				投与量・剤型・投与経路	
210	国立F (発達心)	適応外使用	広汎性発達障害	男 13歳 11ヶ月 (1989/12/14生) 外米・継続中	
	安全性: 有効性: 用 法:	総 合:		2003/11/13 ~ 30.00mg/日 (3x) → 錠・カプセル 内用	
211	国立F (総合診)	適応外使用	borderline mentality	男 14歳 1ヶ月 (1989/10/09生) 外米・投与終了	
	安全性: 有効性: 用 法:	総 合:		2003/11/28 ~ 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
212	国立F (発達心)	適応外使用	行為障害	女 14歳 10ヶ月 (1989/01/09生) 外米・継続中	
	安全性: 有効性: 用 法:	総 合:		2003/11/10 ~ 40.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	
213	国立F (思春心)	適応外使用	注意欠陥多動障害	男 14歳 11ヶ月 (1988/12/01生) 外米・継続中	
	安全性: 有効性: 用 法:	総 合:		2003/11/28 ~ 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
214	国立F (発達心)	適応外使用	学習障害の疑い	男 15歳 1ヶ月 (1988/10/23生) 外米・継続中	
	安全性: 有効性: 用 法:	総 合:		2003/11/20 ~ 5.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
215	国立F (発達心)	適応外使用	記憶障害	女 15歳 3ヶ月 (1988/09/03生) H: 165.0cm W: 60.0kg 外米・継続中	
	安全性: 有効性: 用 法:	総 合:		2003/11/18 ~ 40.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	
216	国立F (発達心)	適応外使用	注意欠陥多動障害	男 15歳 10ヶ月 (1988/01/04生) H: 175.0cm W: 76.0kg 外米・継続中	
	安全性: 有効性: 用 法:	総 合:		2003/11/27 ~ 30.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	
217	国立F (思春心)	適応外使用	注意欠陥多動障害	女 15歳 10ヶ月 (1988/01/11生) H: 163.1cm W: 46.6kg 外米・継続中	
	安全性: 有効性: 用 法:	総 合:		2003/11/11 ~ 20.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	
218	大学B 小児科	適応外使用	言語発達遅延	女 4歳 7ヶ月 (1999/04/17生) 外米・	
	安全性: 有効性: 用 法:	総 合:		15.00mg/日 (2x) → 散 内用	
219	大学B 小児科	適応外使用	ADHD、学習障害	女 5歳 3ヶ月 (1998/08/16生) 外米・	
	安全性: 有効性: 用 法:	総 合:		15.00mg/日 (2x) → 散 内用	
220	大学B 小児科	適応外使用	ファンコニー症候群、てんかん	女 5歳 4ヶ月 (1998/07/12生) 外米・	
	安全性: 有効性: 用 法:	総 合:		10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	

## WEB調査 実績データ

## 塩酸メチルフェニデート錠・散

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/ 複合コメント				投与量・剤型・投与経路
221	大学B	小児科	適応外使用	学習障害	
	安全性:				男 5歳 8ヶ月 (1998/04/14生) 外来・
	有効性:				
	用 法:				10.00mg/日(2x) ~ 散 内用 →
	総 合:				
222	大学B	小児科	適応外使用	精神schizo、うつ病	
	安全性:	null			男 5歳 9ヶ月 (1998/03/07生) 外来・
	有効性:				
	用 法:	null			15.00mg/日(2x) ~ 錠・カプセル 内用 →
	総 合:	null			
223	大学B	小児科	適応外使用	言語発達遅延	
	安全性:				男 5歳 9ヶ月 (1998/02/19生) 外来・
	有効性:				
	用 法:				5.00mg/日(1x) ~ 散 内用 →
	総 合:				
224	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	
	安全性:				男 5歳 10ヶ月 (1998/01/18生) 外来・
	有効性:				
	用 法:				16.00mg/日(2x) ~ 散 内用 →
	総 合:				
225	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	
	安全性:	null			男 5歳 10ヶ月 (1998/01/29生) 外来・
	有効性:				
	用 法:	null			17.00mg/日(4x) ~ 錠・カプセル 内用 →
	総 合:	null			
226	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、学習障害	
	安全性:				男 6歳 1ヶ月 (1997/10/27生) 外来・
	有効性:				
	用 法:				15.00mg/日(2x) ~ 散 内用 →
	総 合:				
227	大学B	神経科	適応外使用	ADHD	
	安全性:				男 6歳 2ヶ月 (1997/10/01生) 外来・
	有効性:				
	用 法:				10.00mg/日(2x) ~ 散 内用 →
	総 合:				
228	大学B	小児科	適応外使用	精神発達遅滞	
	安全性:	null			男 6歳 4ヶ月 (1997/07/24生) 外来・
	有効性:				
	用 法:	null			~ (3x) → 錠・カプセル 内用
	総 合:	null			
229	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	
	安全性:				女 6歳 5ヶ月 (1997/06/22生) 外来・
	有効性:				
	用 法:				16.00mg/日(2x) ~ 散 内用 →
	総 合:				
230	大学B	小児科	適応外使用	精神発達遅滞	
	安全性:				女 6歳 5ヶ月 (1997/07/01生) 外来・
	有効性:				
	用 法:				~ 2.50mg/日(1x) → 散 内用
	総 合:				
231	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	
	安全性:	null			男 6歳 8ヶ月 (1997/03/14生) 外来・
	有効性:				
	用 法:	null			~ 10.00mg/日(2x) → 錠・カプセル 内用
	総 合:	null			

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実績名	患者背景
	安全性／有効性 用法・用量／総合コメント			投与量・剤型・投与経路	
232	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、精神発達遅延	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:	null			男 6歳 10ヶ月 (1997/01/18生) 外来・ ～ 15.00mg/日(3x) 散 内用
233	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				男 6歳 10ヶ月 (1997/01/23生) 外来・ ～ 14.00mg/日(2x) 錠・カプセル、散 内用
234	大学B	小児科	適応外使用	興奮状態、薬剤性パーキンソニズム	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				女 6歳 11ヶ月 (1997/01/10生) 外来・ ～ 5.00mg/日(2x) 散 内用
235	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、精神発達遅延	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:	null			男 7歳 0ヶ月 (1996/12/07生) 外来・ ～ 15.00mg/日(2x) 散 内用
236	大学B	小児科	適応外使用	てんかん、精神発達遅延	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				女 7歳 0ヶ月 (1996/12/11生) 外来・ ～ 10.00mg/日(2x) 散 内用
237	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、うつ病	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				男 7歳 1ヶ月 (1996/11/04生) 外来・ ～ 10.00mg/日(1x) 錠・カプセル 内用
238	大学B	小児科	適応外使用	自閉症	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				男 7歳 1ヶ月 (1996/10/27生) ～ 10.00mg/日(2x) 散 内用
239	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				男 7歳 3ヶ月 (1996/08/31生) 外来・ ～ 20.00mg/日(2x) 錠・カプセル 内用
240	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、うつ病、精神発達遅延	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:	null			男 7歳 3ヶ月 (1996/08/17生) 外来・ ～ 20.00mg/日(2x) 錠・カプセル 内用
241	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、糖尿病	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				男 7歳 5ヶ月 (1996/07/07生) 外来・ ～ 20.00mg/日(2x) 散 内用
242	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:	null			男 7歳 5ヶ月 (1996/07/05生) 外来・ ～ 30.00mg/日(3x) 錠・カプセル 内用

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/ 趣合コメント				投与量・剤型・投与経路
243	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 7歳 6ヶ月 (1996/05/27生) 外来・ ~ 15.00mg/日(2x) → 錠・カプセル 内用
244	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 7歳 6ヶ月 (1996/06/14生) 外来・ ~ 20.00mg/日(2x) → 散 内用
245	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、うつ病	男 7歳 7ヶ月 (1996/04/26生) 外来・ ~ 20.00mg/日(2x) → 散 内用
246	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、学習障害	女 7歳 7ヶ月 (1996/04/16生) 外来・ ~ 20.00mg/日(2x) → 散 内用
247	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、精神発達遅滞	男 7歳 7ヶ月 (1996/04/21生) 外来・ ~ 5.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用
248	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 7歳 8ヶ月 (1996/03/26生) 外来・ ~ 30.00mg/日(3x) → 錠・カプセル 散 内用
249	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 7歳 8ヶ月 (1996/04/08生) 外来・ ~ 20.00mg/日(2x) → 錠・カプセル 内用
250	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 7歳 9ヶ月 (1996/02/22生) 外来・ ~ 12.00mg/日(2x) → 散 内用
251	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 7歳 9ヶ月 (1996/03/07生) 外来・ ~ 10.00mg/日(2x) → 散 内用
252	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、うつ病	男 7歳 9ヶ月 (1996/03/07生) 外来・ ~ 20.00mg/日(2x) → 散 内用
253	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 7歳 11ヶ月 (1995/12/19生) 外来・ ~ 18.00mg/日(2x) → 散 内用