

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
254	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 8歳 0ヶ月 (1995/11/20生) 外来・ ~ 18.00mg/日 (3x) → 錠・カプセル 内用	
	安全性: 有効性: 用法: null		null			
	総合: null					
255	大学B	小児科	適応外使用	学習障害	男 8歳 0ヶ月 (1995/12/01生) 外来・ ~ 15.00mg/日 (1x) → 散 内用	
	安全性: 有効性: 用法:					
	総合:					
256	大学B	小児科	適応外使用	多動性障害、興奮状態	女 8歳 1ヶ月 (1995/11/03生) 外来・ ~ 15.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	
	安全性: 有効性: 用法:					
	総合:					
257	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、学習障害	男 8歳 2ヶ月 (1995/09/28生) ~ 20.00mg/日 (2x) → 散 内用	
	安全性: 有効性: 用法:					
	総合:					
258	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 8歳 3ヶ月 (1995/08/15生) 外来・ ~ 15.00mg/日 (2x) → 散 内用	
	安全性: 有効性: 用法:					
	総合:					
259	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、躁病	女 8歳 3ヶ月 (1995/09/03生) 外来・ ~ 40.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	
	安全性: 有効性: 用法: null		null			
	総合: null					
260	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 8歳 4ヶ月 (1995/08/07生) 外来・ ~ 20.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	
	安全性: 有効性: 用法:					
	総合:					
261	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 8歳 4ヶ月 (1995/08/07生) 外来・ ~ 12.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	
	安全性: 有効性: 用法:					
	総合:					
262	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	女 8歳 8ヶ月 (1995/03/22生) 外来・ ~ 15.00mg/日 (2x) → 散 内用	
	安全性: 有効性: 用法:					
	総合:					
263	大学B	神経科	適応外使用	ADHD、うつ病	男 8歳 8ヶ月 (1995/03/23生) 外来・ ~ 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
	安全性: 有効性: 用法:					
	総合:					
264	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 8歳 9ヶ月 (1995/02/20生) 外来・ ~ 5.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
	安全性: 有効性: 用法:					
	総合:					

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
265	大学B	小児科	適応外使用	精神発達遅延	男 8歳 9ヶ月 (1995/03/13生) 外来・
	安全性:				~
	有効性:				10.00mg/日 (2x) →
	用法:				散
	総合:				内服
266	大学B	小児科	適応外使用	てんかん	男 8歳 10ヶ月 (1995/01/20生) 外来・
	安全性:		null		~
	有効性:				10.00mg/日 (2x) →
	用法: null				錠・カプセル
	総合: null				内服
267	大学B	小児科	適応外使用	乳児けいれん	女 8歳 11ヶ月 (1995/01/06生) 外来・
	安全性:				~
	有効性:				20.00mg/日 (2x) →
	用法:				錠・カプセル
	総合:				内服
268	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、うつ病	男 9歳 0ヶ月 (1994/11/25生) 外来・
	安全性:				~
	有効性:				5.00mg/日 (1x) →
	用法:				錠・カプセル
	総合:				内服
269	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 9歳 0ヶ月 (1994/12/12生) 外来・
	安全性:				~
	有効性:				10.00mg/日 (1x) →
	用法:				錠・カプセル
	総合:				内服
270	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 9歳 1ヶ月 (1994/11/11生) 外来・
	安全性:				~
	有効性:				30.00mg/日 (2x) →
	用法:				錠・カプセル
	総合:				内服
271	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 9歳 1ヶ月 (1994/10/29生) 外来・
	安全性:		null		~
	有効性:				45.00mg/日 (6x) →
	用法: null				錠・カプセル
	総合: null				内服
272	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 9歳 2ヶ月 (1994/10/13生) 外来・
	安全性:				~
	有効性:				10.00mg/日 (2x) →
	用法:				錠・カプセル
	総合:				内服
273	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、うつ病	女 9歳 2ヶ月 (1994/10/09生) 外来・
	安全性:				~
	有効性:				15.00mg/日 (2x) →
	用法:				錠・カプセル
	総合:				内服
274	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、学習障害	男 9歳 4ヶ月 (1994/08/09生) 外来・
	安全性:		null		~
	有効性:				20.00mg/日 (2x) →
	用法: null				散
	総合: null				内服
275	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、学習障害	男 9歳 4ヶ月 (1994/08/15生) 外来・
	安全性:				~
	有効性:				30.00mg/日 (3x) →
	用法:				錠・カプセル
	総合:				内服

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
276	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、学習障害		女 9歳 4ヶ月 (1994/08/13生) 外来・
	安全性:					~
	有効性:					13.00mg/日 (2x)
	用法:					散 内用
総合:						→
277	大学B	小児科	適応外使用	ADHD		男 9歳 6ヶ月 (1994/06/06生) 外来・
	安全性:					~
	有効性:					30.00mg/日 (1x)
	用法:					錠・カプセル 内用
総合:						→
278	大学B	小児科	適応外使用	ADHD		男 9歳 8ヶ月 (1994/04/09生) 外来・
	安全性:					~
	有効性:					30.00mg/日 (2x)
	用法:					錠・カプセル 内用
総合:						→
279	大学B	小児科	適応外使用	ADHD		男 9歳 9ヶ月 (1994/03/05生) 外来・
	安全性:		null			~
	有効性:					15.00mg/日 (3x)
	用法:	null				錠・カプセル 内用
総合:	null					→
280	大学B	小児科	適応外使用	非定型自閉症、精神発達遅延		男 9歳 9ヶ月 (1994/02/22生) 外来・
	安全性:					~
	有効性:					20.00mg/日 (2x)
	用法:					錠・カプセル 内用
総合:						→
281	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、うつ病		男 9歳 10ヶ月 (1994/01/24生) 外来・
	安全性:					~
	有効性:					30.00mg/日 (2x)
	用法:					錠・カプセル 内用
総合:						→
282	大学B	小児科	適応外使用	ADHD		男 10歳 0ヶ月 (1993/11/24生) 外来・
	安全性:					~
	有効性:					15.00mg/日 (2x)
	用法:					錠・カプセル 内用
総合:						→
283	大学B	小児科	適応外使用	ADHD		男 10歳 1ヶ月 (1993/11/13生) 外来・
	安全性:					~
	有効性:					20.00mg/日 (2x)
	用法:					錠・カプセル 内用
総合:						→
284	大学B	小児科	適応外使用	ADHD		男 10歳 2ヶ月 (1993/10/13生) 外来・
	安全性:		null			~
	有効性:					30.00mg/日 (3x)
	用法:	null				錠・カプセル 内用
総合:	null					→
285	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、反応性うつ病		女 10歳 3ヶ月 (1993/08/25生) 外来・
	安全性:					~
	有効性:					40.00mg/日 (2x)
	用法:					錠・カプセル 内用
総合:						→
286	大学B	小児科	適応外使用	薬剤性パーキンソニズム、興奮状態		男 10歳 3ヶ月 (1993/08/28生) 外来・
	安全性:					~
	有効性:					10.00mg/日 (1x)
	用法:					錠・カプセル 内用
総合:						→

No	施設名 診療科 対象疾患			適応外使用の実病名	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型	投与経路
287	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 10歳 3ヶ月 (1993/09/14生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				30.00mg/日 (2x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
総合:						
288	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 10歳 5ヶ月 (1993/06/19生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				15.00mg/日 (2x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
総合:						
289	大学B	小児科	適応外使用	うつ病、ADHD、学習障害	女 10歳 6ヶ月 (1993/06/08生)	外来・
	安全性:				null	
	有効性:				~	
	用法:				20.00mg/日 (1x)	→
総合:				錠・カプセル	内用	
総合: null						
290	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	女 10歳 7ヶ月 (1993/04/24生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				30.00mg/日 (3x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
総合:						
291	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、うつ病	男 10歳 7ヶ月 (1993/05/02生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				20.00mg/日 (2x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
総合:						
292	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、学習障害	男 10歳 7ヶ月 (1993/05/10生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				18.00mg/日 (2x)	→
	用法:				散	内用
総合:						
293	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、うつ病	男 10歳 9ヶ月 (1993/02/16生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				25.00mg/日 (3x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
総合:						
294	大学B	小児科	適応外使用	学習障害	男 11歳 1ヶ月 (1992/10/27生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				20.00mg/日 (1x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
総合:						
295	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 11歳 1ヶ月 (1992/11/07生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				30.00mg/日 (3x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
総合:						
296	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 11歳 2ヶ月 (1992/10/13生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				15.00mg/日 (2x)	→
	用法:				散	内用
総合:						
297	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、うつ病	男 11歳 2ヶ月 (1992/10/12生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				10.00mg/日 (2x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
総合:						

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	投与量・剤型・投与経路
298	大学B	小児科	適応外使用	ADHD		
	安全性: 有効性: 用法: null				男 11歳 2ヶ月 (1992/09/19生)	外来・
	総合: null				10.00mg/日 (2x) 錠・カプセル 内用	→
299	大学B	小児科	適応外使用	ADHD, うつ病		
	安全性: 有効性: 用法: null				男 11歳 3ヶ月 (1992/08/22生)	外来・
	総合: null				30.00mg/日 (6x) 錠・カプセル 内用	→
300	大学B	小児科	適応外使用	自閉症		
	安全性: 有効性: 用法:				男 11歳 5ヶ月 (1992/07/09生)	外来・
	総合:				20.00mg/日 (3x) 錠・カプセル 内用	→
301	大学B	小児科	適応外使用	てんかん, 躁病		
	安全性: 有効性: 用法: null				男 11歳 6ヶ月 (1992/05/28生)	外来・
	総合: null				20.00mg/日 (2x) 錠・カプセル 内用	→
302	大学B	小児科	適応外使用	ADHD		
	安全性: 有効性: 用法:				男 11歳 7ヶ月 (1992/04/26生)	外来・
	総合:				30.00mg/日 (2x) 錠・カプセル 内用	→
303	大学B	小児科	適応外使用	ADHD		
	安全性: 有効性: 用法:				男 11歳 7ヶ月 (1992/05/09生)	外来・
	総合:				80.00mg/日 (4x) 錠・カプセル 内用	→
304	大学B	小児科	適応外使用	ADHD		
	安全性: 有効性: 用法: null				男 11歳 8ヶ月 (1992/03/30生)	外来・
	総合: null				20.00mg/日 (2x) 錠・カプセル 内用	→
305	大学B	小児科	適応外使用	学習障害, Epilepsy		
	安全性: 有効性: 用法:				男 11歳 9ヶ月 (1992/02/23生)	外来・
	総合:				20.00mg/日 (2x) 錠・カプセル 内用	→
306	大学B	小児科	適応外使用	ADHD, うつ病		
	安全性: 有効性: 用法:				男 11歳 9ヶ月 (1992/02/29生)	外来・
	総合:				40.00mg/日 (4x) 錠・カプセル 内用	→
307	大学B	小児科	適応外使用	ADHD		
	安全性: 有効性: 用法:				男 11歳 10ヶ月 (1992/01/31生)	外来・
	総合:				40.00mg/日 (2x) 錠・カプセル 内用	→
308	大学B	小児科	適応外使用	ADHD, 精神schizo		
	安全性: 有効性: 用法: null				男 12歳 3ヶ月 (1991/08/23生)	外来・
	総合: null				10.00mg/日 (2x) 錠・カプセル 内用	→

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の実績名	患者背景	
	用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
309	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、うつ病		男 12歳 4ヶ月 (1991/07/17生) 外来・
	安全性:					~
	有効性:					10.00mg/日 (3x) --
	用法:					錠・カプセル 内用
総合:						
310	大学B	小児科	適応外使用	ADHD		女 12歳 8ヶ月 (1991/03/25生) 外来・
	安全性:					~
	有効性:					30.00mg/日 (2x) --
	用法:					錠・カプセル 内用
総合:						
311	大学B	小児科	適応外使用	ADHD		男 12歳 9ヶ月 (1991/02/22生) 外来・
	安全性:		null			~
	有効性:					20.00mg/日 (4x) --
	用法:					錠・カプセル 内用
総合:						
312	大学B	小児科	適応外使用	ADHD		男 13歳 4ヶ月 (1990/07/31生) 外来・
	安全性:					~
	有効性:					20.00mg/日 (2x) --
	用法:					錠・カプセル 内用
総合:						
313	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、Epilepsy		男 13歳 9ヶ月 (1990/02/23生) 外来・
	安全性:					~
	有効性:					10.00mg/日 (1x) --
	用法:					錠・カプセル 内用
総合:						
314	大学B	小児科	適応外使用	うつ病、ADHD		男 14歳 0ヶ月 (1989/11/27生) 外来・
	安全性:					~
	有効性:					30.00mg/日 (1x) --
	用法:					錠・カプセル 内用
総合:						
315	大学B	小児科	適応外使用	ADHD		男 14歳 1ヶ月 (1989/11/10生) 外来・
	安全性:					~
	有効性:					80.00mg/日 (2x) --
	用法:					錠・カプセル 内用
総合:						
316	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、学習障害		男 14歳 3ヶ月 (1989/09/04生) 外来・
	安全性:					~
	有効性:					20.00mg/日 (2x) --
	用法:					錠・カプセル 内用
総合:						
317	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、学習障害		女 14歳 8ヶ月 (1989/03/21生) 外来・
	安全性:					~
	有効性:					40.00mg/日 (2x) --
	用法:					錠・カプセル 内用
総合:						
318	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、うつ病		男 14歳 9ヶ月 (1989/02/17生) 外来・
	安全性:					~
	有効性:					30.00mg/日 (3x) --
	用法:					錠・カプセル 内用
総合:						
319	大学B	小児科	適応外使用	ADHD		男 15歳 2ヶ月 (1988/10/03生) 外来・
	安全性:					~
	有効性:					30.00mg/日 (3x) --
	用法:					錠・カプセル 内用
総合:						

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
320	大学B	小児科	適応外使用	てんかん、ADHD	男	15歳 7ヶ月 (1988/05/03生) 外来・
	安全性:				100.00mg/日 (5x)	→
	有効性:				錠・カプセル	内用
	用法:					
321	大学C	小児科	適応外使用	ADHD	女	6歳 6ヶ月 (1997/04/28生) 外来・継続中
	安全性:				2003/11/12 ~	→
	有効性: 不明または未判定				5.00mg/日 (1x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
322	大学C	精神科 (精神科神経科)	適応外使用	ADHD	男	7歳 10ヶ月 (1995/12/25生) 外来・継続中
	安全性: 特になし				2003/09/17 ~	→
	有効性: やや有効				30.00mg/日 (3x)	10.00mg → 30.00mg
	用法:				錠・カプセル	内用
323	大学C	精神科 (精神科神経科)	適応外使用	ADHD	男	8歳 6ヶ月 (1995/04/22生) 外来・継続中
	安全性: 特になし				2003/04/02 ~	→
	有効性: 著効				20.00mg/日 (2x)	10.00mg → 20.00mg
	用法:				錠・カプセル	内用
324	大学C	精神科 (精神科神経科)	適応外使用	ADHD	男	8歳 9ヶ月 (1995/02/02生) 外来・継続中
	安全性: 副作用あり: 概要を記載				2001/09/12 ~	→
	有効性: 著効				20.00mg/日 (2x)	10.00mg → 20.00mg
	用法:				錠・カプセル	内用
325	大学C	精神科 (精神科神経科)	適応外使用	ADHD	男	10歳 0ヶ月 (1993/11/03生) 外来・継続中
	安全性: 特になし				2001/08/22 ~	→
	有効性: 有効				10.00mg/日 (1x)	→
	用法:				その他(錠剤を粉砕化)	内用
326	大学C	精神科 (精神科神経科)	適応外使用	ADHD	女	10歳 5ヶ月 (1993/05/25生) 外来・継続中
	安全性: 特になし				2003/11/07 ~	→
	有効性: 著効				20.00mg/日 (2x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
327	大学C	精神科 (精神科神経科)	適応外使用	ADHD	男	10歳 6ヶ月 (1993/05/16生) 外来・継続中
	安全性: 特になし				2002/11/27 ~	→
	有効性: 著効				(2x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
328	大学C	精神科 (精神科神経科)	適応外使用	ADHD	男	11歳 11ヶ月 (1991/12/03生) 外来・継続中
	安全性: 特になし				2001/09/14 ~	→
	有効性: 著効				20.00mg/日 (2x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
329	大学C	小児科	適応外使用	ADHD	女	12歳 6ヶ月 (1991/05/07生) H: 140.0cm W: 30.0kg 外来・継続中
	安全性: 特になし				2003/09/03 ~	→
	有効性: やや有効				10.00mg/日 (2x)	5.00mg → 10.00mg
	用法:				錠・カプセル	内用
330	大学C	精神科 (精神科神経科)	適応外使用	ADHD	男	13歳 5ヶ月 (1990/05/28生) 外来・継続中
	安全性: 特になし				2003/09/17 ~	→
	有効性: やや有効				30.00mg/日 (3x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			患者背景 投与量・剤型・投与経路	
331	大学D	小児科	適応外使用	注意欠陥多動性障害, 広汎性発達障害	女 6歳 11ヶ月 (1996/12/30生) 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: やや有効 用法: 総 合: 副作用はなく、使いやすい。			2003/07/25 ~ 15.00mg/日 (1x) 10.00mg → 20.00mg 錠・カプセル 内用	
332	大学D	小児科	適応外使用	ADHD	男 7歳 7ヶ月 (1996/04/03生) 外来・投与終了
	安全性: 副作用あり: 概要を記載 食欲不振 有効性: やや有効 用法: 総 合: 薬剤を中止して様子を見ている。自分の調子を自分で判断出来る年齢の児に使用するのが良いと感じる。適応についてははっきりして欲しい。適応なく効果のはっきりしない薬剤であると説明することは診療時間的に大変。教師が勧めることもあるようで両親から希望する症例が多い。			2002/07/16 ~ 2003/11/05 (478日間) 10.00mg/日 (1x) 5.00mg → 10.00mg 散 内用	
333	大学D	神経科	適応外使用	ADHD(注意欠陥多動性障害)	男 8歳 1ヶ月 (1995/10/06生) 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 著効 用法: 総 合: 多動傾向に大変有効で適応症として必要。			2002/12/12 ~ 10.00mg/日 (1x) 5.00mg → 10.00mg 錠・カプセル, 散 内用	
334	大学D	神経科	適応外使用	ADHD(注意欠陥多動性障害)	男 8歳 4ヶ月 (1995/07/08生) 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 総 合: 多動に有効で適応が必要。			2001/06/18 ~ 10.00mg/日 (1x) 2.00mg → 20.00mg 錠・カプセル, 散 内用	
335	大学D	小児科	適応外使用	注意欠陥多動性障害, 広汎性発達障害	男 9歳 2ヶ月 (1994/09/16生) W: 29.0kg 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 総 合: 学校での行動が改善することで本人の自信, 意欲が高まり, また担任・他の生徒からの評価や対応が改善した。			2001/08/29 ~ 10.00mg/日 (1x) 5.00mg → 20.00mg 錠・カプセル 内用	
336	大学D	神経科	適応外使用	ADHD	男 11歳 5ヶ月 (1992/11/06生) 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 朝2錠。 総 合:			20.00mg/日 (1x) 10.00mg → 50.00mg 錠・カプセル 内用	
337	大学D	神経科	適応外使用	ADHD	男 11歳 7ヶ月 (1992/04/26生) 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 朝2錠, 昼1?2錠。学校が休みの日は休薬。 総 合:			20.00mg/日 (2x) 20.00mg → 60.00mg 錠・カプセル 内用	
338	大学D	神経科	適応外使用	ADHD, 軽度脳波異常	男 12歳 10ヶ月 (1991/01/23生) 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: やや有効 用法: どうしても落ち着いていないといけなときのみ, 母が判断して使用。月に1?2回くらいのこと。 総 合: 脳波異常, 成長ホルモン障害があるため使用については迷ったのですが, 父母の強い希望により試しに処方しました。それほど頻繁に使用しているわけではないようなので, 効果に関しては疑問です。			2003/01/30 ~ 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
339	大学D	神経科	適応外使用	ADHD(注意欠陥多動性障害)	男 13歳 3ヶ月 (1990/09/05生) 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: やや有効 用法: 多動・攻撃性増悪にて20mgに増量。 総 合: 多動傾向に必要。			2003/04/10 ~ 10.00mg/日 (1x) 10.00mg → 20.00mg 錠・カプセル 内用	
340	大学D	小児科	適応外使用	ADHD	男 14歳 8ヶ月 (1989/03/23生) 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 学校が無い日は休薬。 総 合: 有用である。			90.00mg/日 (3x) 60.00mg → 90.00mg 錠・カプセル 内用	
341	大学D	小児科	適応外使用	ADHD	男 15歳 2ヶ月 (1988/09/18生) 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 学校が無い日は休薬。 総 合: 有用である。			1998/01/29 ~ 80.00mg/日 (2x) 40.00mg → 80.00mg 錠・カプセル 内用	

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
1	公立こどもE	精神科	うつ病およびうつ状態			女 16歳 10ヶ月 (1987/01/18生) 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 総合:				錠・カプセル 内用	~ -
2	公立こどもE	精神科	強迫性障害			女 12歳 3ヶ月 (1991/08/06生) 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 無効 用法: 総合:				錠・カプセル 内用	~ --
3	公立こどもE	精神科	強迫性障害			男 13歳 0ヶ月 (1990/11/13生) 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 総合:				錠・カプセル 内用	~ --
4	公立こどもE	精神科	適応外使用	PTSD		女 7歳 6ヶ月 (1996/05/18生) 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: やや有効 用法: 総合:				錠・カプセル 内用	~ --
5	公立こどもE	精神科	適応外使用	PTSD		女 9歳 10ヶ月 (1994/01/12生) 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法: 総合:				錠・カプセル 内用	~ --
6	公立こどもE	精神科	適応外使用	周期性嘔吐症		男 10歳 1ヶ月 (1993/10/01生) 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法: 総合:				錠・カプセル 内用	~ --
7	公立こどもE	精神科	適応外使用	反応性愛着障害+うつ状態		女 10歳 3ヶ月 (1993/08/21生) 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 無効 用法: 総合:				錠・カプセル 内用	~ --
8	公立こどもE	精神科	適応外使用	ADHD+反応性愛着障害+うつ状態 リタリンとの併用により行動障害の改善の可能性を考慮		男 11歳 7ヶ月 (1992/03/30生) 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: やや有効 用法: 総合:				錠・カプセル 内用	~ --
9	公立こどもE	精神科	適応外使用	発達障害に伴った強迫傾向		女 13歳 4ヶ月 (1990/07/06生) 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 著効 用法: 総合:				錠・カプセル 内用	~ --
10	公立こどもM	神経科	適応外使用	アスペルガー症候群		男 12歳 10ヶ月 (1991/01/15生) H: 154.2cm W: 52.1kg 外来・継続中 2003/11/26 ~ 2003/12/25 (30日間) 50.00mg/日 (2x) --
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 総合: アスペルガー症候群に伴う不安、焦燥感を標的徴状として使用した				錠・カプセル 内用	~ --
11	国立B	小児科	うつ病およびうつ状態 仮面うつ病			女 13歳 11ヶ月 (1989/12/13生) H: 154.0cm W: 38.0kg 外来・継続中 2003/11/14 ~ 25.00mg/日 (1x) --
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: null 総合: 不定愁訴の多い仮面うつ病に有効と考える				錠・カプセル 内用	~ --

No	施設名 診療科 対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景 投与量・剤型・投与経路
安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			
12	国立F (心内)	うつ病およびうつ状態	女 9歳 1ヶ月 (1994/10/13生) 外来・継続中
	安全性:		
	有効性:		
	用法:		2003/11/20 ~ 25.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
総合:			
13	国立F (発達心)	うつ病およびうつ状態	男 9歳 2ヶ月 (1994/09/11生) 外来・継続中
	安全性:		
	有効性:		
	用法:		2003/11/10 ~ 25.00mg/日 (2x) → 散 内用
総合:			
14	国立F (発達心)	うつ病およびうつ状態	女 9歳 11ヶ月 (1993/11/19生) 11: 131.2cm W: 23.0kg 外来・継続中
	安全性:		
	有効性: 有効		
	用法:		2003/11/12 ~ 50.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
総合:			
15	国立F (心内)	うつ病およびうつ状態	男 10歳 0ヶ月 (1993/11/05生) 外来・継続中
	安全性:		
	有効性:		
	用法:		2003/11/28 ~ 50.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
総合:			
16	国立F (心内)	うつ病およびうつ状態	女 10歳 1ヶ月 (1993/10/15生) H: 132.9cm W: 45.8kg 外来・継続中
	安全性:		
	有効性:		
	用法:		2003/11/06 ~ 50.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
総合:			
17	国立F (発達心)	うつ病およびうつ状態	男 10歳 7ヶ月 (1993/04/23生) 11: 142.1cm W: 39.2kg 外来・継続中
	安全性:		
	有効性:		
	用法:		2003/11/06 ~ 50.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
総合:			
18	国立F (発達心)	うつ病およびうつ状態	男 11歳 3ヶ月 (1992/08/10生) H: 134.4cm W: 52.3kg 外来・継続中
	安全性:		
	有効性:		
	用法:		2003/11/12 ~ (50日間) 25.00mg/日 (2x) → 散 内用
総合:			
19	国立F (思春心)	うつ病およびうつ状態	女 11歳 7ヶ月 (1992/04/17生) 外来・継続中
	安全性:		
	有効性:		
	用法:		2003/11/17 ~ 25.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
総合:			
20	国立F (思春心)	うつ病およびうつ状態	男 11歳 10ヶ月 (1992/01/10生) 外来・継続中
	安全性:		
	有効性:		
	用法:		2003/11/14 ~ 50.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
総合:			
21	国立F (育児心)	うつ病およびうつ状態	女 12歳 8ヶ月 (1991/03/18生) 外来・継続中
	安全性:		
	有効性:		
	用法:		2003/11/27 ~ 50.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
総合:			
22	国立F	うつ病およびうつ状態	男 13歳 2ヶ月 (1990/09/11生) 外来・継続中
	安全性:		
	有効性:		
	用法:		2003/11/07 ~ 100.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用
総合:			

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
23	国立F (発達心)	うつ病およびうつ状態			男 13歳 4ヶ月 (1990/06/28生) H: 144.0cm W: 49.0kg 外来・ 2003/11/11 ~ (15日間) 25.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:					
24	国立F (育児心)	うつ病およびうつ状態			男 13歳 8ヶ月 (1990/03/04生) 外来・継続中 2003/11/17 ~ 20.00mg/日 (4x) → 散 内用	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:					
25	国立F (思春心)	うつ病およびうつ状態			女 13歳 10ヶ月 (1990/01/15生) H: 152.0cm W: 42.0kg 外来・継続中 2003/11/17 ~ 25.00mg/日 → 錠・カプセル 内用	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:					
26	国立F (総合診)	うつ病およびうつ状態			男 14歳 1ヶ月 (1989/10/15生) 外来・ 2003/11/10 ~ (5日間) 50.00mg/日 → 錠・カプセル 内用	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:					
27	国立F (育児心)	うつ病およびうつ状態 強迫性障害			男 14歳 1ヶ月 (1989/10/07生) H: 166.7cm W: 52.2kg 外来・継続中 2003/11/10 ~ 25.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:					
28	国立F (思春心)	うつ病およびうつ状態			女 14歳 4ヶ月 (1989/07/02生) H: 157.4cm W: 37.7kg 外来・ 2003/11/11 ~ (14日間) 50.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:					
29	国立F (思春心)	うつ病およびうつ状態			女 14歳 11ヶ月 (1988/12/01生) 外来・継続中 2003/11/12 ~ 25.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:					
30	国立F (発達心)	うつ病およびうつ状態			男 15歳 1ヶ月 (1988/10/08生) 外来・継続中 2003/11/10 ~ 25.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:					
31	国立F (総合診)	うつ病およびうつ状態			女 15歳 3ヶ月 (1988/07/25生) H: 157.3cm W: 47.9kg 外来・ 2003/11/10 ~ (14日間) 20.00mg/日 (1x) → 散 内用	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:					
32	国立F (総合診)	うつ病およびうつ状態			女 15歳 3ヶ月 (1988/08/19生) H: 151.4cm W: 35.7kg 入院・ 2003/11/08 ~ (6日間) 50.00mg/日 (2x) → 錠・カプセル 内用	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:					
33	国立F (思春心)	うつ病およびうつ状態			男 15歳 5ヶ月 (1988/06/20生) H: 156.3cm W: 54.3kg 外来・継続中 2003/11/05 ~ 25.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:					

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路
34	国立F	(思春心)	うつ病およびうつ状態		男 15歳 8ヶ月 (1988/03/26生) 外来・継続中
	安全性:				
	有効性:				
	用法:				2003/11/26 ~ 50.00mg/日 (2x) -- 錠・カプセル 内用
総合:					
35	国立F	(思春心)	うつ病およびうつ状態		女 15歳 8ヶ月 (1988/03/14生) H: 158.9cm W: 46.5kg 外来・継続中
	安全性:				
	有効性:				
	用法:				2003/11/11 ~ 50.00mg/日 (1x) -- 錠・カプセル 内用
総合:					
36	国立F	(発達心)	うつ病およびうつ状態		女 15歳 9ヶ月 (1988/02/20生) H: 150.7cm W: 38.1kg 外来・継続中
	安全性:				
	有効性:				
	用法:				2003/11/23 ~ 50.00mg/日 (2x) -- 錠・カプセル 内用
総合:					
37	国立F	(思春心)	うつ病およびうつ状態		女 15歳 9ヶ月 (1988/02/07生) H: 157.0cm 外来・継続中
	安全性:				
	有効性:				
	用法:				2003/11/07 ~ 100.00mg/日 (2x) -- 錠・カプセル 内用
総合:					
38	国立F	(思春心)	うつ病およびうつ状態		男 15歳 11ヶ月 (1987/11/19生) H: 167.0cm W: 53.0kg 外来・継続中
	安全性:				
	有効性:				
	用法:				2003/11/13 ~ 25.00mg/日 (1x) -- 錠・カプセル 内用
総合:					
39	国立F	(思春心 総合診)	うつ病およびうつ状態		女 16歳 1ヶ月 (1987/09/17生) H: 160.0cm W: 45.0kg 外来・
	安全性:				
	有効性:				
	用法:				2003/11/10 ~ (21日間) 25.00mg/日 (1x) -- 錠・カプセル 内用
総合:					
40	国立F	(思春心)	うつ病およびうつ状態		男 16歳 7ヶ月 (1987/04/28生) H: 167.0cm W: 65.0kg 外来・継続中
	安全性:				
	有効性:				
	用法:				2003/11/28 ~ 25.00mg/日 (1x) -- 錠・カプセル 内用
総合:					悪くなっている
41	国立F	(育児心)	強迫性障害		女 13歳 9ヶ月 (1990/02/11生) H: 160.4cm W: 35.5kg 入院・
	安全性:				
	有効性:				
	用法:				2003/11/11 ~ (7日間) 50.00mg/日 -- 錠・カプセル 内用
総合:					
42	国立F		適応外使用 てんかん --	睡眠障害	男 8歳 9ヶ月 (1995/03/02生) H: 136.4cm W: 35.8kg 外来・継続中
	安全性:				
	有効性:				
	用法:				2003/11/05 ~ 25.00mg/日 (2x) -- 錠・カプセル, 散 内用
総合:					
43	国立F	(発達心)	適応外使用	注意欠陥多動障害	男 10歳 9ヶ月 (1993/02/16生) H: 125.4cm W: 21.4kg 外来・投与終了
	安全性:				
	有効性:				
	用法:				2003/11/20 ~ (30日間) 50.00mg/日 (2x) -- 錠・カプセル 内用
総合:					リタリン飲むと良い
44	国立F	(発達心)	適応外使用	注意欠陥多動障害	女 11歳 1ヶ月 (1992/09/24生) 外来・継続中
	安全性:				
	有効性:				
	用法:				2003/11/06 ~ 25.00mg/日 (1x) -- 錠・カプセル 内用
総合:					

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の疾病名	患者背景 投与量・剤型・投与経路
45	国立F (発達心)		適応外使用	注意欠陥多動障害の疑い	男 11歳 3ヶ月 (1992/08/24生) 外来・継続中
					安全性: 有効性: 用法: 総合:
46	国立F (発達心)		適応外使用	注意欠陥多動障害	男 11歳 11ヶ月 (1991/12/12生) H: 144.5cm W: 30.0kg 外来・継続中
					安全性: 有効性: 用法: 総合:
47	国立F (発達心)		適応外使用	自閉症	女 12歳 9ヶ月 (1991/02/09生) 外来・継続中
					安全性: 有効性: 用法: 総合:
48	国立F (思春心)		適応外使用	境界知能	女 13歳 3ヶ月 (1990/09/01生) H: 150.8cm W: 57.4kg 外来・継続中
					安全性: 有効性: 用法: 総合:
49	国立F (発達心)		適応外使用	アスペルガー症候群	男 13歳 5ヶ月 (1990/07/03生) 外来・継続中
					安全性: 有効性: 用法: 総合:
50	国立F (思春心)		適応外使用	発達障害	男 14歳 0ヶ月 (1989/11/09生) 外来・継続中
					安全性: 有効性: 用法: 総合: 薬が効いている
51	国立F (総合診)		適応外使用	borderline mentality	男 14歳 1ヶ月 (1989/10/09生) 外来・投与終了
					安全性: 有効性: 無効 用法: 総合:
52	国立F (発達心)		適応外使用	家庭内暴力 PTSD	男 14歳 7ヶ月 (1989/04/22生) 外来・継続中
					安全性: 有効性: 用法: 総合:
53	国立F (発達心)		適応外使用	アスペルガー症候群	男 14歳 11ヶ月 (1988/12/26生) H: 162.0cm W: 48.0kg 外来・継続中
					安全性: 有効性: 用法: 総合:
54	国立F (思春心)		適応外使用	注意欠陥多動障害	男 15歳 0ヶ月 (1988/12/01生) 外来・継続中
					安全性: 有効性: やや有効 用法: 総合:
55	国立F 心療内科		適応外使用	知覚過敏性 関係念慮 幻聴様の訴え	女 15歳 2ヶ月 (1988/08/24生) H: 150.0cm W: 43.9kg 外来・継続中
					安全性: 有効性: 用法: 総合:

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路
56	国立F	(思春心)	適応外使用	不登校 引きこもり	
	安全性: 便秘の薬は飲んでいる(コーラック)				女 16歳 1ヶ月 (1987/10/31生)
	有効性:				W: 55.0kg 外来・継続中
	用法:				2003/11/17 ~
総合: 11/17から1Wでやめてしまった。1/19から再開				50.00mg/日 (1x) --	
				錠・カプセル	内用
57	国立F	(思春心)	適応外使用	発達障害の疑い 境界知能	
	安全性:				男 16歳 1ヶ月 (1987/10/14生)
	有効性:				外来・継続中
	用法:				2003/11/14 ~
総合:				25.00mg/日 (1x) --	
				錠・カプセル	内用
58	国立F	(育児心)	適応外使用	広汎性発達障害	
	安全性:				男 16歳 5ヶ月 (1987/06/10生)
	有効性: 有効				外来・投与終了
	用法:				2003/11/13 ~ 2003/12/18 (36日間)
総合:				50.00mg/日 (1x) --	
				錠・カプセル	内用
59	国立F	(発達心)	適応外使用	自閉症	
	安全性:				男 16歳 5ヶ月 (1987/07/02生)
	有効性:				外来・継続中
	用法:				2003/11/20 ~
総合:				25.00mg/日 (1x) --	
				錠・カプセル	内用
60	大学A	小児科	うつ病およびうつ状態		
	安全性: 特になし				男 15歳 5ヶ月 (1991/06/22生)
	有効性: やや有効				H: 154.7cm W: 46.4kg 外来・継続中
	用法:				2003/06/13 ~
総合:				50.00mg/日 (2x) --	
				錠・カプセル	内用
61	大学B	小児科	うつ病およびうつ状態		
	安全性:				女 9歳 3ヶ月 (1994/09/07生)
	有効性:				外来・
	用法:				~
総合:				75.00mg/日 (1x) --	
				錠・カプセル	内用
62	大学B	小児科	うつ病およびうつ状態		
	安全性:				女 12歳 5ヶ月 (1991/07/07生)
	有効性:				外来・
	用法:				~
総合:				50.00mg/日 (1x) --	
				錠・カプセル	内用
63	大学B	小児科	うつ病およびうつ状態		
	安全性:				女 14歳 6ヶ月 (1989/05/30生)
	有効性:				外来・
	用法:				~
総合:				50.00mg/日 (1x) --	
				錠・カプセル	内用
64	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	
	安全性:				女 6歳 5ヶ月 (1997/06/22生)
	有効性:				外来・
	用法:				~
総合:				50.00mg/日 (1x) --	
				錠・カプセル	内用
65	大学B	小児科	適応外使用	自閉症	
	安全性:				男 6歳 10ヶ月 (1997/02/10生)
	有効性:				外来・
	用法:				~
総合:				50.00mg/日 (1x) --	
				錠・カプセル	内用
66	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、反応性うつ病	
	安全性:				男 6歳 10ヶ月 (1997/02/03生)
	有効性:				外来・
	用法:				~
総合:				25.00mg/日 (1x) --	
				錠・カプセル	内用

No	施設名 診療科 対象疾患			適応外使用の実病名	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型	投与経路
67	大学B	小児科	適応外使用	アスペルガー症候群	男 6歳 10ヶ月 (1997/02/04生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				100.00mg/日 (1x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
68	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、学習障害	男 7歳 3ヶ月 (1996/08/31生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				100.00mg/日 (2x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
69	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 7歳 5ヶ月 (1996/07/05生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				50.00mg/日 (1x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
70	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 7歳 5ヶ月 (1996/07/07生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				25.00mg/日 (1x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
71	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 7歳 6ヶ月 (1996/05/27生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				25.00mg/日 (1x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
72	大学B	小児科	適応外使用	うつ病、ADHD、学習障害	女 7歳 7ヶ月 (1996/04/16生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				25.00mg/日 (1x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
73	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 7歳 8ヶ月 (1996/04/08生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				25.00mg/日 (1x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
74	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、うつ病	男 7歳 9ヶ月 (1996/03/07生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				25.00mg/日 (1x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
75	大学B	小児科	適応外使用	中枢性呼吸不全	女 8歳 0ヶ月 (1995/11/28生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				50.00mg/日 (1x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
76	大学B	小児科	適応外使用	うつ病、てんかん	男 8歳 1ヶ月 (1995/10/17生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				50.00mg/日 (1x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用
77	大学B	小児科	適応外使用	自閉症、アスペルガー症候群	女 8歳 1ヶ月 (1995/10/24生)	外来・
	安全性:				~	
	有効性:				50.00mg/日 (1x)	→
	用法:				錠・カプセル	内用

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の疾病名	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
78	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、学習障害	男	8歳 4ヶ月 (1995/08/07生) 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					
総合:					50.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用	
79	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、反応性うつ病	男	8歳 4ヶ月 (1995/08/07生) 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					
総合:					50.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用	
80	大学B	小児科	適応外使用	自閉症	男	8歳 8ヶ月 (1995/04/05生) 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					
総合:					25.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用	
81	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	女	8歳 8ヶ月 (1995/03/22生) 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					
総合:					25.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用	
82	大学B	小児科	適応外使用	学習障害、ADHD	男	8歳 10ヶ月 (1995/01/31生) 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					
総合:					50.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用	
83	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、うつ病	男	9歳 0ヶ月 (1994/11/25生) 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					
総合:					50.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用	
84	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男	9歳 1ヶ月 (1994/11/11生) 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					
総合:					100.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用	
85	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、うつ病	女	9歳 2ヶ月 (1994/10/09生) 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					
総合:					50.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用	
86	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、学習障害	女	9歳 3ヶ月 (1994/08/13生) 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					
総合:					50.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用	
87	大学B	小児科	適応外使用	精神発達遅滞	男	9歳 9ヶ月 (1994/02/22生) 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					
総合:					75.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用	
88	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男	9歳 9ヶ月 (1994/03/04生) 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					
総合:					25.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用	

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の異病名	患者背景		
	用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路		
89	大学B	小児科	適応外使用	てんかん			
	安全性:	null				女 9歳 9ヶ月 (1994/03/06生)	外来・
	有効性:					~	
	用法:					50.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:							
90	大学B	小児科	適応外使用	ADHD			
	安全性:					男 10歳 0ヶ月 (1993/11/13生)	外来・
	有効性:					~	
	用法:					50.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:							
91	大学B	小児科	適応外使用	ADHD			
	安全性:					男 10歳 0ヶ月 (1993/11/24生)	外来・
	有効性:					~	
	用法:					75.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:							
92	大学B	小児科	適応外使用	てんかん、精神発達遅滞			
	安全性:					女 10歳 3ヶ月 (1993/09/12生)	外来・
	有効性:					~	
	用法:					50.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:							
93	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、反応性うつ病			
	安全性:					女 10歳 3ヶ月 (1993/08/25生)	外来・
	有効性:					~	
	用法:					50.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:							
94	大学B	小児科	適応外使用	自閉症			
	安全性:					男 10歳 7ヶ月 (1993/04/21生)	外来・
	有効性:					~	
	用法:					50.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:							
95	大学B	小児科	適応外使用	脱水症			
	安全性:					男 10歳 7ヶ月 (1993/05/10生)	外来・
	有効性:					~	
	用法:					50.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:							
96	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、うつ病			
	安全性:					男 10歳 9ヶ月 (1993/02/16生)	外来・
	有効性:					~	
	用法:					50.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:							
97	大学B	小児科	適応外使用	不安症、てんかん、チック障害			
	安全性:					男 10歳 11ヶ月 (1992/12/30生)	外来・
	有効性:					~	
	用法:					50.00mg/日 (2x)	錠・カプセル 内用
総合:							
98	大学B	小児科	適応外使用	自閉症			
	安全性:					男 11歳 0ヶ月 (1992/11/21生)	外来・
	有効性:					~	
	用法:					50.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:							
99	大学B	小児科	適応外使用	学習障害			
	安全性:					男 11歳 1ヶ月 (1992/10/27生)	外来・
	有効性:					~	
	用法:					50.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:							

No	施設名 診療科 対象疾患			適応外使用の実病名	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型	投与経路
100	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、学習障害	男 11歳 1ヶ月 (1992/11/07生)	外来・
	安全性:				男 11歳 1ヶ月 (1992/11/07生)	外来・
	有効性:				~	
	用法:				25.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:						
101	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	女 11歳 2ヶ月 (1992/09/18生)	外来・
	安全性:				女 11歳 2ヶ月 (1992/09/18生)	外来・
	有効性:				~	
	用法:				100.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:						
102	大学B	小児科	適応外使用	自閉症	男 11歳 2ヶ月 (1992/10/09生)	外来・
	安全性:				男 11歳 2ヶ月 (1992/10/09生)	外来・
	有効性:				~	
	用法:				50.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:						
103	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、うつ病	男 11歳 2ヶ月 (1992/10/12生)	外来・
	安全性:				男 11歳 2ヶ月 (1992/10/12生)	外来・
	有効性:				~	
	用法:				50.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:						
104	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 11歳 8ヶ月 (1992/03/30生)	外来・
	安全性:				男 11歳 8ヶ月 (1992/03/30生)	外来・
	有効性:				~	
	用法:				50.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:						
105	大学B	小児科	適応外使用	アスペルガー症候群	女 11歳 9ヶ月 (1992/03/10生)	外来・
	安全性:				女 11歳 9ヶ月 (1992/03/10生)	外来・
	有効性:				~	
	用法:				25.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:						
106	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 11歳 10ヶ月 (1992/01/31生)	外来・
	安全性:				男 11歳 10ヶ月 (1992/01/31生)	外来・
	有効性:				~	
	用法:				50.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:						
107	大学B	小児科	適応外使用	学習障害	男 12歳 3ヶ月 (1991/08/22生)	外来・
	安全性:				男 12歳 3ヶ月 (1991/08/22生)	外来・
	有効性:				~	
	用法:				25.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:						
108	大学B	小児科	適応外使用	自閉症	男 12歳 4ヶ月 (1991/07/18生)	外来・
	安全性:				男 12歳 4ヶ月 (1991/07/18生)	外来・
	有効性:				~	
	用法:				50.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:						
109	大学B	小児科	適応外使用	上室性頻拍症	女 12歳 6ヶ月 (1991/06/08生)	外来・
	安全性:				女 12歳 6ヶ月 (1991/06/08生)	外来・
	有効性:				~	
	用法:				50.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:						
110	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	女 12歳 8ヶ月 (1991/03/25生)	外来・
	安全性:				女 12歳 8ヶ月 (1991/03/25生)	外来・
	有効性:				~	
	用法:				100.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:						

No	施設名 診療科 対象疾患			適応外使用の実例名	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
111	大学B	小児科	適応外使用	ADHD		
	安全性: 有効性: 用法: null 総合: null				男 12歳 9ヶ月 (1991/02/22生)	外来・
					~	
					50.00mg/日 (1x) 錠・カプセル 内用	→
112	大学B	小児科	適応外使用	てんかん		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				女 13歳 2ヶ月 (1990/10/01生)	外来・
					~	
					50.00mg/日 (1x) 錠・カプセル 内用	→
113	大学B	小児科	適応外使用	ADHD		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				男 13歳 6ヶ月 (1990/05/16生)	外来・
					~	
					50.00mg/日 (1x) 錠・カプセル 内用	→
114	大学B	小児科	適応外使用	反応性うつ病		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				男 13歳 9ヶ月 (1990/02/16生)	外来・
					~	
					50.00mg/日 (1x) 錠・カプセル 内用	→
115	大学B	小児科	適応外使用	自閉症、うつ病		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				男 13歳 10ヶ月 (1990/01/17生)	外来・
					~	
					50.00mg/日 (1x) 錠・カプセル 内用	→
116	大学B	小児科	適応外使用	うつ病、ADHD		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				男 14歳 0ヶ月 (1989/11/27生)	外来・
					~	
					50.00mg/日 (1x) 錠・カプセル 内用	→
117	大学B	小児科	適応外使用	小児崩壊性障害		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				男 14歳 0ヶ月 (1989/12/02生)	外来・
					~	
					50.00mg/日 (1x) 錠・カプセル 内用	→
118	大学B	小児科	適応外使用	てんかん		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				男 14歳 3ヶ月 (1989/09/05生)	外来・
					~	
					75.00mg/日 (2x) 錠・カプセル 内用	→
119	大学B	小児科	適応外使用	ADHD		
	安全性: 有効性: 用法: null 総合: null				女 14歳 5ヶ月 (1989/06/25生)	外来・
					~	
					50.00mg/日 (1x) 錠・カプセル 内用	→
120	大学B	小児科	適応外使用	ADHD		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				男 14歳 9ヶ月 (1989/03/08生)	外来・
					~	
					50.00mg/日 (1x) 錠・カプセル 内用	→
121	大学B	小児科	適応外使用	ADHD、うつ病		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				男 14歳 9ヶ月 (1989/02/17生)	外来・
					~	
					50.00mg/日 (1x) 錠・カプセル 内用	→

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景	
安全性/有効性 用法・用量/総合コメント					投与量・剤型・投与経路	
122	大学B	小児科	適応外使用	精神遅滞	男 14歳 11ヶ月 (1989/01/02生) 外来・	
	安全性: 有効性: 用法:					男 14歳 11ヶ月 (1989/01/02生) 外来・
	総合:					75.00mg/日 (1x) -- 錠・カプセル 内用
123	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	女 14歳 11ヶ月 (1988/12/17生) 外来・	
	安全性: 有効性: 用法:					女 14歳 11ヶ月 (1988/12/17生) 外来・
	総合:					75.00mg/日 (1x) -- 錠・カプセル 内用
124	大学B	小児科	適応外使用	ADHD	男 15歳 2ヶ月 (1988/10/08生) 外来・	
	安全性: 有効性: 用法:					男 15歳 2ヶ月 (1988/10/08生) 外来・
	総合:					50.00mg/日 (1x) -- 錠・カプセル 内用
125	大学B	小児科	適応外使用	反応性うつ病	女 15歳 5ヶ月 (1988/06/21生) 外来・	
	安全性: 有効性: 用法:					女 15歳 5ヶ月 (1988/06/21生) 外来・
	総合:					25.00mg/日 (1x) -- 錠・カプセル 内用
126	大学B	小児科	適応外使用	社会不安障害	男 15歳 6ヶ月 (1988/06/06生) 外来・	
	安全性: 有効性: 用法:					男 15歳 6ヶ月 (1988/06/06生) 外来・
	総合:					100.00mg/日 (1x) -- 錠・カプセル 内用
127	大学D	神経科	うつ病およびうつ状態			
	安全性: 副作用あり: 概要を記載 胃部不快感, 嘔気 有効性: 有効					女 14歳 8ヶ月 (1989/03/11生) H: 148.0cm W: 54.5kg 入院・継続中
	用法: 総合: 思春期の感情障害にもデプロメールが効果があるかもしれない。					2003/11/25 ~ 75.00mg/日 (2x) 50.00mg -- 75.00mg 錠・カプセル 内用
128	大学D	小児科	強迫性障害 適応外使用として自閉症, 知的障害, 自閉症に関連した強迫性障害を示している。			
	安全性: 特になし 有効性: やや有効					男 14歳 4ヶ月 (1989/08/09生) H: 175.0cm W: 70.0kg 外来・継続中
	用法: 総合: 家族・主治医共に有用性を認識。					2001/02/22 ~ 50.00mg/日 (2x) -- 散 内用
129	大学D	小児科	強迫性障害 適応外使用として自閉症, 知的障害に使用, 自閉症に関連した強迫性障害。			
	安全性: 特になし 有効性: やや有効					男 14歳 9ヶ月 (1989/02/05生) 外来・継続中
	用法: 総合: やや有用である。					2001/08/10 ~ 50.00mg/日 (2x) -- 錠・カプセル, 散 内用
130	大学D	小児科	強迫性障害 適応外として慢性チックに使用, 強迫性障害と慢性チックの合併症。			
	安全性: 特になし 有効性: やや有効					男 14歳 10ヶ月 (1989/01/17生) 外来・継続中
	用法: 総合: やや有用である。					2000/07/13 ~ 50.00mg/日 (2x) -- 錠・カプセル 内用
131	大学D	心療内科	強迫性障害			
	安全性: 特になし 有効性: 有効					女 16歳 7ヶ月 (1987/04/19生) H: 159.7cm W: 45.4kg 外来・継続中
	用法: 150mgでは効果不十分であったため, 200mgまで増量した。 総合: ある考えが繰り返し起こってきてしまっても手につかないで悩んでいた症例であったが, 十分な薬効が得られている。経過観察法である。					2003/07/22 ~ 200.00mg/日 (2x) 100.00mg -- 200.00mg 錠・カプセル 内用
132	大学D	小児科	適応外使用 自閉症を適応症に追加して欲しい。	自閉症, 精神遅滞		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定					男 3歳 8ヶ月 (2000/04/03生) 外来・継続中
	用法: 総合:					2003/07/11 ~ 45.00mg/日 (2x) 15.00mg -- 45.00mg 散 内用