




図B群(併存急性心不全)




図B群(併存DIC)




図B群(併発胃十二指腸潰瘍)




図B群(併発急性腎不全)




図B群(併発DIC)




図B群(手術関連続発症)



図B群(手術)




肝硬変手術




肝切除術

図B群(中心静脈)





中心静脈カテーテル





中心静脈カテーテル



図B群(人工呼吸)





図B群(人工透析)




図B群(リハビリ)




図B群(年齢)




図B群(基本DPC)




図B群(救急車搬送)




図B群(病態)




図B群(Child分類点数)




図B群(手術)




図B群(中心静脈)




図B群(人工呼吸)




図B群(人工透析)




図B群(リハビリ)




図C群(LOS分析)




図C群(LOS分析)




図C群(cALL分析)




図C群(cALL分析)




図C群(cDPC分析)



図C群(cDPC分析)



図C群(dDPC分析)



平成 16 年度厚生科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）
診断群分類を活用した医療サービスのコスト推計に関する調査研究
研究報告書

診断群分類の精緻化（支払い分類簡素化の視点から）

MDC6

『急性膵炎（DPC6 桁分類 060350）』

『慢性膵炎(膵嚢胞含む)（DPC6 桁分類 060360）』

報告者

桑原 一彰 京都大学大学院医学研究科 医療経済学分野 研究協力者

今中 雄一 京都大学大学院医学研究科 医療経済学分野 教授 分担研究者

診断群分類（DPC）の問題点を継続的に分析し、より妥当な評価体制につなげていくことは急務である。臨床分類としての診断群分類を支払い分類として管理可能なものに簡素化しようとする場合、疾患群に投入される資源として何が一番大きな因子（疾患なのか、疾患に投入される治療なのか）なのかを模索することは必要である。今回、DPC6 桁コード『急性膵炎（胆嚢石症など）（DPC6 桁分類 060350）』『慢性膵炎(膵嚢胞含む)（DPC6 桁分類 060360）』を選択し、その分類の妥当性検証を、平成 15 年度 7 月から 10 月にかけて収集されたデータをもとに行った。各医療費関連指標において、処置処置（中心静脈栄養、人工呼吸・透析など）に配慮（別途独立評価）を要することが判明した。また、臨床分類としての診断群分類を保ちながら、支払い分類方法を妥当に簡素化・効率化する観点において、臨床疾患群としての、膵炎各病態の違いは少なく、これら基本 DPC の統合の妥当性に問題はないと思われる。

A.研究背景と目的

平成 15 年度 4 月より特定機能病院において順次支払いに導入された診断群分類（DPC）は、保険医療に精通する臨床専門科集団の意見を参考にしながら、翌 16 年にも見直しが行われ、民間病院の試行的適応されながら今日に至っている。一方、厚生労働省は診断群分類の支払い評価分類としての妥当性検証と、診断群分類の簡素化に関して検討の意向も表示している。そもそも診断群分類には『臨床的分類』としての意味合いと、『支払い評価分類』としての意味を持たせることが可能であ

る。前者は臨床家にとっての日常診療行為としての評価指標にできる可能性があり、後者はたとえ前者の臨床的分類は異なっても、現在の診断群分類が包括対象とする資源投入量の観点から大きな弁別的差異がない場合、臨床分類を統合して支払い評価分類として簡素化する考えにもなるである。

更にこの統合自体が支払い分類としての弁別的妥当性を向上させる可能性を実は秘めている。具体的には、『支払い評価分類』は、分類構成が樹形図という、臨床疾患群、手術、処置、副傷病による層別分岐構造で、結果的に

分岐が進むに従って症例数が少なくなるという構造的特性を有している。資源投入量に大きな影響をもたらす層が、病名としての疾患群などの上層になく、それらに投入される治療などの下層の因子にある場合は、そこで症例数のしほりⁱで細かく配慮できない構造上の問題点を有している。

したがって疾患群（病名）が資源投入に大きな影響を与えない場合には、基本 DPCⁱⁱである最上層の疾患群をただ単に細かくしてしまうと、それらに対する資源投入量・種類は同等なのに、投入量のばらつきに大きな影響をもたらす下層の因子が細かく考慮されない場合もある。端的に言えば、大した影響もないところで分岐させることが、実態に合うのかどうかの検証ともいえる。診断群分類数としての管理可能性の観点からも、分類統合を臨床的妥当性も担保しつつ、統合することは必要と考える。

以上のように、疾患群、手術・処置などを臨床的観点からみると、在院日数や支払いなどにどのようなばらつきをもたらすのか、学会から提案のあった臨床情報、副傷病や年齢などの重症度は分類上の配慮を必要とするのかどうか、さまざまな観点から検証されるべき事項があろう。

今回、医療費関連指標として在院日数（以下 LOS）、診療報酬総点数（cALL）、包括範囲総点数（cDPC）ⁱⁱⁱ、現行の『包括範囲一日点数（dDPC）』を目的変数として、前述の角度からいかなる問題点があるのか、平成 15 年度 7 月から 10 月まで特定機能病院、民間病院で収集されたデータを活用し分析した。そしてそこで問題になった因子に関して、定義テーブル^{iv}や樹形図^vに反映させることで、より妥当な支払い分類としての DPC 分類につなげ

ることが大きな目的である。

研究目的：①定義テーブル上にある、疾患群や手術・処置、年齢の現状分析、②投入される資源の均質性と臨床的妥当性の観点から診断群分類を幾つかの基本 DPC で統合させ、医療費関連指標（LOS,cALL,cDPC,dDPC）を目的変数とし、支払い評価として留意すべき説明因子を探る。その過程で、基本 DPC で統合された支払い分類や学会から提言のあった臨床情報の妥当性を検証すること、③更に副傷病を系統的に整理し、かつ副傷病が上述指標にいかなる影響をもっているのかを検討、④医療の質の評価として、退院時転帰（入院後 24 時間以内死亡を除く死亡退院）に影響をもつリスク因子（年齢なのか、疾患なのか、手術・処置なのか、地域や施設母体なのか）は何かの分析、である。

B.研究方法

対象

平成 15 年度 7 月から 10 月まで特定機能病院から収集した患者情報（臨床情報〈様式 1〉、診療報酬点数情報〈様式 2 他〉）の内、MDC6『急性膵炎（胆嚢石症など）（DPC6 桁分類 060350）』『慢性膵炎（膵嚢胞含む）（DPC6 桁分類 060360）』の入院後 24 時間以内死亡症例を除外した 1600 件〔内退院時死亡患者 20 件〕である。ここで説明因子として分析したものは以下の通りである。

患者属性因子

- ①年齢因子：15 歳未満、15 歳以上 65 歳未満、65 歳以上未満の 3 カテゴリー
- ②性別
- ③施設地域：北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州

④施設母体：国立、公立^{vi}、私立

⑤施設機能：特定機能病院^{vii}、民間病院

⑥救急車搬送の有無(ambulcat)

臨床情報

⑦疾患群^{viii}：ICD10 は病態を明示しているので、ここでは ICD がもつ臨床情報で以下のよう
に整理した。

病態

急性膵炎、アルコール性慢性膵炎、膵嚢胞、
膵疾患他不明、とした。

⑧手術手技^{ix}：

手術手技はデータセット様式 1 の収集で 5 項
目採取しており、これらの情報を以下のよう
に施行手術処置を組み合わせも考慮して整理
した。

外瘻、内瘻、ステント、碎石、胆嚢胆管手術、
膵のう胞手術手術、膵尾部切除、膵頭十二指
腸切除、膵管腸管吻合とした。

⑨処置

血管塞栓術(embol)^x

気管切開(tracheo)^{xi}

インスリン(insul)

中心静脈栄養(ivhdum)

人工呼吸(ventidum)

人工透析(hddum)

リハビリ(rihadum)

以上の有無を分析した。

⑩入院時併存症、入院後併発症（以下 CC^{xii}）：
慢性併存症、急性併存症、急性併発症を
Manitoba-Darthmouth&Charlson

Comobidity Index の（以下 MD 指標）^{xiii} を
活用し、以下のように整理した。

■ 入院時慢性併存症

糖尿病(dcindm)（合併症を有する糖尿
病:dcinsdm^{xiv}、有しないもの:dcinmdm^{xv}）、
痴呆(dcindem)^{xvi}、対麻痺(dcinprp)^{xvii}、慢性
肺疾患(dcinpd)^{xviii}、末梢血管障害(dcinpvd)^{xix}、
腎臓疾患(dcinrd)^{xx}、慢性腎不全(dcinrft)^{xxi}、
自己免疫疾患(dcinctd)^{xxii}、肝障害(dcinld)（慢
性肝障害:dcinmld^{xxiii}、重症肝障
害:dcinsld^{xxiv}）、悪性新生物(dcinmal)^{xxv}

■ 入院時急性併存症

急性心筋梗塞(dcinami)^{xxvi}、脳血管障害
(dcincva)^{xxvii}、胃十二指腸潰瘍(dcinpu)^{xxviii}、
感染症(dcininf)^{xxix}、急性腎不全(dcinarf)^{xxx}、
急性呼吸不全(dcinapf)^{xxxi}、心不全
(dcinahf)^{xxxii}、急性肝不全(dcinalf)^{xxxiii}、
DIC(dcindic)^{xxxiv}

■ 入院後急性併発症

急性心筋梗塞(dccami)、脳血管障害
(dcccva)、胃十二指腸潰瘍(dccpu)、感染症
(dcccinf)、急性腎不全(dccarf)、急性呼吸不全
(dcccapf)、心不全(dccahf)、急性肝不全(dccalf)、
DIC(dccdic)、静脈血栓塞栓、肺梗塞
(dcccvt)^{xxxv}、手術関連続発症(dcccomp)^{xxxvi}に
ついて、様式 1 の入院時併存症（4 つ併記）
入院後併発症（3 つ併記）から該当 ICD10 コ
ードを収集し、有無を検索した。

目的変数として、コストの代替変数の医療費
関連指標（LOS,cALL, cDPC dDPC）を選択
した。また医療の質評価のために、退院時死
亡確率（入院 24 時間以内死亡例を除く）も
目的変数とした。

解析方法：上記目的変数に影響すると思われ
る因子を抽出するために、各説明因子を強制
投入し重回帰分析を行い、偏回帰係数や標準

化係数が大きくかつ統計的に有意なものを検索した。また施設因子（施設地域、設立母体）の投入前後の重回帰分析^{xxxvii}も行い、決定係数の差を調べた。医療の質の評価については、退院時死亡（入院 24 時間以内死亡患者を除く）に関してロジスティック回帰分析を行い、死亡確率に影響するリスク因子（図表D群でオッズ比：凡例・表の中で Exp(B)と表記）を分析した。尚、前記分析の際の対照群は文末脚注で示す。統計処理は SPSS for Win(Ver11.0)を用いた。統計学的有意差を 0.05 とした。

C.結果

年齢は 15 歳未満 35 件(2.2%)、15 歳以上 65 歳未満 1002 件 (62.6%)、65 歳以上 563 件 (35.2%)で、ヒストグラムではほぼ対称な 1 峰性分布であった（図A群）。男性 1070 件 (66.9%)、女性 530 件 (33.1%)、地域は北海道 76 件(4.8%)、東北 125 件(7.8%)、関東 585 件(36.6%)、中部 211 件(13.2%)、近畿 208 件 (13.0%)、中国 154 件 (9.6%)、四国 30 件 (1.9%)、九州 211 件 (13.2%) であった。施設母体は国立 523 件 (32.7%)、公立 270 件 (16.9%)、私立 807 件 (50.4%)、特定機能 1015 件(63.4%)、民間 585 件(36.6%)であった。救急車搬入は 235 件 (14.7%)、退院時死亡は 20 件 (1.3%) であった。病態は、急性膵炎 860 件(53.8%)、アルコール性慢性膵炎 66 件(4.1%)、膵嚢胞 175 件(10.9%)、膵疾患他不明 499 件(31.2%)であった。

入院時併存症では、合併症を有する糖尿病 28 件(1.8%)、合併症のない糖尿病 152 件 (9.5%)、痴呆 8 件 (0.5%)、慢性肺疾患 32 件 (2.0%)、対麻痺 2 件(0.1%)、末梢血管障害 7 件 (0.4%)、腎臓疾患 9 件(0.6%)、慢性

腎不全 33 件 (2.1%)、自己免疫疾患 11 件 (0.7%)、慢性肝障害 77 件 (4.8%)、重症肝障害 29 件 (1.8%) 悪性新生物 79 件(4.9%) であった。

急性併存症では、急性心筋梗塞 7 件(0.4%)、脳血管障害 14 件(0.9%)、胃十二指腸潰瘍 154 件(9.6%)、感染症 0 件(0.0%)、急性腎不全 19 件(1.2%)、急性呼吸不全 11 件(0.7%)、心不全 8 件(0.5%)、急性肝不全 3 件(0.2%)、DIC35 件(2.2%)であった。

入院後急性併発症では、急性心筋梗塞 1 件 (0.1%)、脳血管障害 3 件(0.2%)、胃十二指腸潰瘍 64 件(4.0%)、感染症 0 件(0.0%)、急性腎不全 4 件(0.3%)、急性呼吸不全 5 件(0.3%)、心不全 5 件(0.3%)、急性肝不全 1 件(0.1%)、DIC17 件(1.1%)、静脈血栓塞栓、肺梗塞 2 件 (0.1%)、手術関連続発症 10 件 (0.6%) であった。

手術は、外瘻9件(0.6%)、内瘻26件(1.6%)、ステント 79 件(4.9%)、ステント+内外瘻 12 件(0.8%)、碎石 11 件(0.7%)、胆嚢胆管手術 10 件(0.6%)、膵のう胞手術 28 件(1.8%)、膵尾部切除 18 件(1.1%)、膵頭十二指腸切除 10 件(0.6%)、膵管腸管吻合 24 件(1.5%)であった。気管切開 4 件(0.3%)、血管塞栓術 4 件(0.3%) であった。

施行処置はインスリン 151 件(9.4%)、中心静脈栄養 310 件 (19.4%)、人工呼吸 37 件 (2.3%)、人工透析 45 件 (2.2%)、リハビリは 27 件 (1.7%) であった。

医療費関連指標である LOS,cALL,cDPC, に関して各説明因子ごとの箱ひげ図を見ると、低年齢で低く、救急車搬送や退院時死亡例で高かった。施設地域、母体、機能に関して差はなかった。病態では膵のう胞で民間が低かった。副傷病では特に DIC、手術関連続発症

では顕著であった。

手術に関しては、その手術侵襲の順に、中央値が大きかった。処置は中心静脈など各処置施行群も高かった。

一方 dDPC については、機能で民間が低く、副傷病では DIC 以外では差は見られなかった。手術・処置では人工呼吸・透析の中央値が大きかった。(図 B 群)。

各目的変数の分布は、LOS,cALL,cDPC では右に裾をひく分布、dDPC は対称的な一峰性分布であった (図 B 群)。

LOS,cALL,cDPC の重回帰分析では、決定係数は各々 0.372(施設因子投入後 0.384),0.551(0.556),0.548(0.554)であった (表 C 群)。dDPC では決定係数は 0.378(0.393)であった (表 C 群)。

説明因子のうち、特に標準化係数に関して、大きくかつ有意確率が 0.05 以下のものを順にみると、LOS (施設因子投入による分析) では中心静脈栄養 (標準化係数 0.368)、リハビリ (標準化係数 0.170) であった。cALL では中心静脈栄養 (標準化係数 0.299)、人工呼吸 (標準化係数 0.247)、人工透析 (標準化係数 0.159)、cDPC も中心静脈栄養 (標準化係数 0.321)、人工呼吸 (標準化係数 0.233)、人工透析 (標準化係数 0.160)、dDPC では人工呼吸 (標準化係数 0.369)、人工透析 (標準化係数 0.136) であった (図 C 群)。副傷病で DIC 以外大きな影響をもつ疾患はなかった。

死亡退院のリスク因子分析では上述モデルでは、人工呼吸 20677.31 [95%信頼区間: 148.12-2883699.9]、併発 DIC 1109.7 [95%信頼区間: 7.43-165712.16] であった (Hosmer-Lemeshow 適合度検定, 有意確率: 0.856) であった。

D. 考察

診断群分類 (手術、処置、副傷病名、重症度) の臨床的妥当性を LOS,cALL,cDPC,dDPC から分析し、支払い分類として継続的に精緻化または簡素化していく作業は必要と思われる。現行の一日定額支払いのもとでは、各説明因子の決定係数は、一件当たり包括額など他の 3 つの医療費関連指標に比較し小さかった。しかしどの評価指標にしる、影響する因子を同定し、これらが妥当に評価されるべきであるのは急務である。

今回、特に『急性膵炎 (胆嚢石症など) (DPC6 桁分類 060350)』『慢性膵炎 (膵嚢胞含む) (DPC6 桁分類 060360)』の診断群分類において、中心静脈栄養、人工呼吸・透析は他の因子に比較し、大きく支払いに影響している。つまり包括範囲に該当する処置において、出来高評価となった診療行為 (ここでは放射線療法、リハビリ) と等しく同じに扱うべきでなく、また前記 3 処置もどれか一つでも出現した場合、『有無評価』だけでいいかという問題を昨年度に引き続き提起している。

また今回、基本 DPC を膵炎病態の観点で統合し、臨床疾患群での差異を比較検討したが、それらの影響は少なかった。前述したとおり、手術はともかく処置を細かく配慮するためには樹形図の構造的特性上、上層で数の集積 (つまり基本 DPC の統合) が必須であり、今回の分析対象での統合の妥当性に問題はないと考えられる。

E. 結論

DPC 分類の精緻化の試みを、MDC6『急性膵炎 (胆嚢石症など) (DPC6 桁分類 060350)』『慢性膵炎 (膵嚢胞含む) (DPC6 桁分類