

慶應義塾大学形成外科：No. 7 既往歴：なし

患者：S. M.	性別：女	年齢 1 歳	開始 02/12/26	適用 1 回	終了 03/01/24
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
7	無	/	7 4 点	A	有用である

適用までの処置：キュレタージュ母斑切除後直ちに適用

合併症：なし

部位：背面

適応創傷面積：20.0 cm x 15.0 cm

色素性母斑切除創の上皮下

慶應義塾大学形成外科：No. 8 既往歴：なし

患者：T. W.	性別：男	年齢 1 1 歳	開始 03/01/23	適用 2 回	終了 03/02/20
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
7	無	/	7 1 点	A	有用である

適用までの処置：母斑切除後直ちに適用

合併症：なし

部位：左膝前面

適応創傷面積：17.5 cm x 15.0 cm

色素性母斑切除創の移植床形成

植皮 03/02/06 観察終了 03/02/20

聖マリアンナ医科大学形成外科：No.1 既往歴：なし

患者：S.T.	性別：男	年齢 3 8 歳	開始 01/05/10	適用 2 回	終了 01/05/23
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	7 4 点	A	有用である

適用までの処置：内服（クラビット、ロキソニン、ダーゼン）

合併症：無し

部位：右踵部

適応創傷面積：4.5 cm x 3.7 cm

難治性皮膚潰瘍の移植床形成目的

植皮 01/05/23

聖マリアンナ医科大学形成外科：No.2 既往歴：なし

患者：F.H.	性別：男	年齢 2 5 歳	開始 01/08/08	適用 1 回	終了 01/08/16
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
8	中程度	01/08/16	3 9 点	D	-----

適用までの処置：手術中に即時適用

合併症：無し

部位：右下腿前面

適応創傷面積：10.0 cm x 10.0 cm

癬痕切除創の移植床形成目的

中止理由：培養真皮適用部位に血腫形成

2 週間以内の中止のため正確な評価はできない

-----（参考症例）

聖マリアンナ医科大学形成外科：No.3 既往歴：なし

患者：H.W.	性別：女	年齢 2 5 歳	開始 01/08/13	適用 5 回	終了 01/08/27
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
6	無	/	6 1 点	A	有用である

適用までの処置：同種培養表皮移植

合併症：なし

部位：左上腕外側面

適応創傷面積：4.0 cm x 3.0 cm

刺青切除創（移植床形成目的）

植皮 01/08/27 観察終了 02/01/11

聖マリアンナ医科大学形成外科：No. 4 既往歴：慢性関節リウマチ

患者：S. S.	性別：女	年齢 7 5 歳	開始 01/08/13	適用 2 0 回	終了 01/10/31
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	6 1 点	A	有用である

適用までの処置：デブリードマン、全層植皮

合併症：なし

部位：右踵部／右足親指

適応創傷面積：3.0 cm x 2.0 cm

難治性皮膚潰瘍の上皮化

2.0 cm x 2.0 cm

聖マリアンナ医科大学形成外科：No. 5 既往歴：なし

患者：M. Y.	性別：男	年齢 6 歳	開始 01/10/04	適用 1 回	終了 01/10/10
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
7	無	/	7 8 点	A	有用である

適用までの処置：切除後即時同種培養真皮を適用

合併症：なし

部位：左下腿後面

適応創傷面積：5.0 cm x 5.0 cm

色素性母斑切除創

聖マリアンナ医科大学形成外科：No. 6 既往歴：なし

患者：S. K.	性別：男	年齢 1 歳	開始 01/11/30	適用 2 回	終了 01/12/08
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
6	無	/	8 3 点	A	極めて有用

適用までの処置：採皮直後同種培養真皮を適用

合併症：なし

部位：頭

適応創傷面積：4.5 cm x 6.0 cm

採皮創（厚さ 0.4 mm）

聖マリアンナ医科大学形成外科：No.7 既往歴：狭心症

患者：W.M.	性別：男	年齢 8 4 歳	開始 01/12/05	適用 6 回	終了 01/12/28
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	70点	A	有用である

適用までの処置：ゲンタシン軟膏塗布

合併症：なし

部位：右手首

適応創傷面積：2.5 cm x 2.5 cm

難治性皮膚潰瘍の肉芽組織形成と上皮化による創閉鎖

聖マリアンナ医科大学形成外科：No.8 既往歴：なし

患者：I.A.	性別：男	年齢 1 歳	開始 01/12/17	適用 2 回	終了 01/12/26
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	83点	A	極めて有用

適用までの処置：ソフラチュールガーゼ、ゲンタシン軟膏、ガーゼ被覆

合併症：なし

部位：右手首内面

適応創傷面積：2.5 cm x 2.5 cm

深達性2度熱傷の上皮化

聖マリアンナ医科大学形成外科：No.9 既往歴：パーキンソン病、糖尿病

患者：S.T.	性別：男	年齢 6 1 歳	開始 02/01/07	適用 1 0 回	終了 02/02/18
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	70点	A	有用である

適用までの処置：ゲンタシン軟膏塗布

合併症：なし

部位：右足（くるぶし）

適応創傷面積：5.0 cm x 5.0 cm

難治性皮膚潰瘍の肉芽組織形成と上皮化

聖マリアンナ医科大学形成外科：No.10 既往歴：糖尿病

患者：？	性別：男	年齢36歳	開始02/01/09	適用6回	終了02/02/13
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	70点	A	有用である

適用までの処置：ソフラチュール

合併症：糖尿病

部位：左下腿後面

適応創傷面積：5.0 cm x 4.0 cm

難治性皮膚潰瘍の肉芽組織形成と上皮化

聖マリアンナ医科大学形成外科：No.11 既往歴：なし

患者：K.N.	性別：男	年齢33歳	開始02/02/01	適用2回	終了02/02/15
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
6	無	/	70点	A	有用である

適用までの処置：手術後即時同種培養真皮適用

合併症：なし

部位：背部

適応創傷面積：10.0 cm x 25.0 cm

刺青切除創の上皮化

聖マリアンナ医科大学形成外科：No.12 既往歴：なし

患者：T.T.	性別：男	年齢50歳	開始02/04/24	適用4回	終了02/05/22
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	82点	A	極めて有用

適用までの処置：ゲンタシン軟膏

合併症：なし

部位：顔面

適応創傷面積：9.0 cm x 6.0 cm

深達性2度熱傷の上皮化

聖マリアンナ医科大学形成外科：No. 1 3 既往歴：脳梗塞

患者：T. N.	性別：男	年齢 6 1 歳	開始 02/05/28	適用 2 回	終了 02/06/04
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	9 2 点	A	極めて有用

適用までの処置：アダプティック塗布

合併症：なし

部位：左前腕／手背

適応創傷面積：10.0 cm x 22.0 cm

深達性 2 度熱傷の上皮化

聖マリアンナ医科大学形成外科：No. 1 4 既往歴：C 型肝炎

患者：K. T.	性別：男	年齢 6 1 歳	開始 02/06/08	適用 3 回	終了 02/06/18
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	02/06/18	5 2 点	D	有用でない

適用までの処置：

合併症：C 型肝炎、気道熱傷

部位：右下腿前面

適応創傷面積：9.0 cm x 18.0 cm

デブリードマンせず適用／2 週間以内の中止のため正確な評価できず。

-----プロトコールに従い（参考症例）

聖マリアンナ医科大学形成外科：No. 1 5 既往歴：なし

患者：Y. S.	性別：女	年齢 2 6 歳	開始 02/06/12	適用 3 回	終了 02/06/25
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
2	無	/	7 1 点	A	有用である

適用までの処置：ソフラチュール、ゲーベンクリーム

合併症：なし

部位：額

適応創傷面積：10.0 cm x 10.0 cm

3 度熱傷壊死組織切除創の移植床形成目的 植皮 02/06/25

聖マリアンナ医科大学形成外科：No.16 既往歴：なし

患者：S.T.	性別：女	年齢 1歳	開始 02/06/13	適用 2回	終了 02/06/19
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	83点	A	極めて有用

適用までの処置：ゲンタシン軟膏

合併症：なし

部位：右側胸部

適応創傷面積：5.0 cm x 10.0 cm

深達性2度熱傷の表皮化

聖マリアンナ医科大学形成外科：No.17 既往歴：なし

患者：S.T.	性別：女	年齢 1歳	開始 02/06/13	適用 2回	終了 02/06/19
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	02/06/19	91点	A	-----

適用までの処置：ゲンタシン軟膏

合併症：なし

部位：右大腿

適応創傷面積：9.0 cm x 15.0 cm

一部過剰肉芽形成となり、除去した方が上皮化が早いと判断し、中止とする。

2週間以内の中止のため正確な評価できず。

-----プロトコールに従い（参考症例）

聖マリアンナ医科大学形成外科：No.18 既往歴：なし

患者：S.T.	性別：女	年齢 1歳	開始 02/06/13	適用 2回	終了 02/06/19
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	83点	A	極めて有用

適用までの処置：ゲンタシン軟膏

合併症：なし

部位：左大腿

適応創傷面積：4.0 cm x 12.0 cm

深達性2度熱傷の表皮化

聖マリアンナ医科大学形成外科：No. 19 既往歴：なし

患者：N.T.	性別：男	年齢 38歳	開始 02/07/11	適用 3回	終了 02/07/27
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
3	無	/	84点	A	極めて有用

適用までの処置：術後、即使用

合併症：なし

部位：左臀部

適応創傷面積：35.0 cm x 24.06 cm

6倍自家メッシュグラフトの被覆

聖マリアンナ医科大学形成外科：No. 20 既往歴：なし

患者：T.I.	性別：男	年齢 29歳	開始 02/09/05	適用 5回	終了 02/09/30
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	88点	A	極めて有用

適用までの処置：ゲンタシン軟膏

合併症：なし

部位：左手背

適応創傷面積：8.0 cm x 8.0 cm

進達性2度熱傷の上皮化

聖マリアンナ医科大学形成外科：No. 21 既往歴：アルコール中毒

患者：	性別：女	年齢 54歳	開始 03/12/11	適用 3回	終了 03/12/20
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1,2	無	/	84点	A	極めて有用

適用までの処置：ソフラチュール、ゲンタシン軟膏

合併症：なし

部位：左肩、左腕

適応創傷面積：22 cm x 15 cm

観察終了：04/02/18



聖マリアンナ医科大学形成外科：No. 2 2 既往歴：なし

患者：K.Y.	性別：女	年齢 2 8 歳	開始 04/11/04	適用 4 回	終了 04/06/01
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
2	無	/	9 2 点	A	極めて有用

適用までの処置：

合併症：なし

部位：右ふくらはぎ

適応創傷面積：8.0 cm x 7.5 cm

植皮：04/06/08 観察終了：04/09/21

聖マリアンナ医科大学形成外科：No. 2 3 既往歴：糖尿病

患者：R.N.	性別：女	年齢 7 1 歳	開始 04/11/16	適用 2 回	終了 04/11/24
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	9 2 点	A	極めて有用

適用までの処置：ゲーベンクリーム塗布

合併症：糖尿病

部位：右足先切断面

適応創傷面積：10 cm x 9 cm

観察終了：04/02/18

横浜市立大学形成外科：No. 1 既往歴：慢性腎不全で透析中

患者：M. M.	性別：女	年齢 61歳	開始 01/08/23	適用 6回	終了 01/09/21
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	88点	A	極めて有用

適用までの処置：ユーパスタ

合併症：なし

部位：左足首後面

適応創傷面積：4.3 cm x 2.3 cm

難治性皮膚潰瘍

横浜市立大学形成外科：No. 2 既往歴：慢性関節リウマチ

患者：N. S.	性別：女	年齢 61歳	開始 01/08/27	適用 3回	終了 01/10/23
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	96点	A	極めて有用

適用までの処置：アクトシン軟膏、ゲンタマイシン軟膏

合併症：なし

部位：右下腿前面

適応創傷面積：5.5 cm x 5.0 cm

難治性皮膚潰瘍

横浜市立大学形成外科：No. 3 既往歴：糖尿病、両下肢静脈血栓症

患者：S. T.	性別：男	年齢 70歳	開始 01/10/12	適用 12回	終了 01/12/21
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	感染徴候	01/12/28	62点	B	有用である

適用までの処置：プロスタグランディン軟膏、ゲンタマイシン軟膏

合併症：なし

部位：左下腿前面

適応創傷面積：9.0 cm x 4.5 cm

難治性皮膚潰瘍

横浜市立大学形成外科：No. 4 既往歴：糖尿病（インスリン使用中）

患者：M. K.	性別：女	年齢 7 2 歳	開始 01/11/14	適用 9 回	終了 02/01/11
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	9 6 点	A	極めて有用

適用までの処置：イソジンゲル

合併症：なし

部位：背部

適応創傷面積：8.0 cm x 4.0 cm

難治性皮膚潰瘍

横浜市立大学形成外科：No. 5 既往歴：なし

患者：Y. H.	性別：女	年齢 8 2 歳	開始 01/11/30	適用 6 回	終了 02/01/09
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	8 8 点	A	極めて有用

適用までの処置：プロスタグランディン軟膏、ゲンタシン軟膏

合併症：なし

部位：頭部

適応創傷面積：8.0 cm x 5.0 cm 7.0 cm x 3.5 cm

難治性皮膚潰瘍（移植床形成目的） 植皮 02/01/09 観察終了 02/03/02

横浜市立大学形成外科：No. 6 既往歴：糖尿病、高血圧

患者：S. T.	性別：男	年齢 6 0 歳	開始 01/12/18	適用 2 回	終了 01/12/28
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
2	無	/	9 6 点	A	極めて有用

適用までの処置：ゲーバンクリーム、ゲンタシン軟膏

合併症：なし

部位：左足甲面／内側面

適応創傷面積：10.0 cm x 10.0 cm

3 度熱傷壊死組織切除創（移植床形成目的） 植皮 01/12/28

横浜市立大学形成外科：No.7 既往歴：肺気腫、多発性脳梗塞、老人性痴呆

患者：S. T.	性別：男	年齢 79歳	開始 02/04/24	適用 7回	終了 02/05/17
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	90点	A	極めて有用

適用までの処置：アクトシン軟膏、フィブラストスプレー

合併症：なし

部位：左大転子部

適応創傷面積：11.0cm x 15.0 cm

手術創離解

植皮 02/05/17 観察終了 02/05/31

横浜市立大学形成外科：No.8 既往歴：抑うつ状態

患者：S. H.	性別：女	年齢 67歳	開始 02/09/10	適用 6回	終了 02/10/07
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
2	無	/	100点	A	極めて有用

適用までの処置：

合併症：なし

部位：左手背

適応創傷面積：9.0 cm x 4.0 cm

3度熱傷壊死組織切除創の移植床形成目的 植皮 02/09/30 観察終了 02/10/07

横浜市立大学形成外科：No.9 既往歴：糖尿病、高血圧症、ASO

患者：C. S.	性別：男	年齢 71歳	開始 02/10/21	適用 5回	終了 02/11/06
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	83点	A	極めて有用

適用までの処置：ソフラチュール、アクトシン軟膏

合併症：

部位：左下肢

適応創傷面積：10 cm x 4 cm、8 cm x 3 cm、4.5 cm x 3 cm

難治性皮膚潰瘍の移植床形成目的 植皮 02/11/11 観察終了 02/11/19

横浜市立大学形成外科：No.10 既往歴：悪性関節リウマチ、高脂血症

患者：F.K.	性別：女	年齢71歳	開始02/12/07	適用7回	終了02/12/31
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	100点	A	極めて有用

適用までの処置：

合併症：悪性関節リウマチ

部位：左下肢

適応創傷面積：8.0 cm x 4.5 cm

難治性皮膚潰瘍の移植床形成目的

現疾患の状態により移植不可

横浜市立大学形成外科：No.11 既往歴：心肥大

患者：T.I.	性別：女	年齢80歳	開始02/12/17	適用6回	終了03/01/07
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	62点	A	有用である

適用までの処置：約2年間アクトシン軟膏

合併症：下肢静脈瘤

部位：左下肢

適応創傷面積：2.5 cm x 2.5 cm

難治性皮膚潰瘍の創閉鎖

横浜市立大学形成外科：No.12 既往歴：肝硬変、アルコール依存症

患者：H.K.	性別：男	年齢59歳	開始03/02/23	適用5回	終了03/03/10
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	83点	A	極めて有用

適用までの処置：クロマイP軟膏+アクトシン、ソフラチュール、乾ガーゼ、  
生食ガーゼ

合併症：肝硬変、アルコール依存症

部位：右手

適応創傷面積：4.6 cm x 1.8 cm

観察終了：04/03/14

横浜市立大学形成外科：No.13 既往歴：顔面、前胸部熱傷、アルコール依存症、両方下腿静脈瘤

患者：T.R.	性別：男	年齢57歳	開始03/03/10	適用16回	終了03/05/27
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	100点	A	極めて有用

適用までの処置：チアミトール消毒、リンデロンVG軟膏、ソフラチュール

合併症：両方下腿静脈瘤

部位：左ひざ下

適応創傷面積：21 cm x 9 cm

横浜市立大学形成外科：No.14 既往歴：高IgE血症

患者：K.T.	性別：男	年齢23歳	開始03/12/10	適用13回	終了04/02/23
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	有	/	100点	A	極めて有用

適用までの処置：フィブラスト、ガデックス軟膏

合併症：高IgE血症

部位：左太大腿

適応創傷面積：3.5 cm x 4.0 cm

観察終了：04/03/30

横浜市立大学形成外科：No.15 既往歴：脊髄カリエス、下半身マヒ

患者：H.A.	性別：男	年齢57歳	開始03/12/19	適用3回	終了03/12/30
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	有	04/01/05	96点	A	極めて有用

適用までの処置：2回の分層植皮術

合併症：脊髄カリエス、下半身マヒ、十二指腸潰瘍

部位：右足つけね外側

適応創傷面積：9.2 cm x 8.9 cm

観察終了：04/03/30

横浜市立大学形成外科：No.16 既往歴：なし

患者：G.G.	性別：男	年齢28歳	開始04/01/06	適用4回	終了04/01/21
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	100点	A	極めて有用

適用までの処置：消毒

合併症：

部位：左足かかと

適応創傷面積：5.5 cm x 2.0 cm

観察終了：04/03/30

横浜市立大学形成外科：No.17 既往歴：子宮筋腫、高血圧症

患者：K.T.	性別：女	年齢62歳	開始04/01/10	適用3回	終了04/01/21
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	98点	A	極めて有用

適用までの処置：消毒、アクトシン軟膏、プロスタンディン軟膏、イソジンゲル等

合併症：両下肢リンパ浮腫

部位：左下肢

適応創傷面積：4.3 cm x 2.2 cm

観察終了：04/03/30

横浜市立大学皮膚科：No. 1 既往歴：骨髄移植

患者：K. M.	性別：女	年齢 20 歳	開始 01/08/24	適用 10 回	終了 01/09/25
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	78 点	A	有用である

適用までの処置：ヒビデン消毒、bFGF スプレー、アクアセル

合併症：GVHD

部位：左肘後面

適応創傷面積：5.7 cm x 2.0 cm

難治性皮膚潰瘍の創閉鎖

横浜市立大学皮膚科：No. 2 既往歴：慢性関節リウマチ、糖尿病

患者：M. A.	性別：女	年齢 77 歳	開始 01/08/30	適用 11 回	終了 01/10/05
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	61 点	A	有用である

適用までの処置：プレドニン、bFGF スプレー、アクアセル

合併症：慢性関節リウマチ、rheumatoid vasculitis、糖尿病

部位：左下腿前面

適応創傷面積：1.4 cm x 1.05 cm

難治性皮膚潰瘍の創閉鎖

横浜市立大学皮膚科：No. 3 既往歴：くも膜下出血

患者：M. N.	性別：男	年齢 70 歳	開始 01/09/06	適用 12 回	終了 01/10/16
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	78 点	A	有用である

適用までの処置：イソジン消毒、bFGF スプレー、アクアセル

合併症：左肩麻痺

部位：左踵

適応創傷面積：2.7 cm x 3.4 cm

難治性皮膚潰瘍の創閉鎖



横浜市立大学皮膚科：No. 4 既往歴：高血圧

患者：I. S.	性別：男	年齢 57 歳	開始 01/11/27	適用 3 回	終了 01/12/04
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	感染	01/12/04	65 点	C	普通

適用までの処置：イソジン消毒、生食洗浄、プロスタンディン軟膏

合併症：右下腿蜂窩織炎

部位：右下腿前面

適応創傷面積：7.0 cm x 2.0 cm

難治性皮膚潰瘍

適用 2 週間以内の中止のため正確な評価はできない

----- (参考症例)

横浜市立大学皮膚科：No. 5 既往歴：深部静脈塞栓症、下腿静脈瘤

患者：I. T.	性別：女	年齢 73 歳	開始 02/01/18	適用 6 回	終了 02/02/04
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	02/02/04	86 点	A	極めて有用

適用までの処置：酸性水消毒、デブリ、bFGF スプレー、アクアセル

合併症：関節リウマチ、深部静脈血栓症、下腿静脈瘤

部位：右足首内側面

適応創傷面積：10.5 cm x 7.3 cm

難治性皮膚潰瘍

中止理由：静脈弁不全のため弁置換手術により中止

横浜市立大学皮膚科：No. 6 既往歴：Werner 症候群

患者：F. S.	性別：女	年齢 50 歳	開始 02/02/04	適用 9 回	終了 02/03/06
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	感染	02/03/06	61 点	B	有用である

適用までの処置：イソジン消毒、イソジンゲル、bFGF スプレー、アクアセル

合併症：Werner 症候群

部位：左足甲面／内側面

適応創傷面積：7.0 cm x 2.0 cm

難治性皮膚潰瘍

横浜市立大学皮膚科：No.7

既往歴：慢性関節リウマチ

患者：M. M.	性別：女	年齢63歳	開始02/11/12	適用10回	終了02/12/03
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	78点	A	有用である

適用までの処置：フィブラストスプレー、アクアセル、アクトシン軟膏  
リプル点滴静注

合併症：なし

部位：両下腿前面

適応創傷面積：8.2 cm x 6.0 cm

難治性皮膚潰瘍の総面積の減少

北里大学形成外科：No. 1

既往歴：悪性リウマチ

患者：R. Y.	性別：男	年齢 60 歳	開始 01/05/22	適用 20 回	終了 01/07/31
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	75 点	A	有用である

適用までの処置：人工真皮／イソジンゲル／PG 軟膏

合併症：ステロイド内服 15mg/日

部位：右下腿前面

適応創傷面積：6.5 cm x 5.5 cm

血管炎による難治性潰瘍

植皮 01/08/02 最終観察 01/10/26

北里大学形成外科：No. 2

既往歴：なし

患者：A. K.	性別：女	年齢 22 歳	開始 01/08/08	適用 5 回	終了 01/09/04
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
7	無	/	88 点	A	極めて有用

適用までの処置：なし

合併症：なし

部位：背部

適応創傷面積：30.0 cm x 20.0 cm

色素性母斑切除後に移植床再建 植皮 01/09/05 (3 倍メッシュ) 最終観察 01/12/07

北里大学形成外科：No. 3

既往歴：アジソン病

患者：K. G.	性別：女	年齢 54 歳	開始 02/03/26	適用 6 回	終了 02/04/12
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	88 点	A	極めて有用

適用までの処置：ポリミキシンB軟膏

合併症：ステロイド内服 15mg/日

部位：右下腿

適応創傷面積：18.0 cm x 10.0 cm

受傷 32 日目の DDB

植皮：なし 最終観察 02/08/23

北里大学形成外科：No. 4

既往歴：なし

患者：T.M.	性別：男	年齢 5 1 歳	開始 02/07/26	適用 3 回	終了 02/08/02
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	9 6 点	A	極めて有用

適用までの処置：ゲーベンクリーム

合併症：なし

部位：右前腕

適応創傷面積：25.0 cm x 10.0 cm

DDBの早期創閉鎖目的に使用

植皮：なし 最終観察 02/08/23

北里大学形成外科：No. 5

既往歴：なし

患者：T.M.	性別：男	年齢 5 1 歳	開始 02/07/26	適用 2 回	終了 02/08/02
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	1 0 0 点	A	極めて有用

適用までの処置：ゲーベンクリーム

合併症：なし

部位：

適応創傷面積：9.0 cm x 6.0 cm

受傷 9 日目のDDB

植皮：なし 最終観察 02/08/06

北里大学形成外科：No. 6

既往歴：なし

患者：H.T.	性別：女	年齢 6 6 歳	開始 03/01/30	適用 7 回	終了 03/03/06
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	9 8 点	A	極めて有用

適用までの処置：オルセノン軟膏

合併症：SLE、慢性関節リウマチ

部位：左足首

適応創傷面積：5.0 cm x 4.0 cm

難治性皮膚潰瘍の創閉鎖