

大阪医科大学形成外科：No. 4 既往歴：なし

患者：K. H.	性別：男	年齢 17 歳	開始 02/06/11	適用 2 回	終了 02/06/20
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
2	無	/	90 点	A	極めて有用

適用までの処置：軟膏療法（イソジンゲル エキザルベ）

合併症：なし

部位：右大腿内側

適応創傷面積：10.0 cm x 20.0 cm

Ⅲ度熱傷壊死組織切除後移植床形成 植皮 02/06/20 最終観察 02/07/08

大阪医科大学形成外科：No. 5 既往歴：てんかん

患者：S. F.	性別：男	年齢 23 歳	開始 02/07/04	適用 4 回	終了 02/07/22
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
2	無	/	75 点	A	有用である

適用までの処置：軟膏療法（イソジンゲル）

合併症：なし

部位：右内頬

適応創傷面積：10.0 cm x 6.0 cm

Ⅲ度熱傷壊死組織切除後移植床形成 植皮 02/07/22 最終観察 02/07/29

大阪医科大学形成外科：No. 6 既往歴：なし

患者：Y. T.	性別：男	年齢 16 歳	開始 02/07/29	適用 3 回	終了 02/08/06
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
8	無	/	69 点	A	有用である

適用までの処置：なし

合併症：なし

部位：右大腿外側

適応創傷面積：23.0 cm x 5.0 cm

右側腹部

21.0 cm x 7.0 cm

Ⅲ度熱傷壊死組織切除後移植床形成目的 植皮 02/08/06 最終観察 02/08/20

大阪医科大学形成外科：No. 7 既往歴：なし

患者：N. I.	性別：男	年齢 50 歳	開始 02/10/08	適用 12 回	終了 02/11/18
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	78 点	B	有用である

適用までの処置：イソジンゲル、エキザルベ

合併症：なし

部位：両足首

適応創傷面積：8.0 cm x 5.0 cm (右)

10.0 cm x 4.0 cm (左)

難治性皮膚潰瘍の移植床形成

植皮 02/11/12 (右) 最終観察 02/11/18

植皮 02/11/18 (左)

大阪医科大学形成外科：No. 8 既往歴：なし

患者：Y. M.	性別：女	年齢 61 歳	開始 02/10/23	適用 2 回	終了 02/11/27
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
2	無	/	90 点	A	極めて有用

適用までの処置：アズノール軟膏

合併症：なし

部位：両大腿部前面

適応創傷面積：10.0 cm x 6.5 cm (右)

14.0 cm x 5.0 cm (左)

Ⅲ度熱傷壊死組織切除後移植床形成

植皮 02/11/05 最終観察 02/11/27

大阪医科大学形成外科：No. 9 既往歴：白内障、膝関節症

患者：M. M.	性別：女	年齢 57 歳	開始 02/10/25	適用 10 回	終了 02/12/06
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	81 点	A	極めて有用

適用までの処置：プロスタディン軟膏

合併症：糖尿病、慢性関節リウマチ

部位：右下肢内側

適応創傷面積：3.5 cm x 2.0 cm 1.5 cm x 0.8 cm

難治性皮膚潰瘍の移植床形成

植皮 02/12/11 最終観察 02/12/26

大阪医科大学形成外科：No. 1 0 既往歴：脊髄損傷

患者：Y.T.	性別：男	年齢 5 5 歳	開始 02/10/05	適用 1 0 回	終了 02/11/15
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	8 6 点	A	極めて有用

適用までの処置：ヨードホルムガーゼ

合併症：なし

部位：仙骨部

適応創傷面積：8.0 cm x 8.0 cm

難治性皮膚潰瘍の移植床形成

植皮 02/11/26 最終観察 03/02/11

大阪医科大学形成外科：No. 1 1 既往歴：SLE

患者：A.T.	性別：男	年齢 7 0 歳	開始 02/11/13	適用 1 9 回	終了 03/01/29
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
6	無	/	9 6 点	A	極めて有用

適用までの処置：プロメライン軟膏 イソジンゲル軟膏

合併症：アルコール性肝障害 ネフローゼ症候群

部位：左前腕

適応創傷面積：10.0 cm x 17.5 cm

外傷性皮膚欠損創

最終観察 03/02/28

大阪医科大学形成外科：No. 1 2 既往歴：なし

患者：N.K.	性別：女	年齢 6 7 歳	開始 02/12/25	適用 9 回	終了 03/02/10
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
6	無	/	8 0 点	A	極めて有用

適用までの処置：アズノール軟膏

合併症：なし

部位：左下腿部前面

適応創傷面積：6.0 cm x 3.5 cm (右)

外傷性皮膚欠損創

植皮 03/2/18 最終観察 03/03/04

大阪医科大学形成外科：No.13 既往歴：なし

患者：A.I.	性別：女	年齢 1歳	開始 03/01/16	適用 5回	終了 03/02/15
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1(4)	無	/	100点	A	極めて有用

適用までの処置：アズノール軟膏

合併症：なし

部位：背部

適応創傷面積：26 cm x 16cm (背部)

右上肢

20 cm x 7cm (右上肢)

深達性Ⅱ度熱傷 (右上肢)

最終観察 03/03/26

分層自家パッチグラフトの被覆保護 (背部)

大阪医科大学形成外科：No.14 既往歴：なし

患者：Y.I.	性別：男	年齢 21歳	開始 03/01/30	適用 3回	終了 03/02/18
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
8	無	/	90点	A	極めて有用

適用までの処置：なし

合併症：なし

部位：前胸部

適応創傷面積：22.0 cm x 23.0 cm

癬痕切除創の移植床形成

植皮 03/02/18 最終観察 03/03/10

大阪医科大学形成外科：No.15 既往歴：なし

患者：T.M.	性別：女	年齢 16歳	開始 03/03/13	適用 3回	終了 03/03/26
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
8	無	/	88点	A	極めて有用

適用までの処置：

合併症：

部位：右大腿部

適応創傷面積：8.0 cm x 5.5 cm

観察終了：04/0315

大阪医科大学形成外科：No. 1 6 既往歴：なし

患者：T.M.	性別：女	年齢 1 6 歳	開始 03/03/13	適用 3 回	終了 03/03/26
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
8	無	/	9 0 点	A	極めて有用

適用までの処置：

合併症：

部位：左大腿部

適応創傷面積：8 cm x 12.5 cm

観察終了：04/03/15

大阪医科大学形成外科：No. 1 7 既往歴：糖尿病

患者：N.H.	性別：女	年齢 4 4 歳	開始 03/08/07	適用 1 2 回	終了 03/09/17
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	8 1 点	A	極めて有用

適用までの処置：プロスタンディン軟膏、フィブラストスプレー

合併症：腎移植術後ステロイド 5mg 免疫抑制剤内服中

部位：右足すね

適応創傷面積：2.8 cm x 2.0 cm

観察終了：04/03/16

大阪医科大学形成外科：No. 1 8 既往歴：右下腿難治性潰瘍

患者：M.M.	性別：女	年齢 5 8 歳	開始 03/09/29	適用 1 2 回	終了 03/11/06
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	8 8 点	A	極めて有用

適用までの処置：イソジンゲル

合併症：糖尿病、慢性関節リウマチ

部位：右足すね

適応創傷面積：3.7 cm x 2.0 cm

観察終了：04/03/16

大阪医科大学形成外科：No.19 既往歴：なし

患者：N.T.	性別：女	年齢18歳	開始04/05/13	適用3回	終了04/05/21
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
2	無	/	75点	A	有用である

適用までの処置：マスク消毒、エキザルベ塗布

合併症：

部位：右下腿

適応創傷面積：10 cm x 30 cm

植皮：040521 観察終了：04/08/25

大阪医科大学形成外科：No.20 既往歴：なし

患者：N.T.	性別：女	年齢18歳	開始04/05/13	適用3回	終了04/05/22
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
2	無	/	81点	A	極めて有用

適用までの処置：マスク消毒、エキザルベ塗布

合併症：

部位：左足首

適応創傷面積：10 cm x 30 cm

植皮：040521 観察終了：04/08/25

大阪医科大学形成外科：No.21 既往歴：なし

患者：O.K	性別：男	年齢66歳	開始04/09/28	適用2回	終了04/10/12
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
8	無	/	80点	A	極めて有用

適用までの処置：全層植皮済み

合併症：

部位：背側：太もも下①

適応創傷面積：① 10 cm x 15 cm

ひざ直上②

② 5 cm x 20 cm

ひざ直下③

③ 5 cm x 20 cm

観察終了：04/11/29

川崎医科大学形成外科：No. 1 既往歴：なし

患者：D. K.	性別：男	年齢 5歳	開始 01/09/06	適用 5回	終了 01/10/01
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1、(2)	無	/	88点	A	極めて有用

適用までの処置：ソフラチュール、ポリミキシンB軟膏

合併症：なし

部位：左上肢

適応創傷面積：10.0 cm x 32.0 cm

2度～3度熱傷混在、3度熱傷壊死組織切除創 植皮 01/10/01 観察終了 02/01/11

川崎医科大学形成外科：No. 2 既往歴：なし

患者：D. K.	性別：男	年齢 5歳	開始 01/09/11	適用 5回	終了 01/10/01
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	中程度	01/10/01	75点	B	有用である

適用までの処置：ソフラチュール、ポリミキシンB軟膏

合併症：なし

部位：前胸部

適応創傷面積：18.0 cm x 27.0 cm

深達性2度熱傷移植床形成

植皮 01/10/01 観察終了 01/10/15

川崎医科大学形成外科：No. 3 既往歴：なし

患者：T. S.	性別：男	年齢 78歳	開始 01/09/21	適用 7回	終了 01/10/29
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
2	無	/	100点	A	極めて有用

適用までの処置：ポリミキシンB軟膏、プロスタグランディン軟膏

合併症：なし

部位：左アキレス腱

適応創傷面積：2.8 cm x 10.5 cm

3度熱傷壊死組織切除創（移植床形成目的）植皮 01/10/29 観察終了 02/01/31

川崎医科大学形成外科：No.4 既往歴：なし

患者：R.E.	性別：女	年齢 8 9 歳	開始 01/10/25	適用 8 回	終了 01/11/22
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	軽度	/	8 4 点	A	極めて有用

適用までの処置：ポリミキシン B 軟膏

合併症：なし

部位：右肩

適応創傷面積：9.0 cm x 11.0 cm

深達性 2 度熱傷の上皮化

川崎医科大学形成外科：No.5 既往歴：腎不全、糖尿病、閉塞性動脈硬化症

患者：K.O.	性別：女	年齢 6 3 歳	開始 01/11/05	適用 8 回	終了 01/12/05
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	6 6 点	A	有用である

適用までの処置：ソルラチュール、ゲンタシン軟膏

合併症：なし

部位：右足背

適応創傷面積：2.5 cm x 2.7 cm

難治性皮膚潰瘍の移植床形成

植皮 01/12/05 観察終了 02/01/31

川崎医科大学形成外科：No.6 既往歴：僧帽弁閉鎖不全、下肢静脈瘤

患者：M.K.	性別：女	年齢 6 6 歳	開始 01/11/09	適用 1 1 回	終了 02/01/08
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	8 4 点	A	極めて有用

適用までの処置：プロスタグランジン軟膏

合併症：下肢静脈瘤

部位：左外顆

適応創傷面積：1.8 cm x 3.6 cm

難治性皮膚潰瘍の創閉鎖

川崎医科大学形成外科：No.7 既往歴：PSS

患者：M. M.	性別：女	年齢 26 歳	開始 02/02/04	適用 12 回	終了 02/03/15
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	83 点	A	極めて有用

適用までの処置：クロマイ P 軟膏

合併症：無し

部位：右膝

適応創傷面積：6.0 cm x 6.8 cm

難治性皮膚潰瘍の移植床形成

植皮 02/3/18 観察終了 02/4/12

川崎医科大学形成外科：No.8 既往歴：なし

患者：T. K.	性別：女	年齢 52 歳	開始 02/03/19	適用 10 回	終了 02/04/30
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	100 点	A	極めて有用

適用までの処置：ポリミキシン B 軟膏

合併症：なし

部位：右大腿

適応創傷面積：16.0 cm x 16.5 cm

深達性 2 度熱傷の上皮化

観察終了 02/05/07

川崎医科大学形成外科：No.9 既往歴：SLE、全身性エリテマドレーズ

患者：M. F.	性別：女	年齢 45 歳	開始 02/05/07	適用 7 回	終了 02/06/03
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	83 点	A	極めて有用

適用までの処置：ゲンタシン軟膏

合併症：なし

部位：左膝

適応創傷面積：6.5cm x 6.6 cm

難治性皮膚潰瘍の移植床形成

植皮 02/06/03 観察終了 02/06/25

川崎医科大学形成外科：No.10 既往歴：なし

患者：F.A.	性別：女	年齢83歳	開始02/07/05	適用20回	終了02/09/17
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
3、(5)	無	/	61点	A	有用である

適用までの処置：ポリミキシンB軟膏

合併症：肺炎、尿路感染症

部位：臀部

3倍メッシュグラフトの被覆および 適応創傷面積：14.0 cm x 16.5 cm

発生した褥瘡の移植床形成 植皮02/09/25 観察終了02/10/08

川崎医科大学形成外科：No.11 既往歴：なし

患者：S.O.	性別：男	年齢60歳	開始02/09/17	適用34回	終了03/02/21
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	61点	A	有用である

適用までの処置：アクアセル

合併症：なし

部位：左下腿

適応創傷面積：11.5cm x 15.0 cm

左下腿壊疽性膿皮症による難治性皮膚潰瘍（移植床形成目的）

上皮化にて治癒

観察終了（03/02/21）

川崎医科大学形成外科：No.12 既往歴：なし

患者：S.O.	性別：男	年齢60歳	開始02/09/17	適用34回	終了03/02/21
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	66点	A	有用である

適用までの処置：アクアセル

合併症：糖尿病、慢性炎症性脱髄性ポリニューロパチー

部位：右すね

適応創傷面積：11.5 cm x 15 cm

観察終了：03/02/28

川崎医科大学形成外科：No. 1 3 既往歴：関節リウマチ

患者：S.A.	性別：女	年齢 77歳	開始 02/12/11	適用 3回	終了 02/12/27
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	81点	A	極めて有用

適用までの処置：プロスタンディン軟膏

合併症：なし

部位：右下肢内側

適応創傷面積：3.4 cm x 7.8 cm

難治性皮膚潰瘍の移植床形成

植皮 02/12/27 観察終了 03/01/24

川崎医科大学形成外科：No. 1 4 既往歴：老人性痴呆症、両下肢熱傷

患者：K.Y.	性別：男	年齢 74歳	開始 02/12/13	適用 52回	終了 03/07/01
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	68点	A	有用である

適用までの処置：精製白糖-ポピドンニョード配合製剤（ユーパスタ）

合併症：なし

部位：右足すね内側

右下腿Ⅲ度熱傷後難治性皮膚潰瘍（移植床形成目的）

適応創傷面積：6 cm x 18 cm

観察終了：03/07/04

川崎医科大学形成外科：No. 1 5 既往歴：シェーグレン、RA、

脳腫瘍、関節リウマチ

患者：K.T.	性別：女	年齢 59歳	開始 03/11/26	適用 13回	終了 04/01/20
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	75点	A	有用である

適用までの処置：洗浄、ユーパスタ

合併症：

部位：右足すね

適応創傷面積：3 cm x 2 cm

観察終了：04/03/08

川崎医科大学形成外科：No.16 既往歴：くも膜下出血

患者：T.S.	性別：女	年齢68歳	開始04/05/28	適用11回	終了04/06/21
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	65点	A	有用である

適用までの処置：強酸水洗浄、ユーパスタ、カルトスタット、ハイドロサイト
ポリミキシンB軟膏、アクアセル、

合併症：深部静脈血栓症

部位：右肩

適応創傷面積：7 cm x 10 cm

観察終了：04/06/23

川崎医科大学形成外科：No.17 既往歴：強迫性障害、境界型人格障害

患者：H.T.	性別：女	年齢34歳	開始04/07/13	適用8回	終了04/07/29
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
2	有	04/07/31	57点	B	普通

適用までの処置：洗浄、ポリミキシンB軟膏、トレックスガーゼ

合併症：

部位：左腕

適応創傷面積：4.5 cm x 3.3 cm

観察終了：04/07/31

川崎医科大学形成外科：No.18 既往歴：limited ssc、ASO、DVT

患者：M.S.	性別：女	年齢76歳	開始04/09/14	適用7回	終了04/10/01
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	71点	A	有用である

適用までの処置：カデックス軟膏、ユーパスタ軟膏、プロイライン軟膏

合併症：

部位：左足首内側

適応創傷面積：9 cm x 4.7 cm

植皮：04/10/4 観察終了：04/12/04

川崎医科大学形成外科：No. 19 既往歴：両下腿静脈瘤、糖尿病

患者：S.M.	性別：男	年齢 62歳	開始 04/12/01	適用 11回	終了 05/01/04
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	75点	A	有用である

適用までの処置：洗浄、ゲーベンクリーム

合併症：

部位：左足すね

適応創傷面積：5.6 cm x 6.7 cm

観察終了：05/01/11

岡山大学皮膚科：No. 1

既往歴：糖尿病、高血圧

患者：K.H.	性別：男	年齢 6 3 歳	開始 02/07/02	適用 3 回	終了 02/07/12
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	7 8 点	A	有用である

適用までの処置：ゲンタシン軟膏、プロスタンディン軟膏

合併症：なし

部位：右頬部

適応創傷面積：4.0 cm x 4.0 cm

全層植皮片の脱落、壊死後の移植床形成

難治性皮膚潰瘍（移植床形成目的） 植皮 02/07/12 観察終了 02/10/23

岡山大学皮膚科：No. 2

既往歴：全身性エリラマドーデス

患者：C.I.	性別：女	年齢 5 3 歳	開始 02/09/05	適用 5 回	終了 02/10/10
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	6 1 点	A	有用である

適用までの処置：プロスタンディン軟膏

合併症：なし

部位：右足首

適応創傷面積：7.0 cm x 3.0 cm

難治性皮膚潰瘍（移植床形成目的） 植皮 02/10/04 観察終了 02/10/10

岡山大学皮膚科：No. 3

既往歴：熱傷瘢痕

患者：M.I.	性別：男	年齢 6 6 歳	開始 02/11/26	適用 4 回	終了 03/01/08
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	8 8 点	A	極めて有用

適用までの処置：プロスタンディン軟膏ほか

合併症：潰瘍の下方に膿瘍形成したため一部解放創とした

部位：左足外側

適応創傷面積：1.0 cm x 1.0 cm

難治性皮膚潰瘍の創閉鎖

鳥取大学皮膚科：No. 1

既往歴：高血圧症

患者：	性別：女	年齢 8 5 歳	開始 04/03/04	適用 4 回	終了 04/03/15
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
2	無	/	7 5 点	A	有用である

適用までの処置：分層植皮

合併症：

部位：右腕

適応創傷面積：2 cm x 1 cm

観察終了：04/03/15

鳥取大学皮膚科：No. 2

既往歴：左膝関節症、老人性痴呆

患者：S.K.	性別：女	年齢 7 5 歳	開始 02/04/22	適用 6 回	終了 02/08/08
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
2	無	/	6 1 点	A	有用である

適用までの処置：デブリードメント、ゲーベンクリーム

合併症：肺炎（020624 頃）

部位：左手首

適応創傷面積：5 cm x 10 cm

観察終了：02/08/29

鳥取大学皮膚科：No. 3

既往歴：閉塞性肥大型心筋症

脊髄空洞症、腰部変形脊椎症

患者：M.Y.	性別：男	年齢 8 1 歳	開始 02/08/07	適用 5 回	終了 02/08/19
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
3	無	03/08/19	6 1 点	A	—

適用までの処置：アクアセルガーゼ

合併症：ほぼ寝たきり状態

部位：左足側つけね

適応創傷面積：5 cm x 5 cm

観察終了：02/08/19

-----（参考症例）

香川医科大学形成外科：No. 1 既往歴：なし

患者：N. A.	性別：男	年齢 21 歳	開始 01/10/12	適用 13 回	終了 01/11/19
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
2、(3)	無	/	74 点	A	有用である

適用までの処置：ゲーベンクリーム、ポリミキシン入り生食湿布

合併症：なし

部位：左足切断骨露出面

適応創傷面積：40.0 cm x 20.0 cm

3 度熱傷壊死組織切除創（移植床形成目的） 植皮 01/11/19 観察終了 02/01/17

香川医科大学形成外科：No. 2 既往歴：両下肢静脈瘤手術／肝硬変

患者：H. S.	性別：女	年齢 70 歳	開始 02/01/04	適用 7 回	終了 02/01/25
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
3	無	/	91 点	A	極めて有用

適用までの処置：生食洗浄、ゲーベンクリーム

合併症：創部より緑膿菌 3+、MRSA2+ 確認

部位：右下腿全周

適応創傷面積：20.0 cm x 20.0 cm

3 度熱傷壊死組織切除創／3 倍メッシュグラフトの被覆保護

香川医科大学形成外科：No. 3 既往歴：高血圧、甲状腺機能低下症、脳腫瘍

患者：T. K.	性別：女	年齢 83 歳	開始 02/09/27	適用 7 回	終了 02/10/18
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	83 点	A	極めて有用

適用までの処置：フィブラストスプレー、イソジンゲル

合併症：MRSA 感染症

部位：左下腿外側

適応創傷面積：10.0 cm x 20.0 cm

難治性皮膚潰瘍の移植床形成

植皮 02/10/18 観察終了 02/11/08

香川医科大学形成外科：No. 4

既往歴：糖尿病、糖尿病性腎症、
慢性動脈閉塞症、狭心症

患者：T.T.	性別：男	年齢 66歳	開始 03/02/10	適用 9回	終了 03/02/27
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	75点	A	有用である

適用までの処置：フィブラストスプレー、プロスタンディン、ゲンタシン、
イソジンゲル

合併症：MRSA 感染症

部位：左足先

適応創傷面積：5.0 cm x 5.0 cm

左側第1趾、第4趾、第5趾の難治性皮膚潰瘍の創閉鎖

福岡大学形成外科：No. 1

既往歴：胃癌、高血圧、糖尿病

患者：C. T.	性別：男	年齢 5 9 歳	開始 02/01/08	適用 4 回	終了 02/02/14
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
2	無	/	8 3 点	A	極めて有用

適用までの処置：ゲーベンクリーム

合併症：なし

部位：左右上腕 適応創傷面積：右 14.5 cm x 9.0 cm 左 20.0 cm x 12.0 cm
3 度熱傷壊死組織切除創（移植床形成目的） 植皮 02/01/25 観察終了 02/02/14

福岡大学形成外科：No. 2

既往歴：なし

患者：E. K.	性別：女	年齢 1 9 歳	開始 02/01/18	適用 5 回	終了 02/02/08
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
3	無	/	7 4 点	A	有用である

適用までの処置：エキザルベ軟膏／プロスタグランディン軟膏

合併症：なし

部位：右大腿前面 適応創傷面積：21.0 cm x 16.0 cm
深達性 2 度熱傷／3 倍自家メッシュグラフト・パッチグラフトの被覆保護

福岡大学形成外科：No. 3

既往歴：高血圧症

患者：T. Y.	性別：女	年齢 7 3 歳	開始 02/01/31	適用 4 回	終了 02/02/23
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
3	感染	02/02/19	7 3 点	B	有用である

適用までの処置：エキザルベ軟膏

合併症：なし

部位：左大腿部・下腿部後面 適応創傷面積：20.0 cm x 10.0 cm
3 度熱傷壊死組織切除創／6 倍自家メッシュグラフトの被覆保護

福岡大学形成外科：No. 4

既往歴：なし

患者：T. T.	性別：男	年齢 30歳	開始 02/05/27	適用 1回	終了 02/05/29
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
3	無	02/05/29	評価不能	評価不能	評価不能

適用までの処置：ゲーベンクリーム

合併症：なし

部位：左体幹

適応創傷面積：40.0cm x 10.0 cm

3度熱傷壊死組織切除創/3倍自家メッシュグラフトの被覆保護

初回手術（5/27）後に全身状態が急速に悪化し、死亡したため中止した。

-----（参考症例）

福岡大学形成外科：No. 5

既往歴：なし

患者：U. R.	性別：男	年齢 1歳	開始 02/05/28	適用 7回	終了 02/06/29
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
3	無	/	100点	A	極めて有用

適用までの処置：エキザルベ軟膏、ゲーベンクリーム

合併症：なし

部位：右体幹

適応創傷面積：18.0cm x 11.0 cm

深達性2度熱傷/分層自家パッチグラフトの被覆保護

福岡大学形成外科：No. 6

既往歴：なし

患者：K. R.	性別：男	年齢 10ヶ月	開始 02/07/24	適用 11回	終了 02/09/12
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	90点	A	極めて有用

適用までの処置：エキザルベ軟膏

合併症：現在までは認めていない

部位：左体幹、左大腿

適応創傷面積：体幹 15.0 cm x 6.0 cm

大腿 12.0 cm x 5.0 cm

深達性2度熱傷の上皮化

創面との固着が生じ剥離する際に表皮化を阻害する傾向あり

福岡大学形成外科：No. 7

既往歴：なし

患者：Y.Y.	性別：男	年齢 3歳	開始 03/04/14	適用 4回	終了 03/04/21
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	93点	A	極めて有用

適用までの処置：リンデロンVG軟膏塗布

合併症：

部位：顔、右手

適応創傷面積：10 cm x 10 cm

観察終了：030528

福岡大学形成外科：No. 8

既往歴：なし

患者：Y.K.	性別：男	年齢 10歳	開始 03/05/12	適用 8回	終了 03/05/20
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	03/05/15	69点	B	有用である

適用までの処置：

合併症：

部位：背中、上腕から腰まで、左腕 適応創傷面積：40 cm x 10 cm

観察終了：03/05/20

福岡大学形成外科：No. 9

既往歴：なし

患者：T.I.	性別：男	年齢 9歳	開始 03/07/01	適用 6回	終了 03/07/08
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	93点	A	極めて有用

適用までの処置：リンデロンVG軟膏塗布

合併症：

部位：右足大腿

左右大腿

適応創傷面積：10 cm x 40 cm

観察終了：03/07/18