

福岡大学形成外科：No.10 既往歴：なし

患者：M.S.	性別：男	年齢 38歳	開始 03/08/23	適用 4回	終了 03/08/27
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	04/09/05	69点	B	有用である

適用までの処置：ソフラチュール、生食ガーゼ、ドレッシング

合併症：気道熱傷

部位：左右手背

適応創傷面積：10 cm x 20 cm

観察終了：030905

福岡大学形成外科：No.11 既往歴：なし

患者：H.F.	性別：男	年齢 3歳	開始 04/02/16	適用 9回	終了 04/03/05
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	有	/	93点	A	有用である

適用までの処置：リンデロンVG軟膏塗布

合併症：

部位：左下腿

適応創傷面積：9 cm x 4 cm

観察終了：040315

福岡大学形成外科：No.12 既往歴：なし

患者：W.H.	性別：男	年齢 68歳	開始 04/05/08	適用 7回	終了 04/05/28
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	04/05/31	84点	A	極めて有用

適用までの処置：

合併症：

部位：

適応創傷面積：2 cm x 1.5 cm

4 cm x 2.1 cm

1.9 cm x 2.0 cm

2.0 cm x 2.0 cm

観察終了：04/05/29

福岡大学形成外科：No.13 既往歴：なし

患者：I.A.	性別：女	年齢 7歳	開始 04/05/24	適用 5回	終了 04/06/07
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	04/06/15	100点	A	極めて有用

適用までの処置：フィブラストスプレー、白色ワセリン軟膏塗布

合併症：

部位：右腕

適応創傷面積：13 cm x 7 cm

観察終了：05/02/26

福岡大学形成外科：No.14 既往歴：なし

患者：K.K.	性別：男	年齢 24歳	開始 04/07/06	適用 6回	終了 04/07/23
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	83点	A	極めて有用

適用までの処置：消毒、ガーゼ、ドレッシングのみ

合併症：

部位：右手掌

適応創傷面積：10 cm x 20 cm

観察終了：04/10/11

福岡大学形成外科：No.15 既往歴：なし

患者：S.A.	性別：女	年齢 1歳	開始 04/08/25	適用 3回	終了 04/08/29
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
3	無	04/08/29	61点	B	有用である

適用までの処置：

合併症：

部位：左足すね

適応創傷面積：6 cm x 13 cm

植皮：island 共に適応 観察終了：04/09/10

福岡大学形成外科：No.16 既往歴：なし

患者：U.S.	性別：男	年齢 1歳	開始 04/08/27	適用 4回	終了 04/09/03
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	100点	A	極めて有用

適用までの処置：リンデロンVG軟膏塗布

合併症：

部位：右肩～前胸部

適応創傷面積：19 cm x 4 cm

観察終了：05/02/25

福岡大学形成外科：No.17 既往歴：なし

患者：W.K.	性別：男	年齢 0歳	開始 04/09/03	適用 ① 4回 ② 2回	終了 ① 04/09/13 ② 04/09/06
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	100点	A	極めて有用

適用までの処置：他院にて、ゲーベンクリーム

合併症：

部位：①右手背

適応創傷面積：① 13 cm x 8 cm

②右前腕

② 14 cm x 5 cm

観察終了：05/02/26

福岡大学形成外科：No.18 既往歴：なし

患者：N.M.	性別：男	年齢 36歳	開始 04/09/16	適用右 2回 左 3回	終了 04/09/24 了左 04/09/18
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	100点	A	極めて有用

適用までの処置：リンデロンVG軟膏塗布

合併症：

部位：両手甲右

適応創傷面積：9.0 cm x 9.0 cm

両手甲左

7.5 cm x 6.5 cm

観察終了：04/02/15

福岡大学形成外科：No.19

既往歴：なし

患者：N.H.	性別：男	年齢 0歳	開始①040929 ②040929 ③041002	適用①2回 ②1回 ③2回	終了①041002 ②040929 ③041005
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	100点	A	極めて有用

適用までの処置：リンデロンVG軟膏塗布、ハイドロサイト貼付

合併症：

部位：①右腋窩

適応創傷面積：① 8 cm x 7 cm

②右手

② 8 cm x 8 cm

③右手背

③ 4 cm x 4 cm

観察終了：05/02/04

福岡大学形成外科：No.20

既往歴：なし

患者：S.M.	性別：男	年齢30歳	開始04/10/15	適用4回	終了04/10/26
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	75点	A	有用である

適用までの処置：生食ガーゼ、リンデロンVG軟膏塗布

合併症：

部位：左腕

適応創傷面積：5 cm x 5 cm

観察終了：05/02/17

福岡大学形成外科：No.21

既往歴：脳梗塞、高血圧症

患者：M.S.	性別：男	年齢77歳	開始04/11/25	適用4回	終了04/12/07
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	04/12/13	71点	A	有用である

適用までの処置：リンデロンVG軟膏塗布

合併症：

部位：右大腿

適応創傷面積：21 cm x 16 cm

植皮：04/12/14 観察終了：05/01/29

九州大学皮膚科：No. 1

既往歴：十二指腸潰瘍

患者：J. U.	性別：男	年齢 6 8 歳	開始 02/05/27	適用 3 回	終了 02/06/03
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
9	無	/	8 3 点	A	極めて有用

適用までの処置：クロマイ P 軟膏

合併症：糖尿病

部位：左足背

適応創傷面積：9.3 cm x 7.8 cm

procarcinoma の切除後潰瘍

植皮 02/06/06 観察終了 02/06/18

九州大学皮膚科：No. 2

既往歴：胃潰瘍、右下肢熱傷

患者：S. N.	性別：男	年齢 4 9 歳	開始 02/07/16	適用 3 回	終了 02/07/30
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
3	無	/	8 8 点	A	極めて有用

適用までの処置：ゲーベン Cr、プロスタジン軟膏

合併症：熱傷瘢痕

部位：右小腿

適応創傷面積：20.0 cm x 14.0 cm

熱傷瘢痕有棘細胞癌切除後の 6 倍メッシュ植皮部

植皮 02/07/30 観察終了 02/08/09

九州大学皮膚科：No. 3

既往歴：なし

患者：M. T	性別：女	年齢 4 3 歳	開始 02/07/26	適用 1 0 回	終了 02/09/12
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
6	有	02/09/12	7 5 点	B	有用である

適用までの処置：生食洗浄、プロスタジン軟膏、ゲンタシン軟膏

合併症：なし

部位：右眼窩内

適応創傷面積：0.5 cm x 2.0 cm

眼窩内容摘出→植皮→骨露出潰瘍

カンジダ感染のため中止

九州大学皮膚科：No. 4

既往歴：左下腿熱傷

患者：T. N.	性別：男	年齢 5 9 歳	開始 02/08/13	適用 5 回	終了 02/08/27
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
9	無	/	7 9 点	A	有用である

適用までの処置：なし

合併症：なし

部位：右足底

適応創傷面積：10.0 cm x 9.0 cm

悪性黒色腫切除後潰瘍の移植床形成

植皮 02/09/03 観察終了 02/09/22

九州大学皮膚科：No. 5

既往歴：高血圧

患者：Y. M.	性別：男	年齢 5 5 歳	開始 02/08/16	適用 5 回	終了 02/09/11
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
9	無	/	7 9 点	A	有用である

適用までの処置：なし

合併症：なし

部位：右第3指々背

適応創傷面積：4.8 cm x 5.0 cm

有棘細胞癌切除後潰瘍

植皮 02/09/03 観察終了 02/09/11

九州大学皮膚科：No. 6

既往歴：糖尿病

患者：E. S.	性別：女	年齢 7 1 歳	開始 02/08/29	適用 6 回	終了 02/09/30
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	9 3 点	A	極めて有用

適用までの処置：生食洗浄、生食湿布、抗 MRSA 抗生剤

合併症：糖尿病

部位：左足背

適応創傷面積：10.5 cm x 3.5 cm

左内果部

適応創傷面積：5.5 cm x 5.0 cm

難治性皮膚潰瘍の移植床形成

植皮 02/09/19 観察終了 02/09/30

九州大学皮膚科：No. 7

既往歴：なし

患者：S. T.	性別：女	年齢 5 1 歳	開始 02/09/05	適用 3 回	終了 02/09/17
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
9	無	/	8 8 点	A	極めて有用

適用までの処置：なし

合併症：なし

部位：右肩

適応創傷面積：15.0 cm x 6.0 cm

腫瘍切除創に 6 倍自家メッシュグラフトの被覆保護

九州大学皮膚科：No. 8

既往歴：DM

患者：S. E.	性別：女	年齢 7 1 歳	開始 02/11/06	適用 1 1 回	終了 02/12/20
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	9 6 点	A	極めて有用

適用までの処置：

合併症：うっ滞性皮膚炎症、NIDDM

部位：左足背

適応創傷面積：7.5 cm x 1.0 cm

3.1cm x 2.1 cm

難治性皮膚潰瘍の上皮化

3.0 cm x 2.2 cm

九州大学皮膚科：No. 9

既往歴：熱傷

患者：K. N.	性別：女	年齢 5 0 歳	開始 02/11/07	適用 5 回	終了 02/12/10
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
9	無	/	8 1 点	A	極めて有用

適用までの処置：イソジン消毒、ユーパスタ

合併症：熱傷瘢痕

部位：左足背

適応創傷面積：14.0 cm x 8.0 cm

腫瘍切除後の移植床形成

植皮 02/11/26 観察終了 02/12/10

九州大学皮膚科：No. 1 0

既往歴：RA、DM

患者：J. M.	性別：女	年齢 5 6 歳	開始 02/11/12	適用 6/5 回	終了 03/01/14
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	7 1 点	A	有用である

適用までの処置：ネクロトミー、アクトシン外用

合併症：RA、DM

部位：左下腿外側

適応創傷面積：3.3 cm x 2.5 cm

難治性皮膚潰瘍の移植床形成

適用 6 回後植皮 02/11/28 (1 回目) 外泊後脱落 02/12/09

再度開始 02/12/24 適用 5 回後 植皮 03/01/06 (2 回目) 観察終了 03/01/14

九州大学皮膚科：No. 1 1

既往歴：なし

患者：A. I.	性別：女	年齢 2 7 歳	開始 02/11/14	適用 5 回	終了 02/12/13
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
9	無	/	8 0 点	A	極めて有用

適用までの処置：なし

合併症：母斑様基底細胞癌症候群

部位：左頬

適応創傷面積：3.8 cm x 4.1 cm

腫瘍切除後の移植床形成

植皮 02/12/03 観察終了 02/12/13

九州大学皮膚科：No. 1 2

既往歴：外傷後難治性潰瘍

患者：Y. J.	性別：女	年齢 5 3 歳	開始 02/11/28	適用 4 回	終了 02/12/13
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
8	無	/	9 2 点	A	極めて有用

適用までの処置：

合併症：外傷後左足関節変型治癒

部位：左足背

適応創傷面積：7.0 cm x 6.0 cm

瘢痕切除後の移植床形成

左下腿の潰瘍周囲の瘢痕組織に病理学的異型があり切断術施行のため中止



九州大学皮膚科：No.13

既往歴：RA

患者：MN.	性別：女	年齢37歳	開始02/12/02	適用17回	終了03/02/14
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	100点	A	極めて有用

適用までの処置：プロスタンディン軟膏、ゲーベンクリーム、アクトシン軟膏

合併症：全身性強皮症

部位：左手指

適応創傷面積：2.0 cm x 2.2 cm

難治性皮膚潰瘍の創閉鎖

九州大学皮膚科：No.14

既往歴：横断性脊髄炎

患者：？	性別：女	年齢51歳	開始02/12/19	適用1回	終了03/01/05
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	97点	A	極めて有用

適用までの処置：プロスタンジン軟膏

合併症：うっ滞性皮膚炎症

部位：左下腿

適応創傷面積：5.0 cm x 5.0 cm

難治性皮膚潰瘍の移植床形成

植皮02/12/22 観察終了03/01/05

九州大学皮膚科：No.15

既往歴：なし

患者：A.I.	性別：女	年齢87歳	開始02/12/19	適用3回	終了03/01/17
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	93点	A	極めて有用

適用までの処置：ゲーベンクリーム

合併症：なし

部位：左足底

適応創傷面積：5.4 cm x 2.1 cm

難治性皮膚潰瘍の移植床形成

植皮02/12/26 観察終了03/01/17

九州大学皮膚科：No. 1 6

既往歴：慢性関節リウマチ、心筋梗塞

患者：K. F.	性別：女	年齢 6 8 歳	開始 02/12/19	適用 1 4 回	終了 03/03/03
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	9 2 点	A	極めて有用

適用までの処置：生食洗浄、ゲーベンクリーム

合併症：深部静脈血栓症、RA

部位：左下腿前面

適応創傷面積：5.0 cm x 3.4 cm

難治性皮膚潰瘍の創閉鎖

九州大学皮膚科：No. 1 7

既往歴：なし

患者：F. K.	性別：女	年齢 7 3 歳	開始 02/12/24	適用 4 回	終了 03/01/30
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
9	無	/	9 2 点	A	極めて有用

適用までの処置：なし

合併症：悪性黒色腫切除創

部位：左足踵

適応創傷面積：8.0 cm x 8.0 cm

腫瘍切除創の移植床形成

植皮 03/01/09 観察終了 03/01/30

九州大学皮膚科：No. 1 8

既往歴：なし

患者：I. M.	性別：女	年齢 4 1 歳	開始 03/01/16	適用 4 回	終了 03/01/27
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
6	無	/	8 4 点	A	極めて有用

適用までの処置：

合併症：皮膚付属器悪性腫瘍術後

部位：頭部右側面

適応創傷面積：8.2 cm x 6.6 cm

植皮：03/01/30 観察終了：03/01/30

九州大学皮膚科：No. 19

既往歴：高血圧、脊椎腫瘍術後

患者：S.S.	性別：女	年齢 86歳	開始 03/01/23	適用 7回	終了 03/02/26
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	92点	A	極めて有用

適用までの処置：デブリードマン、生食洗浄、アクトシン軟膏

合併症：高血圧、抹消神経障害

部位：左足、第1趾、第3趾、第4趾 適応創傷面積：0.8 cm x 1.2 cm

深達性Ⅱ度熱傷

1.2 cm x 1.5 cm

1.2 cm x 1.5 cm

植皮 03/02/18 観察終了 03/02/26

九州大学皮膚科：No. 20

既往歴：なし

患者：K.M.	性別：男	年齢 58歳	開始 03/02/04	適用 5回	終了 03/02/20
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	92点	A	極めて有用

適用までの処置：ネクロトミー、アクトシン外用、ヒピテン浴、ユーパスタ

合併症：アルコール性肝障害、それに伴う異栄養症、抹消神経障害

部位：両足指（左第Ⅰ①、②） 適応創傷面積：1.8 cm x 1.5 cm、2.3cm x 0.9 cm

（右第Ⅰ③）

2.5 cm x 1.3 cm

（右第Ⅱ④）

2.0 cm x 1.0 cm

植皮：03/02/24 観察終了：03/03/10

九州大学皮膚科：No. 21

既往歴：なし

患者：I.M.	性別：女	年齢 41歳	開始 03/02/07	適用 14回	終了 03/03/24
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	4	52点	A	普通

適用までの処置：

合併症：皮膚付属器悪性腫瘍術後

部位：頭部右側面（2箇所）

適応創傷面積：1.6 cm x 1.1 cm

1.3 cm x 0.9 cm

（骨穿孔術施行日：030313）

観察終了：03/03/28

九州大学皮膚科：No. 2 2

既往歴：C型肝炎、高血圧

患者：T.O.	性別：女	年齢 7 1 歳	開始 03/02/19	適用 1 2 回	終了 03/12/19
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	9 8 点	A	極めて有用

適用までの処置：生食洗浄、フィブラストスプレー、ユーパスタ外用

合併症：慢性関節リウマチ、クリオグロブリン血漿

部位：右すね側面

適応創傷面積：2 cm x 3 cm

4 cm x 6 cm

観察終了：03/12/25

九州大学皮膚科：No. 2 3

既往歴：

患者：E.S.	性別：女	年齢 7 1 歳	開始 03/02/20	適用 6 回	終了 03/03/10
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	有	4	8 0 点	C	普通

適用までの処置：

合併症：糖尿病、うっ帯性皮膚炎

部位：左内果

適応創傷面積：0.3 cm x 0.3 cm

0.2 cm x 0.2 cm

観察終了：03/03/13

九州大学皮膚科：No. 2 4

既往歴：胆嚢摘出、腰椎圧迫骨折

患者：A.K.	性別：女	年齢 8 7 歳	開始 03/03/18	適用 5 回	終了 03/03/31
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
6	無	/	8 3 点	A	極めて有用

適用までの処置：

合併症：右足底悪性黒色腫 Stage 0

部位：右足底

適応創傷面積：8.1 cm x 5.7 cm

植皮：04/04/03 観察終了：04/04/16

九州大学皮膚科：No. 2 5

既往歴：なし

患者：A.K.	性別：女	年齢 8 7 歳	開始 03/04/21	適用 3 回	終了 03/04/28
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
6	無	/	8 3 点	A	極めて有用

適用までの処置：腫瘍拡大切除、CDS 貼付、自家分層皮膚移植、Hecrotomy

合併症：右足底悪性黒色腫 Stage 0

部位：右足底

適応創傷面積：4.5 cm x 4.6 cm

植皮：04/04/30 観察終了：04/05/15

九州大学皮膚科：No. 2 6

既往歴：高血圧

患者：I.A.	性別：女	年齢 8 7 歳	開始 03/04/24	適用 4 回	終了 03/05/06
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
6	無	/	9 2 点	A	極めて有用

適用までの処置：

合併症：有棘細胞癌、術後潰瘍

部位：左手薬指

適応創傷面積：3.0 cm x 2.5 cm

植皮：03/05/08 観察終了：03/05/12

九州大学皮膚科：No. 2 7

既往歴：慢性 C 型肝炎

患者：H.S.	性別：男	年齢 4 8 歳	開始 03/04/25	適用 5 回	終了 03/05/08
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
6	無	/	8 8 点	A	極めて有用

適用までの処置：

合併症：右肘窩の動静脈癌切除語の皮膚欠損

部位：右肘

適応創傷面積：5 cm x 3 cm

植皮：03/05/13 観察終了：03/05/20

九州大学皮膚科：No. 2 8

既往歴：慢性腎不全人工透析

患者：Y.A.	性別：女	年齢 4 9 歳	開始 03/06/06	適用 4 回	終了 03/06/16
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
6	無	/	9 2 点	A	極めて有用

適用までの処置：ゲーベンクリーム塗布

合併症：人工透析

部位：右膝下

適応創傷面積：12 cm x 9.5 cm

植皮：03/06/19 観察終了：03/06/29

九州大学皮膚科：No. 2 9

既往歴：慢性 C 型肝炎、左乳癌、

Peutz-Jegher 症候群、右卵巣腫

患者：T.Y.	性別：女	年齢 6 6 歳	開始 03/07/01	適用 5 回	終了 03/07/14
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	9 2 点	A	極めて有用

適用までの処置：イソジン消毒

合併症：左乳癌、肝転移に対する放射線照射

部位：腹部（右季肋部）

適応創傷面積：6 cm x 4.5 cm

植皮：03/07/15 観察終了：03/07/25

九州大学皮膚科：No. 3 0

既往歴：左大腿骨髓炎

患者：Y.T.	性別：男	年齢 5 9 歳	開始 03/07/16	適用 6 回	終了 03/08/05
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
6	無	/	9 2 点	A	極めて有用

適用までの処置：

合併症：左膝関節症

部位：左膝

適応創傷面積：13 cm x 6 cm

植皮：03/08/07 観察終了：03/08/18

九州大学皮膚科：No. 3 1 既往歴：労働時狭心症、末期腎不全

患者：K.I.	性別：女	年齢 73 歳	開始 03/09/16	適用 2 回	終了 03/09/19
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	点		

適用までの処置：ユーパスタ、アクトシン

合併症：末期腎不全、甲状腺機能低下症、コレステロール塞栓

部位：左 V 趾基部外側

適応創傷面積：2.2 cm x 2.0 cm

患者死亡のため 2 回で終了

----- (参考症例)

九州大学皮膚科：No. 3 2 既往歴：強皮症

患者：M.N.	性別：女	年齢 37 歳	開始 03/09/16	適用 10 回	終了 03/10/17
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	100 点	A	極めて有用

適用までの処置：フィブラストスプレー

合併症：

部位：右足 3 指、PIP 背側

適応創傷面積：1.2 cm x 0.5 cm

観察終了：03/10/21

九州大学皮膚科：No. 3 3 既往歴：腸ヘルニア、強皮症、皮膚筋炎

患者：S.I.	性別：女	年齢 61 歳	開始 03/12/12	適用 19 回	終了 04/03/12
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	有	/	75 点	B	有用である

適用までの処置：フィブラストスプレー

合併症：

部位：土踏まず側面

適応創傷面積：2.5 cm x 2.9 cm

足首前面

1.1 cm x 1.8 cm

観察終了：04/03/23

九州大学皮膚科：No. 3 4

既往歴：交通外傷

患者：Y.M.	性別：男	年齢 3 4 歳	開始 04/01/14	適用 6 回	終了 04/01/30
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	/	8 8 点	A	極めて有用

適用までの処置：生食洗浄、フィブラストスプレー、ガーゼ保護

合併症：うっ帯性皮膚炎、静脈瘤症候群

部位：右すね側面

適応創傷面積：4.8 cm x 3.5 cm

1.1 cm x 2.5 cm

植皮：04/02/03 観察終了：04/02/18

九州大学皮膚科：No. 3 5

既往歴：prostatic cancer、白内障 P/S 両眼

患者：K.S.	性別：男	年齢 7 2 歳	開始 04/01/16	適用 1 1 回	終了 04/02/20
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
6	無	/	9 2 点	A	極めて有用

適用までの処置：フィブラストスプレー、エキザルベ軟膏塗布

合併症：高血圧

部位：足首前面

適応創傷面積：2.5 cm x 1.5 cm

観察終了：04/02/24

九州大学皮膚科：No. 3 6

既往歴：PA、ASO、うっ帯性皮膚炎

患者：S.H.	性別：女	年齢 8 3 歳	開始 04/02/20	適用 6 回	終了 04/03/08
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	有	1	5 2 点	B	普通

適用までの処置：ゲーベンクリーム塗布

合併症：

部位：右膝下側面

適応創傷面積：8 cm x 5 cm

観察終了：04/05/14



九州大学皮膚科：No. 3 7

既往歴：強皮症

患者：C.M.	性別：女	年齢 3 6 歳	開始 04/03/05	適用 1 1 回	終了 04/04/12
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	無	4	5 2 点	A	普通

適用までの処置：プロスタンディン軟膏塗布

合併症：強皮症

部位：左中指第二関節

適応創傷面積：1.5cm x 1.5 cm

観察終了：04/05/31

九州大学皮膚科：No. 3 8

既往歴：強皮症

患者：Y.H.	性別：女	年齢 6 1 歳	開始 04/07/15	適用 4 回	終了 04/08/21
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
5	有	1	5 2 点	B	普通

適用までの処置：フィブラストスプレー

合併症：

部位：左足中指側面

適応創傷面積：1.5 cm x 0.8 cm

観察終了：04/08/21

千葉県救急医療センター：No. 1 既往歴：左腎摘術後

患者：T.N.	性別：男	年齢 6 7 歳	開始 04/09/27	適用 4 回	終了 04/10/06
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
3	無	/	6 9 点	B	有用である

適用までの処置：軟膏、温浴療法、植皮術（生着不良）

合併症：

部位：左肩～側面①

適応創傷面積：① 9 cm x 25 cm

右方～側面②

② 10 cm x 25 cm

観察終了：04/10/28

千葉県救急医療センター：No. 2 既往歴：脳梗塞

患者：	性別：男	年齢 6 2 歳	開始 04/12/12	適用 5 回	終了 04/12/24
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
3	有	/	7 8 点	B	有用である

適用までの処置：軟膏療法、温浴療法

合併症：

部位：右わき腹

適応創傷面積：35 cm x 30 cm

観察終了：05/01/25

湘南鎌倉総合病院形成外科：No. 1 既往歴：なし

患者：T. T.	性別：男	年齢 6 2 歳	開始 02/01/17	適用 2 回	終了 02/02/15
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
3	無	/	9 0 点	A	極めて有用

適用までの処置：軟膏処置

合併症：なし

部位：右下腿

適応創傷面積：60.0 cm x 20.0 cm

3 度熱傷壊死組織切除創 / 3 倍自家メッシュグラフトの被覆保護

湘南鎌倉総合病院形成外科：No. 2 既往歴：糖尿病

患者：O. F.	性別：女	年齢 8 4 歳	開始 02/02/07	適用 3 回	終了 02/03/03
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
1	無	/	8 0 点	A	極めて有用

適用までの処置：被覆材、ゲーベンクリーム

合併症：あり

部位：左肩

適応創傷面積：20.0 cm x 10.0 cm

深達性 2 度熱傷の表皮化

湘南鎌倉総合病院形成外科：No. 3 既往歴：なし

患者：N. N.	性別：男	年齢 4 3 歳	開始 02/02/21	適用 1 回	終了 02/03/08
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
3	無	/	9 0 点	A	極めて有用

適用までの処置：軟膏、被覆材

合併症：なし

部位：前胸部

適応創傷面積：60.0 cm x 60.0 cm

刺青切除創 / 3 倍自家メッシュグラフトの被覆保護

湘南鎌倉総合病院形成外科：No. 4 既往歴：虫垂切除

患者：S. S.	性別：女	年齢 7 9 歳	開始 02/03/07	適用 1 回	終了 02/03/26
適応	不具合	中止	有効性	安全性	総合評価
3	無	/	6 2 点	A	有用である

適用までの処置：ゲーベンクリーム

合併症：高血圧、喘息

部位：右大腿部

適応創傷面積：50.0 cm x 25.0 cm

3 度熱傷壊死組織切除創 / 3 倍自家メッシュグラフトの被覆保護