

7.9% (2002年) → 5.6% (2004年) と減少していた。

補聴器を日常「使用する」者は、男性では、7.7% (2002年) → 8.1% (2004年) とほとんど変わらず、女性でも、6.2% (2002年) → 7.1% (2004年) とほとんど変わらなかった。

視力、眼鏡使用

「顔を見てわかる程度」および「ほとんど見えない」の者は、男性では、4.8% (2002年) → 5.8% (2004年) と増加し、女性でも、3.4% (2002年) → 7.0% (2004年) に増加していた。

眼鏡を日常「使用する」者は、男性では、81.5% (2002年) → 81.0% (2004年) とほとんど変わらず、女性でも、82.4% (2002年) → 81.6% (2004年) とほとんど変わらなかった。

基本的日常生活動作 (ADL)

歩行「普通 (自立)」の者は、男性では、99.8% (2002年) → 99.6% (2004年) とほとんど変わらず、女性でも、99.8% (2002年) → 99.5% (2004年) とほとんど変わらなかった。

食事「普通 (自立)」の者は、男性では、100.0% (2002年) → 99.8% (2004年) とほとんど変わらず、女性でも、100.0% (2002年) → 100.0% (2004年) と変わらなかった。

入浴「普通 (自立)」の者は、男性では、99.6% (2002年) → 99.0% (2004年) とほとんど変わらず、女性でも、99.8% (2002年) → 99.8% (2004年) と変わらなかった。

着脱衣「普通 (自立)」の者は、男性では、99.8% (2002年) → 99.6% (2004年) とほとんど変わらず、女性でも、100.0% (2002年) → 100.0% (2004年) と変わらなかった。

排泄「普通 (自立)」の者は、男性では、100.0%

(2002年) → 100.0% (2004年) と変わらず、女性でも、100.0% (2002年) → 100.0% (2004年) と変わらなかった。

失禁、失禁回数

失禁については、2002年と2004年とでは、質問やそのカテゴリーが一部異なるため比較は難しい。よって、2004年時の失禁について述べると、失禁の「ある」者は、男性では、16.3%、女性では、33.3%であった。また、失禁が「ある」者のうち、失禁回数 (2004年) が少なくとも1週間に1～2回以上「ある」者は、男性では、43.5%、女性では、39.7%であった。

運動習慣

日常の運動習慣が「ある (している)」者は、男性では、80.6% (2002年) → 78.7% (2004年) とほとんど変わらず、女性では、75.4% (2002年) → 76.1% (2004年) とほとんど変わらなかった。しかし、年齢階級別にみると、女性の80歳以上 (82歳以上) では、71.8% (2002年) → 80.3% (2004年) に増加していた。

老研式活動能力指標

「新聞を読んでいる (できる)」者は、男性では、96.7% (2002年) → 95.0% (2004年) とほとんど変わらなかったが、女性では、91.7% (2002年) → 87.4% (2004年) とやや減少していた。

「本や雑誌を読んでいる (できる)」者は、男性では、89.4% (2002年) → 76.4% (2004年) とかなり減少し、女性でも、87.3% (2002年) → 71.0% (2004年) と大幅に減少していた。

「友人を訪問している (できる)」者は、男性では、76.5% (2002年) → 52.8% (2004年) へ

約 25%減少し、女性でも、84.2% (2002 年) → 66.9% (2004 年) と約 20%に減少していた。

「家族や友人の相談にのる (できる)」者は、男性では、86.3% (2002 年) → 72.4% (2004 年) に、女性でも、87.9% (2002 年) → 76.0% (2004 年) に、いずれも約 10~15%減少していた。

「若い人に話かける (できる)」者は、男性では、85.6% (2002 年) → 72.8% (2004 年) にかなり減少し、女性でも、90.0% (2002 年) → 82.5% (2004 年) に減少していた。

この他の 8 項目「電車やバスを使って一人で外出 (できる)」、「日用品の買い物 (できる)」、「食事の用意 (できる)」、「請求書の支払い (できる)」、「預貯金の出し入れ (できる)」、「年金などの書類作成 (できる)」、「健康情報への関心 (ある)」、「病人の見舞い (できる)」については、男女ともほとんど変わらなかった。

老研式活動能力指標の総得点 (13 点満点) では、「12 点以上」の者は、男性では、72.1% (2002 年) → 53.3% (2004 年) に、女性でも、80.3% (2002 年) → 63.8% (2004 年) に、いずれも約 15~20%減少していた。

また、この指標の下位尺度である「手段的自立 (問 1~5)」で、「5 点」の者は、男性では、80.2% (2002 年) → 82.3% (2004 年) とほとんど変わらず、女性でも、93.8% (2002 年) → 94.2% (2004 年) とほとんど変わらなかった。一方、同じ下位尺度である「知的能動性 (問 6~9)」では、「4 点」の者は、男性では、76.7% (2002 年) → 66.0% (2004 年) に、女性でも、79.8% (2002 年) → 64.0% (2004 年) に、いずれも約 10~15%減少していた。さらに、「社会的役割

(問 10~13)」では、「4 点」の者は、男性では、63.8% (2002 年) → 40.3% (2004 年) に、女性でも、71.2% (2002 年) → 49.2% (2004 年) に、いずれも約 20~25%減少していた。

趣味

趣味が「よくする」者は、男性では、52.2% (2002 年) → 45.7% (2004 年) にやや減少し、女性でも、53.3% (2002 年) → 47.6% (2004 年) にやや減少していた。

地域活動への参加

「地域活動への参加 (している)」者は、男性では、43.8% (2002 年) → 32.6% (2004 年) に、女性でも、46.3% (2002 年) → 42.2% (2004 年) に、いずれも約 5~10%減少していた。

飲酒習慣

お酒を「飲む」者は、男性では、64.8% (2002 年) → 61.4% (2004 年) とほとんど変わらず、女性でも、28.7% (2002 年) → 26.4% (2004 年) とほとんど変わらなかった。

喫煙習慣

たばこを「吸う」者は、男性では、23.5% (2002 年) → 21.3% (2004 年) とほとんど変わらず、女性でも、3.8% (2002 年) → 3.5% (2004 年) とほとんど変わらなかった。

咀嚼機能

「どんなものでも噛める」者は、男性では、67.5% (2002 年) → 69.7% (2004 年) とほとんど変わらず、女性でも、68.3% (2002 年) → 66.4% (2004 年) とほとんど変わらなかった。

認知機能

「認知機能低下 (MMSE23 点以下)」の者は、男性では、3.3% (2002 年) →8.4% (2004 年) へ、女性でも、3.8% (2002 年) →7.1% (2004 年) へいずれもかなり増加していた。

年齢階級別にみれば、男性では、75 歳以上 (77 歳以上) で、1.8% (2002 年) →7.2% (2004 年) とかなり増加し、80 歳以上 (82 歳以上) でも、6.3% (2002 年) →16.8% (2004 年) と大幅に増加した。女性においても、75 歳以上 (77 歳以上) で、3.7% (2002 年) →8.6% (2004 年) でかなり増加し、80 歳以上 (82 歳以上) でも、10.3% (2002 年) →16.2% (2004 年) と増加していた。

大うつ病リスク

「大うつ病リスクあり (MINI スケール) あり」の者は、男性では、1.0% (2002 年) →1.3% (2004 年) へ、女性でも、2.1% (2002 年) →2.4% (2004 年) にやや増加していた。

身長

身長 (平均値) は、男性では、161.0cm (2002 年) →161.0cm (2004 年) と変わらず、女性でも、148.1cm (2002 年) →147.9cm (2004 年) とほとんど変わらなかった。

体重

体重 (平均値) は、男性では、60.2kg (2002 年) →59.7kg (2004 年) に、女性では、49.8kg (2002 年) →49.3kg (2004 年) に、いずれも 0.5kg 減少していた。

BMI (体格指数)

BMI (平均値) は、男性では、23.2 (2002 年)

→23.0 (2004 年) に、女性では、22.7 (2002 年) →22.5 (2004 年) に、いずれも 0.2 減少していた。

収縮期血圧

収縮期血圧 (平均値) は、男性では、149.0mmHg (2002 年) →148.1mmHg (2004 年) とほとんど変わらず、女性でも、145.2mmHg (2002 年) →145.8mmHg (2004 年) とほとんど変わらなかった。

拡張期血圧

拡張期血圧 (平均値) は、男性では、84.1mmHg (2002 年) →82.3mmHg (2004 年) とほとんど変わらず、女性でも、80.9mmHg (2002 年) →79.8mmHg (2004 年) とほとんど変わらなかった。

脈拍数

脈拍数 (平均値) は、男性では、78.5 回/分 (2002 年) →77.6 回/分 (2004 年) とほとんど変わらず、女性でも、80.6 回/分 (2002 年) →80.6 回/分 (2004 年) と変わらなかった。

握力

握力 (平均値) は、男性では、30.9kg (2002 年) →28.4kg (2004 年) に 2.5kg 減少し、女性でも、18.5kg (2002 年) →17.4kg (2004 年) に、1.1kg 減少していた。

通常歩行速度

通常歩行速度 (平均値) は、男性では、1.24m/秒 (2002 年) →1.23m/秒 (2004 年) とほとんど変わらず、女性でも、1.18m/秒 (2002 年) →1.17m/秒 (2004 年) とほとんど変わらなかった。

最大歩行速度

最大歩行速度（平均値）は、男性では、1.96m/秒（2002年）→1.95m/秒（2004年）とほとんど変わらず、女性でも、1.72m/秒（2002年）→1.74m/秒（2004年）とほとんど変わらなかった。

膝伸展力

膝伸展力（平均値）は、男性では、78.2Nm（2002年）→79.1Nm（2004年）に0.9Nm増加し、女性でも、48.6Nm（2002年）→52.4Nm（2004年）に3.8Nmとかなり増加した。年齢階級別にみれば、男性では、74歳以下（76歳以下）で、82.9Nm（2002年）→86.6Nm（2004年）に3.7Nm増加し、女性でも、74歳以下（76歳以下）で、52.9Nm（2002年）→58.4Nm（2004年）に5.5Nmとかなり増加した。

ファンクショナルリーチ

ファンクショナルリーチ（平均値）は、男性では、35.6cm（2002年）→35.2cm（2004年）と変わらず、女性でも、33.2cm（2002年）→32.7cm（2004年）とほとんど変わらなかった。

骨密度

骨密度（平均値）は、男性では、0.466g/cm²（2002年）→0.457g/cm²（2004年）と0.009g/cm²の減少で、女性でも、0.301g/cm²（2002年）→0.292g/cm²（2004年）と0.009g/cm²の減少で、2年間の骨密度減少率は、男性が約2%、女性が約3%であった。

アルブミン

アルブミン（平均値）は、男性では、4.2g/dl（2002年）→4.3g/dl（2004年）とほとんど変

わらず、女性でも、4.2g/dl（2002年）→4.3g/dl（2004年）とほとんど変わらなかった。

総コレステロール

総コレステロール（平均値）は、男性では、193.5mg/dl（2002年）→196.9mg/dl（2004年）とほとんど変わらず、女性でも、211.3mg/dl（2002年）→215.3mg/dl（2004年）とほとんど変わらなかった。

HDLコレステロール

HDLコレステロール（平均値）は、男性では、55.9mg/dl（2002年）→59.7mg/dl（2004年）と約4mg/dl増加し、女性でも、64.1mg/dl（2002年）→69.0mg/dl（2004年）と約5mg/dl増加した。

白血球数

白血球数（平均値）は、男性では、6327/ μ l（2002年）→6347/ μ l（2004年）とほとんど変わらず、女性でも、6145/ μ l（2002年）→6343/ μ l（2004年）に増加していた。

赤血球数

赤血球数（平均値）は、男性では、424万/ μ l（2002年）→441万/ μ l（2004年）に増加し、女性でも、398万/ μ l（2002年）→418万/ μ l（2004年）に増加していた。

血色素量

血色素量（平均値）は、男性では、13.8g/dl（2002年）→14.0g/dl（2004年）と0.2g/dl増加し、女性でも、12.7g/dl（2002年）→12.9g/dl（2004年）と0.2g/dl上昇していた。

ヘトクリット

ヘトクリット（平均値）は、男性では、40.6%（2002年）→42.9%（2004年）と2.3%増加し、女性でも、37.2%（2002年）→40.0%（2004年）と2.8%増加していた。

HbA1c

HbA1c（平均値）は、男性では、5.5%（2002年）→5.2%（2004年）と0.3%減少し、女性でも、5.4%（2002年）→5.2%（2004年）と0.2%減少していた。

健康度自己評価 BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
健康 自己 評価	非常に健康	47	21.6%	44	26.3%	25	26.3%	116	24.2%
	まあ健康な方	139	63.8%	102	61.1%	56	58.9%	297	61.9%
	あまり健康ではない	27	12.4%	19	11.4%	12	12.6%	58	12.1%
	健康でない	5	2.3%	2	1.2%	2	2.1%	9	1.9%
	合計	218	100.0%	167	100.0%	95	100.0%	480	100.0%

a. 性別 = 男性

健康度自己評価 BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
健康 自己 評価	非常に健康	56	18.9%	49	19.9%	24	20.5%	129	19.6%
	まあ健康な方	183	61.8%	135	54.9%	66	56.4%	384	58.3%
	あまり健康ではない	43	14.5%	50	20.3%	20	17.1%	113	17.1%
	健康でない	14	4.7%	12	4.9%	7	6.0%	33	5.0%
	合計	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659	100.0%

a. 性別 = 女性

健康度自己評価 BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
健康 自己 評価	非常に健康	41	18.8%	38	22.9%	19	20.0%	98	20.5%
	まあ健康な方	133	61.0%	100	60.2%	60	63.2%	293	61.2%
	あまり健康ではない	32	14.7%	22	13.3%	12	12.6%	66	13.8%
	健康でない	12	5.5%	6	3.6%	4	4.2%	22	4.6%
	合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

健康度自己評価 BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
健康 自己 評価	非常に健康	52	17.6%	33	13.5%	20	17.1%	105	16.0%
	まあ健康な方	188	63.5%	146	59.6%	69	59.0%	403	61.2%
	あまり健康ではない	46	15.5%	42	17.1%	20	17.1%	108	16.4%
	健康でない	10	3.4%	24	9.8%	8	6.8%	42	6.4%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

痛みの有無 BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
痛みの有無	ある	99	45.4%	78	46.7%	38	40.0%	215	44.8%
	ない	119	54.6%	89	53.3%	57	60.0%	265	55.2%
	合計	218	100.0%	167	100.0%	95	100.0%	480	100.0%

a. 性別 = 男性

痛みの有無 BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
痛みの有無	ある	184	62.2%	154	62.6%	77	65.8%	415	63.0%
	ない	112	37.8%	92	37.4%	40	34.2%	244	37.0%
	合計	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659	100.0%

a. 性別 = 女性

痛みの有無 BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
痛みの有無	ある	91	41.7%	78	47.0%	37	38.9%	206	43.0%
	ない	127	58.3%	88	53.0%	58	61.1%	273	57.0%
	合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

痛みの有無 BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
痛みの有無	ある	165	55.7%	151	61.6%	69	59.0%	385	58.5%
	ない	131	44.3%	94	38.4%	48	41.0%	273	41.5%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

転倒の有無 BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
転倒の有無	転んだことがある	22	10.1%	29	17.4%	17	17.9%	68	14.2%
	転んだことがない	196	89.9%	138	82.6%	78	82.1%	412	85.8%
	合計	218	100.0%	167	100.0%	95	100.0%	480	100.0%

a. 性別 = 男性

転倒の有無 BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
転倒の有無	転んだことがある	66	22.3%	51	20.7%	19	16.2%	136	20.6%
	転んだことがない	230	77.7%	195	79.3%	98	83.8%	523	79.4%
	合計	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659	100.0%

a. 性別 = 女性

転倒の有無 BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
転倒の有無	転んだことがある	22	10.1%	22	13.3%	14	14.7%	58	12.1%
	転んだことがない	196	89.9%	144	86.7%	81	85.3%	421	87.9%
	合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

転倒の有無 BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
転倒の有無	転んだことがある	46	15.5%	51	20.8%	29	24.8%	126	19.1%
	転んだことがない	250	84.5%	194	79.2%	88	75.2%	532	80.9%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

転倒回数 BY 年齢階級 (2002年) ^a

		年齢階級 (2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
転倒回数	回数不明・未回答	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	1	18	81.8%	20	69.0%	9	52.9%	47	69.1%
	2	1	4.5%	5	17.2%	5	29.4%	11	16.2%
	3	2	9.1%	2	6.9%	2	11.8%	6	8.8%
	10	1	4.5%	0	.0%	0	.0%	1	1.5%
	24	0	.0%	1	3.4%	0	.0%	1	1.5%
	無数・多数	0	.0%	1	3.4%	1	5.9%	2	2.9%
	合計	22	100.0%	29	100.0%	17	100.0%	68	100.0%

a. 性別 = 男性

転倒回数 BY 年齢階級 (2002年) ^a

		年齢階級 (2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
転倒回数	回数不明・未回答	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	1	52	80.0%	35	68.6%	9	47.4%	96	71.1%
	2	7	10.8%	7	13.7%	2	10.5%	16	11.9%
	3	3	4.6%	2	3.9%	5	26.3%	10	7.4%
	4	0	.0%	2	3.9%	2	10.5%	4	3.0%
	5	2	3.1%	2	3.9%	0	.0%	4	3.0%
	10	1	1.5%	0	.0%	0	.0%	1	.7%
	無数・多数	0	.0%	3	5.9%	1	5.3%	4	3.0%
合計	65	100.0%	51	100.0%	19	100.0%	135	100.0%	

a. 性別 = 女性

転倒回数 BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
転倒回数	回数不明・未回答	0	.0%	1	4.5%	1	7.1%	2	3.4%
	1	12	54.5%	10	45.5%	6	42.9%	28	48.3%
	2	5	22.7%	3	13.6%	3	21.4%	11	19.0%
	3	2	9.1%	5	22.7%	1	7.1%	8	13.8%
	4	0	.0%	1	4.5%	1	7.1%	2	3.4%
	5	2	9.1%	1	4.5%	0	.0%	3	5.2%
	6	1	4.5%	0	.0%	0	.0%	1	1.7%
	12	0	.0%	1	4.5%	0	.0%	1	1.7%
	20	0	.0%	0	.0%	1	7.1%	1	1.7%
	無数・多数	0	.0%	0	.0%	1	7.1%	1	1.7%
合計	22	100.0%	22	100.0%	14	100.0%	58	100.0%	

a. 性別 = 男性

転倒回数 BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
転倒回数	回数不明・未回答	0	.0%	0	.0%	1	3.4%	1	.8%
	1	29	63.0%	35	68.6%	17	58.6%	81	64.3%
	2	10	21.7%	11	21.6%	6	20.7%	27	21.4%
	3	6	13.0%	3	5.9%	3	10.3%	12	9.5%
	4	1	2.2%	0	.0%	0	.0%	1	.8%
	5	0	.0%	1	2.0%	1	3.4%	2	1.6%
	10	0	.0%	0	.0%	1	3.4%	1	.8%
	無数・多数	0	.0%	1	2.0%	0	.0%	1	.8%
	合計	46	100.0%	51	100.0%	29	100.0%	126	100.0%

a. 性別 = 女性

転倒恐怖感 BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
転倒恐怖感	とてもこわい	26	12.0%	19	11.4%	16	16.8%	61	12.7%
	少しこわい	61	28.1%	48	28.7%	25	26.3%	134	28.0%
	こわくない	130	59.9%	100	59.9%	54	56.8%	284	59.3%
	合計	217	100.0%	167	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

転倒恐怖感 BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
転倒恐怖感	とてもこわい	71	24.0%	73	29.7%	35	29.9%	179	27.2%
	少しこわい	114	38.5%	103	41.9%	46	39.3%	263	39.9%
	こわくない	111	37.5%	70	28.5%	36	30.8%	217	32.9%
	合計	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659	100.0%

a. 性別 = 女性

転倒恐怖感 BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
転倒恐怖感	とてもこわい	17	7.8%	15	9.3%	8	8.4%	40	8.4%
	少しこわい	58	26.6%	51	31.5%	33	34.7%	142	29.9%
	こわくない	143	65.6%	96	59.3%	54	56.8%	293	61.7%
	合計	218	100.0%	162	100.0%	95	100.0%	475	100.0%

a. 性別 = 男性

転倒恐怖感 BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
転倒恐怖感	とてもこわい	64	21.8%	74	30.3%	38	32.5%	176	26.9%
	少しこわい	91	31.0%	81	33.2%	40	34.2%	212	32.4%
	こわくない	139	47.3%	89	36.5%	39	33.3%	267	40.8%
	合計	294	100.0%	244	100.0%	117	100.0%	655	100.0%

a. 性別 = 女性

移動能力 BY 年齢階級 (2002年) ^a

		年齢階級 (2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
移動能力	1人で外出できる	214	98.2%	164	98.2%	91	95.8%	469	97.7%
	1人で遠出はできない	4	1.8%	3	1.8%	4	4.2%	11	2.3%
	少しは動ける	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	あまり動けない	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	寝たり起きたり	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	218	100.0%	167	100.0%	95	100.0%	480	100.0%

a. 性別 = 男性

移動能力 BY 年齢階級 (2002年) ^a

		年齢階級 (2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
移動能力	1人で外出できる	293	99.0%	230	93.9%	104	88.9%	627	95.3%
	1人で遠出はできない	3	1.0%	15	6.1%	12	10.3%	30	4.6%
	少しは動ける	0	.0%	0	.0%	1	.9%	1	.2%
	あまり動けない	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	寝たり起きたり	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

移動能力 BY 年齢階級 (2004年) ^a

		年齢階級 (2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
移動能力	1人で外出できる	213	97.7%	162	97.6%	88	92.6%	463	96.7%
	1人で遠出はできない	5	2.3%	4	2.4%	5	5.3%	14	2.9%
	少しは動ける	0	.0%	0	.0%	2	2.1%	2	.4%
	あまり動けない	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	寝たり起きたり	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

移動能力 BY 年齢階級 (2004年) ^a

		年齢階級 (2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
移動能力	1人で外出できる	289	97.6%	227	92.7%	105	89.7%	621	94.4%
	1人で遠出はできない	6	2.0%	17	6.9%	11	9.4%	34	5.2%
	少しは動ける	1	.3%	1	.4%	1	.9%	3	.5%
	あまり動けない	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	寝たり起きたり	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

歩行補助具の使用 BY 年齢階級 (2002年) ^a

		年齢階級 (2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
歩行補助具の使用	使っている	6	2.8%	5	3.0%	5	5.3%	16	3.3%
	使っていない	210	96.3%	161	96.4%	89	93.7%	460	95.8%
	全く歩行できない	2	.9%	1	.6%	1	1.1%	4	.8%
	合計	218	100.0%	167	100.0%	95	100.0%	480	100.0%

a. 性別 = 男性

歩行補助具の使用 BY 年齢階級 (2002年) ^a

		年齢階級 (2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
歩行補助具の使用	使っている	13	4.4%	20	8.1%	24	20.5%	57	8.6%
	使っていない	281	94.9%	225	91.5%	93	79.5%	599	90.9%
	全く歩行できない	2	.7%	1	.4%	0	.0%	3	.5%
	合計	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659	100.0%

a. 性別 = 女性

歩行補助具の使用 BY 年齢階級 (2004年) ^a

		年齢階級 (2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
歩行補助具の使用	使っている	6	2.8%	10	6.0%	13	13.7%	29	6.1%
	使っていない	209	95.9%	156	94.0%	81	85.3%	446	93.1%
	全く歩行できない	3	1.4%	0	.0%	1	1.1%	4	.8%
	合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

歩行補助具の使用 BY 年齢階級 (2004年) ^a

		年齢階級 (2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
歩行補助具の使用	使っている	16	5.4%	37	15.1%	30	25.6%	83	12.6%
	使っていない	280	94.6%	207	84.5%	85	72.6%	572	86.9%
	全く歩行できない	0	.0%	1	.4%	2	1.7%	3	.5%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

外出の頻度 BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
外出 の頻 度	1日1回以上	183	83.9%	133	79.6%	70	74.5%	386	80.6%
	2~3日に1回程度	30	13.8%	29	17.4%	20	21.3%	79	16.5%
	1週間に1回程度	4	1.8%	5	3.0%	3	3.2%	12	2.5%
	ほとんど外出しない	1	.5%	0	.0%	1	1.1%	2	.4%
	合計	218	100.0%	167	100.0%	94	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

外出の頻度 BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
外出 の頻 度	1日1回以上	247	83.4%	194	78.9%	97	82.9%	538	81.6%
	2~3日に1回程度	44	14.9%	43	17.5%	15	12.8%	102	15.5%
	1週間に1回程度	4	1.4%	8	3.3%	4	3.4%	16	2.4%
	ほとんど外出しない	1	.3%	1	.4%	1	.9%	3	.5%
	合計	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659	100.0%

a. 性別 = 女性

外出の頻度 BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
外出 の頻 度	1日1回以上	182	83.5%	128	77.1%	72	75.8%	382	79.7%
	2~3日に1回程度	33	15.1%	33	19.9%	19	20.0%	85	17.7%
	1週間に1回程度	1	.5%	3	1.8%	2	2.1%	6	1.3%
	ほとんど外出しない	2	.9%	2	1.2%	2	2.1%	6	1.3%
	合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

外出の頻度 BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
外出 の頻 度	1日1回以上	250	84.5%	187	76.3%	84	71.8%	521	79.2%
	2~3日に1回程度	43	14.5%	46	18.8%	30	25.6%	119	18.1%
	1週間に1回程度	3	1.0%	9	3.7%	1	.9%	13	2.0%
	ほとんど外出しない	0	.0%	3	1.2%	2	1.7%	5	.8%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

ADL_聴力 BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_聴力	普通	205	94.0%	149	89.2%	77	81.1%	431	89.8%
	大きい声での会話	13	6.0%	16	9.6%	15	15.8%	44	9.2%
	ほとんど聞えない	0	.0%	2	1.2%	3	3.2%	5	1.0%
	合計	218	100.0%	167	100.0%	95	100.0%	480	100.0%

a. 性別 = 男性

ADL_聴力 BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_聴力	普通	277	93.6%	229	93.1%	101	86.3%	607	92.1%
	大きい声での会話	19	6.4%	16	6.5%	16	13.7%	51	7.7%
	ほとんど聞えない	0	.0%	1	.4%	0	.0%	1	.2%
	合計	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659	100.0%

a. 性別 = 女性

ADL_聴力 BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_聴力	普通	204	93.6%	150	90.4%	74	77.9%	428	89.4%
	大きい声での会話	14	6.4%	15	9.0%	21	22.1%	50	10.4%
	ほとんど聞えない	0	.0%	1	.6%	0	.0%	1	.2%
	合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

ADL_聴力 BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_聴力	普通	283	95.6%	235	95.9%	103	88.0%	621	94.4%
	大きい声での会話	13	4.4%	10	4.1%	14	12.0%	37	5.6%
	ほとんど聞えない	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

ADL_補聴器の使用 BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_補聴器の使用	日常使用する	13	6.0%	10	6.0%	14	14.7%	37	7.7%
	使用しないために使用	205	94.0%	157	94.0%	81	85.3%	443	92.3%
	合計	218	100.0%	167	100.0%	95	100.0%	480	100.0%

a. 性別 = 男性

ADL_補聴器の使用 BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_補聴器の使用	日常使用する	15	5.1%	14	5.7%	12	10.3%	41	6.2%
	使用しないために使用	281	94.9%	232	94.3%	105	89.7%	618	93.8%
	合計	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659	100.0%

a. 性別 = 女性

ADL_補聴器の使用 BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_補聴器の使用	日常使用する	14	6.4%	12	7.2%	13	13.7%	39	8.1%
	使用しないために使用	204	93.6%	154	92.8%	82	86.3%	440	91.9%
	合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

ADL_補聴器の使用 BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_補聴器の使用	日常使用する	20	6.8%	15	6.1%	12	10.3%	47	7.1%
	使用しないために使用	276	93.2%	230	93.9%	105	89.7%	611	92.9%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

ADL_視力 BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_視力	普通	208	95.4%	157	94.0%	92	96.8%	457	95.2%
	顔を見て誰かわかる位	9	4.1%	8	4.8%	3	3.2%	20	4.2%
	ほとんど見えない	1	.5%	2	1.2%	0	.0%	3	.6%
	合計	218	100.0%	167	100.0%	95	100.0%	480	100.0%

a. 性別 = 男性

ADL_視力 BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_視力	普通	287	97.0%	238	96.7%	112	95.7%	637	96.7%
	顔を見て誰かわかる位	9	3.0%	7	2.8%	5	4.3%	21	3.2%
	ほとんど見えない	0	.0%	1	.4%	0	.0%	1	.2%
	合計	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659	100.0%

a. 性別 = 女性

ADL_視力 BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_視力	普通	209	95.9%	154	92.8%	88	92.6%	451	94.2%
	顔を見て誰かわかる位	8	3.7%	11	6.6%	7	7.4%	26	5.4%
	ほとんど見えない	1	.5%	1	.6%	0	.0%	2	.4%
	合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

ADL_視力 BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_視力	普通	280	94.6%	226	92.2%	106	90.6%	612	93.0%
	顔を見て誰かわかる位	16	5.4%	17	6.9%	10	8.5%	43	6.5%
	ほとんど見えない	0	.0%	2	.8%	1	.9%	3	.5%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

ADL_めがねの使用 BY 年齢階級 (2002年) ^a

		年齢階級 (2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_めがねの使用	日常使用する	180	82.6%	130	77.8%	81	85.3%	391	81.5%
	使用しない・たまたまに使用	38	17.4%	37	22.2%	14	14.7%	89	18.5%
	合計	218	100.0%	167	100.0%	95	100.0%	480	100.0%

a. 性別 = 男性

ADL_めがねの使用 BY 年齢階級 (2002年) ^a

		年齢階級 (2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_めがねの使用	日常使用する	247	83.4%	203	82.5%	93	79.5%	543	82.4%
	使用しない・たまたまに使用	49	16.6%	43	17.5%	24	20.5%	116	17.6%
	合計	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659	100.0%

a. 性別 = 女性

ADL_めがねの使用 BY 年齢階級 (2004年) ^a

		年齢階級 (2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_めがねの使用	日常使用する	176	80.7%	130	78.3%	82	86.3%	388	81.0%
	使用しない・たまたまに使用	42	19.3%	36	21.7%	13	13.7%	91	19.0%
	合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

ADL_めがねの使用 BY 年齢階級 (2004年) ^a

		年齢階級 (2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_めがねの使用	日常使用する	244	82.4%	201	82.0%	92	78.6%	537	81.6%
	使用しない・たまたまに使用	52	17.6%	44	18.0%	25	21.4%	121	18.4%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

ADL_歩行 BY 年齢階級(2002年) ^a

	年齢階級(2002年)							
	74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_歩行 普通	217	99.5%	167	100.0%	95	100.0%	479	99.8%
物につかまる・介助	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
歩行不能・歩けない	1	.5%	0	.0%	0	.0%	1	.2%
合計	218	100.0%	167	100.0%	95	100.0%	480	100.0%

a. 性別 = 男性

ADL_歩行 BY 年齢階級(2002年) ^a

	年齢階級(2002年)							
	74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_歩行 普通	296	100.0%	245	100.0%	116	99.1%	657	99.8%
物につかまる・介助	0	.0%	0	.0%	1	.9%	1	.2%
歩行不能・歩けない	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

ADL_歩行 BY 年齢階級(2004年) ^a

	年齢階級(2004年)							
	76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_歩行 普通	217	99.5%	166	100.0%	94	98.9%	477	99.6%
物につかまる・介助	0	.0%	0	.0%	1	1.1%	1	.2%
歩行不能・歩けない	1	.5%	0	.0%	0	.0%	1	.2%
合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

ADL_歩行 BY 年齢階級(2004年) ^a

	年齢階級(2004年)							
	76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_歩行 普通	296	100.0%	242	98.8%	117	100.0%	655	99.5%
物につかまる・介助	0	.0%	3	1.2%	0	.0%	3	.5%
歩行不能・歩けない	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

ADL_食事 BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_食事	普通	218	100.0%	167	100.0%	95	100.0%	480	100.0%
	食べやすくする	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	自分では食べられない	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	218	100.0%	167	100.0%	95	100.0%	480	100.0%

a. 性別 = 男性

ADL_食事 BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_食事	普通	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659	100.0%
	食べやすくする	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	自分では食べられない	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659	100.0%

a. 性別 = 女性

ADL_食事 BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_食事	普通	218	100.0%	166	100.0%	94	98.9%	478	99.8%
	食べやすくする	0	.0%	0	.0%	1	1.1%	1	.2%
	自分では食べられない	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

ADL_食事 BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ADL_食事	普通	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%
	食べやすくする	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	自分では食べられない	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性