

# 鈍的外傷 ISS参照画面

# ISS

	○1 軽症	○2 中等症	○3重症	○重症(生命危機)	○致命的(生存困難)
<b>頭頸部</b>	頭部外傷 2 時間の頭痛、幻暈 骨折/偏位を伴わない頸髓の伸展	事故後の記憶喪失 嗜眠/昏迷 1時間以内の意識障害 頭蓋単純骨折 頸椎の小骨折	意識障害(6h以内) 頭蓋底骨折 頭蓋複合骨折 脳挫傷/SAH 頸動脈内膜損傷 喉頭/咽頭挫傷 頸椎脱臼/骨折	意識障害(24h以内) 痛覚刺激のみ反応 2cm以上の陥没骨折 100ml以内の頭蓋内血腫 頸髓不全損傷 咽頭挫滅	意識障害(24h以上) 脳幹損傷 100ml以上の頭蓋内血腫 C4以下の頸髓完全損傷
<b>顔面</b>	○1 軽症 角膜擦過傷 舌挫折裂傷 鼻骨/舌骨骨折 歯牙損傷	○2 中等症 LeFort I型骨折 頬骨/眼窩/下顎骨骨折 強膜/角膜損傷	○3重症 LeFort II型骨折 視神経挫裂創	○重症(生命危機) LeFort III型骨折	○致命的(生存困難)
<b>胸部</b>	○1 軽症 肋骨骨折 骨性胸郭挫傷 胸骨挫傷 胸椎挫傷	○2 中等症 2-3本の肋骨骨折 胸骨骨折 胸椎挫傷 胸椎棘突起/横突起骨折 胸椎小圧迫骨折(<20%)	○3重症 肺挫傷/裂傷(1葉) 片側血気胸 横隔膜破裂 4本以上の肋骨骨折 気道熱傷(小) 胸椎椎弓骨折 胸髄振盪	○重症(生命危機) 肺挫傷/裂傷(複数葉) 両側血気胸 縦隔血腫/気腫 横隔膜破裂 frail chest 緊張性気胸 胸髄不完全損傷	○致命的(生存困難)
<b>腹部</b>	○1 軽症 陰囊、陰、会陰部擦過傷/表在性裂創/挫傷 腰椎挫挫 血尿	○2 中等症 消化管、腸間膜、尿管等の挫傷/表在性裂傷 腎、肝、脾小挫傷/裂傷 腰椎小骨折 腰髄神経根損傷	○3重症 小腸、腸間膜、尿管等の穿孔 腎、肝、脾大挫傷 腹腔内出血(>1000ml) 後腹膜血腫 腰椎骨折 腰髄損傷(横断症状)	○重症(生命危機) 胃、十二指腸、大腸、直腸の穿孔 消化管・尿管狭窄 肝裂傷 腸骨動脈大裂傷 腰髄不全損傷 胎盤剝離	○致命的(生存困難) 組織欠損または大量汚染を伴う十二指腸・大腸の穿孔 肝/脾/腎/脾の複雑破裂 腰髄完全損傷
<b>四肢</b>	○1 軽症 肘、肩、手首、足首打撲 手指、足趾脱臼/骨折 四肢関節の捻挫	○2 中等症 上腕骨、脛骨、鎖骨、肩甲骨等の骨折 単純骨盤骨折 肘・手・肩の脱臼 主要筋、腱挫裂創 主要動静脈の内膜損傷/小裂傷	○3重症 骨盤複雑骨折 大腿骨骨折 手首/足首/膝/股関節脱臼、膝靭帯断裂 膝下または上肢切断 大動脈内膜損傷/小裂傷	○重症(生命危機) 骨盤粉碎骨折 膝上での切断/粉碎 大腿、上腕動脈の大裂傷	○致命的(生存困難) 開放性骨盤粉碎骨折
<b>外表</b>	○1 軽症 I度熱傷 II/III度熱傷(<10%) 表在性裂創<10cm 擦過傷<50cm(顔/手ではその半分)	○2 中等症 II/III度熱傷(10-19%) 表在性裂創>10cm 擦過傷>50cm(顔/手ではその半分)	○3重症 II/III度熱傷(20-29%) (同等の範囲のdegloving injury)	○重症(生命危機) II/III度熱傷(30-39%) (同等の範囲のdegloving injury)	○致命的(生存困難) II/III度熱傷(40-89%) (同等の範囲のdegloving injury)

戻る

# 鋭的外傷 ISS参照画面

## ISS

	○1 軽症	○2 中等症	○3重症	○重症(生命危機)	○致命的(生存困難)
<b>頭頸部</b>		臓器損傷のない 頸部鋭的損傷	組織損傷/臓器損傷を 伴う頸部鋭的損傷 頸動脈/椎骨動脈/内 頸動脈の小裂創 頸静脈の欠損 咽頭、喉頭表層裂創 甲状腺裂創	神経脱落症状を伴 う動脈小裂創 頸動脈/椎骨動脈/ 内頸動脈横断損傷 内頸静脈部分欠損 咽頭、喉頭穿孔	貫通した鋭的損傷 大脳、小脳鋭的損傷 頸髓裂創 完全頸髓損傷 喉頭、咽頭複雑裂創 頸動脈/椎骨動脈部分欠損
<b>顔面</b>	臓器損傷のない 鋭的損傷	表在性組織損傷 を伴う鋭的損傷	大きな組織欠損 を伴う鋭的損傷		
<b>胸部</b>	胸腔内に至らない 鋭的損傷	胸管裂創 胸膜裂創	肺裂創(1葉) 片側血気胸 横隔膜裂創 気管/気管支/食道表 在裂創 無名静脈、肺動脈、 鎖骨下静脈表在裂創	表在性大動脈裂創 主要動静脈裂創 気管/気管支/食道穿孔 複数葉肺裂創 縦隔血腫・気腫 両側血気胸 心タンポナーデ	大動脈大裂創 主要動脈横断裂創 組織欠損を伴う気管/気 管支/食道裂創 緊張性気胸 1000mlを超える血胸 胸髓裂創
<b>腹部</b>	腹腔内に至らない 鋭的損傷	胃/小腸/腸間膜/膀胱 /尿管/尿道/腎/肝/脾 の表在性裂創 腹膜の裂創	主要動脈の表在裂創 十二指腸/大腸/直腸の 表在性裂創 小腸/腸間膜/膀胱/尿管 の全層性裂創 1000ml以上の出血を伴 う腎/肝/脾小裂創	大動脈小裂創 小動脈の大裂創 腸骨静脈そのほかの 静脈横断裂創 大量汚染を伴う小 腸・膀胱損傷 腸間膜/膀胱損傷	大動脈大裂創 組織欠損または大量 汚染を伴う十二指 腸・大腸の裂創 組織欠損を伴う肝/脾 /腎/脾損傷 腰髓裂創
<b>四肢</b>	上腕静脈その他静 脈の表在性裂創	内部構造の損傷を伴わ ない単純鋭的損傷 主要動脈の表在裂創 主要静脈の大裂創 正中/大腿/脛骨/腓骨の 神経損傷	内部構造の損傷を伴う 複雑鋭的損傷 大腿動脈表在裂創 腋窩動静脈/膝窩動静脈 /大腿静脈の大裂創 同一肢での複数神経損 傷・複数筋断裂	上腕動脈/大腿動脈 の大裂創 上腕動脈/腋窩動脈/ 膝窩動脈の部分欠損	大腿動脈の部分欠損
<b>外表</b>	組織損傷のない鋭的損 傷 体表10cm以内、頭/手 5cm以内の表在裂創	組織損傷を伴う鋭的損 傷 体表10cm以上、頭/手 5cm以上の表在裂創			

戻る

【保存用症例レポート】（必ず各施設で専用ファイルに綴じ、保管してください）

医療機関名	<input type="text"/>	外傷原因	<input type="text"/>
科名	<input type="text"/>	入院時診断	<input type="text"/>
担当医名	<input type="text"/>	入院時診断その他	<input type="text"/>
被験者イニシャル姓	<input type="text"/>	合併損傷1	<input type="text"/>
被験者イニシャル名	<input type="text"/>	合併損傷2	<input type="text"/>
		合併損傷3	<input type="text"/>
症例登録番号	<input type="text"/>	合併損傷4	<input type="text"/>
割付	<input type="text"/>	合併損傷5	<input type="text"/>
麻酔方法	<input type="text"/>	合併損傷6	<input type="text"/>
割付日	<input type="text"/>	合併損傷7	<input type="text"/>
割付時刻	<input type="text"/>	ISS	<input type="text"/>
生年月日	<input type="text"/>	既往症1	<input type="text"/>
年齢	<input type="text"/>	既往症2	<input type="text"/>
性別	<input type="text"/>	既往症3	<input type="text"/>
身長	<input type="text"/>	既往症4	<input type="text"/>
体重	<input type="text"/>	受傷前使用薬1	<input type="text"/>
		受傷前使用薬2	<input type="text"/>
		受傷前使用薬3	<input type="text"/>
GCS E	<input type="text"/>	受傷日	<input type="text"/>
GCS V	<input type="text"/>	受傷時刻	<input type="text"/>
GCS M	<input type="text"/>	来院日	<input type="text"/>
GCS total	<input type="text"/>	来院時刻	<input type="text"/>
収縮期血圧	<input type="text"/>		
拡張期血圧	<input type="text"/>		
来院時心拍数	<input type="text"/>		
来院時瞳孔径左	<input type="text"/>		
来院時瞳孔径右	<input type="text"/>		
来院時対光反射左	<input type="text"/>	軽度低体温の有無	<input type="text"/>
来院時対光反射右	<input type="text"/>	導入日	<input type="text"/>
来院時CT所見	<input type="text"/>	導入時刻	<input type="text"/>
InitICP	<input type="text"/>	体温35.5℃以下になった日	<input type="text"/>
PostDrgICP	<input type="text"/>	体温35.5℃以下になった時刻	<input type="text"/>
同意の有無	<input type="text"/>	体温34度以下になった日	<input type="text"/>
手術の有無	<input type="text"/>	体温34度以下になった時刻	<input type="text"/>
手術開始日	<input type="text"/>	復温開始日	<input type="text"/>
手術開始時刻	<input type="text"/>	復温開始時刻	<input type="text"/>
手術終了日	<input type="text"/>	体温36度以上になった日	<input type="text"/>
手術終了時刻	<input type="text"/>	体温36度以上になった時刻	<input type="text"/>
術式1	<input type="text"/>		
術式2	<input type="text"/>		
麻酔法	<input type="text"/>		

ドルミカム使用の有無   
 ドルミカム初回投与量   
 ドルミカム持続投与量   
 ドロレプタン使用の有無   
 ドロレプタン初回投与量   
 ドロレプタン持続投与量   
 フェンタネスト使用の有無   
 フェンタネスト初回投与量   
 フェンタネスト持続投与量

ベクロニウムの使用の有無   
 ベクロニウム初回投与量   
 ベクロニウム持続投与量   
 パンクロニウム使用の有無   
 パンクロニウム初回投与量   
 パンクロニウム持続投与量

その他1   
 薬剤投与理由1   
 その他2   
 薬剤投与理由2

データ採取日時   
 データ採取時刻   
 内頸静脈温   
 肺動脈温   
 鼓膜温   
 膀胱温   
 脳温   
 収縮期血圧day0   
 拡張期血圧day0   
 平均血圧day0   
 頭蓋内圧   
 脳灌流圧   
 吸入酸素濃度   
 動脈血酸素分圧   
 動脈血二酸化炭素分圧   
 動脈血pH   
 動脈血酸素飽和度   
 内頸静脈血酸素飽和度   
 心拍出量   
 中心静脈圧   
 肺動脈楔入圧   
 心係数   
 全身末梢血管抵抗   
 全身末梢血管抵抗係数   
 混合静脈血酸素飽和度   
 ヘモグロビン   
 酸素供給量   
 酸素消費量   
 酸素摂取率

RBCday0   
 WBCday0   
 Hctday0   
 Pltday0   
 BILday0   
 ALBday0   
 ASTday0   
 ALTday0   
 LDHday0   
 CKday0   
 BUNday0   
 Creday0   
 Naday0   
 Kday0   
 Clday0   
 Caday0   
 Mgdlay0   
 BSday0   
 APTTday0   
 PTday0   
 FIBday0   
 FDPday0   
 DDday0   
 ATday0

ECG不整脈day0   
 HRday0   
 ECGその他day0   
 尿潜血day0   
 尿糖day0   
 尿蛋白day0   
 尿ウロビリday0

データ採取日時day1	<input type="text"/>	RBCday1	<input type="text"/>
データ採取時刻day1	<input type="text"/>	WBCday1	<input type="text"/>
内頸静脈温day1	<input type="text"/>	Hctday1	<input type="text"/>
肺動脈温day1	<input type="text"/>	Pltday1	<input type="text"/>
鼓膜温day1	<input type="text"/>	BILday1	<input type="text"/>
膀胱温day1	<input type="text"/>	ALBday1	<input type="text"/>
脳温day1	<input type="text"/>	ASTday1	<input type="text"/>
収縮期血圧day1	<input type="text"/>	ALTday1	<input type="text"/>
拡張期血圧day1	<input type="text"/>	LDHday1	<input type="text"/>
平均血圧day1	<input type="text"/>	CKday1	<input type="text"/>
頭蓋内圧day1	<input type="text"/>	BUNday1	<input type="text"/>
脳灌流圧day1	<input type="text"/>	Creday1	<input type="text"/>
吸入酸素濃度day1	<input type="text"/>	Naday1	<input type="text"/>
動脈血酸素分圧day1	<input type="text"/>	Kday1	<input type="text"/>
動脈血二酸化炭素分圧day1	<input type="text"/>	Clay1	<input type="text"/>
動脈血pHday1	<input type="text"/>	Caday1	<input type="text"/>
動脈血酸素飽和度day1	<input type="text"/>	Mgday1	<input type="text"/>
内頸静脈血酸素飽和度day1	<input type="text"/>	BSday1	<input type="text"/>
心拍出量day1	<input type="text"/>	APTTday1	<input type="text"/>
中心静脈圧day1	<input type="text"/>	PTday1	<input type="text"/>
肺動脈楔入圧day1	<input type="text"/>	FIBday1	<input type="text"/>
心係数day1	<input type="text"/>	FDPday1	<input type="text"/>
全身末梢血管抵抗day1	<input type="text"/>	DDday1	<input type="text"/>
全身末梢血管抵抗係数day1	<input type="text"/>	ATday1	<input type="text"/>
混合静脈血酸素飽和度day1	<input type="text"/>		
ヘモグロビンday1	<input type="text"/>	ECG不整脈day1	<input type="text"/>
酸素供給量day1	<input type="text"/>	HRday1	<input type="text"/>
酸素消費量day1	<input type="text"/>	ECGその他day1	<input type="text"/>
酸素摂取率day1	<input type="text"/>	尿潜血day1	<input type="text"/>
		尿糖day1	<input type="text"/>
		尿蛋白day1	<input type="text"/>
		尿ウロビリday1	<input type="text"/>

データ採取日時day3	<input type="text"/>	RBCday3	<input type="text"/>
データ採取時刻day3	<input type="text"/>	WBCday3	<input type="text"/>
内頸静脈温day3	<input type="text"/>	Hctday3	<input type="text"/>
肺動脈温day3	<input type="text"/>	Pltday3	<input type="text"/>
鼓膜温day3	<input type="text"/>	BILday3	<input type="text"/>
膀胱温day3	<input type="text"/>	ALBday3	<input type="text"/>
脳温day3	<input type="text"/>	ASTday3	<input type="text"/>
収縮期血圧day3	<input type="text"/>	ALTday3	<input type="text"/>
拡張期血圧day3	<input type="text"/>	LDHday3	<input type="text"/>
平均血圧day3	<input type="text"/>	CKday3	<input type="text"/>
頭蓋内圧day3	<input type="text"/>	BUNday3	<input type="text"/>
脳灌流圧day3	<input type="text"/>	Creday3	<input type="text"/>
吸入酸素濃度day3	<input type="text"/>	Naday3	<input type="text"/>
動脈血酸素分圧day3	<input type="text"/>	Kday3	<input type="text"/>
動脈血二酸化炭素分圧day3	<input type="text"/>	Clday3	<input type="text"/>
動脈血pHday3	<input type="text"/>	Caday3	<input type="text"/>
動脈血酸素飽和度day3	<input type="text"/>	Mgday3	<input type="text"/>
内頸静脈血酸素飽和度day3	<input type="text"/>	BSday3	<input type="text"/>
心拍出量day3	<input type="text"/>	APTTday3	<input type="text"/>
中心静脈圧day3	<input type="text"/>	PTday3	<input type="text"/>
肺動脈楔入圧day3	<input type="text"/>	FIBday3	<input type="text"/>
心係数day3	<input type="text"/>	FDPday3	<input type="text"/>
全身末梢血管抵抗day3	<input type="text"/>	DDday3	<input type="text"/>
全身末梢血管抵抗係数day3	<input type="text"/>	ATday3	<input type="text"/>
混合静脈血酸素飽和度day3	<input type="text"/>		
ヘモグロビンday3	<input type="text"/>		
酸素供給量day3	<input type="text"/>	ECG不整脈day3	<input type="text"/>
酸素消費量day3	<input type="text"/>	HRday3	<input type="text"/>
酸素摂取率day3	<input type="text"/>	ECGその他day3	<input type="text"/>
		尿潜血day3	<input type="text"/>
		尿糖day3	<input type="text"/>
		尿蛋白day3	<input type="text"/>
		尿ウロビリday3	<input type="text"/>

デ一夕採取日時pre	<input type="text"/>		
デ一夕採取時刻pre	<input type="text"/>		
内頸静脈温pre	<input type="text"/>	RBCpre	<input type="text"/>
肺動脈温pre	<input type="text"/>	WBCpre	<input type="text"/>
鼓膜温pre	<input type="text"/>	Hctpre	<input type="text"/>
膀胱温pre	<input type="text"/>	Pltpre	<input type="text"/>
脳温pre	<input type="text"/>	BILpre	<input type="text"/>
収縮期血圧pre	<input type="text"/>	ALBpre	<input type="text"/>
拡張期血圧pre	<input type="text"/>	ASTpre	<input type="text"/>
平均血圧pre	<input type="text"/>	ALTpre	<input type="text"/>
頭蓋内圧pre	<input type="text"/>	LDHdpre	<input type="text"/>
脳灌流圧pre	<input type="text"/>	CKpre	<input type="text"/>
吸入酸素濃度pre	<input type="text"/>	BUNpre	<input type="text"/>
動脈血酸素分圧pre	<input type="text"/>	Crepre	<input type="text"/>
動脈血二酸化炭素分圧pre	<input type="text"/>	Napre	<input type="text"/>
動脈血pHpre	<input type="text"/>	Kpre	<input type="text"/>
動脈血酸素飽和度pre	<input type="text"/>	Clpre	<input type="text"/>
内頸静脈血酸素飽和度pre	<input type="text"/>	Capre	<input type="text"/>
心拍出量pre	<input type="text"/>	Mgpre	<input type="text"/>
中心静脈圧pre	<input type="text"/>	BSpre	<input type="text"/>
肺動脈楔入圧pre	<input type="text"/>	APTTpre	<input type="text"/>
心係数pre	<input type="text"/>	PTpre	<input type="text"/>
全身末梢血管抵抗pre	<input type="text"/>	FIBpre	<input type="text"/>
全身末梢血管抵抗係数pre	<input type="text"/>	FDPpre	<input type="text"/>
混合静脈血酸素飽和度pre	<input type="text"/>	DDpre	<input type="text"/>
ヘモグロビンpre	<input type="text"/>	ATpre	<input type="text"/>
酸素供給量pre	<input type="text"/>		
酸素消費量pre	<input type="text"/>		
酸素摂取率pre	<input type="text"/>		
		ECG不整脈pre	<input type="text"/>
		HRpre	<input type="text"/>
		ECGその他pre	<input type="text"/>
		尿潜血pre	<input type="text"/>
		尿糖pre	<input type="text"/>
		尿蛋白pre	<input type="text"/>
		尿ウロビリpre	<input type="text"/>

データ採取日時post	<input type="text"/>		
データ採取時刻post	<input type="text"/>	RBCpost	<input type="text"/>
内頸静脈温post	<input type="text"/>	WBCpost	<input type="text"/>
肺動脈温post	<input type="text"/>	Hctpost	<input type="text"/>
鼓膜温post	<input type="text"/>	Pltpost	<input type="text"/>
膀胱温post	<input type="text"/>	BILpost	<input type="text"/>
脳温post	<input type="text"/>	ALBpost	<input type="text"/>
収縮期血圧post	<input type="text"/>	ASTpost	<input type="text"/>
拡張期血圧post	<input type="text"/>	ALTpost	<input type="text"/>
平均血圧post	<input type="text"/>	LDHpost	<input type="text"/>
頭蓋内圧post	<input type="text"/>	CKpost	<input type="text"/>
脳灌流圧post	<input type="text"/>	BUNpost	<input type="text"/>
吸入酸素濃度post	<input type="text"/>	Crepost	<input type="text"/>
動脈血酸素分圧post	<input type="text"/>	Na <sup>+</sup> post	<input type="text"/>
動脈血二酸化炭素分圧post	<input type="text"/>	K <sup>+</sup> post	<input type="text"/>
動脈血pHpost	<input type="text"/>	Cl <sup>-</sup> post	<input type="text"/>
動脈血酸素飽和度post	<input type="text"/>	Ca <sup>2+</sup> post	<input type="text"/>
内頸静脈血酸素飽和度post	<input type="text"/>	Mg <sup>2+</sup> post	<input type="text"/>
心拍出量post	<input type="text"/>	BSpost	<input type="text"/>
中心静脈圧post	<input type="text"/>	APTTpost	<input type="text"/>
肺動脈楔入圧post	<input type="text"/>	PTpost	<input type="text"/>
心係数post	<input type="text"/>	FIBpost	<input type="text"/>
全身末梢血管抵抗post	<input type="text"/>	FDPpost	<input type="text"/>
全身末梢血管抵抗係数post	<input type="text"/>	DDpost	<input type="text"/>
混合静脈血酸素飽和度post	<input type="text"/>	ATpost	<input type="text"/>
ヘモグロビンpost	<input type="text"/>		
酸素供給量post	<input type="text"/>	GCS1w	<input type="text"/>
酸素消費量post	<input type="text"/>	GCS30	<input type="text"/>
酸素摂取率post	<input type="text"/>	評価日1w	<input type="text"/>
		評価日30	<input type="text"/>
ECG不整脈post	<input type="text"/>		
HRpost	<input type="text"/>	評価日1	<input type="text"/>
ECGその他post	<input type="text"/>	評価日2	<input type="text"/>
尿潜血post	<input type="text"/>	GOS1	<input type="text"/>
尿糖post	<input type="text"/>	GOS2	<input type="text"/>
尿蛋白post	<input type="text"/>		
尿ウロビリpost	<input type="text"/>		



合併症発生日

合併症

合併症報告

有害事象発生日

重篤有害事象

TF発生日

TF処置

中止または脱落日

脱落原因事象

脱落詳細

## IV. 重篤な有害事象報告書

## 重篤な有害事象報告書(提出用)

### 重篤な有害事象の定義

概ね 1 ヶ月以内に被験者に当該傷病(頭部外傷)に起因する事象以外で新たに発現、あるいは増悪した病態などで臨床上好ましくないもののうち、以下のものをいう。

- a. 死に至るもの(死亡)
- b. 生命を脅かすもの(死亡につながる恐れのあるもの)
- c. 治療のため入院期間が著明に延長するもの
- d. 永続的に顕著な障害・機能不全に陥るもの(障害)

医療機関名  科名  報告者   
イニシャル 姓  名  性別  男  女  生年月日   
カルテ番号  症例登録番号  割付

有害事象発現日  有害事象の分類(上記から選択)  a  b  c  d  
事務局への連絡  済  未  プロトコルからの離脱  有  無

### 重篤な有害事象の内容

### 処置および転帰

重篤な有害事象が発生した場合には、メールか電話、FAXのいずれかの手段を用いて、速やかに事務局までご連絡ください。その後、本報告書を作成して下さい。

報告先: 山口大学救急医学。

e-MAIL: [tmaekawa@yamaguchi-u.ac.jp](mailto:tmaekawa@yamaguchi-u.ac.jp)

TEL: 0836-22-2343 または 0836-22-2773 FAX: 0836-22-2344

## V. 倫理委員会申請資料

(配付の CD-ROM に収録)

- ・ 倫理委員会向け説明文書
- ・ 研究デザインとプロトコールの骨子
- ・ 患者向け説明文書
- ・ 同意書

平成 14 年度厚生労働科学研究費補助金（医療技術評価総合研究事業）

「超急性期軽度低体温療法による重症脳障害患者の予後改善戦略と医療費評価」—多施設無作為対照臨床研究

本研究は、平成 14 年度厚生労働科学研究費補助金（医療技術評価総合研究事業）を受けて、受傷 6 時間以内の重症頭部外傷に対する軽度低体温療法の効果を多施設無作為対照臨床研究（RCT）として検討するもので、全国で 37 施設の参加を予定しています。本試験の研究計画は、「超急性期軽度低体温療法による重症脳障害患者の予後改善戦略と医療費評価」班会議の中でこれまでに得られている知見を整理し、現時点で最も適切と考えられる軽微あるいは軽度低体温療法の手技や手順を検討し、研究計画全体に関して研究参加者のコンセンサスを得て実施されるものです。

重症頭部外傷は、交通事故や転落・墜落などの事故によって生じる事が多く、若年者から高齢者に至る広範な年齢層の人達に致死性的あるいは重篤な神経学的後遺症をもたらしてきました。突然の事故による頭部外傷は多くの国民の健康を脅かし、介護など社会的・経済的負担をもたらす大きな原因となっています。従って、重症頭部外傷による神経損傷を可及的に減じて新たな治療法を開発することが重要な課題となっています。頭部外傷に伴う神経損傷を減ずるには急性期に介入することが最も効果的です。本研究に参加した施設は、いずれも救急医療の最前線で診療しており、重症頭部外傷の急性期に介入できる施設です。しかしながら、決定的な急性期治療は未だ確立されていません。その中で、軽度低体温療法が最も効果的なものと期待されています。

軽度低体温療法の効果については基礎（動物）実験で証明されており、臨床への応用が始まっていますが、実験動物と人間の違いを配慮した治療法の検討がなされておらず、新たなプロトコルで EBM に基づく有効な治療法を確立する必要があります。また、受傷後超急性期（3～6 時間以内）に軽度低体温（32～34℃）療法を開始すれば、患者の予後が著明に改善される可能性があると考えられていますが、未だ質の高いエビデンスはありません。本研究に参加している多くの施設において、本治療法を重症頭部外傷例に適応し、良好な結果が得られていることが報告されていますが、大規模ランダム化比較試験でないため、そのエビデンスは低いレベルとなっています。本治療法を多施設・無作為・対照・臨床研究（RCT）で実施し、軽度低体温療法の利益を最大に引き出し、危険性を最小に抑えるとともに、新しい治療法を確立して国民の保健に資することが重要です。本治療法は初期には集中治療の必要性等により医療費が高額となりますが、長期的・総合的に従来の治療法と比較すれば、本治療法の方が安くなり、費用効果効率も優れているとの研究報告もあります。また、本治療法を EBM として確立して諸外国に発信できれば、日本の臨床研究の評価も得られ、

今後創薬等でも日本のデータの信頼性が高まり、益することが多いと思われま  
す。本研究では、現在得られるエビデンスを整理して軽度低体温療法の最適な  
手順を定め、ランダム化比較試験を実施し、軽度低体温療法の有用性を検証し  
ます。それを通じて質の高いエビデンスを生み出し、軽度低体温療法に関する  
妥当な治療指針を導き出すことを目指しています。

本研究では、受傷 6 時間以内に軽微あるいは軽度低体温療法が可能な重症頭  
部外傷を対象として、多施設無作為対照臨床研究で検討します。対象選択基準  
や手技については班会議の中で現状を踏まえた上で最適化されたものです。対  
象患者は割付けセンターへの登録 (UMIN 使用) とともにランダムに軽度低体温  
群と対照軽微低体温群に振り分けられます。この際患者に関するデータは強度  
な暗号通信モード (128 ビット専用モード) で扱われます。両群ともに患者来院  
時から積極的な体温管理を行い、頭部外傷時に有害であるとされる体温上昇を  
抑制することを前提としています。その後、可及的に軽度低体温群では内頸静  
脈血液温を 32~34℃に、対照軽微低体温群では 35.5~37.0℃にコントロールし  
ます。介入前および介入後の一定期間、神経学的モニター、循環モニター、神  
経学的スコアなどを追跡します。機能予後評価は治療の割付けを知らされてい  
ない熟練した評価者が行います。試験の完了後、エンドポイントに関して 2 群  
を比較し、安全性と有効性に関して検討します。なお、被験者の治療にあつ  
て、試験期間中、鎮静薬や鎮痛薬などの使用にあつては制限されますが、そ  
れ以外の本邦で承認をうけている標準的治療法はいずれの治療群でも全く制限  
されません。

試験の進行状況は種々の通信手段でモニターし、また班会議などを通じてフ  
ィードバックすることになっています。試験はヘルシンキ宣言に基づき Good  
Clinical Practice (GCP) に準拠して実施します。倫理面に関しては班会議で十  
分検討されたものです。各施設においては本研究に関し臨床治験委員会、倫理  
委員会等で討議を経る事を必須としています。試験の安全性に関わることに  
ついて試験参加者とは独立した独立モニタリング委員会が監視し、試験中に安全  
性に関わる問題が生じたと判断した場合には班会議に対して試験計画の変更や  
中止を含めて要求できるようにしています。被験者 (あるいは代諾者) には書  
面によるインフォームドコンセントを得ます。急性期の軽度低体温療法は発症  
後 3~6 時間以内に可及的に治療を開始しなければならず、来院から治療開始  
までわずかな時間しか残されていないので、インフォームドコンセントも急  
性期の時間との戦いの中で行わなければなりません。救急外来受診後検査を進  
めながら、診断・治療と同時進行し、インフォームドコンセントを得ることが  
必要です。しかし、重症頭部外傷患者では意識状態が悪くて本人の同意はえら  
れず、この短時間に御家族あるいは代諾者と連絡をとることができない場合に  
は、米国でも同様の状況下でとられる方法としての “Waiver of consent” に則  
り、本臨床研究を開始することがあり得ます。この場合、後で御家族あるいは  
代諾者のインフォームドコンセントを得ることになります。

超急性期軽度低体温療法による重症脳障害患者の予後改善戦略と医療費評価  
 —多施設無作為対照臨床研究—

研究デザインとプロトコルの骨子

1. 背景	前述
2. 目的	重症頭部外傷患者に対する軽度低体温療法(脳低温療法)の有用性と適正な患者管理方法について、積極的に体温上昇を抑制する軽微低体温療法を対照として、多施設無作為対照臨床研究 (RCT) で検証する。また本治療法の医療経済上の利点を検証する。
3. 対象	重症頭部外傷患者 (グラスゴー・コーマ・スケール、 $4 \leq \text{GCS} \leq 8$ )
A. 選択基準	<p>(1) 頭部外傷症例で、初診時のグラスゴー・コーマ・スケール、<math>4 \leq \text{GCS} \leq 8</math> の患者。(受傷後 5 時間以内にこの適応となった場合も含む)</p> <p>(2) 受傷時刻が特定可能で 6 時間以内に軽度低体温療法あるいは軽微低体温療法が可能な患者。(軽度低体温療法群では 6 時間以内に <math>35.5^{\circ}\text{C}</math> まで体温を下げることを必要条件とする。)</p> <p>(3) 年齢 15 歳以上、70 歳未満。</p> <p>(4) 性別は問わない。</p> <p>(5) 家族または代諾者から文書での同意取得が可能な患者または、“Waiver of consent” policy を満たす患者</p>
B. 除外基準	<p>1) 全身性のもの</p> <p>(1) 出血性ショックなど、他部位の損傷により収縮期血圧が 90 mmHg 以上に保てない場合。</p> <p>(1) 導入前の血小板数が <math>50,000 /\text{mm}^3</math> 未満の場合。</p> <p>(2) 軽度低体温療法に耐えられないと判断される重篤な肝疾患を持つ患者。</p> <p>(3) 軽度低体温療法に耐えられないと判断される重篤な心不全を持つ患者。</p> <p>(4) 軽度低体温療法に耐えられないと判断される重篤な不整脈を持つ患者。</p> <p>(5) 急性心筋梗塞の所見がある患者。</p> <p>(6) 妊娠または妊娠の疑いがある患者。</p> <p>(7) 泥酔状態にある患者。</p> <p>2) 頭部外傷に関連するもの</p> <p>(9) 開放性脳損傷 (重症例) 患者。</p> <p>(10) 急性硬膜外血腫等で手術により予後良好と予測できる患者。</p> <p>3) その他</p> <p>(11) 家族または代諾者が本研究への参加を拒否した場合。</p> <p>(12) その他、主治医が不適格と判断した患者。</p>

C. 来院時 低体温症 例の扱い	<p>(1) 30.0℃ (深部温) 未満の症例は除外する。</p> <p>(2) 30.0℃以上の症例は pre-registration を行う。 35.5℃を目標に復温を開始し、インフォームドコンセントを得る。</p> <p>(3) Registration 後、軽度低体温群に割り振られれば可及的に管理指針に従って 32.0~34.0℃に維持する。</p> <p>(4) 対照軽微低体温群に割り振られれば可及的に管理指針に従って 35.5~37.0℃に復温し、維持する。</p>
4. 臨床研 究デザイ ン	多施設、無作為、対照、臨床研究。
5. 症例の 登録と割 付け	<p>登録・ランダム化は、UMIN (大学病院医療情報ネットワーク) のインターネット医学研究データセンターのバックアップを受けて、24時間体制のオンラインで行う。選択基準を満たし、除外基準のいずれにも該当しない対象候補患者が入院した場合、直ちに患者のイニシアル、性別、生年月日、GCS をもって pre-registration を行う。UMIN より仮の症例登録番号が配布される。その後、高体温をきたさないよう積極的に体温管理しながらインフォームドコンセントを得るように努力する。インフォームドコンセントが得られた時点で registration を行う。受傷後 2 時間以内に家族または代諾者と連絡がとれなかった場合には waiver of consent policy を採用して registration を行う。治療群の割付けは、対象例をランダムに年齢、施設、重症度 (GCS)、性別に関して最小化法で 2 群の平衡をとりながら行う。</p>
6. 体温管 理手技	最低 72 時間は内頸静脈血温度を、対照軽微低体温療法群は 35.5~37.0℃、軽度低体温群は 32~34℃に置く。
A. 導入期	<p>(1) Pre-registration 後、35.5℃を目標に体温管理を行う。</p> <p>(2) Registration 後できるだけ早期から麻酔下に全身冷却を開始する。</p> <p>(3) 鎮静・鎮痛薬の使用は割付けにしたがって、規定の用法・用量にて行う。</p> <p>(4) 脳温測定法は、原則として内頸静脈血液温 (全例必須) を基準にし、これを脳温の代用とする。内頸静脈カテーテルを挿入できなかった場合には、深部温 (膀胱温など) で代用する。</p> <p>(5) 指定された神経学的モニター、循環モニター、酸素代謝モニター、生化学モニターの下に適切な患者管理を行う。</p>



B. 維持期	<p>(1) 受傷日を day 0 として day 3 (最低 72 時間) までは規定の体温を維持する。必要に応じて軽度低体温期間を延長してもよい。</p> <p>(2) 神経学的モニター、循環モニター、酸素代謝モニター、生化学モニターの下、一定の基準を満たすように患者管理を行う。</p>
C. 復温期/ その他	<p>(1) Day4 から 0.1~1℃/日の割合で復温を開始する(0.1℃/時間以下の速度)。</p> <p>(2) 内頸静脈血液温度が 35℃以上の状態で筋弛緩薬 (ベクロニウム、パンクロニウム) を中止する。</p>
D. 終了時	<p>(1) 脳圧・全身状態・画像をもとに、36℃以上で安定した時点で麻酔薬を中止する。</p> <p>(2) Day 7 までは 37℃までの常温を維持し、38℃以上の高体温を避ける。</p>
E. その他	<p>(1) 脳圧管理を目的としてプロトコルを逸脱した場合には treatment failure としてその旨を報告し、データ収集を規定の期間継続する。この場合、現在行い得る全ての治療法を選択できる。</p>
7. 患者管理規定と他の治療	<p>(1) 対象患者は ICU 等において治療する。</p> <p>(2) 本プロトコルに記載した以外の治療については手術療法を含め日本神経外傷学会の頭部外傷治療ガイドラインに従う。</p> <p>(3) 本邦で許可されている全ての治療法を行うことができる。ただし、バルビタールの持続投与とステロイドの反復投与を禁止する。また各群に割付けられた麻酔法に関しては復温が得られるまでの期間中に原則として指定された以外の鎮静薬・鎮痛薬を用いない。</p> <p>(4) Treatment failure となった場合には、バルビタールの持続投与を含めた本邦で許可されている全ての治療法を行うことができる。</p> <p>(5) 他の臨床試験、試験的療法は禁止する。</p> <p>(6) 軽度低体温療法に伴う副作用や合併症に対しては、適切な治療を行う。</p>
8. 評価	<p>(1) ランダム化前の評価、および療法中、療法終了までの評価は療法関係者が行う。その後の定期的評価は訓練された第三者的評価者が行う。</p> <p>(2) 評価・検査のスケジュールは付表 (20 頁) に記す。</p>
9. End point	
A. Primary	<p>(1) 機能予後評価 割付け後 3 ヶ月 (± 2 週間) および 6 ヶ月 (± 2 週間) の状</p>

End Point	<p>態をグラスゴー・アウトカム・スケール (GOS) で評価する。 また、高次脳機能評価も6ヶ月(±2週間)で行う。</p> <p>(2) 医療経済評価 当該年度終了後または目標症例数終了後に本法の医療経済評価を適当数行う。</p>
B. Secondary End Point	<p>(1) 軽度低体温療法あるいは軽微低体温療法中の各種機能検査結果。</p> <p>(2) 軽度低体温療法あるいは軽微低体温療法中の各種生化学検査結果。</p> <p>(3) 割付け後3ヶ月以内の死亡。</p> <p>(4) 割付け後1週間(±1日)、30日(±5日)のGCS。</p> <p>(5) Treatment failure。</p> <p>(6) その他の有害事象。</p>
10. 中止 または 脱落	<p>(1) 被験者またはその代諾者から中止の申し出があったとき。</p> <p>(2) 死亡したとき。</p> <p>(3) 重篤な有害事象の発現、合併症の悪化などにより試験の継続が困難と判断されたとき。</p> <p>(4) 登録後に対象として不適格であることが判明したとき。</p> <p>(5) 重大な研究計画書違反が明らかとなったとき。</p>
11. 目標 症例数	初年度100例、次年度150例、最終年度50例を目標とし、計300症例とする。
12. 研究 期間	3年間を予定。
13. 統計 解析	データ解析委員会により行う。
14. イン フォーム ドコンセ ント	家族または代諾者から研究の被験者となることの文書による同意を取得する。
15. 被験 者の安全 を確保す るための 事項	<p><u>重篤な有害事象の定義</u> 概ね1ヶ月以内に被験者に当該傷病(頭部外傷)に起因する事象以外で新たに発現、あるいは増悪した病態などで臨床上好ましくないものうち、以下のものをいう。</p> <p>a. 死に至るもの(死亡)</p> <p>b. 生命を脅かすもの(死亡につながる恐れのあるもの)</p> <p>c. 治療のため入院期間が著明に延長するもの</p> <p>d. 永続的に顕著な障害・機能不全に陥るもの(障害)</p> <p><u>対処法</u> 重篤な有害事象が発生した場合には本臨床研究における手技との因果関係に関わらず、速やかに処置を講じ、被験者の安全確保を行う。被験者</p>

	<p>を鑑別し得る情報、事象名、発現日、重篤性、処置などについて事務局へ直ちに連絡する。当該研究者は当該有害事象が独立モニタリング委員会への緊急報告の対象となると判断した場合には、直ちにこれを報告する。また、主任研究者または分担研究者は必要に応じて他の実施医療機関と各研究者へその詳細および注意事項を連絡するとともに、研究継続の可否と研究実施計画書の変更の要否を判断し、必要な処置を講じる。主治医は伝えるべきと判断した副作用などについて被験者または代諾者へ情報を提供し、各研究者は被験者または代諾者が本研究に継続して参加する意思があるかどうかを確認する。</p>
16. 中間解析	<p>データ解析委員会は、半年（あるいは 50 例の集積）ごとに研究の進行状況を分析し、中間解析を行い、安全性に関する解析結果を独立モニタリング委員会に報告する。独立モニタリング委員会は、これに基づき、研究班に研究計画書の変更、研究の継続・中止・中断を提言することができる。</p> <p>中間解析において得られる結果に基づいた研究の中止基準は、安全性（死亡率）に関しては <math>p &lt; 0.05</math>、有効性に関しては <math>p &lt; 0.05/4 = 0.0125</math> とする。中間解析は班会議のつど研究班に報告し承認を受ける。</p>
17. 研究の質の保証	<p>研究参加施設に対し、内頸静脈酸素飽和度連続モニター、Swan-Gantz カテーテル連続モニター、記録ソフト、コンピューターを貸し出すことによって、患者の生体機能を連続して記録する。記録はプロトコール遵守監視委員会に提出しなければならない。同委員会は、報告書の内容と記録を評価し、誤りや矛盾点等を検討する。</p> <p>報告された症例のなかからランダムに抽出した症例に対し、施設訪問を行い、報告を求める。</p>
18. 研究計画書の改訂	<p>研究班で討議した後、主任研究者は企画委員会の議を経て、研究計画書の改訂を行うことができる。</p>
19. 研究全体の中止	<p>独立モニタリング委員会から勧告を受けた場合、その他研究の続行に関して重大な支障が生じたとの動議が提出された場合、主任研究者は班員を招集し緊急班会議を開催しなければならない。班での討議の結果により、主任研究者は研究全体を中止することができる。</p>

## 超急性期重症脳障害患者に対する軽度低体温療法の評価に関する 全国共同研究の説明

1. 当院では質の高い種々の医療を患者様に提供し、加えて、病気の治療法の効果についての検討も行っています。
2. 今回、ご家族が緊急入院されました。直ちに行った頭部の断層撮影検査（CT）で、重症の頭部外傷である事が判明いたしました。
3. 脳が損傷を受けますと、重症の場合には損傷を受けた部分だけでなく、健康であった部分にも影響が及び、脳全体がだめになってしまうことがあります。重症の場合には通常、体温が上昇し40℃を越えることもあります。そうなりますと、生命に危険性がおよぶとともに、助かったとしても麻痺や言葉の障害、意識がもどらないなどの後遺症が残ります。そのため、体温の異常な上昇を防ぐことが非常に大切です。
4. しかしながら、重症の頭部外傷の場合、現時点では、脳全体を回復させる完璧な治療法はありません。
5. 頭部外傷を負ってから数時間以内であれば、脳の温度を 32.0～34.0℃ぐらまで少し下げることによって、脳全体を保護できるということがわかってきました。これを「軽度低体温療法」または「脳低温療法」と呼んでおり、脳の障害を阻止して、麻痺や言葉の障害、意識がもどらないなどの後遺症を残さないようにするための新しい治療法として注目されています。
6. しかし、この治療法によって劇的に状態が改善し社会復帰できる例がある反面、体温を下げることによる全身への悪影響により、むしろ症状が悪化したり死亡する場合があることもわかっています。