

(1)性・年代別

N. :「非常に重い」の割合
 T.N.:「重い+非常に重い」の割合
 T.P.:「症状なし+軽い」の割合

○:95%水準で有意差あり
 ×:95%水準で有意差なし

男性

	年	■非常に重い ■重い □やや重い □軽い □症状なし					重い計	検定結果		
		N.	T.N.	T.P.	N.	T.N.		T.P.		
水っばな	2004年	3.0	8.0	24.0	44.0	21.0	35.0	×	○	○
	2003年	7.0	19.0	25.0	37.0	12.0	51.0			
くしゃみ	2004年	2.0	9.0	18.0	50.0	21.0	29.0	×	○	○
	2003年	6.0	21.0	23.0	35.0	15.0	50.0			
鼻づまり	2004年	5.0	11.0	20.0	38.0	26.0	36.0	×	○	○
	2003年	6.0	22.0	27.0	28.0	17.0	55.0			
鼻のかゆみ	2004年	2.0	10.0	12.0	30.0	46.0	24.0	×	×	×
	2003年	4.0	14.0	12.0	38.0	32.0	30.0			
目のかゆみ	2004年	11.0	9.0	25.0	32.0	23.0	45.0	×	○	○
	2003年	17.0	20.0	26.0	23.0	14.0	63.0			
涙目	2004年	2.0	8.0	22.0	29.0	39.0	32.0	×	×	×
	2003年	6.0	12.0	20.0	37.0	25.0	38.0			

女性

	年	■非常に重い ■重い □やや重い □軽い □症状なし					重い計	検定結果		
		N.	T.N.	T.P.	N.	T.N.		T.P.		
水っばな	2004年	1.0	10.0	16.0	52.0	21.0	27.0	○	×	○
	2003年	7.0	10.0	27.0	45.0	11.0	44.0			
くしゃみ	2004年	3.0	13.0	17.0	52.0	15.0	33.0	×	×	○
	2003年	8.0	14.0	31.0	37.0	10.0	53.0			
鼻づまり	2004年	2.0	14.0	16.0	31.0	37.0	32.0	×	×	×
	2003年	5.0	16.0	23.0	41.0	15.0	44.0			
鼻のかゆみ	2004年	1.0	17.0	17.0	33.0	32.0	35.0	×	×	×
	2003年	4.0	12.0	23.0	35.0	26.0	39.0			
目のかゆみ	2004年	8.0	22.0	20.0	29.0	21.0	50.0	×	×	×
	2003年	8.0	21.0	25.0	35.0	11.0	54.0			
涙目	2004年	3.0	18.0	12.0	35.0	32.0	33.0	×	×	×
	2003年	3.0	10.0	21.0	40.0	26.0	34.0			

10代

N:「非常に重い」の割合
 T.N:「重い+非常に重い」の割合
 T.P:「症状なし+軽い」の割合
 O:95%水準で有意差あり
 X:95%水準で有意差なし

(%)

	年	■非常に重い ■重い □やや重い □軽い □症状なし					重い計	検定結果		
		非常に重い	重い	やや重い	軽い	症状なし		N	T.N	T.P
水っぱな	2004年	5.0	12.5	27.5	32.5	22.5	45.0	X	X	X
	2003年	10.0	20.0	22.5	32.5	15.0	52.5			
くしゃみ	2004年	5.0	20.0	25.0	37.5	12.5	50.0	X	X	X
	2003年	15.0	20.0	25.0	37.5	2.5	60.0			
鼻づまり	2004年	7.5	22.5	17.5	35.0	17.5	47.5	X	X	X
	2003年	15.0	22.5	25.0	25.0	12.5	62.5			
鼻のかゆみ	2004年	2.5	20.0	17.5	25.0	35.0	40.0	X	X	X
	2003年	7.5	17.5	20.0	30.0	25.0	45.0			
目のかゆみ	2004年	27.5	17.5	12.5	25.0	17.5	57.5	X	X	X
	2003年	15.0	25.0	20.0	25.0	15.0	60.0			
涙目	2004年	2.5	20.0	25.0	25.0	27.5	47.5	X	X	X
	2003年	2.5	12.5	12.5	47.5	25.0	27.5			

20代


(%)

	年	■非常に重い ■重い □やや重い □軽い □症状なし					重い計	検定結果		
		非常に重い	重い	やや重い	軽い	症状なし		N	T.N	T.P
水っぱな	2004年	2.5	7.5	25.0	45.0	20.0	35.0	X	X	X
	2003年	10.0	15.0	22.5	37.5	15.0	47.5			
くしゃみ	2004年	5.0	10.0	17.5	47.5	20.0	32.5	X	X	O
	2003年	7.5	10.0	37.5	32.5	12.5	55.0			
鼻づまり	2004年	7.5	12.5	22.5	22.5	35.0	42.5	X	X	X
	2003年	10.0	20.0	27.5	25.0	17.5	57.5			
鼻のかゆみ	2004年	2.5	25.0	7.5	22.5	42.5	35.0	X	X	X
	2003年	5.0	15.0	25.0	22.5	32.5	45.0			
目のかゆみ	2004年	5.0	25.0	27.5	22.5	20.0	57.5	X	X	X
	2003年	15.0	15.0	32.5	20.0	17.5	62.5			
涙目	2004年	12.5	25.0	27.5	35.0		37.5	X	X	X
	2003年	2.5	5.0	20.0	40.0	32.5	27.5			


30代

N.:「非常に重い」の割合
 T.N.:「重い+非常に重い」の割合
 T.P.:「症状なし+軽い」の割合

○:95%水準で有意差あり
 ×:95%水準で有意差なし



40代



50代以上


N. :「非常に重い」の割合
 T.N. :「重い+非常に重い」の割合
 T.P. :「症状なし+軽い」の割合

○ : 95%水準で有意差あり
 × : 95%水準で有意差なし

(%)


		■非常に重い □重い □やや重い □軽い □症状なし					重い計	検定結果		
		N.	T.N.	T.P.	N.	T.N.		T.P.		
水っぱな	2004年	10.0	15.0	57.5	17.5	25.0	○	×	×	
	2003年	10.0	15.0	17.5	52.5	5.0	42.5			
くしゃみ	2004年	12.5	7.5	50.0	30.0	20.0	×	×	○	
	2003年	7.5	22.5	15.0	35.0	20.0	45.0			
鼻づまり	2004年	5.0	17.5	35.0	40.0	25.0	×	×	×	
	2003年	2.5	15.0	22.5	40.0	20.0	40.0			
鼻のかゆみ	2004年	7.5	15.0	40.0	37.5	22.5	×	×	×	
	2003年	5.0	10.0	10.0	40.0	35.0	25.0			
目のかゆみ	2004年	5.0	10.0	22.5	30.0	32.5	×	×	×	
	2003年	7.5	22.5	25.0	32.5	12.5	55.0			
涙目	2004年	2.5	15.0	10.0	30.0	42.5	27.5	×	×	
	2003年	5.0	22.5	22.5	30.0	20.0	50.0		○	

(2)総括状態別



■今年(2004年)と昨年(2003年)との比較

(%)



Ⅱ. 精神的症状（QOL）について

(1)性・年代別

男性

N:「とてもひどい」の割合
 T.N:「ひどい+とてもひどい」の割合
 T.P:「支障なし+軽い」の割合

○:95%水準で有意差あり
 ×:95%水準で有意差なし

(%)

							ひどい計	検定結果		
		N	T.N	T.P						
勉強・仕事・家事の支障(さしさわり)	2004年	4.0	21.0	42.0	33.0	25.0	○	○	○	
	2003年	5.0	11.0	28.0	40.0	16.0	44.0			
精神集中不良	2004年	1.0	11.0	15.0	34.0	39.0	27.0	×	×	○
	2003年	4.0	12.0	34.0	35.0	15.0	50.0			
思考力の低下(考えがまとまらない)	2004年	1.0	6.0	12.0	35.0	46.0	19.0	×	×	○
	2003年	2.0	11.0	26.0	32.0	29.0	39.0			
新聞や読書の支障(不便)	2004年	2.0	4.0	11.0	33.0	50.0	17.0	×	×	×
	2003年	3.0	6.0	18.0	41.0	32.0	27.0			
記憶力低下(ものおぼえが悪い)	2004年	2.0	5.0	28.0	65.0	7.0	×	×	○	
	2003年	1.0	4.0	11.0	32.0	52.0	16.0			
スポーツ、ピクニックなど野外生活の支障	2004年	4.0	12.0	25.0	59.0	16.0	○	○	○	
	2003年	4.0	15.0	22.0	28.0	31.0	41.0			
外出の支障(控えがち)	2004年	1.0	6.0	28.0	63.0	9.0	×	○	○	
	2003年	2.0	14.0	16.0	26.0	42.0	32.0			
人とつき合いの支障(控えがち)	2004年	3.0	5.0	25.0	67.0	8.0	×	×	○	
	2003年	1.0	7.0	10.0	32.0	50.0	18.0			
他人と会話・電話の支障(さしさわり)	2004年	3.0	10.0	30.0	57.0	13.0	×	×	○	
	2003年	2.0	6.0	18.0	42.0	32.0	26.0			
まわりの人が気になる	2004年	4.0	9.0	22.0	64.0	14.0	○	×	×	
	2003年	1.0	8.0	16.0	30.0	46.0	24.0			
睡眠障害(眠りが良くない)	2004年	3.0	4.0	12.0	23.0	58.0	19.0	×	×	×
	2003年	4.0	10.0	16.0	26.0	44.0	30.0			
倦怠感(だるい)	2004年	3.0	3.0	23.0	34.0	37.0	29.0	×	×	×
	2003年	4.0	10.0	25.0	34.0	27.0	39.0			
疲労(つかれやすい)	2004年	1.0	6.0	23.0	39.0	31.0	30.0	×	×	×
	2003年	4.0	6.0	27.0	36.0	27.0	37.0			
気分が晴れない	2004年	4.0	9.0	16.0	37.0	34.0	29.0	×	×	○
	2003年	5.0	12.0	33.0	31.0	19.0	50.0			
いらいら感	2004年	6.0	8.0	15.0	35.0	36.0	29.0	×	×	×
	2003年	6.0	12.0	23.0	26.0	33.0	41.0			
ゆううつ	2004年	5.0	6.0	15.0	30.0	44.0	26.0	×	×	○
	2003年	5.0	9.0	27.0	23.0	36.0	41.0			
生活に不満足	2004年	5.0	4.0	13.0	23.0	55.0	22.0	×	×	○
	2003年	4.0	12.0	20.0	26.0	38.0	36.0			

女性

N. :「とてもひどい」の割合
 T.N. :「ひどい+とてもひどい」の割合
 T.P. :「支障なし+軽い」の割合

○ :95%水準で有意差あり
 × :95%水準で有意差なし

(%)

							ひどい計	検定結果		
		N.	T.N.	T.P.	N.	T.N.		T.P.		
勉強・仕事・家事の支障(さしさわり)	2004年	2.0	9.0	11.0	42.0	36.0	22.0	×	×	○
	2003年	4.0	9.0	25.0	39.0	23.0	38.0			
精神集中不良	2004年	3.0	11.0	15.0	32.0	39.0	29.0	×	×	×
	2003年	4.0	10.0	25.0	41.0	20.0	39.0			
思考力の低下(考えがまとまらない)	2004年	4.0	7.0	18.0	27.0	44.0	29.0	×	×	×
	2003年	2.0	9.0	20.0	36.0	33.0	31.0			
新聞や読書の支障(不便)	2004年	2.0	8.0	9.0	32.0	49.0	19.0	×	×	×
	2003年	1.0	7.0	16.0	33.0	43.0	24.0			
記憶力低下(ものおぼえが悪い)	2004年	2.0	5.0	10.0	20.0	63.0	17.0	×	×	×
	2003年	4.0	5.0	12.0	37.0	42.0	21.0			
スポーツ、ピクニックなど野外生活の支障	2004年	5.0	7.0	7.0	25.0	56.0	19.0	×	○	○
	2003年	8.0	15.0	22.0	27.0	28.0	45.0			
外出の支障(控えがち)	2004年	8.0	8.0	8.0	24.0	52.0	24.0	×	×	×
	2003年	5.0	10.0	18.0	25.0	42.0	33.0			
人とつき合いの支障(控えがち)	2004年	8.0	4.0	3.0	22.0	65.0	13.0	×	×	×
	2003年	3.0	4.0	13.0	30.0	50.0	20.0			
他人と会話・電話の支障(さしさわり)	2004年	1.0	6.0	10.0	27.0	56.0	17.0	×	×	×
	2003年	1.0	6.0	9.0	36.0	48.0	16.0			
まわりの人が気になる	2004年	2.0	5.0	11.0	23.0	59.0	18.0	×	×	×
	2003年	1.0	3.0	14.0	38.0	44.0	18.0			
睡眠障害(眠りが良くない)	2004年	2.0	8.0	13.0	25.0	52.0	23.0	×	×	×
	2003年	7.0	8.0	16.0	32.0	37.0	31.0			
倦怠感(だるい)	2004年	2.0	8.0	21.0	29.0	40.0	31.0	×	×	×
	2003年	4.0	14.0	19.0	36.0	27.0	37.0			
疲労(つかれやすい)	2004年	3.0	12.0	18.0	33.0	34.0	33.0	×	×	×
	2003年	4.0	20.0	15.0	36.0	25.0	39.0			
気分が晴れない	2004年	6.0	8.0	16.0	34.0	36.0	30.0	×	×	○
	2003年	6.0	18.0	22.0	31.0	23.0	46.0			
いらいら感	2004年	4.0	13.0	14.0	28.0	41.0	31.0	×	×	×
	2003年	6.0	9.0	19.0	29.0	37.0	34.0			
ゆううつ	2004年	3.0	10.0	13.0	33.0	41.0	26.0	×	×	○
	2003年	5.0	14.0	23.0	29.0	29.0	42.0			
生活に不満足	2004年	1.0	7.0	14.0	26.0	52.0	22.0	○	×	×
	2003年	7.0	10.0	12.0	33.0	38.0	29.0			

10代

N. :「とてもひどい」の割合
 T.N. :「ひどい+とてもひどい」の割合
 T.P. :「支障なし+軽い」の割合
 ○ :95%水準で有意差あり
 × :95%水準で有意差なし

(%)

							ひどい 計	検定結果		
		N.	T.N.	T.P.	N.	T.N.		T.P.		
勉強・仕事・ 家事の支障 (さしさわり)	2004年	5.0	25.0	30.0	40.0		30.0	×	×	×
	2003年	2.5	7.5	22.5	37.5	30.0	32.5			
精神集中不良	2004年	2.5	12.5	17.5	22.5	45.0	32.5	×	×	×
	2003年	2.5	15.0	27.5	27.5	27.5	45.0			
思考力の低下 (考えが まとまらない)	2004年	2.5	7.5	7.5	30.0	52.5	17.5	×	×	×
	2003年	10.0	12.5	27.5	50.0		22.5			
新聞や読書の 支障(不便)	2004年	10.0	5.0	32.5	52.5		15.0		×	×
	2003年	5.0	12.5	35.0	47.5		17.5			
記憶力低下 (ものおぼえが 悪い)	2004年	7.5	2.5	12.5	77.5		10.0	×	×	×
	2003年	2.5	7.5	32.5	55.0		12.5			
スポーツ、 ピクニックなど 野外生活の 支障	2004年	5.0	2.5	30.0	62.5		7.5		×	○
	2003年	12.5	25.0	27.5	35.0		37.5			
外出の支障 (控えがち)	2004年	2.5	5.0	17.5	75.0		7.5	×	×	○
	2003年	7.5	5.0	12.5	27.5	47.5	25.0			
人とつき合いの 支障 (控えがち)	2004年	2.5	2.5	20.0	75.0		5.0		×	×
	2003年	10.0	25.0	65.0		10.0				
他人と会話・ 電話の支障 (さしさわり)	2004年	7.5	7.5	25.0	60.0		15.0		×	×
	2003年	2.5	17.5	25.0	55.0		20.0			
まわりの人が 気になる	2004年	5.0	2.5	10.0	7.5	75.0	17.5	×	×	×
	2003年	5.0	2.5	22.5	67.5		10.0			
睡眠障害 (眠りが 良くない)	2004年	7.5	15.0	30.0	47.5		22.5	×	×	×
	2003年	12.5	10.0	12.5	25.0	40.0	35.0			
倦怠感 (だるい)	2004年	5.0	5.0	25.0	32.5	32.5	35.0	×	×	×
	2003年	10.0	20.0	30.0	40.0		30.0			
疲労 (つかれ やすい)	2004年	2.5	7.5	22.5	32.5	35.0	32.5	×	×	×
	2003年	10.0	25.0	27.5	37.5		35.0			
気分が 晴れない	2004年	10.0	10.0	5.0	40.0	35.0	25.0	×	×	×
	2003年	5.0	15.0	25.0	27.5	27.5	45.0			
いらいら感	2004年	15.0	5.0	12.5	25.0	42.5	32.5	○	×	×
	2003年	2.5	15.0	17.5	20.0	45.0	35.0			
ゆううつ	2004年	15.0	2.5	10.0	30.0	42.5	27.5	×	×	×
	2003年	5.0	7.5	17.5	22.5	47.5	30.0			
生活に不満足	2004年	12.5	15.0	15.0	57.5		27.5	×	×	×
	2003年	2.5	17.5	10.0	20.0	50.0	30.0			

20代

N. 「とてもひどい」の割合
 T.N. 「ひどい+とてもひどい」の割合
 T.P. 「支障なし+軽い」の割合

○:95%水準で有意差あり
 ×:95%水準で有意差なし

(%)

	年	困り具合					ひどい計	検定結果		
		とてもひどい	ひどい	ややひどい	軽い	支障なし		N.	T.N.	T.P.
勉強・仕事・家事の支障(さしさわ)	2004年	10.0	20.0	32.5	37.5		30.0	○	×	×
	2003年	10.0	15.0	12.5	40.0	22.5	37.5			
精神集中不良	2004年	2.5	17.5	12.5	35.0	32.5	32.5	×	×	×
	2003年	7.5	15.0	22.5	45.0	10.0	45.0			
思考力の低下(考えがまとまらない)	2004年	5.0	7.5	12.5	37.5	37.5	25.0	×	×	×
	2003年	5.0	12.5	25.0	37.5	20.0	42.5			
新聞や読書の支障(不便)	2004年	10.0	15.0	22.5	52.5		25.0	×	×	×
	2003年	5.0	7.5	10.0	40.0	37.5	22.5			
記憶力低下(ものおぼえが悪い)	2004年	12.5	25.0	62.5		12.5	12.5	×	×	×
	2003年	2.5	5.0	12.5	22.5	57.5	20.0			
スポーツ、ピクニックなど野外生活の支障	2004年	5.0	5.0	12.5	17.5	60.0	22.5	×	×	×
	2003年	10.0	10.0	17.5	22.5	40.0	37.5			
外出の支障(控えがち)	2004年	7.5	5.0	10.0	20.0	57.5	22.5	×	×	×
	2003年	2.5	2.5	17.5	27.5	50.0	22.5			
人とつき合いの支障(控えがち)	2004年	2.5	2.5	20.0	72.5		7.5	×	×	×
	2003年	2.5	7.5	32.5	57.5		10.0			
他人と会話・電話の支障(さしさわ)	2004年	5.0	7.5	35.0	52.5		12.5	×	×	×
	2003年	5.0	5.0	5.0	35.0	50.0	15.0			
まわりの人が気になる	2004年	2.5	10.0	22.5	62.5		15.0	×	×	×
	2003年	2.5	7.5	37.5	52.5		10.0			
睡眠障害(眠りが良くない)	2004年	2.5	7.5	10.0	32.5	47.5	20.0	×	×	×
	2003年	5.0	10.0	12.5	25.0	47.5	27.5			
倦怠感(だるい)	2004年	2.5	7.5	32.5	25.0	32.5	42.5	×	×	×
	2003年	5.0	15.0	20.0	45.0	15.0	40.0			
疲労(つかれやすい)	2004年	2.5	12.5	20.0	40.0	25.0	35.0	×	×	×
	2003年	5.0	12.5	20.0	42.5	20.0	37.5			
気分が晴れない	2004年	2.5	7.5	27.5	25.0	37.5	37.5	×	×	×
	2003年	5.0	17.5	25.0	22.5	30.0	47.5			
いらいら感	2004年	5.0	7.5	22.5	22.5	42.5	35.0	×	×	×
	2003年	10.0	7.5	17.5	25.0	40.0	35.0			
ゆううつ	2004年	2.5	10.0	12.5	27.5	47.5	25.0	×	×	×
	2003年	7.5	12.5	15.0	25.0	40.0	35.0			
生活に不満足	2004年	2.5	2.5	25.0	25.0	45.0	30.0	×	○	×
	2003年	7.5	12.5	7.5	30.0	42.5	27.5			

N. :「とてもひどい」の割合
 T.N. :「ひどい+とてもひどい」の割合
 T.P. :「支障なし+軽い」の割合
 ○:95%水準で有意差あり
 ×:95%水準で有意差なし

	年						ひどい 計	検定結果		
		N.	T.N.	T.P.	N.	T.N.		T.P.		
勉強・仕事・ 家事の支障 (さしさわりの)	2004年	12.5	7.5	57.5	22.5	20.0	×	×	○	
	2003年	5.0	10.0	35.0	32.5	17.5	50.0			
精神集中不良	2004年	5.0	17.5	40.0	37.5	22.5	×	×	○	
	2003年	5.0	7.5	37.5	40.0	10.0	50.0			
思考力の低下 (考えが まとまらない)	2004年	5.0	22.5	20.0	52.5	27.5	×	×	×	
	2003年	2.5	10.0	30.0	37.5	20.0	42.5			
新聞や読書の 支障(不便)	2004年	2.5	7.5	25.0	65.0	10.0		×	×	
	2003年	5.0	17.5	45.0	32.5	22.5				
記憶力低下 (ものおぼえが 悪い)	2004年	5.0	20.0	75.0	5.0	5.0	×	×	○	
	2003年	2.5	5.0	15.0	40.0	37.5	22.5			
スポーツ、 ピクニックなど 野外生活の 支障	2004年	5.0	12.5	17.5	65.0	17.5	×	○	○	
	2003年	7.5	17.5	25.0	25.0	25.0	50.0			
外出の支障 (控えがち)	2004年	2.5	10.0	30.0	57.5	12.5	×	○	○	
	2003年	2.5	12.5	25.0	22.5	37.5	40.0			
人とつき合いの 支障 (控えがち)	2004年	2.5	5.0	20.0	70.0	10.0	×	×	×	
	2003年	2.5	2.5	17.5	32.5	45.0	22.5			
他人と会話・ 電話の支障 (さしさわりの)	2004年	10.0	27.5	62.5	10.0	10.0		×	×	
	2003年	2.5	10.0	62.5	25.0	12.5				
まわりの人が 気になる	2004年	2.5	10.0	25.0	62.5	12.5		×	×	
	2003年	2.5	17.5	35.0	45.0	20.0				
睡眠障害 (眠りが 良くない)	2004年	10.0	10.0	17.5	62.5	20.0	×	×	×	
	2003年	5.0	2.5	27.5	32.5	32.5	35.0			
倦怠感 (だるい)	2004年	2.5	5.0	15.0	35.0	42.5	22.5	×	×	
	2003年	5.0	10.0	27.5	40.0	17.5	42.5			
疲労 (つかれ やすい)	2004年	2.5	12.5	15.0	45.0	25.0	30.0	×	×	
	2003年	5.0	15.0	22.5	42.5	15.0	42.5			
気分が 晴れない	2004年	5.0	2.5	22.5	35.0	35.0	30.0	×	×	
	2003年	5.0	7.5	40.0	32.5	15.0	52.5			
いらいら感	2004年	2.5	12.5	15.0	32.5	37.5	30.0	×	×	
	2003年	5.0	10.0	20.0	40.0	25.0	35.0			
ゆううつ	2004年	2.5	5.0	17.5	27.5	47.5	25.0	×	×	
	2003年	5.0	10.0	32.5	27.5	25.0	47.5			
生活に不満足	2004年	7.5	10.0	27.5	55.0	17.5	×	×	×	
	2003年	5.0	5.0	25.0	27.5	37.5	35.0			

40代

N. :「とてもひどい」の割合
 T.N. :「ひどい+とてもひどい」の割合
 T.P. :「支障なし+軽い」の割合

○ :95%水準で有意差あり
 × :95%水準で有意差なし

(%)


							ひどい 計	検定結果		
		N.	T.N.	T.P.						
勉強・仕事・ 家事の支障 (さしさわ)	2004年	2.5	2.5	12.5	50.0	32.5	17.5	×	×	○
	2003年	2.5	5.0	35.0	47.5	10.0	42.5			
精神集中不良	2004年	7.5	17.5	37.5	37.5		25.0	×	×	×
	2003年	2.5	7.5	32.5	35.0	22.5	42.5			
思考力の低下 (考えが まとまらない)	2004年	5.0	20.0	32.5	42.5		25.0		×	×
	2003年	5.0	27.5	35.0	32.5		32.5			
新聞や読書の 支障(不便)	2004年	2.5	15.0	47.5	35.0		17.5		×	×
	2003年	7.5	27.5	37.5	27.5		35.0			
記憶力低下 (ものおぼえが 悪い)	2004年	5.0	7.5	37.5	50.0		12.5	×	×	×
	2003年	2.5	2.5	12.5	40.0	42.5	17.5			
スポーツ、 ピクニックなど 野外生活の 支障	2004年	2.5	7.5	2.5	37.5	50.0	12.5	×	○	○
	2003年	7.5	22.5	25.0	25.0	20.0	55.0			
外出の支障 (控えがち)	2004年	5.0	10.0	5.0	30.0	50.0	20.0	×	×	×
	2003年	22.5	17.5	32.5	27.5		40.0			
人とつき合いの 支障 (控えがち)	2004年	5.0	5.0	25.0	62.5		12.5	×	×	×
	2003年	12.5	5.0	40.0	42.5		17.5			
他人と会話・ 電話の支障 (さしさわ)	2004年	2.5	2.5	12.5	22.5	60.0	17.5	×	×	×
	2003年	7.5	15.0	40.0	37.5		22.5			
まわりの人が 気になる	2004年	5.0	7.5	32.5	52.5		15.0	×	×	×
	2003年	2.5	30.0	32.5	35.0		32.5			
睡眠障害 (眠りが 良くない)	2004年	2.5	12.5	22.5	62.5		15.0		×	×
	2003年	12.5	15.0	30.0	42.5		27.5			
倦怠感 (だるい)	2004年	2.5	17.5	42.5	37.5		20.0	×	○	×
	2003年	5.0	12.5	22.5	27.5	32.5	40.0			
疲労 (つかれ やすい)	2004年	5.0	22.5	32.5	40.0		27.5	×	×	×
	2003年	5.0	12.5	22.5	32.5	27.5	40.0			
気分が 晴れない	2004年	2.5	10.0	7.5	45.0	35.0	20.0	×	×	○
	2003年	5.0	17.5	20.0	37.5	20.0	42.5			
いらいら感	2004年	10.0	12.5	42.5	35.0		22.5	×	×	×
	2003年	5.0	5.0	27.5	30.0	32.5	37.5			
ゆううつ	2004年	2.5	12.5	40.0	45.0		15.0	×	×	○
	2003年	2.5	10.0	30.0	27.5	30.0	42.5			
生活に不満足	2004年	10.0	7.5	32.5	50.0		17.5	×	×	×
	2003年	2.5	10.0	17.5	37.5	32.5	30.0			

50代以上

N:「とてもひどい」の割合
 T.N:「ひどい+とてもひどい」の割合
 T.P:「支障なし+軽い」の割合
 ○:95%水準で有意差あり
 ×:95%水準で有意差なし


	年	図とてもひどい □ひどい □ややひどい □軽い □支障なし					ひどい計	検定結果		
		N	T.N	T.P	N	T.N		T.P		
勉強・仕事・家事の支障(さしさわ)	2004年	2.5	2.5	15.0	40.0	40.0	20.0	×	×	○
	2003年	2.5	12.5	27.5	40.0	17.5	42.5			
精神集中不良	2004年	5.0	12.5	10.0	30.0	42.5	27.5	×	×	×
	2003年	2.5	10.0	27.5	42.5	17.5	40.0			
思考力の低下(考えがまとまらない)	2004年	5.0	7.5	12.5	35.0	40.0	25.0	×	×	×
	2003年	2.5	12.5	20.0	32.5	32.5	35.0			
新聞や読書の支障(不便)	2004年	10.0	5.0	7.5	35.0	42.5	22.5	×	×	×
	2003年	5.0	7.5	17.5	27.5	42.5	30.0			
記憶力低下(ものおぼえが悪い)	2004年	5.0	5.0	10.0	25.0	55.0	20.0	×	×	×
	2003年	2.5	7.5	10.0	37.5	42.5	20.0			
スポーツ、ピクニックなど野外生活の支障	2004年	5.0	5.0	17.5	22.5	50.0	27.5	×	×	×
	2003年	5.0	12.5	17.5	37.5	27.5	35.0			
外出の支障(控えがち)	2004年	5.0	5.0	10.0	32.5	47.5	20.0	×	×	×
	2003年	5.0	17.5	12.5	17.5	47.5	35.0			
人とつき合いの支障(控えがち)	2004年	5.0	7.5	5.0	32.5	50.0	17.5	×	×	×
	2003年	7.5	10.0	17.5	25.0	40.0	35.0			
他人と会話・電話の支障(さしさわ)	2004年	7.5	12.5	32.5	47.5	20.0	×	×	×	
	2003年	2.5	12.5	20.0	32.5	32.5	35.0			
まわりの人が気になる	2004年	2.5	5.0	12.5	25.0	55.0	20.0	×	×	×
	2003年	15.0	17.5	42.5	25.0	32.5				
睡眠障害(眠りが良くない)	2004年	2.5	10.0	15.0	17.5	55.0	27.5	×	×	×
	2003年	5.0	10.0	12.5	32.5	40.0	27.5			
倦怠感(だるい)	2004年	2.5	7.5	20.0	22.5	47.5	30.0	×	×	×
	2003年	5.0	12.5	20.0	32.5	30.0	37.5			
疲労(つかれやすい)	2004年	2.5	7.5	22.5	30.0	37.5	32.5	×	×	×
	2003年	5.0	15.0	15.0	35.0	30.0	35.0			
気分が晴れない	2004年	5.0	12.5	17.5	32.5	32.5	35.0	×	×	×
	2003年	7.5	17.5	27.5	35.0	12.5	52.5			
いらいら感	2004年	2.5	17.5	10.0	35.0	35.0	30.0	×	×	×
	2003年	7.5	15.0	22.5	22.5	32.5	45.0			
ゆううつ	2004年	20.0	17.5	32.5	30.0	37.5	×	×	×	
	2003年	5.0	17.5	30.0	27.5	20.0	52.5			
生活に不満足	2004年	7.5	10.0	22.5	60.0	17.5	○	×	○	
	2003年	10.0	10.0	20.0	32.5	27.5	40.0			

(2)総括状態別



■今年(2004年)と昨年(2003年)との比較

(%)



(3)領域別スコア(合計の平均)

■今年(2004年)と昨年(2003年)との比較

* ◀統計的有意差あり (スコア/合計の平均点)

		n=	QOL スコア計	① 日常生活 スコア	② 戸外活動 スコア	③ 社会生活 スコア	④ 睡眠 スコア	⑤ 身体 スコア	⑥ 精神生活 スコア
全体	2004年	(200)	14.45	4.24	1.44	1.82	0.77	2.14	4.05
	2003年	(200)	19.84	5.84	2.50	2.51	1.10	2.64	5.25

性別	男性	2004年	(100)	13.53	3.97	1.11	1.62	0.71	2.08	4.04
		2003年	(100)	19.99	6.06	2.41	2.67	1.04	2.54	5.27
	女性	2004年	(100)	15.36	4.51	1.76	2.01	0.83	2.20	4.05
		2003年	(100)	19.69	5.62	2.59	2.35	1.16	2.74	5.23
年代別	10代	2004年	(40)	14.08	3.90	0.93	1.50	0.90	2.28	4.58
		2003年	(40)	16.45	4.75	2.13	1.65	1.30	2.08	4.55
	20代	2004年	(40)	15.35	4.63	1.63	1.68	0.85	2.50	4.08
		2003年	(40)	19.30	6.35	2.08	1.95	1.00	2.90	5.03
	30代	2004年	(40)	12.78	3.58	1.18	1.48	0.68	2.13	3.75
		2003年	(40)	21.20	6.38	2.78	2.53	1.15	2.98	5.40
	40代	2004年	(40)	13.75	4.28	1.65	2.03	0.55	1.78	3.48
		2003年	(40)	20.38	5.78	3.08	2.80	0.98	2.65	5.10
	50代以上	2004年	(40)	16.28	4.83	1.80	2.40	0.88	2.03	4.35
		2003年	(40)	21.88	5.95	2.45	3.63	1.08	2.60	6.18
総括的状態別	晴れ晴れ	2004年	(122)	8.89	2.66	0.80	1.03	0.49	1.58	2.34
	～普通	2003年	(96)	11.48	3.65	1.44	1.48	0.67	1.55	2.70
	泣きたい	2004年	(78)	23.13	6.72	2.44	3.04	1.21	3.01	6.72
		2003年	(104)	27.56	7.87	3.48	3.46	1.50	3.64	7.61

Ⅲ. 総括的状态

Ⅲ. 総括的状态

N. :「泣きたい(4)」の割合
 T.N. :「やや泣きたい(3)+泣きたい(4)」の割合
 T.P. :「晴ればれ(0)+やや晴ればれ(1)」の割合

○ : 95%水準で有意差あり
 × : 95%水準で有意差なし

■今年(2004年)と昨年(2003年)との比較

(%)

	性別	年代別	年	n=	泣きたい(4) (3) (2) (1) 晴ればれ(0)					やや+ 泣きたい計	検定結果		
					N.	T.N.	T.P.	N.	T.N.		T.P.		
全体			2004年	(200)	6.5	32.5	33.0	24.5	3.5	39.0	×	○	○
			2003年	(200)	10.5	41.5	32.0	14.0	2.0	52.0			
性別	男性		2004年	(100)	4.0	29.0	34.0	30.0	3.0	33.0	×	○	○
			2003年	(100)	10.0	44.0	32.0	12.0	2.0	54.0			
	女性		2004年	(100)	9.0	36.0	32.0	19.0	4.0	45.0	×	×	×
			2003年	(100)	11.0	39.0	32.0	16.0	2.0	50.0			
年代別	10代		2004年	(40)	7.5	37.5	32.5	17.5	5.0	45.0	×	×	×
			2003年	(40)	5.0	35.0	35.0	20.0	5.0	40.0			
	20代		2004年	(40)	5.0	32.5	35.0	25.0	2.5	37.5	×	×	×
			2003年	(40)	10.0	35.0	37.5	12.5	5.0	45.0			
	30代		2004年	(40)	10.0	30.0	40.0	20.0		40.0	×	×	×
			2003年	(40)	12.5	42.5	32.5	12.5		55.0			
	40代		2004年	(40)	5.0	40.0	25.0	27.5	2.5	45.0	×	×	○
			2003年	(40)	2.5	50.0	40.0	7.5		52.5			
50代以上		2004年	(40)	5.0	22.5	32.5	32.5	7.5	27.5	○	○	○	
		2003年	(40)	22.5	45.0	15.0	17.5		67.5				


IV. 花粉症の治療状況

IV.花粉症の治療状況

(1)通院・治療状況

■今年(2004年)と昨年(2003年)との比較


(%)



1回目：2004年3月2日実査(新宿)
2回目：2004年3月26日実査(新宿)

(2) 受けたことのある治療方法(療法) (%)

(%)



→ (3) [分からない/覚えていない人ベース] 治療方法(形状) (件)

(件)

