

Q18

		調査数	素晴らしい 良い	良い	まあ まあ	悪い	分から ない
全 体		2,000	9.0	47.6	40.2	3.1	0.3
調 査 地 点	東北・北関東	400	7.3	48.0	40.3	4.3	0.3
	首都圏	400	6.3	49.0	41.5	3.0	0.3
	静岡・愛知	400	11.0	44.3	41.8	2.8	0.3
	近畿圏	400	11.5	49.5	36.5	1.8	0.8
	北九州・長崎	400	8.8	47.0	40.8	3.5	-
年 代	20 代	400	17.0	53.0	25.8	3.5	0.8
	30 代	400	8.8	53.5	35.0	2.8	-
	40 代	400	7.5	48.3	42.0	2.3	-
	50 代	400	7.8	40.8	48.8	2.5	0.3
	60 代	400	3.8	42.3	49.3	4.3	0.5
性 別	男 性	1,000	10.1	46.8	39.2	3.4	0.5
	女 性	1,000	7.8	48.3	41.1	2.7	0.1

Q19 【調査地点別】

	調査 数	東北・北関東			首都圏			静岡・愛知		
		はい	いいえ	分から ない	はい	いいえ	分から ない	はい	いいえ	分から ない
a 風邪	400	28.3	71.3	0.5	32.0	68.0	-	25.3	74.5	0.3
b 咽喉炎	400	6.3	93.5	0.3	12.3	87.8	-	6.0	93.8	0.3
c 頭痛	400	25.5	74.3	0.3	24.3	75.8	-	20.8	79.0	0.3
d めまい	400	10.0	89.5	0.5	8.8	91.3	-	7.0	92.8	0.3
e 動悸	400	9.0	90.8	0.3	4.0	96.0	-	4.5	95.5	-
f 呼吸困難	400	1.8	98.0	0.3	2.8	97.3	-	1.3	98.8	-
g 腰痛	400	33.3	66.8	-	28.0	72.0	-	32.0	68.0	-
h インフルエンザ	400	0.5	99.3	0.3	0.3	99.8	-	0.8	99.3	-
i 不安状態(不安神経症)	400	7.5	91.5	1.0	3.0	97.0	-	1.8	97.0	1.3
j うつ病	400	1.0	98.0	1.0	0.5	99.5	-	0.5	99.5	-
k 疲労	400	42.5	56.8	0.8	43.0	57.0	-	37.0	61.8	1.3
l いらいら感	400	25.5	73.5	1.0	24.0	75.8	0.3	21.0	78.5	0.5
m 神経質	400	8.8	89.3	2.0	7.8	91.8	0.5	10.0	88.5	1.5

	調査数	近畿圏			北九州・長崎		
		はい	いいえ	分からない	はい	いいえ	分からない
a 風邪	400	26.3	73.5	0.3	24.0	76.0	-
b 咽喉炎	400	8.3	91.0	0.8	12.0	88.0	-
c 頭痛	400	29.0	71.0	-	23.8	76.3	-
d めまい	400	7.3	92.8	-	9.5	90.5	-
e 動悸	400	5.5	94.5	-	6.8	93.3	-
f 呼吸困難	400	3.0	97.0	-	2.3	97.8	-
g 腰痛	400	29.0	70.8	0.3	35.8	64.0	0.3
h インフルエンザ	400	1.3	98.5	0.3	0.3	99.5	0.3
i 不安状態(不安神経症)	400	5.8	93.5	0.8	5.3	94.3	0.5
j うつ病	400	0.8	99.0	0.3	1.8	98.0	0.3
k 疲労	400	39.3	60.5	0.3	42.3	57.0	0.8
l いらいら感	400	29.0	70.5	0.5	27.8	71.5	0.8
m 神経質	400	11.5	87.8	0.8	12.0	86.0	2.0

Q19 【年代別】

	調査数	20代			30代			40代		
		はい	いいえ	分からない	はい	いいえ	分からない	はい	いいえ	分からない
a 風邪	400	36.5	63.5	-	33.0	66.8	0.3	23.0	77.0	-
b 咽喉炎	400	10.8	89.0	0.3	10.3	89.5	0.3	7.5	92.5	-
c 頭痛	400	32.5	67.3	0.3	28.5	71.5	-	29.0	70.8	0.3
d めまい	400	11.5	88.3	0.3	7.3	92.8	-	10.0	90.0	-
e 動悸	400	2.3	97.5	0.3	3.8	96.3	-	6.5	93.5	-
f 呼吸困難	400	2.0	97.8	0.3	2.0	98.0	-	2.3	97.8	-
g 腰痛	400	26.3	73.5	0.3	26.3	73.8	-	34.8	65.3	-
h インフルエンザ	400	-	99.8	0.3	-	100.0	-	0.3	99.8	-
i 不安状態(不安神経症)	400	5.3	93.5	1.3	4.8	95.0	0.3	3.8	95.8	0.5
j うつ病	400	1.5	98.3	0.3	0.8	99.0	0.3	-	99.8	0.3
k 疲労	400	37.0	62.8	0.3	40.8	58.3	1.0	44.5	55.0	0.5
l いらいら感	400	28.3	71.0	0.8	27.5	71.5	1.0	31.8	67.8	0.5
m 神経質	400	10.5	88.0	1.5	8.5	89.8	1.8	11.3	87.3	1.5

	調査数	50代			60代		
		はい	いいえ	分からない	はい	いいえ	分からない
a 風邪	400	23.0	76.8	0.3	20.3	79.3	0.5
b 咽喉炎	400	7.8	92.0	0.3	8.5	91.0	0.5
c 頭痛	400	19.3	80.8	-	14.0	86.0	-
d めまい	400	8.0	91.8	0.3	5.8	94.0	0.3
e 動悸	400	9.3	90.8	-	8.0	92.0	-
f 呼吸困難	400	3.8	96.3	-	1.0	99.0	-
g 腰痛	400	36.3	63.8	-	34.5	65.3	0.3
h インフルエンザ	400	1.0	99.0	-	1.8	97.8	0.5
i 不安状態(不安神経症)	400	5.3	94.0	0.8	4.3	95.0	0.8
j うつ病	400	1.5	98.5	-	0.8	98.5	0.8
k 疲労	400	47.0	52.0	1.0	34.8	65.0	0.3
l いらいら感	400	26.3	73.3	0.5	13.5	86.3	0.3
m 神経質	400	11.5	87.5	1.0	8.3	90.8	1.0

Q19 【性別】

	調査数	男性			女性		
		はい	いいえ	分からない	はい	いいえ	分からない
a 風邪	1,000	28.2	71.6	0.2	26.1	73.7	0.2
b 咽喉炎	1,000	8.0	91.6	0.4	9.9	90.0	0.1
c 頭痛	1,000	19.0	80.9	0.1	30.3	69.6	0.1
d めまい	1,000	4.8	95.0	0.2	12.2	87.7	0.1
e 動悸	1,000	4.9	95.0	0.1	7.0	93.0	-
f 呼吸困難	1,000	2.0	97.9	0.1	2.4	97.6	-
g 腰痛	1,000	30.8	69.1	0.1	32.4	67.5	0.1
h インフルエンザ	1,000	0.8	99.0	0.2	0.4	99.5	0.1
i 不安状態(不安神経症)	1,000	4.3	95.2	0.5	5.0	94.1	0.9
j うつ病	1,000	1.1	98.6	0.3	0.7	99.0	0.3
k 疲労	1,000	40.3	59.2	0.5	41.3	58.0	0.7
l いらいら感	1,000	23.4	76.1	0.5	27.5	71.8	0.7
m 神経質	1,000	10.3	88.5	1.2	9.7	88.8	1.5

Q20

		調査数	はい	いいえ	回答拒否	分からない
全 体		2,000	43.9	51.7	0.4	4.1
調査地点	東北・北関東	400	38.3	56.5	0.8	4.5
	首都圏	400	52.0	44.3	-	3.8
	静岡・愛知	400	36.0	59.3	0.3	4.5
	近畿圏	400	51.5	45.3	-	3.3
	北九州・長崎	400	41.5	53.0	1.0	4.5
年代	20 代	400	40.5	55.3	0.5	3.8
	30 代	400	40.3	55.0	0.5	4.3
	40 代	400	45.3	50.0	0.5	4.3
	50 代	400	45.8	48.8	0.3	5.3
	60 代	400	47.5	49.3	0.3	3.0
性別	男 性	1,000	38.3	56.2	0.7	4.8
	女 性	1,000	49.4	47.1	0.1	3.4

Q23

		調査数	はい	いいえ	回答拒否	分からない
全 体		2,000	13.4	77.6	0.2	8.9
調査地点	東北・北関東	400	14.0	75.3	0.3	10.5
	首都圏	400	13.5	74.0	0.3	12.3
	静岡・愛知	400	10.8	81.5	-	7.8
	近畿圏	400	14.3	78.0	-	7.8
	北九州・長崎	400	14.3	79.3	0.5	6.0
年代	20 代	400	11.0	80.3	0.3	8.5
	30 代	400	10.3	82.3	0.3	7.3
	40 代	400	16.5	74.8	0.3	8.5
	50 代	400	15.0	76.8	0.3	8.0
	60 代	400	14.0	74.0	-	12.0
性別	男 性	1,000	12.4	79.7	0.3	7.6
	女 性	1,000	14.3	75.5	0.1	10.1

Q23 【調査地点別】

	調査数	東北・北関東				首都圏			
		よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない	よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない
a 日本うつ病学会	400	0.5	3.5	22.3	73.8	-	3.5	15.8	80.8
b 精神障害者家族会	400	0.3	6.0	20.5	73.3	0.3	4.5	17.5	77.8
c 精神障害者本人の活動組織	400	-	2.5	7.0	90.5	-	2.8	7.8	89.5
d 断酒会	400	4.5	14.0	35.0	46.5	1.0	16.5	31.3	51.3
e いのちの電話	400	8.3	29.3	39.0	23.5	2.3	35.0	41.0	21.8
f あしなが育英会	400	5.8	31.8	35.5	27.0	4.5	36.8	38.3	20.5
g 自殺死亡が3万人を超えた	400	5.0	19.5	28.8	46.8	2.8	21.8	25.3	50.3
h 精神保健福祉センター	400	2.3	8.0	25.3	64.5	0.3	7.0	19.8	73.0
i 統合失調症への名称変更	400	2.3	11.5	8.5	77.8	1.5	7.3	9.0	82.3

	調査数	静岡・愛知				近畿圏			
		よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない	よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない
a 日本うつ病学会	400	0.3	2.8	16.8	80.3	0.3	7.3	16.5	76.0
b 精神障害者家族会	400	0.5	3.3	13.8	82.5	0.8	6.8	14.0	78.5
c 精神障害者本人の活動組織	400	0.3	2.5	7.0	90.3	1.0	2.5	6.3	90.3
d 断酒会	400	2.0	13.8	29.8	54.5	4.8	17.5	29.5	48.3
e いのちの電話	400	5.0	21.3	41.5	32.3	7.0	29.0	41.0	23.0
f あしなが育英会	400	5.8	19.3	33.3	41.8	10.3	32.0	38.3	19.5
g 自殺死亡が3万人を超えた	400	3.5	13.8	23.0	59.8	4.8	17.3	23.5	54.5
h 精神保健福祉センター	400	1.0	5.5	15.0	78.5	1.5	8.0	19.8	70.8
i 統合失調症への名称変更	400	-	5.5	6.5	88.0	2.3	7.3	6.0	84.5

	調査数	北九州・長崎			
		よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない
a 日本うつ病学会	400	1.0	3.5	18.8	76.8
b 精神障害者家族会	400	0.3	3.3	19.5	77.0
c 精神障害者本人の活動組織	400	0.3	3.3	9.0	87.5
d 断酒会	400	2.5	20.0	37.0	40.5
e いのちの電話	400	6.0	31.8	40.8	21.5
f あしなが育英会	400	6.3	29.3	37.3	27.3
g 自殺死亡が3万人を超えた	400	4.8	21.0	28.5	45.8
h 精神保健福祉センター	400	2.0	11.5	20.5	66.0
i 統合失調症への名称変更	400	2.3	8.3	12.5	77.0

Q23 【年代別】

	調査数	20代				30代			
		よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない	よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない
a 日本うつ病学会	400	-	1.8	16.0	82.3	0.3	2.5	15.5	81.8
b 精神障害者家族会	400	0.3	2.3	11.3	86.3	0.3	3.3	13.8	82.8
c 精神障害者本人の活動組織	400	-	1.0	7.0	92.0	-	1.5	6.3	92.3
d 断酒会	400	0.8	5.8	16.3	77.3	2.0	10.3	24.8	63.0
e いのちの電話	400	4.3	22.5	38.0	35.3	5.3	28.3	41.0	25.5
f あしなが育英会	400	6.3	22.0	32.3	39.5	6.3	28.3	35.8	29.8
g 自殺死亡が3万人を超えた	400	3.8	15.8	23.3	57.3	3.0	17.0	24.5	55.5
h 精神保健福祉センター	400	1.0	8.8	25.8	64.5	1.0	6.0	19.8	73.3
i 統合失調症への名称変更	400	1.8	8.0	6.8	83.5	2.3	7.3	8.5	82.0

	調査数	40代				50代			
		よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない	よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない
a 日本うつ病学会	400	0.8	5.0	18.5	75.8	0.5	6.8	19.5	73.3
b 精神障害者家族会	400	0.3	5.5	16.0	78.3	0.5	7.8	18.8	73.0
c 精神障害者本人の活動組織	400	-	3.3	8.8	88.0	0.5	5.0	6.8	87.8
d 断酒会	400	3.0	19.0	38.8	39.3	5.3	24.5	42.0	28.3
e いのちの電話	400	6.0	35.0	42.5	16.5	8.5	34.3	40.0	17.3
f あしなが育英会	400	8.5	35.5	36.8	19.3	6.8	35.8	37.0	20.5
g 自殺死亡が3万人を超えた	400	4.0	17.5	26.0	52.5	6.8	24.0	25.3	44.0
h 精神保健福祉センター	400	1.5	8.0	16.5	74.0	2.8	9.3	17.3	70.8
i 統合失調症への名称変更	400	1.0	8.8	12.0	78.3	1.8	9.3	7.5	81.5

	調査数	60代			
		よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない
a 日本うつ病学会	400	0.5	4.5	20.5	74.5
b 精神障害者家族会	400	0.8	5.0	25.5	68.8
c 精神障害者本人の活動組織	400	1.0	2.8	8.3	88.0
d 断酒会	400	3.8	22.3	40.8	33.3
e いのちの電話	400	4.5	26.3	41.8	27.5
f あしなが育英会	400	4.8	27.5	40.8	27.0
g 自殺死亡が3万人を超えた	400	3.3	19.0	30.0	47.8
h 精神保健福祉センター	400	0.8	8.0	21.0	70.3
i 統合失調症への名称変更	400	1.5	6.5	7.8	84.3

Q23 【性別】

	調査数	男性				女性			
		よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない	よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない
a 日本うつ病学会	1,000	0.4	4.6	17.3	77.7	0.4	3.6	18.7	77.3
b 精神障害者家族会	1,000	0.3	4.2	14.9	80.6	0.5	5.3	19.2	75.0
c 精神障害者本人の活動組織	1,000	0.2	2.5	6.8	90.5	0.4	2.9	8.0	88.7
d 断酒会	1,000	2.3	16.5	30.0	51.2	3.6	16.2	35.0	45.2
e いのちの電話	1,000	3.8	25.4	39.6	31.2	7.6	33.1	41.7	17.6
f あしなが育英会	1,000	5.5	26.1	37.5	30.9	7.5	33.5	35.5	23.5
g 自殺死亡が3万人を超えた	1,000	4.3	19.1	26.7	49.9	4.0	18.2	24.9	52.9
h 精神保健福祉センター	1,000	0.8	8.0	18.9	72.3	2.0	8.0	21.2	68.8
i 統合失調症への名称変更	1,000	1.2	6.9	7.9	84.0	2.1	9.0	9.1	79.8

3. 精神保健の知識と理解に関する日豪比較共同研究に係る Q1-Q16 の付表-2
(事例別およびその重症度別)

Q1 「事例に問題があるとするば、それは何だと思うか」、そう思うもの (複数回答)

	調査数	うつ病	神経症	統合失調症・パラノイア	こころの病気	心理的・精神的・感情の問題	ストレス	なんらかの問題あり	がん	その他	問題なし	分からない	
全体	2,000	49.8	20.2	25.4	46.4	60.8	44.6	21.0	0.7	8.5	0.2	1.0	
分類	うつ病 (計)	1,000	57.1	21.1	9.1	43.9	59.6	64.4	20.0	1.2	6.6	0.2	0.8
	うつ病	500	49.2	19.2	9.6	39.8	58.6	64.8	21.0	1.2	8.8	0.2	0.6
	うつ病 (希死念慮)	500	65.0	23.0	8.6	48.0	60.6	64.0	19.0	1.2	4.4	0.2	1.0
	統合失調症 (計)	1,000	42.5	19.3	41.6	48.9	62.0	24.8	21.9	0.2	10.4	0.2	1.2
	早期統合失調症	500	48.4	17.2	34.0	54.4	61.6	28.6	20.6	-	11.4	-	1.8
	慢性統合失調症	500	36.6	21.4	49.2	43.4	62.4	21.0	23.2	0.4	9.4	0.4	0.6

Q1 「事例に何か問題があるとするば、それは何だと思うか」、最もそう思うもの

	調査数	うつ病	神経症	統合失調症・パラノイア	こころの病気	心理的・精神的・感情の問題	ストレス	なんらかの問題あり	がん	その他	問題なし	分からない	
全体	2,000	20.2	2.4	13.5	13.5	27.5	13.4	3.1	0.2	5.1	0.2	1.1	
分類	うつ病 (計)	1,000	28.8	2.3	1.7	9.7	27.1	22.4	3.2	0.3	3.4	0.2	0.9
	うつ病	500	22.6	2.0	2.2	9.2	29.4	25.0	3.8	0.4	4.6	0.2	0.6
	うつ病 (希死念慮)	500	35.0	2.6	1.2	10.2	24.8	19.8	2.6	0.2	2.2	0.2	1.2
	統合失調症 (計)	1,000	11.6	2.5	25.3	17.2	27.8	4.4	3.0	-	6.8	0.2	1.2
	早期統合失調症	500	13.6	2.6	17.2	21.6	28.4	5.0	2.2	-	7.6	-	1.8
	慢性統合失調症	500	9.6	2.4	33.4	12.8	27.2	3.8	3.8	-	6.0	0.4	0.6

Q2 「事例にとって最も良い援助はどれか」、そう思うもの (複数回答)

	調査数	友人・家族に相談する	医者にも診てもらおう	精神科医に診て貰う	薬を飲む	カウンセラーに会う	彼らがまず問題を認める	その他	分からない	
全体	2,000	57.8	17.5	52.9	6.3	71.4	23.3	5.7	1.1	
分類	うつ病 (計)	1,000	71.1	20.4	46.4	5.7	68.4	23.9	5.5	0.7
	うつ病	500	71.8	20.8	43.8	3.4	62.0	23.4	8.4	0.4
	うつ病 (希死念慮)	500	70.4	20.0	49.0	8.0	74.8	24.4	2.6	1.0
	統合失調症 (計)	1,000	44.5	14.6	59.3	6.8	74.3	22.6	5.8	1.4
	早期統合失調症	500	43.8	13.4	58.6	7.8	76.4	23.4	4.4	1.6
	慢性統合失調症	500	45.2	15.8	60.0	5.8	72.2	21.8	7.2	1.2

Q2「事例にとって最も良い援助はどれか」、最もそう思うもの

	調査数	友人・家族に相談する	医者にも診てもらう	精神科医にも診てもらう	薬を飲む	カウンセラーにあう	彼らがまず問題を認める	その他	分からない	
全体	2,000	23.0	3.4	23.1	0.2	38.6	7.3	3.2	1.5	
分類	うつ病(計)	1,000	31.7	4.5	16.5	0.1	35.8	7.4	2.9	1.1
	うつ病	500	31.8	6.0	16.8	-	32.0	8.0	4.6	0.8
	うつ病(希死念慮)	500	31.6	3.0	16.2	0.2	39.6	6.8	1.2	1.4
	統合失調症(計)	1,000	14.2	2.2	29.6	0.3	41.4	7.1	3.4	1.8
	早期統合失調症	500	12.8	1.6	27.6	-	45.6	7.8	2.6	2.0
	慢性統合失調症	500	15.6	2.8	31.6	0.6	37.2	6.4	4.2	1.6

Q4「次の人達は事例にとって助けになるか、悪影響になるか」

	調査数	うつ病(計)					統合失調症(計)				
		助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない	助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない
a 一般開業医または家庭医	1,000	28.2	55.2	9.2	6.3	1.1	20.9	60.4	12.7	5.3	0.7
b ふつうの薬剤師(薬局)	1,000	6.7	64.3	22.8	3.9	2.3	4.2	67.0	22.7	3.5	2.6
c カウンセラー	1,000	86.7	10.0	1.0	1.4	0.9	87.8	8.5	1.5	1.6	0.6
d ソーシャルワーカー	1,000	71.8	22.4	2.2	2.4	1.2	71.8	20.8	3.9	2.2	1.3
e 電話相談サービス	1,000	46.1	40.4	7.6	4.3	1.6	32.6	49.2	11.5	4.4	2.3
f 精神科医	1,000	70.9	20.7	5.1	2.1	1.2	76.0	17.4	4.4	1.7	0.5
g 心理学者	1,000	53.9	34.7	7.0	2.6	1.8	60.7	29.4	5.5	2.9	1.5
h 家族の援助	1,000	84.6	11.4	1.6	2.1	0.3	78.6	15.0	4.5	1.5	0.4
i 親友からの援助	1,000	84.0	10.8	1.6	3.2	0.4	70.3	22.1	4.1	2.7	0.8
j 自然療法家や漢方医	1,000	13.0	61.3	18.0	4.5	3.2	8.7	64.5	19.8	3.3	3.7
k 牧師や司祭など聖職者	1,000	16.8	55.1	19.4	5.6	3.1	13.9	52.5	25.2	5.3	3.1
l 彼ら自身で処理	1,000	22.4	30.0	42.0	3.9	1.7	21.9	33.1	39.8	3.5	1.7

	調査数	うつ病					早期統合失調症				
		助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない	助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない
a 一般開業医/家庭医	500	30.4	55.6	9.4	4.0	0.6	19.0	61.4	12.6	6.0	1.0
b ふつうの薬剤師(薬局)	500	6.8	66.2	23.6	2.8	0.6	4.2	66.4	22.4	3.6	3.4
c カウンセラー	500	85.8	10.2	1.0	2.0	1.0	87.0	8.2	1.4	2.4	1.0
d ソーシャルワーカー	500	73.4	21.2	1.4	3.0	1.0	68.4	22.6	4.8	3.2	1.0
e 電話相談サービス	500	42.4	44.8	8.6	2.8	1.4	35.6	42.6	11.0	7.0	3.8
f 精神科医	500	69.4	22.2	5.4	2.4	0.6	73.0	17.4	6.0	2.8	0.8
g 心理学者	500	56.6	33.6	6.0	2.6	1.2	56.2	31.6	6.0	4.2	2.0
h 家族の援助	500	85.0	11.6	1.6	1.6	0.2	76.8	16.4	4.6	1.8	0.4
i 親友からの援助	500	84.8	10.0	1.8	3.0	0.4	70.4	21.8	4.0	2.8	1.0
j 自然療法家や漢方医	500	11.2	63.4	18.8	4.4	2.2	8.4	63.6	18.2	4.6	5.2
k 牧師や司祭など聖職者	500	13.6	55.6	24.2	4.8	1.8	11.6	51.4	26.0	6.2	4.8
l 彼ら自身で処理	500	24.4	29.6	41.4	3.8	0.8	22.4	32.2	38.8	4.2	2.4

	調査数	うつ病(希死念慮)					慢性統合失調症				
		助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない	助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない
a 一般開業医/家庭医	500	26.0	54.8	9.0	8.6	1.6	22.8	59.4	12.8	4.6	0.4
b ふつうの薬剤師(薬局)	500	6.6	62.4	22.0	5.0	4.0	4.2	67.6	23.0	3.4	1.8
c カウンセラー	500	87.6	9.8	1.0	0.8	0.8	88.6	8.8	1.6	0.8	0.2
d ソーシャルワーカー	500	70.2	23.6	3.0	1.8	1.4	75.2	19.0	3.0	1.2	1.6
e 電話相談サービス	500	49.8	36.0	6.6	5.8	1.8	29.6	55.8	12.0	1.8	0.8
f 精神科医	500	72.4	19.2	4.8	1.8	1.8	79.0	17.4	2.8	0.6	0.2
g 心理学者	500	51.2	35.8	8.0	2.6	2.4	65.2	27.2	5.0	1.6	1.0
h 家族の援助	500	84.2	11.2	1.6	2.6	0.4	80.4	13.6	4.4	1.2	0.4
i 親友からの援助	500	83.2	11.6	1.4	3.4	0.4	70.2	22.4	4.2	2.6	0.6
j 自然療法家や漢方医	500	14.8	59.2	17.2	4.6	4.2	9.0	65.4	21.4	2.0	2.2
k 牧師や司祭など聖職者	500	20.0	54.6	14.6	6.4	4.4	16.2	53.6	24.4	4.4	1.4
l 彼ら自身で処理	500	20.4	30.4	42.6	4.0	2.6	21.4	34.0	40.8	2.8	1.0

Q5 「次の薬は事例にとって助けになるか、悪影響になるか」

	調査数	うつ病 (計)					統合失調症 (計)				
		助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない	助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない
a 強壮剤/漢方薬	1,000	18.3	59.2	14.2	3.5	4.8	11.5	66.9	14.7	2.2	4.7
b 鎮痛剤	1,000	4.0	45.5	43.0	2.0	5.5	4.4	52.8	36.1	1.5	5.2
c 抗うつ剤	1,000	35.4	37.2	19.7	3.5	4.2	39.2	40.4	12.9	4.3	3.2
d 抗生剤	1,000	6.1	51.9	33.7	2.6	5.7	6.6	59.7	25.9	1.2	6.6
e 睡眠薬	1,000	28.9	35.5	27.4	4.9	3.3	23.1	40.9	28.5	4.8	2.7
f 抗精神病薬	1,000	22.2	46.1	21.4	3.8	6.5	35.7	42.1	12.9	4.6	4.7
g 精神安定剤	1,000	37.7	37.3	16.7	3.0	5.3	41.9	39.2	11.4	4.1	3.4

	調査数	うつ病					早期統合失調症				
		助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない	助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない
a 強壮剤/漢方薬	500	20.2	59.0	14.6	2.8	3.4	10.6	66.0	14.6	2.4	6.4
b 鎮痛剤	500	4.4	45.6	43.4	1.8	4.8	4.2	51.2	36.6	1.6	6.4
c 抗うつ剤	500	34.8	39.8	18.2	2.8	4.4	38.6	37.4	15.2	5.4	3.4
d 抗生剤	500	6.2	56.2	29.8	2.4	5.4	4.8	57.4	29.0	1.0	7.8
e 睡眠薬	500	31.6	36.2	27.0	2.4	2.8	21.4	38.8	30.0	6.2	3.6
f 抗精神病薬	500	22.6	49.0	19.0	2.4	7.0	30.2	41.6	17.4	5.2	5.6
g 精神安定剤	500	38.4	39.2	15.8	2.2	4.4	38.4	38.8	13.4	5.0	4.4

	調査数	うつ病 (希死念慮)					慢性統合失調症				
		助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない	助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない
a 強壮剤/漢方薬	500	16.4	59.4	13.8	4.2	6.2	12.4	67.8	14.8	2.0	3.0
b 鎮痛剤	500	3.6	45.4	42.6	2.2	6.2	4.6	54.4	35.6	1.4	4.0
c 抗うつ剤	500	36.0	34.6	21.2	4.2	4.0	39.8	43.4	10.6	3.2	3.0
d 抗生剤	500	6.0	47.6	37.6	2.8	6.0	8.4	62.0	22.8	1.4	5.4
e 睡眠薬	500	26.2	34.8	27.8	7.4	3.8	24.8	43.0	27.0	3.4	1.8
f 抗精神病薬	500	21.8	43.2	23.8	5.2	6.0	41.2	42.6	8.4	4.0	3.8
g 精神安定剤	500	37.0	35.4	17.6	3.8	6.2	45.4	39.6	9.4	3.2	2.4

Q6「次の治療法は事例にとって助けになるか、悪影響になるか」

	調査数	うつ病 (計)					統合失調症 (計)				
		助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない	助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない
a 積極的に体を動かす	1,000	71.4	21.1	3.8	3.2	0.5	72.0	19.6	3.7	3.7	1.0
b 書物から処理を知る	1,000	59.7	27.8	7.7	4.5	0.3	52.2	33.7	9.2	3.8	1.1
c 外出したり出歩く	1,000	69.5	22.9	3.9	3.5	0.2	64.4	25.6	6.0	3.4	0.6
d リラクゼーション	1,000	39.7	46.0	7.9	4.6	1.8	27.8	50.2	15.0	4.3	2.7
e アルコールを断つ	1,000	12.1	63.6	16.1	6.4	1.8	17.9	63.2	11.8	4.0	3.1
f 精神療法	1,000	48.6	39.2	5.8	3.9	2.5	60.4	30.6	3.9	3.0	2.1
g 催眠	1,000	28.4	49.5	14.1	3.8	4.2	27.8	51.0	13.9	4.5	2.8
h 精神科病棟に入院	1,000	12.8	36.3	43.3	5.6	2.0	26.0	35.3	31.3	6.0	1.4
i ECTを受ける	1,000	1.8	38.4	52.3	1.2	6.3	1.4	41.4	47.3	2.3	7.6
j 時々飲酒する	1,000	28.2	45.2	18.8	6.0	1.8	17.6	45.3	29.1	5.0	3.0
k ダイエットする	1,000	5.8	34.5	55.4	1.7	2.6	4.4	39.5	51.8	1.7	2.6

	調査数	うつ病					早期統合失調症				
		助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない	助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない
a 積極的に体を動かす	500	69.4	24.2	3.6	2.8	-	73.4	16.6	3.8	4.8	1.4
b 書物から処理を知る	500	60.0	29.8	7.6	2.4	0.2	57.6	29.2	8.0	4.4	0.8
c 外出したり出歩く	500	67.0	26.8	3.0	3.0	0.2	67.2	20.8	7.4	3.6	1.0
d リラクゼーション	500	38.2	49.2	7.6	3.8	1.2	26.2	48.6	16.4	5.0	3.8
e アルコールを断つ	500	10.0	66.6	17.2	4.8	1.4	18.6	60.6	11.4	5.0	4.4
f 精神療法	500	49.0	38.4	7.4	2.8	2.4	53.8	33.4	5.2	4.4	3.2
g 催眠	500	28.0	50.8	14.2	3.2	3.8	22.4	50.2	17.4	6.2	3.8
h 精神科病棟に入院	500	13.6	37.2	43.0	4.8	1.4	22.0	31.2	38.0	6.8	2.0
i ECTを受ける	500	2.2	41.6	50.2	1.4	4.6	1.4	36.8	50.6	2.4	8.8
j 時々飲酒する	500	31.4	45.2	17.4	5.0	1.0	15.2	43.4	31.4	6.4	3.6
k ダイエットする	500	5.6	36.0	55.2	1.6	1.6	4.4	36.8	53.2	1.8	3.8

	調査数	うつ病 (希死念慮)					慢性統合失調症				
		助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない	助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない
a 積極的に体を動かす	500	73.4	18.0	4.0	3.6	1.0	70.6	22.6	3.6	2.6	0.6
b 書物から処理を知る	500	59.4	25.8	7.8	6.6	0.4	46.8	38.2	10.4	3.2	1.4
c 外出したり出歩く	500	72.0	19.0	4.8	4.0	0.2	61.6	30.4	4.6	3.2	0.2
d リラクゼーション	500	41.2	42.8	8.2	5.4	2.4	29.4	51.8	13.6	3.6	1.6
e アルコールを断つ	500	14.2	60.6	15.0	8.0	2.2	17.2	65.8	12.2	3.0	1.8
f 精神療法	500	48.2	40.0	4.2	5.0	2.6	67.0	27.8	2.6	1.6	1.0
g 催眠	500	28.8	48.2	14.0	4.4	4.6	33.2	51.8	10.4	2.8	1.8
h 精神科病棟に入院	500	12.0	35.4	43.6	6.4	2.6	30.0	39.4	24.6	5.2	0.8
i ECTを受ける	500	1.4	35.2	54.4	1.0	8.0	1.4	46.0	44.0	2.2	6.4
j 時々飲酒する	500	25.0	45.2	20.2	7.0	2.6	20.0	47.2	26.8	3.6	2.4
k ダイエットする	500	6.0	33.0	55.6	1.8	3.6	4.4	42.2	50.4	1.6	1.4

Q7「次のことは事例にとって助けになるか、悪影響になるか」

	調査数	うつ病 (計)					統合失調症 (計)				
		助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない	助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない
a 情報提供するウェブを調べる	1,000	45.7	40.1	7.1	4.4	2.7	47.7	38.2	8.4	3.1	2.6
b Eメールなどから専門家の意見を知る	1,000	53.8	34.8	5.3	4.2	1.9	56.7	32.1	5.5	2.9	2.8
c 情報提供する本を調べる	1,000	51.9	39.8	3.7	3.6	1.0	55.5	35.5	4.6	3.0	1.4
d 健康問題の情報を健康教室などで知る	1,000	53.2	36.2	4.1	4.5	2.0	48.6	40.7	4.9	4.1	1.7

	調査数	うつ病					早期統合失調症				
		助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない	助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない
a 情報提供するウェブを調べる	500	45.6	41.2	8.0	3.8	1.4	48.4	35.8	7.2	4.4	4.2
b Eメールなどから専門家の意見を知る	500	54.0	35.8	5.0	4.4	0.8	56.8	29.4	5.2	4.0	4.6
c 情報提供する本を調べる	500	54.0	39.2	3.0	3.4	0.4	57.4	32.6	4.2	4.0	1.8
d 健康問題の情報を健康教室などで知る	500	55.2	34.8	4.4	4.6	1.0	46.6	39.6	5.2	5.8	2.8

	調査数	うつ病 (希死念慮)					慢性統合失調症				
		助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない	助けになる	どちらでもない	悪影響	場合による	分からない
a 情報提供するウェブを調べる	500	45.8	39.0	6.2	5.0	4.0	47.0	40.6	9.6	1.8	1.0
b Eメールなどから専門家の意見を知る	500	53.6	33.8	5.6	4.0	3.0	56.6	34.8	5.8	1.8	1.0
c 情報提供する本を調べる	500	49.8	40.4	4.4	3.8	1.6	53.6	38.4	5.0	2.0	1.0
d 健康問題の情報を健康教室などで知る	500	51.2	37.6	3.8	4.4	3.0	50.6	41.8	4.6	2.4	0.6

Q8「事例が最適と思われる専門家の治療を受けたらどうなるか」

	調査数	それ以上何の問題も残さないで、十分に回復出来た	十分に回復出来た、しかし問題は再び起こる可能性がある	部分的に回復出来た	部分的に回復出来た、しかし問題は再び起こる可能性がある	改善なし	悪化する	分からない	
全体	2,000	5.1	33.4	14.3	43.3	1.9	0.1	2.1	
分類	うつ病 (計)	1,000	6.6	35.5	15.1	39.0	1.8	0.1	1.9
	うつ病	500	7.4	37.2	14.8	37.4	2.4	-	0.8
	うつ病 (希死念慮)	500	5.8	33.8	15.4	40.6	1.2	0.2	3.0
	統合失調症 (計)	1,000	3.6	31.2	13.4	47.5	2.0	0.1	2.2
	早期統合失調症	500	4.4	34.6	13.2	42.2	2.4	0.2	3.0
	慢性統合失調症	500	2.8	27.8	13.6	52.8	1.6	-	1.4

Q9「事例が専門家の治療を何ら受けないとしたらどうなるか」

	調査数	それ以上何の問題も残さないで、十分に回復出来た	十分に回復出来た、しかし問題は再び起こる可能性がある	部分的に回復出来た	部分的に回復出来た、しかし問題は再び起こる可能性がある	改善なし	悪化する	分からない	
全体	2,000	0.5	2.7	2.9	9.2	32.3	50.2	2.5	
分類	うつ病 (計)	1,000	0.7	3.4	3.8	11.8	28.1	49.2	3.0
	うつ病	500	0.6	4.2	3.8	12.4	29.8	47.6	1.6
	うつ病 (希死念慮)	500	0.8	2.6	3.8	11.2	26.4	50.8	4.4
	統合失調症 (計)	1,000	0.2	1.9	1.9	6.5	36.5	51.1	1.9
	早期統合失調症	500	-	2.6	2.6	8.6	33.6	49.0	3.6
	慢性統合失調症	500	0.4	1.2	1.2	4.4	39.4	53.2	0.2

Q10 「事例は地域の他の人と比べて長期的にはどうなるか」

	調査数	うつ病 (計)					統合失調症 (計)				
		もっと そうない りそう	同じ くらい	そうなり そうには ない	場合 による	分か らない	もっと そうない りそう	同じ くらい	そうなり そうには ない	場合 による	分か らない
a 暴力的になりそう	1,000	4.5	29.7	60.9	2.4	2.5	10.8	38.5	44.4	2.8	3.5
b 大量飲酒をしそう	1,000	9.9	31.3	53.0	2.5	3.3	9.6	33.1	51.1	2.6	3.6
c 不法な薬物を使用しそう	1,000	10.1	29.4	54.4	2.5	3.6	12.3	30.4	50.4	3.0	3.9
d 交友関係が乏しくなりそう	1,000	28.7	34.5	30.8	4.2	1.8	31.3	37.8	26.4	2.1	2.4
e 自殺を企てそう	1,000	20.3	28.8	45.1	3.6	2.2	18.7	33.2	39.7	3.5	4.9
f 他人の気持ちを理解しそう	1,000	30.0	39.6	25.8	3.0	1.6	22.6	36.8	35.0	2.8	2.8
g よい結婚ができそう	1,000	9.6	50.9	29.9	5.1	4.5	6.6	41.9	42.4	3.8	5.3
h 優しい親になりそう	1,000	18.7	46.0	26.6	4.1	4.6	10.3	43.4	36.8	4.3	5.2
i 生産的な労働者になりそう	1,000	8.3	48.3	34.1	4.1	5.2	7.1	46.5	37.6	3.7	5.1
j 創造的/芸術的な人になりそう	1,000	8.5	45.8	34.7	4.7	6.3	13.4	41.5	34.7	3.5	6.9

	調査数	うつ病					早期統合失調症				
		もっと そうない りそう	同じ くらい	そうなり そうには ない	場合 による	分か らない	もっと そうない りそう	同じ くらい	そうなり そうには ない	場合 による	分か らない
a 暴力的になりそう	500	4.8	35.2	55.4	2.2	2.4	10.0	38.6	43.8	3.0	4.6
b 大量飲酒をしそう	500	10.2	34.6	50.6	2.0	2.6	11.4	33.0	47.6	2.8	5.2
c 不法な薬物を使用しそう	500	11.4	31.2	52.0	2.0	3.4	12.4	29.4	49.8	3.2	5.2
d 交友関係が乏しくなりそう	500	29.0	38.8	27.0	3.6	1.6	31.2	38.0	26.0	2.0	2.8
e 自殺を企てそう	500	16.8	31.6	46.2	3.4	2.0	18.8	35.4	36.0	4.4	5.4
f 他人の気持ちを理解しそう	500	30.8	39.0	26.6	2.4	1.2	25.8	36.8	31.2	2.6	3.6
g よい結婚ができそう	500	9.2	51.4	30.6	5.0	3.8	8.8	44.0	36.6	4.0	6.6
h 優しい親になりそう	500	18.8	45.8	28.0	3.8	3.6	12.6	45.2	32.0	3.8	6.4
i 生産的な労働者になりそう	500	8.8	51.0	32.6	3.8	3.8	6.6	48.4	34.6	3.6	6.8
j 創造的/芸術的な人になりそう	500	7.8	48.0	37.0	3.0	4.2	13.0	43.8	30.0	3.6	9.6

	調査数	うつ病 (希死念慮)					慢性統合失調症				
		もっと そうなり そう	同じ くらい	そうなり そうには ない	場合 による	分か らない	もっと そうなり そう	同じ くらい	そうなり そうには ない	場合 による	分か らない
a 暴力的になりそう	500	4.2	24.2	66.4	2.6	2.6	11.6	38.4	45.0	2.6	2.4
b 大量飲酒をしそう	500	9.6	28.0	55.4	3.0	4.0	7.8	33.2	54.6	2.4	2.0
c 不法な薬物を使用しそう	500	8.8	27.6	56.8	3.0	3.8	12.2	31.4	51.0	2.8	2.6
d 交友関係が乏しくなりそう	500	28.4	30.2	34.6	4.8	2.0	31.4	37.6	26.8	2.2	2.0
e 自殺を企てそう	500	23.8	26.0	44.0	3.8	2.4	18.6	31.0	43.4	2.6	4.4
f 他人の気持ちを理解しそう	500	29.2	40.2	25.0	3.6	2.0	19.4	36.8	38.8	3.0	2.0
g よい結婚ができそう	500	10.0	50.4	29.2	5.2	5.2	4.4	39.8	48.2	3.6	4.0
h 優しい親になりそう	500	18.6	46.2	25.2	4.4	5.6	8.0	41.6	41.6	4.8	4.0
i 生産的な労働者になりそう	500	7.8	45.6	35.6	4.4	6.6	7.6	44.6	40.6	3.8	3.4
j 創造的/芸術的な人になりそう	500	9.2	43.6	32.4	6.4	8.4	13.8	39.2	39.4	3.4	4.2

Q11 「地域の他の人々が事例のことを知ったら差別するようになると思うか」

		調査数	はい	いいえ	分からない
全 体		2,000	41.9	34.4	23.7
分 類	うつ病 (計)	1,000	30.1	44.8	25.1
	うつ病	500	27.6	48.6	23.8
	うつ病 (希死念慮)	500	32.6	41.0	26.4
	統合失調症 (計)	1,000	53.7	24.0	22.3
	早期統合失調症	500	44.8	29.6	25.6
	慢性統合失調症	500	62.6	18.4	19.0

Q12 「事例について個人的にはどのように考えるか」

	調査数	うつ病 (計)				統合失調症 (計)					
		強く 賛成	賛成	賛成でも反 対でもない	反対	強く 反対	強く 賛成	賛成	賛成でも反 対でもない	反対	強く 反対
a 望めば問題から抜け出せる	1,000	9.5	38.8	21.1	27.0	3.6	6.7	32.1	19.9	35.9	5.4
b 問題は個人的な弱さの現れだ	1,000	9.3	35.9	26.9	23.0	4.9	9.4	36.9	25.2	25.8	2.7
c 問題は本当の医学的病気でない	1,000	7.9	31.4	29.2	25.3	6.2	7.7	25.9	27.2	31.3	7.9
d そんな問題を持つ人は危険だ	1,000	2.5	12.8	34.4	40.3	10.0	5.3	23.7	35.0	30.5	5.5
e 彼らを避けるのが最もよい	1,000	0.6	6.2	27.3	49.9	16.0	2.4	12.4	32.7	42.9	9.6
f 何をすべきかわからない	1,000	2.0	17.3	34.9	39.2	6.6	3.9	34.4	38.9	20.6	2.2
g 問題があっても誰にも言わない	1,000	4.8	21.0	29.5	36.1	8.6	7.3	28.8	30.2	29.2	4.5
h 問題を知れば雇わない	1,000	7.9	30.7	41.2	17.8	2.4	12.5	41.9	32.9	11.3	1.4
i 問題を知れば投票しない	1,000	21.0	34.9	28.4	13.1	2.6	28.4	37.5	22.4	9.5	2.2

	調査数	肯定層		否定層	
		うつ病	統合失調症	うつ病	統合失調症
a 望めば問題から抜け出せる	1,000	48.3	38.8	30.6	41.3
b 問題は個人的な弱さの現れだ	1,000	45.2	46.3	27.9	28.5
c 問題は本当の医学的病気でない	1,000	39.3	33.6	31.5	39.2
d そんな問題を持つ人は危険だ	1,000	15.3	29.0	50.3	36.0
e 彼らを避けるのが最もよい	1,000	6.8	14.8	65.9	52.5
f 何をしでかすかわからない	1,000	19.3	38.3	45.8	22.8
g 問題があっても誰にも言わない	1,000	25.8	36.1	44.7	33.7
h 問題を知れば雇わない	1,000	38.6	54.4	20.2	12.7
i 問題を知れば投票しない	1,000	55.9	65.9	15.7	11.7

※ 『肯定層』 = 「強く賛成」 + 「賛成」、 『否定層』 = 「強く反対」 + 「反対」

	調査数	うつ病				早期統合失調症					
		強く賛成	賛成	賛成でも反対でもない	反対	強く反対	強く賛成	賛成	賛成でも反対でもない	反対	強く反対
a 望めば問題から抜け出せる	500	10.6	36.6	23.0	27.8	2.0	7.6	33.6	19.2	34.0	5.6
b 問題は個人的な弱さの現れだ	500	9.6	35.8	26.4	23.8	4.4	9.6	37.0	22.6	27.6	3.2
c 問題は本当の医学的病気でない	500	7.6	32.6	30.2	22.8	6.8	7.0	24.4	26.2	32.4	10.0
d そんな問題を持つ人は危険だ	500	2.4	12.2	34.2	40.4	10.8	4.4	16.0	37.4	34.2	8.0
e 彼らを避けるのが最もよい	500	0.8	7.0	26.4	52.2	13.6	2.2	9.6	34.0	42.8	11.4
f 何をしでかすかわからない	500	2.4	16.2	30.2	43.6	7.6	3.0	28.0	43.8	22.4	2.8
g 問題があっても誰にも言わない	500	6.6	20.2	28.4	38.2	6.6	6.4	28.6	30.2	29.2	5.6
h 問題を知れば雇わない	500	7.8	30.8	40.2	18.8	2.4	9.8	37.8	37.4	13.2	1.8
i 問題を知れば投票しない	500	23.4	34.6	25.0	14.2	2.8	21.6	36.4	26.8	12.4	2.8

	調査数	肯定層		否定層	
		うつ病	統合失調症	うつ病	統合失調症
a 望めば問題から抜け出せる	500	47.2	41.2	29.8	39.6
b 問題は個人的な弱さの現れだ	500	45.4	46.6	28.2	30.8
c 問題は本当の医学的病気でない	500	40.2	31.4	29.6	42.4
d そんな問題を持つ人は危険だ	500	14.6	20.4	51.2	42.2
e 彼らを避けるのが最もよい	500	7.8	11.8	65.8	54.2
f 何をしでかすかわからない	500	18.6	31.0	51.2	25.2
g 問題があっても誰にも言わない	500	26.8	35.0	44.8	34.8
h 問題を知れば雇わない	500	38.6	47.6	21.2	15.0
i 問題を知れば投票しない	500	58.0	58.0	17.0	15.2

※ 『肯定層』 = 「強く賛成」 + 「賛成」、 『否定層』 = 「強く反対」 + 「反対」

	調査数	うつ病 (希死念慮)					慢性統合失調症				
		強く賛成	賛成	賛成でも反対でもない	反対	強く反対	強く賛成	賛成	賛成でも反対でもない	反対	強く反対
a 望めば問題から抜け出せる	500	8.4	41.0	19.2	26.2	5.2	5.8	30.6	20.6	37.8	5.2
b 問題は個人的な弱さの現れだ	500	9.0	36.0	27.4	22.2	5.4	9.2	36.8	27.8	24.0	2.2
c 問題は本当の医学的病気でない	500	8.2	30.2	28.2	27.8	5.6	8.4	27.4	28.2	30.2	5.8
d そんな問題を持つ人は危険だ	500	2.6	13.4	34.6	40.2	9.2	6.2	31.4	32.6	26.8	3.0
e 彼らを避けるのが最もよい	500	0.4	5.4	28.2	47.6	18.4	2.6	15.2	31.4	43.0	7.8
f 何をしてもかすかわからない	500	1.6	18.4	39.6	34.8	5.6	4.8	40.8	34.0	18.8	1.6
g 問題があっても誰にも言わない	500	3.0	21.8	30.6	34.0	10.6	8.2	29.0	30.2	29.2	3.4
h 問題を知れば雇わない	500	8.0	30.6	42.2	16.8	2.4	15.2	46.0	28.4	9.4	1.0
i 問題を知れば投票しない	500	18.6	35.2	31.8	12.0	2.4	35.2	38.6	18.0	6.6	1.6

	調査数	肯定層		否定層	
		うつ病	統合失調症	うつ病	統合失調症
a 望めば問題から抜け出せる	500	49.4	36.4	31.4	43.0
b 問題は個人的な弱さの現れだ	500	45.0	46.0	27.6	26.2
c 問題は本当の医学的病気でない	500	38.4	35.8	33.4	36.0
d そんな問題を持つ人は危険だ	500	16.0	37.6	49.4	29.8
e 彼らを避けるのが最もよい	500	5.8	17.8	66.0	50.8
f 何をしてもかすかわからない	500	20.0	45.6	40.4	20.4
g 問題があっても誰にも言わない	500	24.8	37.2	44.6	32.6
h 問題を知れば雇わない	500	38.6	61.2	19.2	10.4
i 問題を知れば投票しない	500	53.8	73.8	14.4	8.2

※『肯定層』 = 「強く賛成」 + 「賛成」、『否定層』 = 「強く反対」 + 「反対」

Q13 「事例について一般の人々はどのように考えると、あなたは思うか」

	調査数	うつ病 (計)				統合失調症 (計)					
		強く賛成	賛成	賛成でも反対でもない	反対	強く反対	強く賛成	賛成	賛成でも反対でもない	反対	強く反対
a 望めば問題から抜け出せる	1,000	4.0	37.8	25.3	30.3	2.6	4.9	31.3	23.8	35.0	5.0
b 問題は個人的な弱さの現れだ	1,000	6.4	49.8	27.9	14.5	1.4	6.7	50.9	25.6	15.3	1.5
c 問題は本当の医学的病気でない	1,000	5.5	36.4	33.7	23.3	1.1	4.4	38.1	34.1	21.1	2.3
d そんな問題を持つ人は危険だ	1,000	3.9	27.4	39.0	26.7	3.0	11.0	46.5	27.9	13.5	1.1
e 彼らを避けるのが最もよい	1,000	3.4	27.8	35.0	30.7	3.1	7.8	47.4	28.9	13.9	2.0
f 何をしてもかすかわからない	1,000	4.2	31.9	35.8	25.7	2.4	10.0	53.0	25.7	10.3	1.0
g 問題があっても誰にも言わない	1,000	4.8	31.7	35.2	26.4	1.9	8.4	40.7	31.9	17.4	1.6
h 問題を知れば雇わない	1,000	11.4	49.0	27.8	10.6	1.2	20.9	55.1	18.5	4.8	0.7
i 問題を知れば投票しない	1,000	22.8	45.8	22.8	7.4	1.2	32.9	44.1	18.0	4.1	0.9

	調査数	肯定層		否定層	
		うつ病	統合失調症	うつ病	統合失調症
a 望めば問題から抜け出せる	1,000	41.8	36.2	32.9	40.0
b 問題は個人的な弱さの現れだ	1,000	56.2	57.6	15.9	16.8
c 問題は本当の医学的病気でない	1,000	41.9	42.5	24.4	23.4
d そんな問題を持つ人は危険だ	1,000	31.3	57.5	29.7	14.6
e 彼らを避けるのが最もよい	1,000	31.2	55.2	33.8	15.9
f 何をしてもかすかわからない	1,000	36.1	63.0	28.1	11.3
g 問題があっても誰にも言わない	1,000	36.5	49.1	28.3	19.0
h 問題を知れば雇わない	1,000	60.4	76.0	11.8	5.5
i 問題を知れば投票しない	1,000	68.6	77.0	8.6	5.0

※ 『肯定層』 = 「強く賛成」 + 「賛成」、『否定層』 = 「強く反対」 + 「反対」

	調査数	うつ病				早期統合失調症					
		強く賛成	賛成	賛成でも反対でもない	反対	強く反対	強く賛成	賛成	賛成でも反対でもない	反対	強く反対
a 望めば問題から抜け出せる	500	4.4	41.0	23.4	29.4	1.8	4.6	32.4	24.8	32.4	5.8
b 問題は個人的な弱さの現れだ	500	7.0	51.2	26.2	15.0	0.6	6.4	51.0	27.8	13.2	1.6
c 問題は本当の医学的病気でない	500	6.4	38.6	30.8	23.4	0.8	3.4	35.4	38.4	19.8	3.0
d そんな問題を持つ人は危険だ	500	4.6	28.0	35.0	29.0	3.4	7.4	44.0	32.2	14.8	1.6
e 彼らを避けるのが最もよい	500	3.2	29.0	34.6	30.8	2.4	5.2	46.2	32.6	14.0	2.0
f 何をしてもかすかわからない	500	4.6	31.2	36.4	25.0	2.8	8.0	50.6	29.6	10.6	1.2
g 問題があっても誰にも言わない	500	4.6	33.2	35.6	24.6	2.0	7.4	42.4	35.4	14.0	0.8
h 問題を知れば雇わない	500	10.8	54.8	24.0	9.2	1.2	17.2	55.6	20.4	6.0	0.8
i 問題を知れば投票しない	500	24.4	49.2	18.0	7.2	1.2	26.0	46.0	21.2	5.4	1.4

	調査数	肯定層		否定層	
		うつ病	統合失調症	うつ病	統合失調症
a 望めば問題から抜け出せる	500	45.4	37.0	31.2	38.2
b 問題は個人的な弱さの現れだ	500	58.2	57.4	15.6	14.8
c 問題は本当の医学的病気でない	500	45.0	38.8	24.2	22.8
d そんな問題を持つ人は危険だ	500	32.6	51.4	32.4	16.4
e 彼らを避けるのが最もよい	500	32.2	51.4	33.2	16.0
f 何をしてくすかわからない	500	35.8	58.6	27.8	11.8
g 問題があっても誰にも言わない	500	37.8	49.8	26.6	14.8
h 問題を知れば雇わない	500	65.6	72.8	10.4	6.8
i 問題を知れば投票しない	500	73.6	72.0	8.4	6.8

※ 『肯定層』 = 「強く賛成」 + 「賛成」、『否定層』 = 「強く反対」 + 「反対」

	調査数	うつ病 (希死念慮)				慢性統合失調症					
		強く賛成	賛成	賛成でも反対でもない	反対	強く反対	強く賛成	賛成	賛成でも反対でもない	反対	強く反対
a 望めば問題から抜け出せる	500	3.6	34.6	27.2	31.2	3.4	5.2	30.2	22.8	37.6	4.2
b 問題は個人的な弱さの現れだ	500	5.8	48.4	29.6	14.0	2.2	7.0	50.8	23.4	17.4	1.4
c 問題は本当の医学的病気でない	500	4.6	34.2	36.6	23.2	1.4	5.4	40.8	29.8	22.4	1.6
d そんな問題を持つ人は危険だ	500	3.2	26.8	43.0	24.4	2.6	14.6	49.0	23.6	12.2	0.6
e 彼らを避けるのが最もよい	500	3.6	26.6	35.4	30.6	3.8	10.4	48.6	25.2	13.8	2.0
f 何をしてくすかわからない	500	3.8	32.6	35.2	26.4	2.0	12.0	55.4	21.8	10.0	0.8
g 問題があっても誰にも言わない	500	5.0	30.2	34.8	28.2	1.8	9.4	39.0	28.4	20.8	2.4
h 問題を知れば雇わない	500	12.0	43.2	31.6	12.0	1.2	24.6	54.6	16.6	3.6	0.6
i 問題を知れば投票しない	500	21.2	42.4	27.6	7.6	1.2	39.8	42.2	14.8	2.8	0.4

	調査数	肯定層		否定層	
		うつ病	統合失調症	うつ病	統合失調症
a 望めば問題から抜け出せる	500	38.2	35.4	34.6	41.8
b 問題は個人的な弱さの現れだ	500	54.2	57.8	16.2	18.8
c 問題は本当の医学的病気でない	500	38.8	46.2	24.6	24.0
d そんな問題を持つ人は危険だ	500	30.0	63.6	27.0	12.8
e 彼らを避けるのが最もよい	500	30.2	59.0	34.4	15.8
f 何をしてくすかわからない	500	36.4	67.4	28.4	10.8
g 問題があっても誰にも言わない	500	35.2	48.4	30.0	23.2
h 問題を知れば雇わない	500	55.2	79.2	13.2	4.2
i 問題を知れば投票しない	500	63.6	82.0	8.8	3.2

※ 『肯定層』 = 「強く賛成」 + 「賛成」、『否定層』 = 「強く反対」 + 「反対」