




対象年齢  
生後1ヵ月～6歳

トップ > 発熱

### おがあさんの症状

- 発熱 (38℃以上)
- けいれん・ふるえ
- 吐き気
- せき・ゼゼエする
- 腹痛・便秘
- 皮膚のブツブツ
- 下痢
- 泣き止まない
- おしっこが出ない
- 意識がない
- 目を痛がる
- 頭痛
- 誤飲
- ウンチが変
- 鼻血
- 動物に咬まれた
- 虫に刺された
- やけど
- 頭を強くぶつけた



## 発熱 (38℃以上)

●お子さんにあてはまる項目全てにチェックしてください。  
※この1つ  をクリックしてください。(複数選択可)

- 生後3ヵ月未満である。
- 元気はある。
- 無表情で活気がない。
- おしっこが出ている。オムツがいつものとおり濡れている。
- あやすと笑う。
- 1日中ウトウトしている。
- 水分はとれる。

### 結果をみる

↑当てはまる症状を全てチェックしたらクリック！  
結果ボタンを押すと選択した項目に対応した結果が表示されます。

全ての項目をリセットする

管理

### おがあさんの救急

### 緊急時のLINK集

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集





# こどもの救急

対象年齢  
生後1か月～6歳

トップ > 発熱38℃以上 > 急患診療所に行く

- 気になる症状**
- 発熱 (38℃以上)
  - けいれん・ふるえ
  - 吐き気
  - せき・ゼエゼエする
  - 腹痛・便秘
  - 皮膚のブツブツ
  - 下痢
  - 泣き止まない
  - おしっこが出ない
  - 言語がない
  - 目を痛がる
  - 頭痛
  - 嘔吐
  - ウンチが変
  - 鼻血
  - 動物に咬まれた
  - 虫に刺された
  - やけど
  - 頭を強くぶつけた

## 行く!

急を要する症状がみられるようです。  
病院へ行くとよいでしょう。


お子さんの症状

■生後3か月未満である。

### 急患診療所に行く前に

#### 病院に行く前に準備するもの

- 健康保険証
- 母子健康手帳
- お金
- 着替え



#### 病院に行く時に…

- (1) 家を出る前に火元を確認!
- (2) 戸じまりを忘れずに!
- (3) 交通事故に気をつけましょう!

解熱剤を与える場合、次の種類は使わないでください。

×アスピリン
×ポンタール
×ボルタレン

### 急患診療所

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集

#### お医者さんに伝えましょう

1. 「いつから」「何℃の熱が」「どの位」続きましたか。  
いつから:  
何℃の熱が:  
どの位続いた:
2. 何かお薬をあげましたか。飲ませた場合お薬の説明書を持っていきましょう。  
薬の種類:

※このページをプリントアウトし、上記の事項を記入後、急患診療所の先生に見せると便利です。

>>戻る

(C)2004 社団法人 日本小児科学会





# こどもの救急

対象年齢  
生後1か月～6歳

## 高熱による症状

- 発熱(38℃以上)
- けいれん・ふるえ
- 吐き気
- せき・ゼゼエする
- 腹痛・便秘
- 皮膚のブツブツ
- 下痢
- 泣き止まない
- おしっこが出ない
- 意識がない
- 耳を痛がる
- 頭痛
- 嘔吐
- ウンチが変
- 鼻血
- 動物に咬まれた
- 虫に刺された
- やけど
- 頭を強くぶつけた

## おたふく病

## おたふく病のLINK

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集

トップ ▶ 発熱38℃以上 ▶ おたふく病 ▶ 赤ちゃんの救急

## おたふく病の症状が長引き



急を要する症状はみられないようです。  
様子をみながら診療時間になるのを待って  
お子さんを病院へつれて行くとよいでしょう。

お子さんの症状  元気はある。

## 餅子をごまめにみまじよう



解熱剤を与える場合、次の種類は変わらないでください。

- ×アスピリン
- ×ボンタール
- ×ボルタレン

## 発熱時の看病ポイント

- お子さんの状態は、熱の出始めは温かめに、熱が出きったら涼しくしてあげましょう。
- お子さんが暑そうなら涼しく、寒そうなら温かく、わまきやおふとんを調整してあげましょう。
- 脱水を起こさないよう、水分補給はこまめに。
- お子さんが気持ちよさそうだったら、氷のうを頭に当てるなど冷やしてあげましょう。
- 汗をよくかくので、着替えをごまめにしてあげましょう。
- 熱があっても元気そうだったら、解熱剤は使用しないようにしましょう。

**ただし症状が大きく変わったら急患診療所を受診してください。**  
※休日は、正月期間中は平日に急患診療所を受診してください。

## お医者さんに伝えましょう

- 1.「いつから」「何℃の熱が」「どの位」続きましたか。  
いつから:  
何℃の熱が:  
どの位続いた:
- 2.何かお薬をあげましたか。飲ませた場合お薬の説明書を持っていきましょう。  
薬の種類:



※このページをプリントアウトし、  
看病の際参考にしてください。

>>戻る

(C)2004 社団法人 日本小児科学会






発熱 (38℃以上)
けいれん・ふるえ
吐き気
せき・ゼゼゼする
腹痛・便秘
皮膚のブツブツ
下痢
泣き止まない
おしっこが出ない
意識がない
目を痛がる
頭痛
嘔飲
ウンチが変
鼻血
動物に咬まれた
虫に刺された
やけど
頭を強くぶつけた

**お母さんのLINK**

TOPページ  
サイトマップ  
インフォメーション  
このサイトについて  
リンク集

トップ > けいれん・ふるえ



## けいれん・ふるえ

●お子さんにあてはまる項目全てにチェックしてください。  
当てはまる  をクリックしてください (複数選択可)

けいれんのヒテオをしてみる。(QuickTime3MB) ▶

- 生後6か月未満である。
- けいれんが止まって、意識が戻った。
- くちびるの紫色が元に戻った。
- 初回のけいれんである。
- けいれんが5分以下でとまった。
- 体温が38℃以下であった。
- けいれんに左右差がある。
- けいれんと同時に吐いたり、もらしたりした。
- 最近頭を激しくぶつけた。
- 何度も、繰り返しけいれんがおこる。
- てんかんという症状がついている。
- けいれんかどうか分からない。

### 結果をさがす

↑当てはまる症状を全てチェックしたらクリック！  
結果ボタンを押すと選択した項目に対応した結果が表示されます。

全ての項目をリセットする

管理





トップ > けいれん・ふるえ > けいれん・ふるえのビデオ

### 気になる症状

発熱 (38℃以上)

けいれん・ふるえ

吐き気

せき・ゼゼゼする

腹痛・便秘

皮膚のブツブツ

下痢

泣き止まない

おしっこが出ない

意識がない

耳を痛がる

頭痛

嘔吐

ウンチが変


鼻血

動物に咬まれた

虫に刺された

やけど

頭を強くぶつけた




## けいれん・ふるえ

●お子さんにあてはまる項目全てにチェックしてください。

まだ不明な項目は  をクリックしてください (複数選択可)

けいれんのビデオ (QuickTime 3MB)

>>戻る



関連のリンク集

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集





- 赤ちゃんの症状**
- 発熱 (38C以上)
  - けいれん・ふるえ
  - 吐き気
  - せき・ゼゼゼする
  - 腹痛・便秘
  - 皮膚のブツブツ
  - 下痢
  - 泣き止まない
  - おしっこが出ない
  - 意識がない
  - 目を痛がる
  - 頭痛
  - 誤飲
  - ウンチが変
  - 鼻血
  - 動物に咬まれた
  - 虫に刺された
  - やけど
  - 頭を強くぶつけた

## ママの救急

## ママの救急

TOPページ  
 サイトマップ  
 インフォメーション  
 このサイトについて  
 リンク集

トップ > けいれん・ふるえ

行く!

救急車を呼ぶには

急を要する症状がみられるようです。

お子さんの症状

■生後6ヵ月未満である。


### 救急車の呼び方

まずは119にダイヤルを!

- (1) 局番なしの「119」をダイヤルします。
- (2) 「救急車をお願いします」と伝えます。
- (3) 次のことを伝えましょう。
  - お子さんの年齢
  - お子さんの名前
  - 住所
  - 電話番号
  - 場所の目標となる建物
- (4) お子さんの症状(上の選択肢)を伝えましょう。

### 救急車を待っている間

- (1) 次のものを準備しましょう。
  - 健康保険証
  - 母子健康手帳
  - お金
- (2) 玄関の鍵を開けておきましょう。
- (3) 家族や近所の人がいれば、救急車が到着したときの誘導をお願いしましょう。



### 救急車で病院に行く時

- (1) 家を出る前に火元を確認!
- (2) 戸じまりを忘れずに!

口に物をくわえさせてはいけません。

**けいれん時の看病ポイント**

顔を横向けにして、衣類をゆるめます。

### お医者さんに伝えましょう

1. 「いつから」「どんなけいれんが」「どの位」続きましたか。
  - いつから:
  - どんなけいれんが:

どの位続いた:

2 けいれんに、右半身、左半身だけのような左右差がありますか。

左右差はない 右半身のけいれんが強い 左半身のけいれんが強い

3 けいれんがみられたときの体温は何度ありましたか。

(            度)

測っていない( 発熱があった 発熱はない わからない)

※このページをプリントアウトし、上記の事項を記入後、急患診療所の先生に見せると便利です。

>>戻る

(C)2004 社団法人 日本小児科学会

●社団法人 日本小児科学会 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY  
Copyright © 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.





# 子どもの救急


対象年齢  
生後1か月～6歳

- 気になる症状**
- 発熱 (38C以上)
  - けいれん・ふるえ
  - 吐き気
  - せき・ゼエゼエする
  - 腹痛・便秘
  - 皮膚のブツブツ
  - 下痢
  - 泣き止まない
  - おしっこが出ない
  - 意識がない
  - 耳を痛がる
  - 頭痛
  - 誤飲
  - ウンチが変
  - 鼻血
  - 動物に咬まれた
  - 虫に刺された
  - やけど
  - 頭を強くぶつけた

トップ > けいれん・ふるえ > けいれん・ふるえ

## 行く!

急を要する症状がみられるようです。  
病院へ行くとよいでしょう。




お子さんの症状

- 何度も、繰り返しけいれんがおこる。
- けいれんかどうか分からない。

### 急患診療所に行く前に

#### 病院に行く前に準備するもの

- 健康保険証
- 母子健康手帳
- お金
- 着替え



#### 病院に行く時に…

- (1) 家を出る前に火元を確認!
- (2) 戸じまりを忘れずに!
- (3) 交通事故に気をつけましょう!



口に物をくわえさせてはいけません。

**意識がない時の看病ポイント**

顔を横向けにして、衣類をゆるめます。

#### お医者さんに伝えましょう

1. 「いつから」「どんなけいれんが」「どの位」続きましたか。  
いつから:  
どんなけいれんが:  
どの位続いた:
2. けいれんに、右半身、左半身だけのような左右差がありますか。  
 左右差はない  右半身のけいれんが強い  左半身のけいれんが強い
3. けいれんがみられたときの体温は何度ありましたか。  
 ( ) 度  
 測っていない(  発熱があった  発熱はない  わからない)

※このページをプリントアウトし、上記の事項を記入後、急患診療所の先生に見せると便利です。

[>>戻る](#)

©2004 社団法人 日本小児科学会

## 子どもの救急

### 緊急の時のLINK

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集







# 子どもの救急

対象年齢  
生後1か月～6歳

トップ > けいれん・ふるえ おうち(様子)のみしよ

けいれん
発熱 (38C以上)
けいれん・ふるえ
吐き気
せき・ゼゼゼする
腹痛・便秘
皮膚のブツブツ
下痢
泣き止まない
おしっこが出ない
意識がない
耳を痛がる
頭痛
誤飲
ウンチが変
鼻血
動物に咬まれた
虫に刺された
やけど
頭を強くぶつけた


おたふく病

SEOの時のLINK

TOPページ  
サイトマップ  
インフォメーション  
このサイトについて  
リンク集

待つ

(おたふく病)の予防と治療



急を要する症状はみられないようです。  
様子をみながら診療時間になるのを待って  
お子さんを病院へつれて行くとよいでしょう。

お子さんの症状

■くちびるの紫色が元に戻った。

## 様子をこまめにみましょう

口に物をくわえさせてはいけません。

**けいれん時の看病ポイント**

顔を横向けにして、衣類をゆるめます。

体を揺すったり、たたいたりしないようにしましょう。

けいれん時にケガをしないように、お子さんの周囲にある危険なもの(熱い飲みもの、先のとがったものなど)を取り除きましょう。

ただし症状が大きく変わったら急患診療所を要診してください。  
連休・正月期間中は土日にも急患診療所に受診してください。

### お医者さんに伝えましょう

- 「いつから」「どんなけいれんが」「どの位」続きましたか。  
いつから:  
どんなけいれんが:  
どの位続いた:
- けいれんに、右半身、左半身だけの様な左右差がありますか。  
左右差はない 右半身のけいれんが強い 左半身のけいれんが強い
- けいれんがみられたときの体温は何度ありましたか。  
 (      ) 度  
測っていない( 発熱があった 発熱はない わからない)



※このページをプリントアウトし、  
看病の際参考にしてください。

>>戻る

(C)2004 社団法人 日本小児科学会





### 気になる症状

発熱 (38C以上)

けいれん・ふるえ

吐き気

せき・ゼゼエする

腹痛・便秘

皮膚のブツブツ

下痢

泣き止まない

おしっこが出ない

意識がない

目を痛がる

頭痛

誤飲

ウンチが変

鼻血

動物に咬まれた

虫に刺された

やけど

頭を強くぶつけた

トップページ



## 吐き気

●お子さんにあてはまる項目全てにチェックしてください。

※この1つ□をクリックしてください。(複数選択可)


- 生後3か月未満である。
- 母乳、ミルクのたびに勢いよくおう吐を繰り返す。
- ほとんど飲めない。
- がまんできないほどの激しいおなかの痛みを訴える。
- 血、もしくは胆汁(緑色の液体)を吐いた。
- 吐いたものがコーヒーの残りがすのようだ。
- 元気がある。
- いつもと様子があまり変わらない。
- おしっこがでている。オムツがいつも通りぬれている。
- くちびるが乾いている。
- 頭を激しく痛がる。
- 無表情でウトウトしている。

### 注意喚起

↑当てはまる症状を全てチェックしたらクリック！  
結果ボタンを押すと選択した項目に対応した結果が表示されます。

全ての項目をリセットする

管理



関連のリンク集

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集





# ママの救急

対象年齢  
生後1か月～6歳

## 高熱による症状

発熱 (38℃以上)

けいれん・ふるえ

吐き気

せき・ゼゼエする

腹痛・便秘

皮膚のブツブツ

下痢

泣き止まない

おしっこが出ない

反応がない

耳を痛がる

頭痛

誤飲

ウンチが変

鼻血

動物に咬まれた

虫に刺された

やけど

頭を強くぶつけた

## ママの救急

### 緊急時のLINK集

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集

トップ > 吐き気 日本小児科医学会

## 行く! 救急車を呼ぶタイミングで病院へ行く

急を要する症状がみられるようです。  
病院へ行くとよいでしょう。




お子さんの症状

- 生後3か月未満である。
- 母乳、ミルクのたびに勢いよくおう吐を繰り返す。

### 急患診療所に行く前に

#### 病院に行く前に準備するもの

- 健康保険証
- 母子健康手帳
- お金
- 着替え



#### 病院に行く時に…

- (1) 家を出る前に火元を確認!
- (2) 戸じまりを忘れずに!
- (3) 交通事故に気をつけましょう!

### 吐き気・おう吐時の看病ポイント

吐いたものがのどにつまらないように、横を向いて寝かせましょう。

病院に行くとき吐いたものをビニール袋などに入れて持っていきましょう。

乳幼児用イオン飲料を少しずつ頻繁にあげましょう

ご家庭に、乳幼児用イオン飲料を常備しておくといいてしょう  
脱水時に水分とともにミネラルも補給でき、



#### お医者さんに伝えましょう

1. 「いつから」「何回」吐きましたか。

いつから:  
吐いた回数:

2. 吐いたものの特徴を選んでください。

- 酸っぱい匂いがする
- おうちの匂いに似ている
- コーヒーの残りかすのようだ
- 緑っぽい色をしている
- その他:

3. オムツを何回替えましたか、または何回おしっこに行きましたか。

午前


午後

( ) 時間で ( ) 回

※このページをプリントアウトし、上記の事項を記入後、急患診療所の先生に見せると便利です。

[>>戻る](#)

(C)2004 社団法人 日本小児科学会

●社団法人 日本小児科学会 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY   
Copyright © 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.



# ママの救急

対象年齢  
生後1か月～6歳

- 気になる症状**
- 発熱（38℃以上）
  - けいれん・ふるえ
  - 吐き気
  - せき・ゼゼエする
  - 腹痛・便秘
  - 皮膚のブツブツ
  - 下痢
  - 泣き止まない
  - おしっこが出ない
  - 意識がない
  - 耳を痛がる
  - 頭痛
  - 誤飲
  - ウンチが変
  - 鼻血
  - 動物に咬まれた
  - 虫に刺された
  - やけど
  - 頭を強くぶつけた

**ママの救急**  
ママの救急のLINK集

TOPページ  
サイトマップ  
インフォメーション  
このサイトについて  
リンク集

トップ > 吐き気・おう吐の様子をみましょう



## おむつ交換の様子をみましょう



急を要する症状はみられないようです。  
様子をみながら診療時間になるのを待って  
お子さんを病院へつれて行くとよいでしょう。

お子さんの症状	<input checked="" type="checkbox"/> 元気がある。
---------	--

## 様子をこまめにみましょう

- 吐き気・おう吐時の看察ポイント**
- 吐いたものがのどにつまらないように、横を向いて寝かせましょう。
  - 乳幼児用イオン飲料を少しずつ頻繁にあげましょう。

ご家庭に、乳幼児用イオン飲料を常備しておく  
とよいでしょう  
脱水時に水分とともにミネラルも補給できませう。



**ただし症状が大きく変わったら急患診療所を受診してください。**  
連休・正月期間中は翌日に急患診療所を受診してください。

## お医者さんに伝えましょう

- 1.「いつから」「何回」吐きましたか。  
いつから：  
吐いた回数：
- 2.吐いたものの特徴を選んでください。  
 酸っぱい匂いがする  
 おうちの匂いに似ている  
 コーヒーの残りがすのようだ  
 緑っぽい色をしている  
 その他：
- 3.オムツを何回替えましたか。または何回おしっこに行きましたか。  
 午前  
 午後  
 ( ) 時間で ( ) 回



※このページをプリントアウトし、  
看病の参考にしてください

>>戻る



トップ [ヘルプ](#) [お問い合わせ](#)

- 気になる症状**
- 発熱 (38C以上)
  - けいれん・ふるえ
  - 吐き気
  - せき・ゼエゼエする**
  - 腹痛・便秘
  - 皮膚のブツブツ
  - 下痢
  - 泣き止まない
  - おしっこが出ない
  - 意識がない
  - 耳を痛がる
  - 頭痛
  - 誤飲
  - ワンチが変
  - 鼻血
  - 動物に咬まれた
  - 虫に刺された
  - やけど
  - 頭を強くぶつけた



## せき・ゼエゼエする

●お子さんにあてはまる項目全てにチェックしてください。

※正しいををクリックしてください。(複数選択可)

- 気管支が弱い、喘息と言われたことがある。
- 38度以上の発熱がある。
- 突然ゼエゼエし始めた。
- ゼエゼエする直前、口に物をくわえていた。
- 唇の色が紫色をしている。
- 顔色はよく、唇も赤い。
- 鼻水が出ている。
- 声がかすれてほとんど聞こえない。話ができない。
- おしっこが少ない。オムツが濡れても軽い。
- 元気がある。


**結果をさがす**

↑当てはまる症状を全てチェックしたらクリック！  
結果ボタンを押すと選択した項目に対応した結果が表示されます。

全ての項目をリセットする



管理



緊急時のLINK集

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集





# こどもの救急

対象年齢  
生後1か月～6歳

- 気になる症状
- 発熱 (38℃以上)
  - けいれん・ふるえ
  - 吐き気
  - せき・ゼゼゼする
  - 腹痛・便秘
  - 皮膚のブツブツ
  - 下痢
  - 泣き止まない
  - おしっこが出ない
  - 意識がない
  - 目を痛がる
  - 頭痛
  - 嘔吐
  - ウンチが変
  - 鼻血
  - 動物に咬まれた
  - 虫に刺された
  - やけど
  - 頭を強くぶつけた

## おたふく病

## おたふく病のLINK集

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集

トップ > せき・ゼゼゼする > 救急車を呼ぶ時



### 救急車で病院に行く時

急を要する症状がみられるようです。



お子さんの症状	■唇の色が紫色をしている。
---------	---------------


### 救急車の呼び方

まずは119にダイヤルを！

- (1) 局番なしの「119」をダイヤルします。
- (2) 「救急車をお願いします」と伝えます。
- (3) 次のことを伝えましょう。
  - お子さんの年齢
  - お子さんの名前
  - 住所
  - 電話番号
  - 場所の目標となる建物
- (4) お子さんの症状(上の選択肢)を伝えましょう。

### 救急車を待っている間

- (1) 次のものを準備しましょう。
  - 健康保険証
  - 母子健康手帳
  - お金
- (2) 玄関の鍵を開けておきましょう。
- (3) 家族や近所の人がいれば、救急車が到着したときの誘導をお願いします。



### 救急車で病院に行く時

- (1) 家を出る前に火元を確認！
- (2) 戸じまりを忘れずに！

**せき・ゼゼゼする時の看病ポイント**

まずは唇の色を観察！

泣いた際に唇の色が明らかに暗赤色や紫色を示す場合には、熱の有無や原因に関わらず急患診療所を受診すべきでしょう。

>>戻る

(C)2004 社団法人 日本小児科学会





トップ > せき 日本小児科学会 JCS

- おこさんの症状**
- 発熱 (38C以上)
  - けいれん・ふるえ
  - 吐き気
  - せき・ゼエゼエする
  - 腹痛・便秘
  - 皮膚のブツブツ
  - 下痢
  - 泣き止まない
  - おしっこが出ない
  - 意識がない
  - 耳を痛がる
  - 頭痛
  - 誤飲
  - ウンチが変
  - 鼻血
  - 動物に咬まれた
  - 虫に刺された
  - やけど
  - 頭を強くぶつけた

**おこさんの救急**

**おこさんのLINK**

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集

## 行く! 急を要する症状がみられるようです。



お子さんの症状


急を要する症状がみられるようです。  
病院へ行くとよいでしょう。

- 気管支が弱い、喘息と言われたことがある。
- 38度以上の発熱がある。

### 急患診療所に行く前に

#### 病院に行く前に準備するもの

- 健康保険証
- 母子健康手帳
- お金
- 着替え



#### 病院に行く時に...

- (1) 家を出る前に火元を確認!
- (2) 戸じまりを忘れずに!
- (3) 交通事故に気をつけましょう!

せき・ゼエゼエする時の看病ポイント
<p><b>まずは唇の色を観察!</b></p> <p>泣いた際に唇の色が明らかに暗赤色や紫色を示す場合には、熱の有無や原因に関わらず急患診療所を受診すべきでしょう。</p>
<p><b>犬の遠吠えみたいな太い声になっていませんか?</b></p> <p>・この場合、なるべく泣かせない様にすることが最も大切です。</p> <p>・昼間に比べ夜にひどくなる事が多くみられます。昼間であれば夕方遅くならないうちに早めに受診しておいた方がいいでしょう。</p> <p>・夜でもあやしているうちにすやすや眠ってしまう様だったら、翌朝まで待っても大丈夫です。ただし赤ちゃんの声がかすれて聞こえなくなる程ひどければ、受診した方が無難でしょう。</p>
<p><b>何か食べていたり、口にくわえて遊んでいませんか?</b></p> <p>・「数分」前まで何もなかったのに(お茶にむせたかのように)急に咳がとまらなくなりましたか? 咳が短時間で止まるようなら心配ありませんが、咳き込みが続くようなら受診した方がいいでしょう。</p> <p>・特にピーナッツなどの豆類を食べていた場合は要注意です。</p>

>>戻る

(C)2004 社団法人 日本小児科学会







病に悩む症状

発熱 (38℃以上)
けいれん・ふるえ
吐き気
せき・ゼゼゼする
腹痛・便秘
皮膚のブツブツ
下痢
泣き止まない
おしっこが出ない
反応がない
目を痛がる
頭痛
誤飲
ウンチが変
鼻血
動物に咬まれた
虫に刺された
やけど
頭を強くぶつけた

## おたふく病


## 緊急時のリンク集

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集

トップ > せき・ゼゼゼする (おたふく病+おたふく病)



### おたふく病(おたふく病)の症状



急を要する症状はみられないようです。  
様子をみながら診療時間になるのを待って  
お子さんを病院へつれて行くといでしょう。

お子さんの症状

- 気管支が弱い、喘息と言われたことがある。
- 元気がある。

### 様子をこまめにみまじよう

#### せき・ゼゼゼする時の看病ポイント

まずは唇の色を観察！

泣いた際に唇の色が明らかに暗赤色や紫色を示す場合には、熱の有無や原因に関わらず急患診療所を受診すべきでしょう。

気管支が弱い(あるいは喘息気味)と言われたことがありますか？

- ・お子さんご本人用に処方された手持ちの気管支拡張剤があれば、それを飲ませて(シールの場合は1枚貼って)30分～1時間位様子を見てください。
- ・咳が軽くなったりよく眠れるようになったりしたら、そのまま様子を見て大丈夫でしょう。
- ・ただし翌日必ずかかりつけ医を受診してください。

だんだんと犬の遠吠えみたいな太い声になっていませんか？

- ・この場合、なるべく泣かせない様にするのが最も大事です。

イラストイラストイラスト

おかあさんがお子さんを抱っこして落ち着かせてあげましょう。

・昼間に比べ夜にひどくなる事が多くみられます。昼間にあれば夕方遅くならないうちに早めに受診しておいた方がいでしょう。

・夜でもあやしているうちにすやすや眠ってしまう様だったら、翌朝まで待っても大丈夫です。ただし赤ちゃんの声がかすれて聞こえなくなる程ひどければ、受診した方が無難でしょう。

何か食べていたり、口にくわえて遊んでいませんか？

- ・「数分」前まで何もなかったのに(お茶にむせたかのように)急に咳がとまらなくなりましたか？ 咳が短時間で止まるようなら心配ありませんが、咳き込みが続くようなら受診した方がいでしょう。
- ・特にピーナッツなどの豆類を食べていた場合は要注意です。

**ただし症状が大きく変わったら急患診療所を要診してください。**  
急患診療所とは、夜間・休日・お盆・お正月に救急センターに代わり、24時間受付している診療所です。



※このページをプリントアウトし、  
看病の参考にしてください

>>戻る



- 気になる症状**
- 発熱 (38C以上)
  - けいれん・ふるえ
  - 吐き気
  - せき・ゼゼエする
  - 腹痛・便秘
  - 皮膚のブツブツ
  - 下痢
  - 泣き止まない
  - おしっこが出ない
  - 発語がない
  - 耳を痛がる
  - 頭痛
  - 誤飲
  - ウンチが変
  - 鼻血
  - 動物に咬まれた
  - 虫に刺された
  - やけど
  - 頭を強くぶつけた

## 気になる病気

## ママのLINK

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集

トップ



## 腹痛・便秘

●お子さんにあてはまる項目全てにチェックしてください。  
当てはまるをクリックしてください。(複数選択可)

- ウンチの中に血が混じっている。
- ウンチの表面に血がつく、もしくはティッシュに血がつく。
- おまた(陰のう、股のつけね)を痛がる。
- おなかを激しくぶつけた。
- おなかがバンバンにふくらんでいる。
- コーヒーの残りかすのようなものを吐いた。
- おなかをさわると嫌がる。
- 腹痛が2、3日続いている。
- おなかの風邪が周りではやっている。
- 数日便が出ていない。
- おへその周りを痛がる。
- ウンチをしたら痛みがやわらいだ。

### しよとせ

↑当てはまる症状を全てチェックしたらクリック！  
結果ボタンを押すと選択した項目に対応した結果が表示されます。

全ての項目をリセットする

管理





トップ・腹痛・便秘・嘔吐・下痢・ゲップ・吐き

### 気になる症状

発熱 (38C以上)

けいれん・ふるえ

吐き気

せき・ゼゼエする

腹痛・便秘

皮膚のブツブツ

下痢

泣き止まない

おしっこが出ない

登壇がない

耳を痛がる

頭痛

過飲

ウンチが変

鼻血

動物に咬まれた

虫に刺された

やけど

頭を強くぶつけた



ママの救急のLINK集

TOPページ  
サイトマップ  
インフォメーション  
このサイトについて  
リンク集

**行く!** 急を要する症状がみられるようです。病院へ行くとよいでしょう。




お子さんの症状

■ウンチの中に血が混じっている。

### 急患診療所に行く前に

#### 病院に行く前に準備するもの

- 健康保険証
- 母子健康手帳
- お金
- 着替え



#### 病院に行く時に…

- (1) 家を出る前に火元を確認!
- (2) 戸じまりを忘れずに!
- (3) 交通事故に気をつけましょう!

### 4 腹痛・便秘時の看病ポイント

<他の症状はありませんか?>

発熱はどうでしょう? また吐き気はありますか?

- ・お腹の風邪では、通常吐き気や発熱を伴うことがよくあります。
- ・室温程度の赤ちゃん用のイオン飲料を少量与え、ミルク・牛乳や食事はなるべく半日程度控えるのがコツです。

咳が激しくありませんか? ゼイゼイしていませんか?

- ・喘息や気管支炎、肺炎でお腹が痛くなることはよくあります。

<原因で何か思い当たることはありませんか?>

同じものを食べた人が、似たような症状で苦しんでいませんか?

- ・お刺身などの生ものや冷たいジュースの取りすぎなど、ころあたりはありませんか?
- ・同じものを食べて、同じ症状の方がほぼ同時に発生した場合は食中毒も考えられます。
- ・バイ菌の検査を、薬(特に抗生剤)を飲む前に行うことが大切です。あわてる必要はありませんが、なるべく早めにかかりつけの先生を受診しましょう。

### お医者さんに伝えましょう

1. おなかの痛みはどのくらい続きましたか。

分( )くらい続いた  痛くなったり治まったりした

2. おう吐はありましたか。

ない  ある(特徴:  コーヒーの残りカスのよう  緑色

その他: ( )

※吐いた場合は、吐いたものをもっていき、受診する際にお医者さんにみせましょう。

3. ウンチは出ましたか?

出ていない(出ていない期間: ( ) 日間)

