



おこにくる症状
発熱（38℃以上）
けいれん・ふるえ
吐き気
せき・ゼエゼエする
腹痛・便秘
皮膚のツツツ
下痢
泣き止まない
おしっこが出ない
嘔吐がない
目を痛がる
頭痛
誤飲
ウンチが変
鼻血
動物に咬まれた
虫に刺された
やけど
頭を強くぶつけた


トップ 腹痛・便秘 わづらわづら子をみましょう



わづらわづら子をみましょう

急を要する症状はみられないようです。

様子をみながら診療時間になるのを待つて
お子さんを病院へつれて行くとよいでしょう。



お子さんの症状

■数日便が出ていない。

経過観察をしましょう

腹痛・便秘時の看病ポイント

<腹痛を訴える場合、まず1日の排便回数とウンチの状態を確認しましょう>

毎日出ていますか？ 固くコロコロとしたウンチではありませんか？

・他に症状がほとんどなく固いウンチであれば、たとえ今日ウンチが出ていたとしても、浣腸が効果的なことがあります。

血が混じっていませんか？ 下痢ですか？

・ウンチに混じらず、お尻を拭いたティッシュに血がつくのは血便ではありません。また、ウンチが固い場合、お尻の出口が切れてウンチの表面に赤い血がごく少量つくことはよくあります。時間外であれば、お湯で清潔に洗っておくだけで十分です。通常の診療時間にかかりつけの先生にご相談ください。

・逆に下痢に血や膿が混じっている場合は、時間をおかず早目に受診する方がいいでしょう。

「ただし症状が大きくなったら急患診療所を受診してください。」

連休（正月期間中は翌日に急患診療所を受診してください。）

お医者さんに伝えましょう

1. おなかの痛みはどのくらい続きましたか。

分くらい)続いた 痛くなったり治まったりした

2. おう吐はありましたか。

ない ある一特徴: 口コーヒーの残りカスのよう 緑色

その他()

※吐いた場合は、吐いたものをとっておき、受診する際にお医者さんにみせましょう。

3. ウンチは出ましたか？

出ていない(出でない期間: 日間)

出た一いつから: 何回: どれくらいの量:

特徴: 口白っぽい 黒っぽい 赤っぽい 黃っぽい

その他()

※オムツをとっておき、受診する際にお医者さんにみせましょう。



このページをプリントアウトし、
看病の際参考にしてください。

>>戻る

(C)2004 厚生労働省研究班・社団法人 日本小児科学会

LINE おかあさんための救急＆予防サイト

対象年齢
1ヶ月～6歳

[TOP](#) [お子さんのアレルギー](#)

皮膚のブツブツ

[写真で見よう！皮膚の症状](#)

かゆみがある。
 菜を飲んで発疹が出てきた。
 もりあがったリング状の発疹が出てきた。
 顔やくちびるが、はればほしい。
 息苦しく、声がかすれてきた。
 舌にイチゴのようなザラザラがある。
 目とくちびるが真っ赤だ。
 暗い紫色の小さな点々が、足のひざから下に出ている。
 関節やおまた(肱のう、股のつけね)をいたがる。
 皮膚のブツブツに、膿(うみ)や汁(しる)がある。
 小さな水ぶくれがボチボチと出てきた。
 リンゴのような赤いほっぺたになった。
 热が長引き、皮膚のブツブツがてはじめた。
 目ヤニやせきがひどく、元気がない。


[もとをさぐる](#)

当てはまる症状を全てチェックしたらクリック！
結果ボタンを押すと選択した項目に対応した結果が表示されます。

[全ての項目をリセットする](#)

[TOPページ](#) [サイトマップ](#) [インフォメーション](#) [このサイトについて](#) [リンク集](#) [管理](#)

●社団法人 日本小児科学会 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY



トップ > 皮膚のブツブツ > ちんこ皮膚

皮膚のブツブツ

以下の写真のうち、お子さんの皮膚の状態に一番近いものはどれですか。



画像をクリックすると、結果ページに進みます。

(当てはまるものがなければ、前のページへ戻る)



皮膚の病のLINK

- [TOPページ](#)
- [サイトマップ](#)
- [インフォメーション](#)
- [このサイトについて](#)
- [リンク集](#)




454 - CAVES



454 - CAVES



454 - CAVES



>>戻る

●社団法人 日本小児科学会 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY



〒107-0054 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY Aoyama 5-chome

TEL: 03-3475-2111 FAX: 03-3475-2112 E-mail: jps@jps.or.jp URL: http://www.jps.or.jp

おかあさんための救急＆予防サイト

対象年齢
生後1ヶ月～6歳

TOP > 皮膚のブツブツ (1ヶ月～6歳) > 行く

行く!

急を要する症状がみられるようです。
病院へ行くとよいでしょう。

お子さんの症状

- 顔やくちびるが、はれぼったい。
- 息苦しく、声がかすれてきた。

人にうつす可能性があります。病院の受付で
もそのことを伝えましょう。

急诊診療所に行く前に

病院に行く前に準備するもの

- 健康保険証
- 母子健康手帳
- お金
- 着替え

病院に行く時に…

- (1)家を出る前に火元を確認！
- (2)戸じまりを忘れずに！
- (3)交通事故に気をつけましょう！

皮膚のブツブツが出た時の看病ポイント

- ・ブツブツの出る前に薬を飲んでいた場合、その薬は飲ませないようにしましょう。また病院にその薬の説明書を持っていきましょう。

お子さんの状況

TOPページ
サイトマップ
インフォメーション
このサイトについて
リンク集

お医者さんに伝えましょう

1. いつからブツブツが出てきましたか。
2. ブツブツが出る前に、いつもと違うことをしましたか。
 薬を飲んだ
 外で草木にさわった
 保育園や幼稚園に同じような症状のあるお子さんがいた
 その他:
3. 今まで薬や食べ物でアレルギーを起こしたことがありますか。
 ある:
 ない
4. ヘットをかっていますか。
 はい ヘットの種類:
 いいえ

※このページをプリントアウトし、上記の事項を記入後、急患診療所の先生に見せると便利です。

>>戻る
(C)2004 社団法人 日本小児科学会

●社団法人 日本小児科学会 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

Copyright 2004, JAPAN PEDIATRIC SOCIETY All rights reserved.



ONLINE おかかるための教養＆予防サイト

子供の皮膚

対象年齢
1ヶ月～6歳

TOP 皮膚のブツブツ わづらで悩まされませんか？

発熱（38℃以上）
けいれん・ふるえ
吐き気
せき・ゼエゼエする
腹痛・便秘
皮膚のブツブツ
下痢
泣き止まない
おしっこが出ない
意識がない
目を痛がる
頭痛
誤飲
ウンチが臭い
吐血
動物に咬まれた
虫に刺された
やけど
頭を強くぶつけた

急を要する症状はみられないようです。
様子をしながら診療時間になるのを待つて
お子さんを病院へつれて行くとよいでしょう。

お子さんの症状 ■熱が長引き、皮膚のブツブツがはじめた。

様子をこまめにみまじょ

皮膚のブツブツが出た時の看病ポイント

- ・ブツブツの出る直前に薬を飲んでいた場合、その薬は飲ませないようにしましょう。また病院にその薬の説明書を持っていきましょう。
- ・小さなお子さん、特に赤ちゃんは肌がテリケートで赤いぶつぶつができやすいものです。よだれやミルク、汗などで余計ひどくなるのでお肌の清潔が第一。お風呂できれいにしてあげましょう。
- ・特にお風呂あがりには赤味が強く見えることがあります、ご心配なく。
- ・瞼が腫れたり喉がゼイゼイしたり、かゆくて仕方がないなど他の症状がなければ、とりあえずおうちで様子を見て大丈夫でしょう。
- ・ベビーオイルでかえって肌荒れが強くなることもあるので、塗り薬といえど安易な使用は控えて、翌日かかりつけの先生を受診しましょう。
- ・もし最近お薬を飲み始めたばかりなら、とりあえず一旦そのお薬をやめて処方して貰った先生に相談して下さい。

ただし症状が大きくなったら直ちに病院を訪してください。
（緊急時以外は必ず翌日以内に受診して下さい）

このページのLINK

TOPページ
サイトマップ
インフォメーション
このサイトについて
リンク集

- お医者さんに伝えましょう
1. いつからブツブツが出てきましたか。
ある
ない
 2. ブツブツが出る前に、いつもと違うことをしましたか。
薬を飲んだ
口外で草木にさわった
保育園や幼稚園に同じような症状のあるお子さんがいた
その他
 3. 今まで薬や食べ物でアレルギーを起こしたことがありますか。
ある
ない
 4. ヘットをかっていますか。
はい ヘットの種類
いいえ



このページをプリントアウトし、
看病の際参考にしてください。


>>戻る

(C)2004 社団法人 日本小児科学会

●社団法人 日本小児科学会 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY All rights reserved





トップ ホーム

お化だる症状

発熱 (38°C以上)

けいれん・ふるえ

吐き気

せき・ゼエゼエする

腹痛・便秘

皮膚のブツブツ

下痢

泣き止まない

おしっこが出ない

意識がない

耳を痛がる

頭痛

誤飲

ウンチが変

鼻血

動物に咬まれた

虫に刺された

やけど

頭を強くぶつけた

下痢

写真で見よう！このウンチは大丈夫。▶

- 生後3ヶ月未満である。
- おしっこがでている。オムツがいつもどおり濡れている。
- 元気がある。
- 何度も吐く。
- 水分はとれている。
- 目がくぼんでいる。
- 38°C以上の発熱。
- くちびるや口の中が乾燥している。

まとめ次第

「当てはまる症状を全てチェックしたらクリック！」

結果ボタンを押すと選択した項目に対応した結果が表示されます。

全ての項目をリセットする→

管理

おひなさん

他のLINK

TOPページ
サイトマップ
インフォメーション
このサイトについて
リンク集

●社団法人 日本小児科学会 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

〒107-0044 東京都港区元赤坂1-10-16 TEL 03-5561-0200



ONLINE あかあさんための教育&予防サイト

赤ちゃんのウンチ

対象年齢
生後1ヶ月～6歳

気になる症状

- 発熱（38℃以上）
- けいれん・ふるえ
- 吐き気
- せき・ゼエゼエする
- 腹痛・便秘
- 皮膚のツツツ
- 下痢
- 泣き止まない
- おしっこが出ない
- 耳垢がない
- 耳を痛がる
- 頭痛
- 誤飲
- ウンチが変
- 鼻血
- 動物に咬まれた
- 虫に刺された
- やけど
- 頭を強くぶつけた

[トップ](#) > 下痢 [下痢の原因](#) [赤ちゃんのウンチ](#)

健康な赤ちゃんのウンチ

赤ちゃんを育てているとき、お母さん方はきっといろいろなウンチをみることでしょう。ここにあげた写真はいずれも生理的なウンチなので、特に治療を必要としませんでした。このようなウンチにもかかわらず、赤ちゃんは機嫌良く順調に育っています。ウンチだけでなく、からだ全体の様子を見ることが大切です。

母乳栄養児のウンチ




▲典型的な母乳栄養児のウンチで、軟らかく、粘液、ツツツが混じっています。



▲淡黄緑色で、ふわっとした発酵性のウンチで、酸臭があり、回数が多いです。



▲泥状のウンチで水分、粘液が多く、回数は多いですが、1回の量はまちまちです。このようなウンチでも機嫌はよく、体重増加は順調です。



▲緑色っぽいウンチ(糞便)で、水分と粘液が多く、周囲にじんで広がっています。




▲茶色で均等なウンチです。オムツにべつとりついて、おちにくいのが特徴です。



▲オムツについたまま放置しておくと、空気に触れて緑色に変化することがあります。

このページのLINK


- [TOPページ](#)
- [サイトマップ](#)
- [インフォメーション](#)
- [このサイトについて](#)
- [リンク集](#)



▲粘液、ツブツブを含んだ緑便です。



▲3日間排便がなく、洗腸したときのウンチです。泥状で悪臭があります。



▲母乳栄養児に似たウンチですが、人工栄養児にもみられる大小のツブツブも混じっています。

■ 哺乳児のウンチ



▲典型的な人工栄養児のウンチです。



▲融臭があり、空気にふれて一部緑色に変化しています。粘液が少なく、オムツからはがれます。



▲回数が多く、軟らかいウンチで粘液やツブツブを含んでいます。機嫌はよく、発育も順調です。



▲果汁を与えると、このような色になり、ゆるむことがあります。このようなウンチでも、全身状態は良好です。




▲形があるウンチで、おむつにくっつきません。

▲人工栄養でも綠便になり、回数の多くなることがあります。機知や体重増加が原因であれば心配ありません。

●おむつのうんち



▲いろいろな種類の食事をするので、色や臭いがおとなとのウンチに似てきます。粘液や、消化されないものが混じっています。



▲母乳とミルクも飲んでいます。粘液やツブツブが混じり、難分発酵性で、オムツにべったりついでいます。



▲朝食べたリンゴ・ニンジンなどが消化されないでそのまま出ています。離乳期ではときどきみられます。

>>戻る

協力 こどもの城 小児保健クリニック 川野裕郎(こうのひろろう)先生

資料提供:アイクレオ株式会社

●社団法人 日本小児科学会 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY



お子さんための救急と予防サイト

下痢の原因

対象年齢
1ヶ月～6歳

TOP > 下痢・吐き気・ツブツブ

行く!

急を要する症状がみられるようです。
病院へ行くとよいでしょう。

お子さんの症状 ■生後3ヶ月未満である。

急患診療所に行く前に

病院に行く前に準備するもの

- 健康保険証
- 母子健康手帳
- お金
- 着替え


病院に行く時に…

- (1) 家を出る前に火元を確認！
- (2) 戸じまりを忘れずに！
- (3) 交通事故に気をつけましょう！

下痢の看病ポイント

・救急外来を受診した方がいいのは、熱や吐き気を伴っている場合、下痢に血や膿が混じっている場合、ぐったりして動くのがおっくうそうな場合などです。

下痢をした場合は、オムツをとっておき、受診する際にお医者さんにみせましょう



お子さんのLINK集

TOPページ
サイトマップ
インフォメーション
このサイトについて
リンク集

お医者さんに伝えましょう

1. ウンチの回数を伝えましょう。

いつから:
何回:
どれくらいの量:

2. ウンチの色はどれに近いですか。

白っぽい 黒っぽい 赤っぽい 黄っぽい
 その他

3. おうちで他にケリをしている人がいますか。

いる いない

4. 水分は取っていますか。

とれている 質:
 とれていない どれくらいの期間

5. 近所にたくさん野良猫がいますか。

いる いない

このページをプリントアウトし、上記の事項を記入後、急患診療所の先生に見せると便利です。

>>戻る

(C)2004 社団法人 日本小児科学会

●社団法人 日本小児科学会 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY All rights reserved



ONLINE おかあさんための救急＆予防サイト

赤ちゃんの病気

対象年齢
1ヶ月～6歳

TOP > 下痢 > おまかせ相談室

おまかせ相談室

急を要する症状はみられないようです。
様子をしながら診療時間になるのを待って
お子さんを病院へつれて行くとよいでしょう。

■おしっこがでている。オムツがいつもどおり濡れ
ている。
■元気がある。

様子をこまめにみまじょ

下痢の看病ポイント

- ・赤ちゃんや小さなお子さんの下痢は長引きますが慌てなくても大丈夫、一番大事なのは上手な水分補給とミルクや食事の調整です。
- ・お腹が空くのは体調がいい証拠ですが、普段と同じ同じ量のミルクや食事では消化不良の後押しになってしまいます。1回に飲むミルクの量を減らしたり、濃い果汁を避けたりしてみましょう。離乳食を食べている赤ちゃんなら一旦離乳食をやめるか、お粥だけにするといいでしょう。
- ・熱や吐き気が無くても、翌日にはかかりつけの先生は診てもらいましょう。

ただし症状が大きくなったら急诊診療所を受診してください。
連休・正月期間中は翌日に急诊診療所に受診してください。

トントをした場合は、オムツをとっておき、受診する際にお医者さんにみせましょう

お医者さんに伝えましょう

1. ウンチの回数を伝えましょう。
 いつから
 何回
 どれくらいの量
2. ウンチの色はどれに近いですか。
 口白っぽい 口黒っぽい 口赤っぽい 口緑っぽい
 口その他
3. おうちで他にゲリをしている人がいますか
 口いる 口いない
4. 水分は取っていますか。
 口とれている 番
 口とれていない どれくらいの時間
5. 近所にたくさん野良猫がいますか
 口いる 口いない



このページをプリントアウトし、
看病の参考にしてください。

>>戻る

(C)2004 社団法人 日本小児科学会

●社団法人 日本小児科学会 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY
Copyright 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY All rights reserved



ONLINE おかあさんための救急＆予防サイト



対象年齢
1ヶ月～6歳

[TOP](#)

泣き止まない

●お子さんにあてはまる項目全てにチェックしてください。
【(複数選択可)】

<input type="checkbox"/> 母乳やミルクを与えると落ち着く。
<input type="checkbox"/> 元気である。
<input type="checkbox"/> だっこしてしばらくすると、泣きやむ。
<input type="checkbox"/> お尻が赤い。
<input type="checkbox"/> 耳をさわる。耳だれがある。
<input type="checkbox"/> オムツを変える時、足を痛がる。
<input type="checkbox"/> 泣いていたのに、急に泣きやみぐったりした。
<input type="checkbox"/> 2～3日前からウンチが出ていない。
<input type="checkbox"/> おまた(陰のう、股のつけね)がふくらんでいる。
<input type="checkbox"/> 顔色が悪く、不機嫌そうに痛がる。
<input type="checkbox"/> 突然、おびえて泣き出す。

結果表示

↓当てはまる症状を全てチェック！
結果ボタンを押すと選択した項目に対応した結果が表示されます。

[全ての項目をリセットする→](#)

お子さんの状態

お子さんのLINK

管理

TOPページ
サイトマップ
インフォメーション
このサイトについて
リンク集

●社団法人 日本小児科学会 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY
Copyright © 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY A division of NPO

あかあさんための救急＆予防サイト

対象年齢
生後1ヶ月～6歳

泣き止まない

お子さんの症状

■耳をさわる。耳だれがある。
■オムツを変える時、足を痛がる。
■泣いていたのに、急に泣きやみぐったりした。

病院に行く前に準備するもの

□健康保険証
□母子健康手帳
□お金
□着替え

病院に行く時に…

(1)家を出る前に火元を確認！
(2)戸じまりを忘れずに！
(3)交通事故に気をつけましょう！

泣き止まないの看病ポイント

・お子さんが泣きやまない時、他に今まで気づかなかった症状はないか、もう一度チェックしてみましょう。ウンチは大丈夫？ お熱は？ どこか痛いところがありますか？ 病院に着いてからお医者さんに聞かれてもお子さんは余計に泣くだけです。自宅を出る前に症状を確認しておきましょう。

・おしゃべりのできない小さなお子さんなら、食欲やお熱を事前にチェックするだけでも重要な手がかりになりますよ。

・もし万が一色が青ざめたり、泣きやんだ後にぐったりしたり、あるいはウンチに血が混じたりするなど症状を伴う場合には注意が必要です。大慌てする必要はありませんが、病院で診て貰った方がいいですね。

お医者さんに伝えましょう

1. いつもと泣き方が違いますか。違う場合どんな泣き方をしていますか。

2. その他気になることがありますか。

このページをプリントアウトし、上記の事項を記入後、急诊診療所の先生に見せると便利です。

お子さんための救急&予防サイト

対象年齢
1ヶ月～6歳

よくある症状

- 発熱（38℃以上）
- けいれん・ふるえ
- 吐き気
- せき・ゼエゼエする
- 腹痛・便秘
- 皮膚のブツブツ
- 下痢
- 泣き止まない
- おしっこが出ない
- 意識がない
- 耳を痛がる
- 頭痛
- 授乳
- ウンチが変
- 鼻血
- 動物に咬まれた
- 虫に刺された
- やけど
- 頭を強くぶつけた

トップ・泣き止まない　お子さんの状況

急を要する症状はみられないようです。
様子をみながら診療時間になるのを待つて
お子さんを病院へつれて行くとよいでしょう。

お子さんの症状 ■突然、おひえて泣き出す、

様子をごめにみましょう

泣き止まないの看病ポイント

お子さんが理由もなくぐずるのはよくあること、特に生後3～4ヶ月頃の赤ちゃんで、
顔色もよく熱もないのにいつまでも（時には2時間以上も）泣きやまないことがあります。
ご両親としては心配になるばかりですよね。でも大丈夫！赤ちゃんだって何となくイララすることもあります。直前までのご機嫌や食欲、ウンチがいつもと同じで、他に症状がなければ少し様子を見てみましょう。翌日かかりつけの小児科医に診て貰うのも大事なポイントです。

ただし症状が大きく変わったら急患診療所を受診してください。
連休・正月期間中は翌日に急患診療所に受診してください。

お医者さんに伝えましょう

- 1.いつもどろき方が違いますか？
- 2.その他気になることがありますか？

このページをプリントアウトし、
看病の参考にしてください。

[TOPページ](#)

[サイトマップ](#)

[インフォメーション](#)

[このサイトについて](#)

[リンク集](#)

[>>戻る](#)

(C)2004 社団法人 日本小児科学会

●社団法人 日本小児科学会 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

会員登録