




こどもの救急

対象年齢
生1ヵ月～6歳

トップ > おしっこが出ない

- 気になる症状
- 発熱 (38C以上)
 - けいれん・ふるえ
 - 吐き気
 - せき・ゼゼエする
 - 腹痛・便秘
 - 皮膚のブツブツ
 - 下痢
 - 泣き止まない
 - おしっこが出ない
 - 意識がない
 - 耳を痛がる
 - 頭痛
 - 誤飲
 - ウンチが変
 - 鼻血
 - 動物に咬まれた
 - 虫に刺された
 - やけど
 - 頭を強くぶつけた



おしっこが出ない

●お子さんにあてはまる項目全てにチェックしてください。
当てはまる をクリックしてください (複数選択可)

- 水分をほとんど取れない。
- 吐いたり下痢をしたりする。
- 唇が乾燥している。
- 発熱がある。
- 元気がある。
- おしっこをするのを嫌がる。

注意事項

↑当てはまる症状を全てチェックしたらクリック！
結果ボタンを押すと選択した項目に対応した結果が表示されます。

全ての項目をリセットする

管理

よくある質問

緊急時のリンク集

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集





気になる症状

発熱 (38℃以上)

けいれん・ふるえ

吐き気

せき・ゼエゼエする

腹痛・便秘

皮膚のブツブツ

下痢

泣き止まない

おしっこが出ない

意識がない

目を痛がる

頭痛

誤飲

ウンチが変

鼻血

動物に咬まれた

虫に刺された

やけど

頭を強くぶつけた

トップ・おしっこが出ない



急患 病院へ行く前に

急を要する症状がみられるようです。

病院へ行くとよいでしょう。




お子さんの症状

- 水分をほとんど取れない。
- 吐いたり下痢をしたりする。
- 唇が乾燥している。

急患診療所に行く前に

病院に行く前に準備するもの

- 健康保険証
- 母子健康手帳
- お金
- 着替え



病院に行く時に…

- (1) 家を出る前に火元を確認!
- (2) 戸じまりを忘れずに!
- (3) 交通事故に気をつけて!

お医者さんに伝えましょう

1. おしっこを最後にしたのはいつですか?

2. 日中暑いところにずっといましたか

はい いいえ

※このページをプリントアウトし、上記の事項を記入後、急患診療所の先生に見せると便利です

急患診療所

緊急時のリンク集

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集

>>戻る

(C)2004 社団法人 日本小児科学会





こどもの救急

対象年齢
1ヵ月～6歳

- おこる症状**
- 発熱 (38.0以上)
 - けいれん・ふるえ
 - 吐き気
 - せき・ゼゼエする
 - 腹痛・便秘
 - 皮膚のブツブツ
 - 下痢
 - 泣き止まない
 - おしっこが出ない
 - 意識がない
 - 目を痛がる
 - 頭痛
 - 過飲
 - ウンチが変
 - 鼻血
 - 動物に咬まれた
 - 虫に刺された
 - やけど
 - 頭を強くぶつけた

おこる病気

関連のLINKS


TOPページ
サイトマップ
インフォメーション
このサイトについて
リンク集

トップ > おしっこが出ない > まつた (尿がでない)



おしっこが出ない時の対処法

急を要する症状はみられないようです。
様子をみながら診療時間になるのを待って
お子さんを病院へつれて行くとよいでしょう。



お子さんの症状 元気がある。

様子をごまめにみまじょう

おしっこが出ない時の看病ポイント	
・おしっこの回数が少くても、1回に出る量が多かったり、オムツがおしっこで濡れて普段と同じ位重くなるなら脱水は心配ありません。	
・空気が乾燥していたり、夏場で汗の量が多ければおしっこの量も減ります。 自家用車などの中に長時間いた後なら、夏場でなくても軽い水分不足になる可能性はあります。 でも、ご機嫌で元気もいようなら、大丈夫！ イオン飲料やミルクなどの水分を多めにあげて様子を見まじょう。	
・室内の温度があまり高くなりすぎないようにしてあげて下さい。	
・幼児ではおしっこをする時痛がったり、頻回に少しずつおしっこを出したりする時は抗生剤を飲む必要があることもあります。	
・男の子では、おちんちんの先が赤く腫れたり、膿が出たりする時があります。 おちんちんが不潔な事が原因ですので、時間外だったらそう一つと温いお湯で洗って様子を見て下さい。軽ければ治ります。もし腫れや痛みがひかない時、はかかりつけの先生を受診して下さい。	
・女の子では下着などにおりものが付く場合も同様です。おかあさんが優しく洗ってあげて下さい。通常急患診療所急を受診する必要はありませんが、翌日にはかかりつけの先生に診てもらって下さい。	

ただし症状が大きく変わったら急患診療所を要診して下さい。
急患診療所とは、平日は午前8時から午後8時までの診療時間です。

- お医者さんに伝えまじょう
1. おしっこを最後にしたのはいつですか？
 2. 日中暑いところにずっといましたか？
 はい いいえ



このページをプリントアウトし、
看病の参考にしてください



こどもの救急

対象年齢
生後1ヵ月～6歳

高熱(38℃以上)
けいれん・ふるえ
吐き気
せき・ゼゼエする
腹痛・便秘
皮膚のブツブツ
下痢
泣き止まない
おしっこが出ない
意識がない
耳を痛がる
頭痛
誤飲
ウンチが変
鼻血
動物に咬まれた
虫に刺された
やけど
頭を強くぶつけた

こどもの救急

TOPページのLINK

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集

トップ > 意識がない

意識がない

●お子さんにあてはまる項目を1つだけにチェックしてください。
※必ず必ず○のシオボタンを押しと選択した項目に対する結果が表示されます。(複数選択不可)

意識がないが目を覚めません

- あやすと笑うが、何となくぼやっとしている。
- あやしても笑わないが、視線は合う。
- 母親と視線があわない。



刺激すると目がさめる、刺激をやめると眠り込む

- 飲み物や乳首を見せると飲もうとする。
- 呼びかけると開眼して目を向ける。
- 呼びかけを繰り返すと辛うじて開眼する。



刺激しても目が覚めない

- 痛み刺激に対し払いのける動作をする。
- 痛み刺激に対し少し手足を動かしたり顔をしかめる。
- 痛み刺激に反応しない。



坂本 吉正 小児神経学、全原出版、東京、1978(引用改変)



トップ > 意識がない・けいれん・嘔吐

高くなる症状

発熱 (38℃以上)

けいれん・ふるえ

吐き気

せき・ゼゼゼする

腹痛・便秘

皮膚のブツブツ

下痢

泣き止まない

おしっこが出ない

意識がない

目を痛がる

頭痛

嘔吐

ウンチが変

鼻血

動物に咬まれた

虫に刺された

やけど

頭を強くぶつけた

おがあさんの救急

緊急の時のLINK集

TOPページ
サイトマップ
インフォメーション
このサイトについて
リンク集

行く! 救急車を呼ぶ時

急を要する症状がみられるようです。



お子さんの症状

■呼びかけると開眼して目を向ける


救急車の呼び方

まずは119にダイヤルを!

- 局番なしの「119」をダイヤルします。
- 「救急車をお願いします」と伝えます。
- 次のことを伝えましょう。
 - お子さんの年齢
 - お子さんの名前
 - 住所
 - 電話番号
 - 場所の目標となる建物
- お子さんの症状(上の選択肢)を伝えましょう。

救急車を持っている間


- 次のものを準備しましょう。
 - 健康保険証
 - 母子健康手帳
 - お金
- 玄関の鍵を開けておきましょう。
- 家族や近所の人がいれば、救急車が到着したときの誘導をお願いしましょう。



救急車で病院に行く時

- 家を出る前に火元を確認!
- 戸じまりを忘れずに!

●救急車を待っている間、
下のような体位をとらせておきましょう。





口に物をくわえさせてはいけません。

※お医者さんに伝えましょう

1. 持病がありますか？

はい いいえ

2. 何かお薬を飲んでいますか？

はい 種類:

いいえ

※はいの場合はお薬の説明書を持っていきましょう。

※このページをプリントアウトし、上記の事項を記入後、急患診療所の先生に見せると便利です。

>>戻る

(C)2004 社団法人 日本小児科学会

●社団法人 日本小児科学会 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY
Copyright © 2004 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY. All rights reserved.





こどもの救急

対象年齢
生後1か月～6歳

トップ > 意識がない・目を閉じたままの状態

- 気になる症状
- 発熱 (38C以上)
 - けいれん・ふるえ
 - 吐き気
 - せき・ゼゼエする
 - 腹痛・便秘
 - 皮膚のブツブツ
 - 下痢
 - 泣き止まない
 - おしっこが出ない
 - 意識がない
 - 耳を痛がる
 - 頭痛
 - 誤飲
 - ウンチが変
 - 鼻血
 - 動物に咬まれた
 - 虫に刺された
 - やけど
 - 頭を強くぶつけた



急を要する症状がみられるようです。

急を要する症状がみられるようです。
病院へ行くとよいでしょう。




お子さんの症状	■飲み物や乳首を見せると飲もうとする。
---------	---------------------

急患診療所に行く前に

病院に行く前に準備するもの

- 健康保険証
- 母子健康手帳
- お金
- 着替え



病院に行く時に…

- (1)家を出る前に火元を確認!
- (2)戸じまりを忘れずに!
- (3)交通事故に気をつけましょう!



口に物をくわえさせてはいけません。

4 意識がない時の看病ポイント

顔を横向けにして、衣類をゆるめます。

お医者さんに伝えましょう

1. 持病がありますか?
はい いいえ
2. 何かお菓子を飲んでいますか?
はい 種類 いいえ
※はいの場合はお菓子の説明書を持っていきましょう。

※このページをプリントアウトし、上記の事項を記入後、急患診療所の先生に見せると便利です。

>>戻る

(C)2004 社団法人 日本小児科学会

こどもの救急

緊急時のLINK集

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集





こどもの救急

対象年齢
生後1か月～6歳

- おこぼる症状**
- 発熱(38℃以上)
 - けいれん・ふるえ
 - 吐き気
 - せき・ゼゼゼする
 - 腹痛・便秘
 - 皮膚のブツブツ
 - 下痢
 - 泣き止まない
 - おしっこが出ない
 - 意識がない
 - 目を痛がる
 - 頭痛
 - 誤飲
 - ウンチが変
 - 鼻血
 - 動物に咬まれた
 - 虫に刺された
 - やけど
 - 頭を強くぶつけた

おこぼる原因

おこぼるのLINK

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集

トップ > 目次 > 目次



耳を痛がる

●お子さんにあてはまる項目全てにチェックしてください。
当てはまるをクリックしてください。(複数選択可)

- 発熱(38℃以上)がある。
- 耳の穴を押しても痛がらない。
- 耳の下が腫れている。
- 頭もひどく痛がる。
- 元気がある。
- 耳だれがある
- 物をかむときに痛がる

結果をみる

↑当てはまる症状を全てチェックしたらクリック!
結果ボタンを押すと選択した項目に対応した結果が表示されます。

全ての項目をリセットする

管理



子どもの救急

対象年齢
1ヵ月～6歳

- おたふく風邪
- 発熱(38℃以上)
 - けいれん・ふるえ
 - 吐き気
 - せき・ゼエゼエする
 - 腹痛・便秘
 - 皮膚のブツブツ
 - 下痢
 - 泣き止まない
 - おしっこが出ない
 - 意識がない
 - 耳を痛がる
 - 頭痛
 - 誤飲
 - ウンチが変
 - 鼻血
 - 動物に咬まれた
 - 虫に刺された
 - やけど
 - 顔を強くぶつけた

おたふく風邪

子供のLINKS

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集

トップ > 耳を痛がる (11/10) > 救急センターへ行く



救急センターへ行く

急を要する症状がみられるようです。
病院へ行くとよいでしょう。




- お子さんの症状
- 頭もひどく痛がる。

急患診療所に行く前に

病院に行く前に準備するもの

- 健康保険証
- 母子健康手帳
- お金
- 着替え



病院に行く時に…

- (1) 家を出る前に火元を確認!
- (2) 戸じまりを忘れずに!
- (3) 交通事故に気をつけましょう!

耳を痛がる時の看病ポイント

・風邪の症状があって、耳たぶのすぐ下や耳の穴を痛がるようでしたら、中耳炎の可能性がります。耳鼻科のお医者さんにご相談ください。

お医者さんに伝えましょう

1. まわりにおたふく風邪のお子さんはいませんか。
はい いいえ
2. おたふく風邪のワクチンをやっていますか。
はい いいえ
3. お家にタバコを吸ってる方はいらっしゃいますか。
はい いいえ

※このページをプリントアウトし、上記の事項を記入後、急患診療所の先生に見せると便利です。

>>戻る

(C)2004 社団法人 日本小児科学会





- おたふく病の症状**
- 発熱 (38℃以上)
 - けいれん・ふるえ
 - 吐き気
 - せき・ゼゼゼする
 - 腹痛・便秘
 - 皮膚のブツブツ
 - 下痢
 - 泣き止まない
 - おしっこが出ない
 - 意識がない
 - 耳を痛がる
 - 頭痛
 - 誤飲
 - ウンチが変
 - 鼻血
 - 動物に咬まれた
 - 虫に刺された
 - やけど
 - 頭を強くぶつけた

おたふく病の予防

おたふく病のLINKS

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集

トップ・耳を痛がる おたふく病の子供のまじよう



おたふく病の子供をかましよう



急を要する症状はみられないようです。
様子をみながら診療時間になるのを待って
お子さんを病院へつれて行くとよいでしょう。

お子さんの症状

- 発熱(38℃以上)がある。
- 耳の穴を押しても痛がらない。
- 耳の下が腫れている。
- 物をかむときに痛がる

様子をこまめにみまじよう

耳を痛がる時の看病ポイント

- ・風邪の症状があって、耳たぶのすぐ下や耳の穴を痛がるようでしたら、中耳炎の可能性がります。耳鼻科のお医者さんにご相談ください。
- ・耳たぶの下から1～2cm以上離れた部位を押さえて痛いならリンパ節の腫れでしょう。診療時間外でしたら、救急でなく翌日まで待って、かかりつけの先生に診てもらえば十分でしょう。
- ・風邪の症状がないのに耳をいじる原因として、耳垢が原因でかゆい、ガサガサ音がするなどよくあげられます。無理しない程度に綿棒で耳垢を取ってあげてください。
- ・熱をこまめに計りましょう。

ただし症状が大きく変わったら急患診療所を受診してください。
連休・正月期間中は翌日に急患診療所を受診してください。

お医者さんに伝えましょう

1. まわりにおたふく風邪のお子さんはいませんか。
はい いいえ
2. おたふく風邪のワクチンをやっていますか。
はい いいえ
3. お家にタバコを吸ってる方はいらっしゃいますか。
はい いいえ



※このページをプリントアウトし、看病の参考にしてください。

>>戻る

(C)2004 社団法人 日本小児科学会





気になる症状

発熱(38℃以上)

けいれん・ふるえ

吐き気

せき・ゼゼゼする

腹痛・便秘

皮膚のブツブツ

下痢

泣き止まない

おしっこが出ない

意識がない

目を痛がる

頭痛

誤飲

ウンチが変

鼻血

動物に咬まれた

虫に刺された

やけど

頭を強くぶつけた

トップページ



頭痛

●お子さんにあてはまる項目全てにチェックしてください。

当てはまるをクリックしてください。(複数選択可)

- けいれん(ひきつけ)がある。
- 頭を激しくぶつけた。
- 顔色がだんだんと悪くなる。
- 元気がある。
- 何回も吐く。
- 発熱(38℃以上)がある。
- 鼻詰まりがひどい。

結果を見る

↑当てはまる症状を全てチェックしたらクリック!

結果ボタンを押すと選択した項目に対応した結果が表示されます。

全ての項目をリセットする

管理




緊急時のLINK集

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集





高熱(38C以上)
けいれん・ふるえ
吐き気
せき・ゼゼエする
腹痛・便秘
皮膚のブツブツ
下痢
泣き止まない
おしっこが出ない
意識がない
目を痛がる
頭痛
誤飲
ウンチが変
鼻血
動物に咬まれた
虫に刺された
やけど
頭を強くぶつけた



TOPページ
サイトマップ
インフォメーション
このサイトについて
リンク集

トップ > 頭痛 > 11歳以上の小学生以上

行く!

急を要する症状がみられるようです。
病院へ行くとよいでしょう。


お子さんの症状

■けいれん(ひきつけ)がある。

急患診療所に行く前に

病院に行く前に準備するもの

- 健康保険証
- 母子健康手帳
- お金
- 着替え



病院に行く時に...

- (1)家を出る前に火元を確認!
- (2)戸じまりを忘れずに!
- (3)交通事故に気をつけましょう!

<h4>頭痛の看病ポイント</h4> <ul style="list-style-type: none"> ・お子さんは頭が痛くて不安になっていることが多いので、優しく落ち着かせることをこころがけてください。 ・熱があれば、厚着を脱げ水分補給をしてあげましょう。 ・吐いた場合の水分補給も大切です。ただ、無理には飲ませないようにしましょう。 ・けいれんを起こしたときは、衣服をゆるめ顔を横に向けて、吐いたものをどにつまらせないようにしましょう。 ・頭痛薬を飲ませないで受診しましょう。

お医者さんに伝えましょう

1. いつからですか。
2. アレルギー鼻炎やちくのうと診断されたことがありますか。

☆このページをプリントアウトし、上記の事項を記入後、急患診療所の先生に見せると便利です

>>戻る



こどもの救急

対象年齢
生後1か月～6歳

- 気になる症状**
- 発熱 (38℃以上)
 - けいれん・ふるえ
 - 吐き気
 - せき・ゼエゼエする
 - 腹痛・便秘
 - 皮膚のブツブツ
 - 下痢
 - 泣き止まない
 - おしっこが出ない
 - 意識がない
 - 耳を痛がる
 - 頭痛
 - 嘔吐
 - ウンチが変
 - 鼻血
 - 動物に咬まれた
 - 虫に刺された
 - やけど
 - 頭を強くぶつけた

お母さんの救急


TOPのLINK

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集

トップ・頭痛

待つ お母さんのおまじない

急を要する症状はみられないようです。
様子をみながら診療時間になるのを待って
お子さんを病院へつれて行くとよいでしょう。

<p>お子さんの症状</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■元気がある。 ■鼻詰まりがひどい。
--	---

様子をこまめにみましょう

頭痛の看病ポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・お子さんは頭が痛くて不安になっていることが多いので、優しく落ち着かせることをこころがけてください。 ・熱があれば、厚着を避け水分補給をしてあげましょう。 ・吐いた場合の水分補給も大切です。ただ、無理には飲ませないようにしましょう。 ・気持ちがよさそうでしたら頭を冷やしてあげましょう。 ・頭痛薬は主治医の指示がない限り飲ませないようにしましょう。
------------------	--

ただし症状が大きく変わったら急患診療所を受診してください。
 連休・正月期間中は翌日に急患診療所を受診してください。

お医者さんに伝えましょう

1. いつからですか。
2. アレルギー鼻炎やちくのうと診断されたことがありますか。



※このページをプリントアウトし、看病の際参考にしてください。

>>戻る

(C)2004 社団法人 日本小児科学会





こどもの救急

対象年齢
生後1ヵ月～6歳

- 熱は出るけど
- 発熱 (38C以上)
- けいれん・ふるえ
- 吐き気
- せき・ゼゼエする
- 腹痛・便秘
- 皮膚のブツブツ
- 下痢
- 泣き止まない
- おしっこが出ない
- 意識がない
- 耳を痛がる
- 頭痛
- 誤飲
- ウンチが変
- 鼻血
- 動物に咬まれた
- 虫に刺された
- やけど
- 頭を強くぶつけた

- おたふく病
- おたふく病のLINK集

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集

トップ

誤飲

まずは何を飲んだかを確認しましょう。

次のものを誤飲した場合 救急車で病院に行きましょう。



誤飲したものによって対応が違うので注意！	
✖	吐かせてはダメ
✖	水を飲ませてはダメ
✖	牛乳を飲ませてはダメ

このページにない場合は次のページへ→

- 塩酸 ✖ ✖
- 黄リン
- 苛性ソーダ
- 殺鼠剤(フラトール) ✖ ✖
- 殺虫剤(一部)
- 三環系抗うつ剤
- シアン化合物 ✖
- 除草剤 ✖
- ストリキニーネ
- バラコート
- ヒ素
- 無機系殺鼠剤(タリウムなど)
- 有機フッ素系殺鼠剤
- 有機リン系殺虫剤

このページにない場合は次のページへ→

重い中毒あるいは傷害を起こす可能性が非常に高くなります。

↓ 誤飲した時の看病ポイント>>

救急車の呼び方


まずは119にダイヤルを！

- (1) 局番なしの「119」をダイヤルします。
- (2) 「救急車をお願いします」と伝えます。
- (3) 次のことを伝えましょう
 - お子さんの年齢
 - お子さんの名前

- 住所
- 電話番号
- 場所の目標となる建物
- (4) お子さんの症状(上の選択肢)を伝えましょう。

救急車を待っている間

- (1) 次のものを準備しましょう。
 - 健康保険証
 - 母子健康手帳
 - お金
- (2) 玄関の鍵を掛けておきましょう。
- (3) 家族や近所の人がいれば、救急車が到着したときの誘導をお願いします。



救急車で病院に行く時

- (1) 家を出る前に火元を確認！
- (2) 戸じまりを忘れずに！





病に悩む症状

発熱（38℃以上）

けいれん・ふるえ

吐き気

せき・ゼエゼエする

腹痛・便秘

皮膚のブツブツ

下痢

泣き止まない

おしっこが出ない

反応がない

耳を痛がる

頭痛

嘔吐

ウンチが変

鼻血

動物に咬まれた

虫に刺された

やけど

頭を強くぶつけた

[トップ](#) > [誤飲](#) > [1. 誤飲した時の看察ポイント](#)

1. 誤飲した時の看察ポイント>>

1 次の場合は飲み込んだものを吐かせてはいけません。

- (1) 6ヵ月未満の乳児
- (2) 意識障害、けいれんがあるとき
- (3) 重症な心疾患や、不整脈があるとき
- (4) 強酸や強アルカリなどの腐食性物質（→ 6へ）
- (5) 灯油やシンナーなどの揮発性石油類
- (6) けいれんを起こすストリキニーネや樟脳などの毒物

2 次の物質は脂溶性なので牛乳を飲ませてはいけません。

- (1) 農薬
- (2) 殺鼠剤
- (3) 殺虫剤
- (4) 防虫剤

3 次のような重い症状のあるときには、直ちに病院に行きましょう。

- (1) 意識障害、けいれんがある。
- (2) 長い時間が経過しても、中毒症状がある。
- (3) 血を吐いた。

4 誤飲した場合の共通の処置

- (1) 液状のものは、皮膚や目についてないかを調べ、付いていれば流水で15分以上洗いましょう。
- (2) 多量の水を飲ませることは、吐かせるための前処置として行う以外は止めましょう。かえって毒物を溶かしたり吸収をうながしたりしてしまいます。

6 強酸や強アルカリなどの腐食性物質を誤飲した場合の処置

- (1) 絶対に吐かせてはいけません。
- (2) すぐに多量の牛乳を飲ませましょう。
- (3) 必ず病院へ行って診察を受けましょう。

お医者さんに伝えましょう

1 何をどの位の量飲みましたか。

 何を：
 どれくらいの量：

2 おう吐はありましたか。

 ない あり() 回

 飲み残しの容器、吐いたものなどをとっておき、
 受診の際お医者さんにみせましょう


※このページをプリントアウトし、上記の事項を記入後、急患診療所の先生に見せると便利です

[>>戻る](#)

(C)2004 社団法人 日本小児科学会

急患診療所

急患診療所のLINK

[急患診療所のLINK](#)

TOPページ
 サイトマップ
 インフォメーション
 このサイトについて
 リンク集



こどもの救急

対象年齢
生後1ヵ月～6歳

- 気になる症状
- 発熱 (38℃以上)
 - けいれん・ふるえ
 - 吐き気
 - せき・ゼゼゼする
 - 腹痛・便秘
 - 皮膚のブツブツ
 - 下痢
 - 泣き止まない
 - おしっこが出ない
 - 発汗がない
 - 目を痛がる
 - 頭痛
 - 誤飲
 - ウンチが変
 - 鼻血
 - 動物に咬まれた
 - 虫に刺された
 - やけど
 - 頭を強くぶつけた

トップ ウンチ



ウンチが変

●お子さんにあてはまる項目全てにチェックしてください。
当てはまるをクリックしてください。(複数選択可)

写真で見よう！このウンチは大丈夫。▶

- 元気である。
- 機嫌が悪く、おなかも痛そうだ。
- 38℃以上の発熱がある。
- 肛門を痛がる。
- クリーム色の下痢便。
- ノリの佃煮のような黒くて粘っこいウンチ。
- イチゴジャムみたいなウンチをした。
- 真っ赤な血液が便の中まで混ざりあっている血便。あるいは血液そのもの。
- ウンチをした後に、便器に血液がついている。

結果をさがす

！当てはまる症状を全てチェックしたらクリック！
結果ボタンを押すと選択した項目に対応した結果が表示されます。

全ての項目をリセットする

管理



このサイトのLINK

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集





- 気になる症状**
- 発熱 (38℃以上)
 - けいれん・ふるえ
 - 吐き気
 - せき・ゼゼゼする
 - 腹痛・便秘
 - 皮膚のブツブツ
 - 下痢
 - 泣き止まない
 - おしっこが出ない
 - 意識がない
 - 耳を痛がる
 - 頭痛
 - 嘔吐
 - ウンチが変
 - 鼻血
 - 動物に咬まれた
 - 虫に刺された
 - やけど
 - 頭を強くぶつけた

子どもの救急

緊急時のLINK

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集

トップ・ウンチの色が変

行く! 急を要する症状がみられるようです。




急を要する症状がみられるようです。
病院へ行くとよいでしょう。

- お子さんの症状
- 38℃以上の発熱がある。

急患診療所に行く前に

病院に行く前に準備するもの

- 健康保険証
- 母子健康手帳
- お金
- 着替え



病院に行く時に...

- (1) 家を出る前に火元を確認!
- (2) 戸じまりを忘れずに!
- (3) 交通事故に気をつけましょう!

お医者さんに伝えましょう

1. ウンチの回数を伝えましょう。
いつから:
何回:
どれくらいの量:
2. ウンチの形状はどれに近いですか。
 コロコロしたウサギのようなウンチ 下痢状のウンチ 普通のウンチと変わらない
3. お菓子をのみましたか。
 はい いいえ
はいの場合一飲んだお菓子の説明書を持っていきましょう

普段と違うウンチがあったら、オムツをとっておき、受診する際にお医者さんにうせましょう



このページをプリントアウトし、上記の事項を記入後、急患診療所の先生に見せると便利です。

>>戻る

(C)2004 社団法人 日本小児科学会





こどもの救急

対象年齢
1ヵ月～6歳

- 高体温の症状**
- 発熱 (38C以上)
 - けいれん・ふるえ
 - 吐き気
 - せき・せえせえする
 - 腹痛・便秘
 - 皮膚のブツブツ
 - 下痢
 - 泣き止まない
 - おしっこが出ない
 - 意識がない
 - 耳を痛がる
 - 頭痛
 - 誤飲
 - ウンチが変
 - 鼻血
 - 動物に咬まれた
 - 虫に刺された
 - やけど
 - 頭を強くぶつけた

トピック：ウンチの色が変・変わった様子があります



おがあさん(お母さん)が知りたいこと



急を要する症状はみられないようです。
様子をみながら診療時間になるのを待って
お子さんを病院へつれて行くとよいでしょう。

お子さんの症状 元気である。

様子をこまめにみまじよう

ウンチの色が変な時の看病ポイント
・(稲毛先生)

ただし症状が大きく変わったら急患診療所を変更してください。
連休・正月期間中は翌日に急患診療所に受診してください。

お医者さんに伝えましょう

- ウンチの回数を伝えましょう。
いつから：
何回：
どれくらいの量：
- ウンチの形状はどれに近いですか。
 ココロコロしたウサギのようなウンチ 下痢状のウンチ 普段のウンチと変わらない ...
- お菜をのみましたか。
 はい いいえ
はいの場合一飲んだお菜の説明書を持っていきましょう。

普段と違うウンチがあったら、オムツをとって
おさ、受診する際にお医者さんに知らせましょう



おがあさん(お母さん)が知りたいこと

- TOPページ
- サイトマップ
- インフォメーション
- このサイトについて
- リンク集



※このページをプリントアウトし、
看病の際参考にしてください。

>>戻る

(C)2004 社団法人 日本小児科学会





気になる症状

発熱 (38℃以上)

けいれん・ふるえ

吐き気

せき・ゼゼエする

腹痛・便秘

皮膚のブツブツ

下痢

泣き止まない

おしっこが出ない

意識がない

目を痛がる

頭痛

嘔吐

ウンチが変

鼻血

動物に咬まれた

虫に刺された

やけど

頭を強くぶつけた

ママの救急

MAMAのLINKS

TOPページ
 サイトマップ
 インフォメーション
 このサイトについて
 リンク集

トピック・ウンチが変

健康な赤ちゃんのウンチ

赤ちゃんを育てているとき、お母さん方はきついろいろなウンチをみることでしょう。ここにあげた写真はいずれも生理的なウンチなので、特に治療を必要ともしませんでした。このようなウンチにもかかわらず、赤ちゃんは機嫌良く順調に育っています。ウンチだけでなく、からだ全体の様子を見ることが大切です。


母乳栄養児のウンチ



▲典型的な母乳栄養児のウンチで、軟らかく、粘液、ツブツブが混じっています。



▲淡黄緑色で、ふわっとした発酵性のウンチで、酸臭があり、回数も多いです。



▲泥状のウンチで水分、粘液が多く、回数は多いですが、1回の量はまちまちです。このようなウンチでも機嫌はよく、体重増加は順調です。



▲緑色っぽいウンチ(緑便)で、水分と粘液が多く、周囲ににじんで広がっています。



▲茶色で均等なウンチです。オムツにべったりついて、おちにくいのが特徴です。



▲オムツについたまま放置しておくと、空気に触れて緑色に変化することがあります。

母乳栄養児のウンチ