

	2004年 4-6月	2004年 7-9月	2004年 10-12月	2005年 1-3月	2004年度	前年度
前立腺肥大症						
前立腺容量20ml未満	8	13	17	20	58	29
前立腺容量50ml未満	12	40	49	42	143	35
前立腺容量50ml以上	7	28	27	23	85	26
(未入力)	2	0	1	0	3	12
(既定外表示)	0	0	0	0	0	2
計	29	81	94	85	289	104
白内障						
1眼	101	420	250	271	1,042	339
2眼	80	110	81	58	329	243
(未入力)	60	40	56	1	157	178
計	241	570	387	330	1,528	760
痔核						
第一度(出血のみ)	2	9	8	5	24	9
第二度(還納可能)	3	15	9	7	34	8
第三度(脱肛)	2	32	24	19	77	9
(未入力)	2	0	1	0	3	12
計	9	56	42	31	138	38
子宮筋腫						
貧血なし(Hb10g/dl以上)	36	79	54	52	221	149
貧血あり(Hb10g/dl未満)	10	25	9	10	54	36
(未入力)	2	0	0	0	2	7
計	48	104	63	62	277	192
乳房の悪性新生物						
ステージI	19	41	32	28	120	41
ステージIIA	18	31	21	15	85	37
ステージIIB	1	8	7	9	25	11
ステージIIIA	2	5	3	2	12	6
ステージIIIB	5	7	8	4	24	5
ステージIV	2	1	6	4	13	4
(未入力)	0	5	0	0	5	3
(既定外表示)	0	0	0	0	0	3
計	47	98	77	62	284	110
そけいヘルニア						
重症度指標なし	105	361	267	230	963	352
計	105	361	267	230	963	352

2-2. 平均在院日数

2004年度中に退院した患者の平均在院日数を四半期ごと(2004年4月～6月、2004年7月～9月、2004年10月～12月、2005年1月～3月)および年度全体で集計しています。本調査の対象となる24疾患を直接の原因として入院した患者を対象とします。

(1) 平均在院日数

対象期間中に退院した患者の平均在院日数を疾患・重症度ごとに集計

(2) 平均在院日数(手術あり)

対象期間中に退院した患者のうち、入院中に手術を受けた人の平均在院日数を疾患・重症度ごとに集計

※手術を目的とした入院が比較的多いと思われる疾患に限る。

【集計表を見る上での注意】

- 退院患者がないケースについては「#N/A」と表記しております。
- 重症度の入力がなかったデータについては(未入力)にまとめて集計しております。
- 重症度の入力があるものの既定の区分のいずれに属するか判別できない場合は(既定外表示)にまとめて集計しております。
- 集計病院数

	2004年			2005年
	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
都病協	15	16	15	11
全日病	—	29	27	27
2協会合計	15	45	42	38

平均在院日数

主傷病別・重症度別の平均在院日数

(単位:日)

	2004年 4-6月	2004年 7-9月	2004年 10-12月	2005年 1-3月	2004年度	前年度
胃の悪性新生物						
ステージⅠ	24.5	26.3	28.2	25.3	26.4	23.1
ステージⅡ	32.3	32.9	36.5	22.0	32.3	33.8
ステージⅢ	37.1	32.8	36.2	29.7	33.6	31.8
ステージⅣ	28.8	28.6	34.0	33.2	30.9	31.8
(未入力)	30.0	36.3	26.2	42.3	33.6	28.6
計	29.7	29.3	32.4	29.7	30.3	28.5
結腸の悪性新生物						
ステージⅠ	18.8	16.8	21.3	19.0	19.0	21.0
ステージⅡ	24.1	27.0	27.1	24.2	26.1	31.6
ステージⅢ	30.2	30.1	36.6	28.7	31.6	28.2
ステージⅣ	32.4	39.7	36.8	34.3	37.0	37.2
(未入力)	17.1	29.7	29.9	#N/A	26.7	27.3
計	26.0	28.5	29.5	27.0	28.2	29.2
気管支および肺の悪性新生物						
ステージⅠ	18.1	16.9	19.1	23.8	19.3	33.0
ステージⅡ	47.2	24.4	34.9	38.7	30.5	27.8
ステージⅢ	33.3	31.2	34.4	37.3	33.7	41.1
ステージⅣ	31.3	29.9	35.4	34.0	32.3	35.8
(未入力)	38.0	35.6	15.3	32.8	30.2	20.4
計	32.0	28.1	32.0	33.6	30.8	35.0
急性心筋梗塞						
KillipⅠ	13.1	21.3	19.7	20.2	19.5	15.6
KillipⅡ	26.3	23.2	23.3	20.2	22.8	26.7
KillipⅢ	33.7	22.3	26.2	38.4	28.8	16.9
KillipⅣ	17.0	19.5	26.5	10.9	19.6	30.5
(未入力)	19.7	25.1	17.4	#N/A	19.7	23.2
計	18.1	21.7	21.4	20.9	20.9	19.4
肺炎						
軽症	15.6	15.6	13.7	14.0	14.5	16.0
中等症	17.0	25.0	20.1	16.6	19.8	19.1
重症	35.9	33.8	25.9	27.5	29.7	28.3
(未入力)	21.2	21.8	21.9	13.2	21.2	21.9
(既定外表示)	#N/A	14.0	#N/A	#N/A	14.0	#N/A
計	19.1	22.8	18.6	17.2	19.4	19.4
喘息						
軽症間欠型	9.0	8.6	8.1	10.1	8.8	8.1
軽症持続型	7.0	9.0	8.2	9.8	8.7	11.8
中等症持続型	10.5	16.0	9.1	9.5	10.9	12.0
重症持続型	28.2	9.1	11.2	12.4	12.3	10.3
(未入力)	9.8	8.2	12.7	#N/A	9.9	9.8
計	10.5	10.5	8.8	10.1	9.8	10.0

	2004年 4-6月	2004年 7-9月	2004年 10-12月	2005年 1-3月	2004年度	前年度
脳梗塞						
JCS 0-1	20.3	26.6	30.5	27.5	27.4	32.2
JCS 2-3	30.7	48.0	46.5	37.9	42.5	40.9
JCS 10-100	42.6	70.7	65.0	65.0	64.3	50.7
JCS 200-300	154.2	41.5	48.5	51.7	64.0	67.6
(未入力)	52.2	47.9	62.2	78.0	54.2	44.0
計	33.7	34.5	37.3	34.2	35.1	38.1
脳出血						
JCS 0-1	31.9	40.3	36.3	32.2	36.0	42.5
JCS 2-3	31.0	52.5	63.3	46.1	50.7	40.1
JCS 10-100	43.8	95.4	52.4	48.3	66.2	51.9
JCS 200-300	33.9	42.4	43.0	40.7	40.3	28.1
(未入力)	66.3	70.6	64.4	35.0	66.3	55.4
計	38.2	55.4	46.4	39.2	46.2	42.7
糖尿病						
軽症	20.7	17.5	19.0	18.0	18.3	19.1
中等症	20.5	21.4	24.1	35.9	26.3	20.8
重症	25.3	39.8	47.4	27.7	35.0	27.7
(未入力)	18.8	15.9	15.6	21.7	17.3	17.7
計	20.9	19.7	22.8	25.1	22.1	21.0
大腿骨頸部骨折						
重症度Ⅰ	68.3	43.2	42.2	41.8	45.4	44.8
重症度Ⅱ	50.6	53.0	42.4	53.8	50.1	46.0
重症度Ⅲ	29.8	39.1	47.1	40.6	41.3	60.9
重症度Ⅳ	18.3	51.1	39.9	24.7	41.3	45.9
(未入力)	39.8	58.2	36.4	#N/A	42.3	38.6
計	51.1	45.5	43.1	43.0	44.8	45.9
胃潰瘍						
ショックなし	16.7	14.5	14.2	15.9	15.0	16.6
ショックあり	14.6	61.7	19.6	15.9	32.8	18.1
(未入力)	23.8	12.7	14.1	14.0	18.8	22.0
計	17.5	20.5	15.1	15.9	17.5	17.8
急性腸炎						
血便なし	5.8	6.9	6.2	6.7	6.5	6.3
血便あり	8.0	9.3	10.0	15.0	10.9	12.2
(未入力)	7.8	5.9	9.0	7.0	7.4	6.9
計	6.0	7.1	6.5	7.3	6.9	6.7
正常分娩						
重症度指標なし	6.5	6.9	6.8	7.0	6.9	6.7
計	6.5	6.9	6.8	7.0	6.9	6.7
急性虫垂炎						
白血球15000/mm3未満	8.0	7.9	8.4	8.1	8.1	9.1
白血球15000/mm3以上	7.9	8.1	9.0	8.6	8.5	9.4
(未入力)	10.4	8.9	5.9	#N/A	8.9	7.8
計	8.5	8.0	8.5	8.2	8.2	8.9
胆石症						
黄疸なし	15.3	14.8	14.5	14.6	14.7	17.4
黄疸あり	20.8	21.5	25.6	23.7	22.9	26.6
(未入力)	15.6	9.2	13.5	22.0	13.4	18.7
計	15.8	15.5	15.1	15.7	15.4	18.2

	2004年 4-6月	2004年 7-9月	2004年 10-12月	2005年 1-3月	2004年度	前年度
前立腺肥大症						
前立腺容量20ml未満	12.3	10.8	12.2	10.8	11.4	13.4
前立腺容量50ml未満	13.4	11.7	13.2	13.1	12.7	13.4
前立腺容量50ml以上	19.4	12.5	14.7	14.4	14.2	18.0
(未入力)	6.0	6.0	8.0	#N/A	6.5	11.9
(既定外表示)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	10.0
計	14.0	11.8	13.4	12.9	12.8	14.4
白内障						
1眼	3.7	3.8	3.9	3.4	3.7	3.9
2眼	9.9	11.3	11.0	11.6	10.9	10.3
(未入力)	2.3	4.9	2.7	3.0	3.1	3.2
計	5.4	5.3	5.2	4.8	5.2	5.8
痔核						
第一度(出血のみ)	4.5	7.1	12.2	7.0	8.6	6.4
第二度(還納可能)	4.3	7.9	5.9	6.4	6.7	5.6
第三度(脱肛)	7.5	5.5	9.0	5.6	6.7	7.2
(未入力)	9.0	#N/A	17.0	#N/A	11.7	8.1
計	6.1	6.4	9.5	6.2	7.3	6.9
子宮筋腫						
貧血なし(Hb10g/dl以上)	11.0	11.8	11.3	11.6	11.5	11.4
貧血あり(Hb10g/dl未満)	14.1	11.9	10.9	11.1	12.0	12.7
(未入力)	11.5	#N/A	#N/A	#N/A	11.5	12.1
計	11.7	11.8	11.2	11.5	11.6	11.7
狭心症						
重症度指標なし	9.0	7.4	6.9	6.5	7.1	9.2
計	9.0	7.4	6.9	6.5	7.1	9.2
腎結石及び尿管結石						
水腎・尿管なし	6.4	4.6	6.4	4.8	5.2	5.4
水腎・尿管あり	7.5	6.1	10.7	6.8	7.6	8.1
(未入力)	3.5	2.3	2.0	2.0	2.9	3.7
計	6.6	5.4	8.8	5.9	6.5	6.3
乳房の悪性新生物						
ステージI	10.9	14.2	12.2	13.2	13.0	14.1
ステージIIA	14.4	17.9	13.9	11.4	15.0	16.8
ステージIIB	31.0	11.8	12.3	10.3	11.9	18.3
ステージIIIA	16.5	15.9	24.3	7.9	14.0	39.3
ステージIIIB	15.7	25.9	25.2	16.2	22.0	37.2
ステージIV	27.2	28.0	12.5	21.7	21.3	27.8
(未入力)	31.5	10.5	88.0	#N/A	23.8	16.3
(既定外表示)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	13.3
計	15.6	18.1	14.7	15.1	16.1	20.2
膝関節症						
骨移植なし	30.1	32.5	32.3	33.6	32.2	36.3
骨移植あり	#N/A	16.0	19.5	35.0	21.8	#N/A
(未入力)	5.0	#N/A	#N/A	#N/A	5.0	22.8
計	29.2	31.7	31.3	33.7	31.5	34.0
そけいヘルニア						
重症度指標なし	4.7	6.5	6.6	6.0	6.2	6.8
計	4.7	6.5	6.6	6.0	6.2	6.8
全疾患合計	18.8	17.9	17.9	17.7	17.9	19.9

平均在院日数(手術あり)

主傷病別・重症度別の平均在院日数

(単位:日)

	2004年 4-6月	2004年 7-9月	2004年 10-12月	2005年 1-3月	2004年度	前年度
胃の悪性新生物						
ステージⅠ	30.2	28.2	30.8	27.0	29.0	30.6
ステージⅡ	34.7	44.1	42.0	29.6	40.1	38.7
ステージⅢ	53.1	46.9	34.9	35.9	41.5	36.3
ステージⅣ	50.0	42.5	44.7	39.5	43.1	42.1
(未入力)	33.8	30.0	49.6	8.0	37.1	36.6
計	39.0	36.5	36.4	31.5	35.7	35.3
結腸の悪性新生物						
ステージⅠ	21.7	19.5	23.2	20.6	21.3	29.6
ステージⅡ	24.1	31.9	31.0	28.6	30.1	33.8
ステージⅢ	35.6	34.2	34.9	31.1	33.7	33.2
ステージⅣ	33.4	43.6	56.1	36.0	44.4	33.2
(未入力)	21.5	44.8	36.7	#N/A	36.8	35.0
計	28.6	31.2	32.8	28.5	30.9	32.9
気管支および肺の悪性新生物						
ステージⅠ	24.4	26.8	28.6	35.9	29.4	33.2
ステージⅡ	16.8	31.5	152.5	58.5	44.7	22.1
ステージⅢ	35.8	51.5	41.6	27.3	41.0	74.1
ステージⅣ	#N/A	41.7	35.5	69.0	43.6	52.5
(未入力)	59.3	#N/A	#N/A	#N/A	59.3	18.0
計	31.0	36.3	41.2	39.6	37.4	39.4
脳出血						
JCS 0-1	46.3	50.3	47.7	37.6	45.5	39.4
JCS 2-3	34.5	42.7	110.0	77.0	65.3	35.0
JCS 10-100	68.2	123.6	70.0	63.0	94.1	89.0
JCS 200-300	81.5	118.8	60.3	96.9	87.7	72.7
(未入力)	55.0	45.0	#N/A	#N/A	51.0	61.4
計	63.4	87.0	63.7	63.6	72.4	60.6
大腿骨頸部骨折						
重症度Ⅰ	70.7	45.8	39.0	43.1	45.9	44.4
重症度Ⅱ	54.4	58.9	43.9	53.2	52.4	47.4
重症度Ⅲ	33.2	41.6	45.4	42.7	42.7	62.1
重症度Ⅳ	24.0	64.8	38.8	30.3	48.3	48.5
(未入力)	42.6	54.6	39.8	#N/A	44.1	41.9
計	54.9	49.7	41.6	44.4	46.5	46.0
急性虫垂炎						
白血球15000/mm3未満	8.6	8.4	9.6	8.0	8.7	10.3
白血球15000/mm3以上	9.8	9.5	9.5	9.7	9.6	10.7
(未入力)	13.4	9.1	5.7	#N/A	10.0	8.3
計	9.7	8.7	9.4	8.5	8.9	10.0
胆石症						
黄疸なし	17.1	14.3	14.9	14.0	14.6	18.6
黄疸あり	21.3	22.2	27.8	26.5	24.6	27.1
(未入力)	16.8	9.6	14.4	22.0	14.4	21.2
計	17.2	15.2	15.8	15.3	15.5	19.5

	2004年 4-6月	2004年 7-9月	2004年 10-12月	2005年 1-3月	2004年度	前年度
前立腺肥大症						
前立腺容量20ml未満	12.3	11.5	12.6	11.2	11.8	13.4
前立腺容量50ml未満	12.6	14.2	13.4	14.1	13.8	14.4
前立腺容量50ml以上	19.4	15.0	15.4	14.2	15.3	21.4
(未入力)	6.0	#N/A	8.0	#N/A	6.7	11.5
(既定外表示)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	10.0
計	13.7	14.1	13.8	13.4	13.8	15.5
白内障						
1眼	3.7	3.8	3.9	3.4	3.7	3.9
2眼	9.9	11.3	11.0	11.6	10.9	10.4
(未入力)	2.3	4.9	2.7	3.0	3.1	3.2
計	5.4	5.4	5.2	4.8	5.2	5.8
痔核						
第一度(出血のみ)	4.5	8.3	16.4	6.6	10.3	8.1
第二度(還納可能)	4.3	7.9	5.9	6.4	6.7	5.6
第三度(脱肛)	7.5	5.5	4.2	5.6	5.2	7.4
(未入力)	9.0	#N/A	17.0	#N/A	11.7	8.8
計	6.1	6.6	7.2	5.9	6.6	7.7
子宮筋腫						
貧血なし(Hb10g/dl以上)	11.1	12.5	11.9	12.6	12.2	11.5
貧血あり(Hb10g/dl未満)	14.1	13.0	11.0	11.1	12.5	13.5
(未入力)	11.5	#N/A	#N/A	#N/A	11.5	12.1
計	11.8	12.6	11.8	12.3	12.2	11.9
乳房の悪性新生物						
ステージⅠ	11.3	14.2	12.8	13.6	13.2	15.1
ステージⅡA	14.9	18.1	13.2	10.5	14.9	17.3
ステージⅡB	31.0	13.1	16.1	15.1	15.4	19.7
ステージⅢA	16.5	20.6	24.3	8.5	18.8	45.3
ステージⅢB	16.2	27.6	25.8	17.3	22.9	37.2
ステージⅣ	30.5	11.0	29.7	31.8	29.0	10.0
(未入力)	#N/A	10.0	#N/A	#N/A	10.0	20.7
(既定外表示)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	13.3
計	14.7	16.4	16.3	14.3	15.6	18.9
そけいヘルニア						
重症度指標なし	4.8	6.6	6.6	5.8	6.2	6.9
計	4.8	6.6	6.6	5.8	6.2	6.9

2-3. 死亡退院率

2004年度中に退院した患者のうち、死亡が原因で退院となった患者の割合を四半期ごと(2004年4月～6月、2004年7月～9月、2004年10月～12月、2005年1月～3月)および年度全体で集計しています。本調査の対象となる24疾患を直接の原因として入院した患者を対象とします。

(1) 死亡退院率

対象期間中に退院した患者のうち、死亡が原因で退院となった患者の割合を疾患・重症度ごとに集計

$$\text{死亡退院率} = \frac{\text{当該疾患の重症度別死亡退院者数}}{\text{当該疾患による退院患者数}} \times 100(\%)$$

(2) 死亡退院率(手術あり)

対象期間中に退院した患者のうち、入院中に手術を受けかつ死亡が原因で退院となった患者の割合を疾患・重症度ごとに集計

※手術を目的とした入院が比較的多いと思われる主傷病に限る。

【集計表を見る上での注意】

○各疾患欄の最上段の数値は、疾患ごとの期間中の退院患者数を表しています。(手術あり)については入院中に手術を受けた退院患者数となります。

○退院患者がないケースについては「#N/A」と表記しております。

○重症度の入力がなかったデータについては(未入力)にまとめて集計しております。

○重症度の入力があるものの既定の区分のいずれに属するか判別できない場合は(既定外表示)にまとめて集計しております。

○集計病院数

	2004年			2005年
	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
都病協	15	16	15	11
全日病	—	29	27	27
2協会合計	15	45	42	38

死亡退院率

[各主傷病最上段の数値は退院患者数]

主傷病別・重症度別の死亡退院率

	2004年 4-6月	2004年 7-9月	2004年 10-12月	2005年 1-3月	2004年度	前年度
胃の悪性新生物 (人)	159	410	302	243	1,114	383
ステージⅠ	0.0%	1.8%	2.0%	0.0%	1.2%	2.8%
ステージⅡ	0.0%	5.3%	4.8%	0.0%	3.6%	4.8%
ステージⅢ	6.5%	15.2%	12.8%	9.1%	11.3%	10.7%
ステージⅣ	36.2%	31.7%	37.0%	34.4%	34.2%	24.8%
(未入力)	25.0%	36.4%	14.3%	33.3%	26.7%	21.9%
計	15.7%	18.0%	16.9%	16.5%	17.1%	12.0%
結腸の悪性新生物 (人)	67	266	211	162	706	222
ステージⅠ	0.0%	1.6%	1.6%	0.0%	1.2%	0.0%
ステージⅡ	0.0%	2.8%	1.9%	2.2%	2.2%	0.0%
ステージⅢ	5.0%	3.9%	2.2%	4.5%	3.8%	2.2%
ステージⅣ	21.4%	45.6%	23.8%	38.1%	36.1%	25.0%
(未入力)	14.3%	15.4%	11.1%	#N/A	13.8%	8.8%
計	7.5%	14.3%	6.6%	11.7%	10.8%	7.2%
気管支および肺の悪性新生物 (人)	159	416	253	226	1,054	413
ステージⅠ	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	3.0%	5.6%
ステージⅡ	10.0%	10.4%	0.0%	22.2%	10.1%	9.5%
ステージⅢ	17.9%	16.0%	10.2%	20.0%	15.8%	10.6%
ステージⅣ	27.9%	29.4%	31.1%	37.7%	31.3%	33.0%
(未入力)	33.3%	11.1%	28.6%	50.0%	26.9%	30.4%
計	23.3%	20.2%	21.3%	27.4%	22.5%	21.8%
急性心筋梗塞 (人)	111	266	227	186	790	327
KillipⅠ	9.3%	2.1%	4.0%	3.5%	3.9%	7.8%
KillipⅡ	15.4%	5.7%	10.2%	11.4%	9.3%	9.5%
KillipⅢ	42.9%	24.0%	14.3%	29.4%	25.4%	57.1%
KillipⅣ	80.0%	56.3%	50.0%	70.0%	58.8%	73.3%
(未入力)	9.4%	14.3%	2.9%	#N/A	7.4%	16.9%
計	15.3%	12.0%	11.5%	14.5%	12.9%	14.1%
肺炎 (人)	498	1,075	1,143	1,257	3,973	1,457
軽症	5.6%	4.0%	2.6%	4.7%	4.0%	4.3%
中等症	6.3%	7.1%	6.9%	7.5%	7.1%	8.2%
重症	40.8%	53.9%	43.5%	49.5%	48.4%	59.3%
(未入力)	13.0%	25.9%	24.4%	0.0%	18.4%	14.2%
(既定外表示)	#N/A	50.0%	#N/A	#N/A	50.0%	#N/A
計	10.4%	14.2%	11.4%	12.6%	12.4%	12.6%
喘息 (人)	139	301	403	220	1,063	434
軽症間欠型	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%
軽症持続型	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%
中等症持続型	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
重症持続型	0.0%	2.9%	0.0%	5.0%	2.1%	4.2%
(未入力)	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.7%
計	0.0%	0.7%	0.0%	0.5%	0.3%	0.7%

	2004年 4-6月	2004年 7-9月	2004年 10-12月	2005年 1-3月	2004年度	前年度
脳梗塞 (人)	297	1,023	794	733	2,847	1,238
JCS 0-1	1.8%	1.4%	1.4%	2.0%	1.6%	1.6%
JCS 2-3	11.9%	5.1%	9.3%	11.2%	8.8%	5.7%
JCS 10-100	25.8%	20.0%	26.0%	31.0%	25.3%	23.9%
JCS 200-300	46.2%	21.7%	63.2%	62.1%	48.8%	57.1%
(未入力)	3.4%	15.0%	5.0%	0.0%	7.1%	4.0%
計	8.4%	4.3%	6.4%	9.0%	6.5%	6.1%
脳出血 (人)	160	371	282	309	1,122	628
JCS 0-1	0.0%	4.8%	3.4%	5.7%	4.3%	3.4%
JCS 2-3	4.0%	6.3%	9.4%	6.7%	7.0%	6.1%
JCS 10-100	17.9%	13.8%	25.5%	25.0%	20.0%	24.2%
JCS 200-300	73.8%	82.0%	69.8%	61.5%	71.6%	72.6%
(未入力)	22.2%	18.2%	0.0%	100.0%	17.9%	13.4%
計	25.6%	17.8%	20.9%	19.1%	20.1%	20.7%
糖尿病 (人)	184	495	391	393	1,463	603
軽症	0.0%	0.3%	0.0%	0.5%	0.3%	0.5%
中等症	3.9%	0.7%	1.5%	0.7%	1.3%	0.0%
重症	0.0%	8.0%	6.7%	2.9%	4.4%	1.7%
(未入力)	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	1.1%	1.8%
計	1.1%	0.8%	1.3%	0.8%	1.0%	0.8%
大腿骨頸部骨折 (人)	153	331	313	334	1,131	552
重症度 I	0.0%	2.8%	0.8%	1.4%	1.5%	0.6%
重症度 II	15.0%	4.9%	1.7%	1.5%	4.8%	1.0%
重症度 III	0.0%	2.6%	1.2%	2.9%	2.1%	1.1%
重症度 IV	0.0%	7.5%	3.8%	0.0%	4.7%	0.0%
(未入力)	2.9%	0.0%	0.0%	#N/A	1.8%	0.0%
計	4.6%	3.6%	1.3%	1.8%	2.6%	0.5%
胃潰瘍 (人)	92	218	190	122	622	242
ショックなし	1.3%	0.5%	1.3%	2.9%	1.4%	0.0%
ショックあり	0.0%	7.1%	3.3%	0.0%	3.7%	9.4%
(未入力)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%
計	1.1%	1.4%	1.6%	2.5%	1.6%	2.5%
急性腸炎 (人)	213	610	458	527	1,808	535
血便なし	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%
血便あり	0.0%	0.0%	7.7%	2.6%	2.2%	0.0%
(未入力)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%
計	0.0%	0.3%	0.4%	0.2%	0.3%	0.2%
正常分娩 (人)	160	638	405	350	1,553	1,138
重症度指標なし	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
急性虫垂炎 (人)	91	385	261	179	916	286
白血球15000/mm3未満	1.6%	0.0%	0.0%	0.8%	0.3%	0.0%
白血球15000/mm3以上	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	0.5%	0.0%
(未入力)	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
計	1.1%	0.0%	0.0%	1.1%	0.3%	0.0%
胆石症 (人)	119	475	404	324	1,322	625
黄疸なし	0.0%	0.7%	0.3%	1.0%	0.6%	0.0%
黄疸あり	11.1%	1.7%	3.7%	0.0%	2.3%	2.0%
(未入力)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.8%	0.8%	0.5%	0.9%	0.8%	0.2%

	2004年 4-6月	2004年 7-9月	2004年 10-12月	2005年 1-3月	2004年度	前年度
前立腺肥大症 (人)	30	106	108	100	344	124
前立腺容量20ml未満	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
前立腺容量50ml未満	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
前立腺容量50ml以上	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%
(未入力)	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
(既定外表示)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
白内障 (人)	242	574	388	330	1,534	766
1眼	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2眼	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(未入力)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
痔核 (人)	9	58	50	41	158	47
第一度(出血のみ)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
第二度(還納可能)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
第三度(脱肛)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(未入力)	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
子宮筋腫 (人)	49	117	71	68	305	199
貧血なし(Hb10g/dl以上)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
貧血あり(Hb10g/dl未満)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(未入力)	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
狭心症 (人)	309	1,578	1,367	1,111	4,365	838
重症度指標なし	0.0%	0.4%	0.3%	0.5%	0.4%	0.6%
計	0.0%	0.4%	0.3%	0.5%	0.4%	0.6%
腎結石及び尿管結石 (人)	131	756	427	343	1,657	361
水腎・水尿管なし	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
水腎・水尿管あり	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.1%	0.0%
(未入力)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%
乳房の悪性新生物 (人)	58	145	110	112	425	140
ステージI	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%
ステージIIA	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ステージIIB	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ステージIIIA	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%
ステージIIIB	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ステージIV	33.3%	30.8%	23.1%	24.3%	26.3%	30.0%
(未入力)	0.0%	16.7%	0.0%	#N/A	11.1%	25.0%
(既定外表示)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%
計	3.4%	6.9%	5.5%	8.0%	6.4%	6.4%
膝関節症 (人)	30	56	51	33	170	82
骨移植なし	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
骨移植あり	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A
(未入力)	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
そけいヘルニア (人)	107	374	272	233	986	359
重症度指標なし	0.9%	0.0%	0.0%	0.4%	0.2%	0.0%
計	0.9%	0.0%	0.0%	0.4%	0.2%	0.0%
全疾患合計	3,567	11,044	8,881	7,936	31,428	11,999
計	6.1%	4.8%	4.6%	5.9%	5.2%	5.2%

死亡退院率(手術あり)

[各主傷病最上段の数値は在院中に手術をした退院患者数]

主傷病別・重症度別の死亡退院率

	2004年 4-6月	2004年 7-9月	2004年 10-12月	2005年 1-3月	2004年度	前年度
胃の悪性新生物 (人)	80	187	174	122	563	223
ステージⅠ	0.0%	1.1%	2.5%	0.0%	1.2%	1.1%
ステージⅡ	0.0%	2.9%	3.0%	0.0%	2.1%	2.9%
ステージⅢ	11.1%	4.8%	7.4%	0.0%	5.4%	2.6%
ステージⅣ	10.0%	21.4%	21.4%	8.0%	17.1%	5.1%
(未入力)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%
計	3.8%	6.4%	6.3%	1.6%	5.0%	2.7%
結腸の悪性新生物 (人)	49	176	159	110	494	153
ステージⅠ	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%
ステージⅡ	0.0%	1.9%	2.2%	0.0%	1.4%	0.0%
ステージⅢ	0.0%	4.7%	0.0%	2.9%	2.3%	2.6%
ステージⅣ	0.0%	14.3%	20.0%	12.5%	14.1%	0.0%
(未入力)	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	5.6%
計	0.0%	4.5%	3.1%	2.7%	3.2%	1.3%
気管支および肺の悪性新生物 (人)	17	49	27	26	119	73
ステージⅠ	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ステージⅡ	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	4.8%	11.1%
ステージⅢ	25.0%	18.2%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%
ステージⅣ	#N/A	30.0%	25.0%	0.0%	25.0%	16.7%
(未入力)	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
計	5.9%	12.2%	3.7%	0.0%	6.7%	4.1%
脳出血 (人)	41	123	77	85	326	160
JCS 0-1	0.0%	2.9%	0.0%	16.7%	5.8%	10.0%
JCS 2-3	0.0%	13.6%	0.0%	5.9%	8.2%	12.9%
JCS 10-100	9.1%	10.2%	19.0%	23.8%	14.7%	25.0%
JCS 200-300	53.8%	62.5%	38.1%	23.5%	43.3%	41.9%
(未入力)	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	7.1%
計	19.5%	15.4%	15.6%	17.6%	16.6%	20.6%
大腿骨頸部骨折 (人)	122	255	271	275	923	383
重症度Ⅰ	0.0%	1.8%	0.8%	1.6%	1.2%	0.8%
重症度Ⅱ	10.0%	4.1%	2.0%	1.9%	3.8%	1.3%
重症度Ⅲ	0.0%	3.4%	1.4%	2.4%	2.2%	0.0%
重症度Ⅳ	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(未入力)	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
計	2.5%	2.4%	1.1%	1.8%	1.8%	0.5%
急性虫垂炎 (人)	68	283	195	142	688	219
白血球15000/mm3未満	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%
白血球15000/mm3以上	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.6%	0.0%
(未入力)	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
計	1.5%	0.0%	0.0%	0.7%	0.3%	0.0%
胆石症 (人)	75	353	309	255	992	454
黄疸なし	0.0%	0.0%	0.4%	0.4%	0.2%	0.0%
黄疸あり	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	1.1%	0.0%
(未入力)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.6%	0.4%	0.3%	0.0%

	2004年 4-6月	2004年 7-9月	2004年 10-12月	2005年 1-3月	2004年度	前年度
前立腺肥大症 (人)	29	81	94	85	289	104
前立腺容量20ml未満	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
前立腺容量50ml未満	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
前立腺容量50ml以上	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%
(未入力)	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
(既定外表示)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
白内障 (人)	241	570	387	330	1,528	760
1眼	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2眼	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(未入力)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
痔核 (人)	9	56	42	31	138	38
第一度(出血のみ)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
第二度(還納可能)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
第三度(脱肛)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(未入力)	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
子宮筋腫 (人)	48	104	63	62	277	192
貧血なし(Hb10g/dl以上)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
貧血あり(Hb10g/dl未満)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(未入力)	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
乳房の悪性新生物 (人)	47	98	77	62	284	110
ステージI	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ステージIIA	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ステージIIB	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ステージIIIA	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%
ステージIIIB	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ステージIV	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(未入力)	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
(既定外表示)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
そけいヘルニア (人)	105	361	267	230	963	352
重症度指標なし	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

2-4. 予定しない再入院率

2004年度中に退院した患者のうち、予定しない再入院であった患者の割合を四半期ごと(2004年4月～6月、2004年7月～9月、2004年10月～12月、2005年1月～3月)および年度全体で集計しています。本調査の対象となる24疾患を直接の原因として入院した患者を対象とします。

※予定しない再入院： 同一の疾患で退院後一ヶ月以内に再度入院する場合をいいます。

(1) 予定しない再入院率

対象期間中に退院した患者のうち、予定しない再入院であった患者の割合を疾患・再入院までの期間ごとに集計

$$\text{予定しない再入院率} = \frac{\text{当該疾患の再入院までの期間別 予定しない再入院患者数}}{\text{当該疾患による退院患者数}} \times 100(\%)$$

(2) 予定しない再入院率(手術あり)

対象期間中に退院した患者のうち、入院期間中に手術を受けかつ予定しない再入院であった患者の割合を疾患・再入院までの期間ごとに集計

※手術を目的とした入院が比較的多いと思われる主傷病に限る。

【集計表を見る上での注意】

○各疾患欄の最上段の数値は、疾患ごとの期間中の退院患者数を表しています。(手術あり)については入院期間中に手術を受けた退院患者数となります。

○集計病院数

	2004年			2005年
	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
都病協	15	16	15	11
全日病	—	29	27	27
2協会合計	15	45	42	38

予定しない再入院率

〔各主傷病最上段の数値は退院患者数〕

主傷病別・再入院までの期間別再入院率

	2004年 4-6月	2004年 7-9月	2004年 10-12月	2005年 1-3月	2004年度	前年度
胃の悪性新生物 (人)	159	410	302	243	1,114	383
15日以内	0.6%	0.5%	0.0%	0.8%	0.4%	0.0%
31日以内	0.0%	0.2%	0.3%	0.0%	0.2%	0.0%
計	0.6%	0.7%	0.3%	0.8%	0.6%	0.0%
結腸の悪性新生物 (人)	67	266	211	162	706	222
15日以内	0.0%	0.4%	0.0%	0.6%	0.3%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.1%	0.0%
計	0.0%	0.4%	0.0%	1.2%	0.4%	0.0%
気管支および肺の悪性新生物 (人)	159	416	253	226	1,054	413
15日以内	0.0%	1.9%	0.4%	0.4%	0.9%	0.0%
31日以内	0.0%	0.2%	0.0%	0.4%	0.2%	0.0%
計	0.0%	2.2%	0.4%	0.9%	1.1%	0.0%
急性心筋梗塞 (人)	111	266	227	186	790	327
15日以内	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.1%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.1%	0.0%
肺炎 (人)	498	1,075	1,143	1,257	3,973	1,457
15日以内	0.4%	0.1%	0.3%	0.2%	0.2%	0.3%
31日以内	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%
計	0.4%	0.1%	0.4%	0.2%	0.3%	0.3%
喘息 (人)	139	301	403	220	1,063	434
15日以内	0.0%	0.3%	0.2%	0.0%	0.2%	0.5%
31日以内	0.7%	0.0%	0.7%	0.0%	0.4%	0.0%
計	0.7%	0.3%	1.0%	0.0%	0.6%	0.5%
脳梗塞 (人)	297	1,023	794	733	2,847	1,238
15日以内	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%
脳出血 (人)	160	371	282	309	1,122	628
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
31日以内	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%
計	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%
糖尿病 (人)	184	495	391	393	1,463	603
15日以内	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.1%	0.0%
31日以内	0.0%	0.2%	0.0%	0.3%	0.1%	0.0%
計	0.0%	0.2%	0.3%	0.3%	0.2%	0.0%
大腿骨頸部骨折 (人)	153	331	313	334	1,131	552
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	2004年 4-6月	2004年 7-9月	2004年 10-12月	2005年 1-3月	2004年度	前年度
胃潰瘍 (人)	92	218	190	122	622	242
15日以内	0.0%	1.4%	0.5%	0.0%	0.6%	0.4%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	1.4%	0.5%	0.0%	0.6%	0.4%
急性腸炎 (人)	213	610	458	527	1,808	535
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%
正常分娩 (人)	160	638	405	350	1,553	1,138
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
急性虫垂炎 (人)	91	385	261	179	916	286
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
胆石症 (人)	119	475	404	324	1,322	625
15日以内	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%
31日以内	0.8%	0.2%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%
計	0.8%	0.4%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%
前立腺肥大症 (人)	30	106	108	100	344	124
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
白内障 (人)	242	574	388	330	1,534	766
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
痔核 (人)	9	58	50	41	158	47
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
子宮筋腫 (人)	49	117	71	68	305	199
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
狭心症 (人)	309	1,578	1,367	1,111	4,365	838
15日以内	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.1%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.1%	0.0%
腎結石及び尿管結石 (人)	131	756	427	343	1,657	361
15日以内	0.0%	0.3%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%
計	0.0%	0.3%	0.5%	0.0%	0.2%	0.0%

	2004年 4-6月	2004年 7-9月	2004年 10-12月	2005年 1-3月	2004年度	前年度
乳房の悪性新生物 (人)	58	145	110	112	425	140
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%
計	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%
膝関節症 (人)	30	56	51	33	170	82
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
そけいヘルニア (人)	107	374	272	233	986	359
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
全疾患合計 (人)	3,567	11,044	8,881	7,936	31,428	11,999
15日以内	0.1%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%
31日以内	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%
計	0.1%	0.2%	0.3%	0.1%	0.2%	0.1%

予定しない再入院率(手術あり)

[各主傷病最上段の数値は在院中に手術をした退院患者数]

主傷病別・再入院までの期間別再入院率

	2004年 4-6月	2004年 7-9月	2004年 10-12月	2005年 1-3月	2004年度	前年度
胃の悪性新生物 (人)	80	187	174	122	563	223
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
結腸の悪性新生物 (人)	49	176	159	110	494	153
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
気管支および肺の悪性新生物 (人)	17	49	27	26	119	73
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
脳出血 (人)	41	123	77	85	326	160
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
大腿骨頭部骨折 (人)	122	255	271	275	923	383
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
急性虫垂炎 (人)	68	283	195	142	688	219
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
胆石症 (人)	75	353	309	255	992	454
15日以内	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	3.1%	0.0%
31日以内	100.0%	50.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%
計	1.3%	0.6%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%
前立腺肥大症 (人)	29	81	94	85	289	104
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
白内障 (人)	241	570	387	330	1,528	760
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
痔核 (人)	9	56	42	31	138	38
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
子宮筋腫 (人)	48	104	63	62	277	192
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	2004年 4-6月	2004年 7-9月	2004年 10-12月	2005年 1-3月	2004年度	前年度
乳房の悪性新生物 (人)	47	98	77	62	284	110
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
計	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%
そけいヘルニア (人)	105	361	267	230	963	352
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%

2-5. 入院後発症感染症

2004年度の入院後発症感染症の発生件数、および2004年度に入院している患者の延べ人数(延べ入院患者数)に対する入院後発症感染症の発生件数の割合を、四半期ごと(2004年4月～6月、2004年7月～9月、2004年10月～12月、2005年1月～3月)および年度全体で集計しています。

疾患に関わらず全ての入院患者を対象とします。

※入院後発症感染症：入院後に病原微生物の感染を生じ、治療を必要とするものをいいます。

病院外で感染が成立し、入院後に発症したものは該当しません。

※延べ入院患者数：病院全体の入院患者数(疾患によらない)を毎日カウントし、その人数を対象期間にわたって合算したもの。

(1) 入院後発症感染症発生件数

対象期間中の入院後発症感染症の発生件数を発生部位ごとに集計

(2) 入院後発症感染症発生率

対象期間中の延べ入院患者数に対する入院後発症感染症の発生件数の割合を発生部位ごとに集計

$$\text{入院後発症感染症発生率} = \frac{\text{対象期間中に発生した部位別の入院後発症感染症の発生件数}}{\text{対象期間中の延べ入院患者数}} \times 1000(\%)$$