

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の症状	患者背景	
	用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
133	小児専門C	神経科	適応外使用	心身症	適応症の心身症における身体症状及び不眠時の鎮静目的で使用	
	安全性: 特になし 有効性: やや有効				女 12歳 4ヶ月	H: 127.0cm W: 15.3kg 外来・継続中
	用法: 総合:				0.25mg/日(1x) → 水剤 内用	
134	小児専門C	神経科	適応外使用	てんかん		
	安全性: 有効性:				男 13歳 1ヶ月	
	用法: 総合:				4.00mg/日(2x) → 散 内用	
135	小児専門C		適応外使用	不安・興奮・抑うつ軽減:(アルコール依存症の禁断症状・離脱症状)		
	安全性: 有効性:				男 13歳 1ヶ月	
	用法: 総合:				40.00mg/日(4x) → 散 内用	
136	小児専門C		適応外使用	不安・興奮・抑うつ軽減:(麻酔前、麻酔導入時、麻酔中、術後)		
	安全性: 有効性:				男 13歳 1ヶ月	
	用法: 総合:				散 内用	
137	小児専門C	麻酔科	麻酔前投薬			
	安全性: 特になし 有効性: やや有効				男 3歳 9ヶ月	H: 97.8cm W: 15.0kg 入院・投与終了 2004/11/10 ~ 2004/11/10 (1日間)
	用法: 総合:				10.00mg/日(1x) → 水剤 内用	
138	小児専門C	麻酔科	麻酔前投薬			
	安全性: 特になし 有効性: 著効				男 5歳 3ヶ月	H: 84.6cm W: 11.6kg 入院・投与終了 2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間)
	用法: 総合:				7.00mg/日(1x) → 散 内用	
139	小児専門C	麻酔科	麻酔前投薬			
	安全性: 特になし 有効性: 著効				女 8歳 5ヶ月	H: 127.0cm W: 26.1kg 入院・投与終了 2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間)
	用法: 総合:				10.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用	
140	小児専門C	麻酔科	麻酔前投薬			
	安全性: 特になし 有効性: 著効				女 9歳 5ヶ月	H: 125.5cm W: 24.0kg 入院・投与終了 2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間)
	用法: 総合:				10.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用	
141	小児専門C	麻酔科	麻酔前投薬			
	安全性: 特になし 有効性: 著効				男 14歳 10ヶ月	H: 156.0cm W: 49.7kg 入院・投与終了 2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間)
	用法: 総合:				10.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用	
142	小児専門D	小児科	筋緊張軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			
	安全性: 特になし 有効性: 有効				男 10歳 10ヶ月	W: 10.0kg 入院・継続中
	用法: 総合:				2003/12/05 ~ 2.50mg/日(1x) 2.00mg → 3.00mg 散 内用	
143	小児専門D	神経科	適応外使用	筋痙攣	脳性マヒに伴う筋緊張の亢進の抑制	
	安全性: 特になし 有効性: やや有効				男 1歳 0ヶ月	W: 11.1kg 入院・継続中
	用法: 総合:				2004-08/30 ~ 3.00mg/日(3x) 1.00mg → 散 内用	

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No	施設名 診療科		対象疾患		適応外使用の症状	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			患者背景 投与量・剤型・投与経路		
144	小児専門D	新生児科	適応外使用	筋痙攣	低酸素性虚血性脳症に伴うけいれんの抑制	
	安全性: 特になし 有効性: 有効				女 3歳 9ヶ月 H: 87.0cm W: 9.9kg 入院・継続中	
	用法: 総合:				2003/11/27 ~ 2.00mg/日 (1x) → 散 内用	
145	小児専門D	神経科	適応外使用	筋痙攣	脱性マヒに伴う筋緊張の亢進の抑制	
	安全性: 特になし 有効性: やや有効				男 6歳 11ヶ月 W: 22.6kg 入院・継続中	
	用法: 総合:				2004/08/23 ~ 3.00mg/日 (3x) 2.00mg → 3.00mg 散 内用	
146	小児専門E		筋緊張の軽減:	(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性: 有効性:				男 1歳 5ヶ月	
	用法: 総合:				~ → 水剤 内用	
147	小児専門E		筋緊張の軽減:	(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性: 有効性:				男 6歳 7ヶ月	
	用法: 総合:				~ → 散 内用	
148	小児専門E		筋緊張の軽減:	(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性: 有効性:				男 6歳 11ヶ月	
	用法: 総合:				~ → 散 内用	
149	小児専門E		筋緊張の軽減:	(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性: 有効性:				女 9歳 3ヶ月	
	用法: 総合:				~ → 水剤 内用	
150	小児専門E		筋緊張の軽減:	(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性: 有効性:				男 15歳 10ヶ月	
	用法: 総合:				~ → 散 内用	
151	小児専門F	小児科	筋緊張の軽減:	(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性: 有効性:				男 13歳 0ヶ月 W: 13.0kg 入院・継続中	
	用法: 総合:				~ 4.00mg/日 (3x) → 散 内用	
152	小児専門F	小児科	適応外使用	てんかん		
	安全性: 有効性:				男 12歳 7ヶ月 W: 14.5kg 外来・継続中	
	用法: 総合:				~ 3.00mg/日 (2x) → 散 内用	
153	小児専門F	神経科	適応外使用	てんかん		
	安全性: 有効性:				女 14歳 10ヶ月 外来・継続中	
	用法: 総合:				~ 3.00mg/日 (3x) → 散 内用	
154	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬			
	安全性: 有効性:				男 0歳 7ヶ月 W: 8.0kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/12/01 ~ 2004/12/01 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 散 内用	

No	施設名 診療科 対象疾患			適応外使用の症状	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			投与量・剤型・投与経路		
155	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		男	0歳 7ヶ月 W: 8.2kg 入院・投与終了
	安全性:				2004/11/30 ~ 2004/11/30 (1日間)	
	有効性:				6.00mg/日 (1x)	→
	用法:				散	内用
総合:						
156	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		男	0歳 9ヶ月 W: 7.2kg 外来・投与終了
	安全性:				2004/11/12 ~ 2004/11/12 (1日間)	
	有効性:				5.00mg/日 (1x)	→
	用法:				散	内用
総合:						
157	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		男	0歳 11ヶ月 W: 8.7kg 外来・投与終了
	安全性:				2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間)	
	有効性:				6.00mg/日 (1x)	→
	用法:				散	内用
総合:						
158	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		男	1歳 4ヶ月 W: 10.9kg 入院・
	安全性:				~	
	有効性:				7.00mg/日 (1x)	→
	用法:				散	内用
総合:						
159	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		男	1歳 10ヶ月 W: 7.0kg 外来・投与終了
	安全性:				2004/11/22 ~ 2004/11/22 (1日間)	
	有効性:				5.00mg/日 (1x)	→
	用法:				散	内用
総合:						
160	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		男	2歳 10ヶ月 W: 13.0kg 入院・投与終了
	安全性:				2004/11/10 ~ 2004/11/10 (1日間)	
	有効性:				10.00mg/日 (1x)	→
	用法:				散	内用
総合:						
161	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		男	3歳 1ヶ月 W: 11.0kg 入院・投与終了
	安全性:				2004/11/11 ~ 2004/11/11 (1日間)	
	有効性:				8.00mg/日 (1x)	→
	用法:				散	内用
総合:						
162	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		男	3歳 3ヶ月 W: 11.9kg 外来・
	安全性:				2004/11/29 ~ 2004/11/29 (1日間)	
	有効性:				8.00mg/日 (1x)	→
	用法:				散	内用
総合:						
163	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		女	3歳 4ヶ月 W: 15.6kg 投与終了
	安全性:				2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間)	
	有効性:				10.00mg/日 (1x)	→
	用法:				散	内用
総合:						
164	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		男	3歳 5ヶ月 W: 12.9kg 入院・投与終了
	安全性:				2004/11/15 ~ 2004/11/15 (1日間)	
	有効性:				8.00mg/日 (1x)	→
	用法:				散	内用
総合:						
165	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		女	3歳 6ヶ月 W: 15.1kg 外来・投与終了
	安全性:				2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間)	
	有効性:				10.00mg/日 (1x)	→
	用法:				散	内用
総合:						

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
	安全性/有効性				患者背景
	用法・用量/総合コメント				
166	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		女 3歳 10ヶ月 W: 13.9kg 入院・投与終了
	安全性:				2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間) 9.00mg/日 (1x) → 散 内用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
167	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		男 3歳 10ヶ月 投与終了
	安全性:				2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 9.00mg/日 (1x) → 散 内用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
168	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		男 3歳 11ヶ月 W: 13.9kg 入院・投与終了
	安全性:				2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
169	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		男 5歳 7ヶ月 W: 18.0kg 外来・投与終了
	安全性:				2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
170	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		女 5歳 9ヶ月 W: 17.0kg 入院・投与終了
	安全性:				2004/12/01 ~ 2004/12/01 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
171	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		男 5歳 9ヶ月 W: 15.2kg 外来・投与終了
	安全性:				2004/11/15 ~ 2004/11/15 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
172	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		男 5歳 9ヶ月 W: 15.0kg 入院・投与終了
	安全性:				2004/11/11 ~ 2004/11/11 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
173	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		女 6歳 1ヶ月 W: 22.0kg 外来・投与終了
	安全性:				2004/11/12 ~ 2004/11/12 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
174	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		女 6歳 8ヶ月 W: 20.0kg 外来・投与終了
	安全性:				2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
175	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		男 6歳 8ヶ月 W: 20.0kg 入院・投与終了
	安全性:				2004/11/22 ~ 2004/11/22 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
176	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		男 7歳 8ヶ月 W: 25.0kg 外来・投与終了
	安全性:				2004/11/15 ~ 2004/11/15 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用
	有効性:				
	用法:				
総合:					

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景 投与量・剤型・投与経路
177	小児専門F	麻酔科	麻酔前投薬		男 10歳 7ヶ月 W: 27.2kg 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 10.00mg/日(1x) → 散 内用
178	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		男 0歳 4ヶ月 入院・継続中
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				~ 1.50mg/日(3x) → 水剤 内用
179	小児専門G	感染科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 0歳 9ヶ月 外来・継続中
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				~ 1.50mg/日(3x) → 水剤 内用
180	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 0歳 10ヶ月 外来・継続中
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				~ 2.00mg/日(2x) → 水剤 内用
181	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		男 0歳 11ヶ月 外来・継続中
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				2004/04/08 ~ 0.80mg/日(2x) → 散 内用
182	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 0歳 11ヶ月 入院・
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				~ 2.00mg/日(2x) → 水剤 内用
183	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 1歳 0ヶ月 外来・継続中
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				~ 0.30mg/日(3x) → 水剤 内用
184	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 1歳 6ヶ月 外来・継続中
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				~ 0.90mg/日(3x) → 散 内用
185	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 1歳 6ヶ月 外来・継続中
	安全性: 有効性: 用法:(0.5, 0.2, 0.5) 総合:				2004/06/18 ~ 1.20mg/日(3x) 1.00mg → 1.25mg 水剤 内用
186	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		男 1歳 9ヶ月 外来・継続中 W: 7.5kg
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				~ 2.00mg/日(1x) → 水剤 内用
187	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 1歳 10ヶ月 外来・継続中
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				~ 0.60mg/日(2x) → 水剤 内用

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の症状	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
188	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			男 2歳 3ヶ月 W: 8.0kg 外来・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					2003/12/04 ~ 1.00mg/日 (2x) → 水剤 内用
総合:						
189	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			女 2歳 9ヶ月 外来・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					~ 2.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
総合:						
190	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			女 2歳 9ヶ月 入院・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					~ 2.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
総合:						
191	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			女 3歳 4ヶ月 外来・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					~ 6.00mg/日 (3x) → 水剤 内用
総合:						
192	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			男 3歳 4ヶ月 外来・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法:		(0.5, 0.5, 0.5, 1.0)			~ 2.50mg/日 (4x) → 水剤 内用
総合:						
193	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			女 4歳 4ヶ月 入院・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					~ 2.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
総合:						
194	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			女 4歳 8ヶ月 外来・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					2000/07/21 ~ 3.00mg/日 (3x) 2.00mg → 3.00mg 水剤 内用
総合:						
195	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			男 5歳 5ヶ月 外来・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					~ 3.00mg/日 (3x) → 散 内用
総合:						
196	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			男 6歳 6ヶ月 外来・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					~ 4.50mg/日 (3x) → 水剤 内用
総合:						
197	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			女 8歳 0ヶ月 外来・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					~ 6.00mg/日 (3x) → 水剤 内用
総合:						
198	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			女 8歳 4ヶ月 外来・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法:					2003/01/14 ~ 0.50mg/日 (1x) → 散 内用
総合:						

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の症状	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	入院・継続中
199	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		男 8歳 8ヶ月	入院・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				3.00mg/日(3x)	→
総合:					散 内用	
200	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 8歳 11ヶ月	外来・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				4.00mg/日(2x)	→
総合:					錠・カプセル 内用	
201	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 8歳 11ヶ月	外来・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法: 朝夕(0.3mg,0.6mg)				0.90mg/日(2x)	→
総合:					散 内用	
202	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 9歳 5ヶ月	外来・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				1.60mg/日(4x)	→
総合:					散 内用	
203	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 9歳 10ヶ月	外来・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				8.00mg/日(3x)	→
総合:					散 内用	
204	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 10歳 1ヶ月	外来・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				3.00mg/日(1x)	→
総合:					水剤 内用	
205	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		男 11歳 0ヶ月	外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法: 0.5mgを1:2で服用				0.50mg/日(2x)	→
総合:					散 内用	
206	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		男 11歳 11ヶ月	外来・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				1.00mg/日(1x)	→
総合:					水剤 内用	
207	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		男 12歳 9ヶ月	外来・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法: (1mg, 2mg)				3.00mg/日(2x)	→
総合:					錠・カプセル 内用	
208	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 14歳 11ヶ月	外来・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				2.00mg/日(2x)	→
総合:					散 内用	
209	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 15歳 7ヶ月	外来・継続中
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				1.00mg/日(2x)	→
総合:					水剤 内用	

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の症状	患者背景		
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	入院・継続中	
210	小児専門G	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			男 15歳 11ヶ月	入院・継続中
	安全性:					~	
	有効性:					6.00mg/日(3x)	→
	用法:					散 内用	
総合:							
211	小児専門G	神経科	神経症における不安・緊張・抑うつ			男 3歳 11ヶ月	外来・継続中
	安全性:					~	
	有効性:					2.00mg/日(2x)	→
	用法:					水剤 内用	
総合:							
212	小児専門G	精神科	神経症における不安・緊張・抑うつ			女 6歳 6ヶ月	外来・継続中
	安全性:					~	
	有効性:					3.00mg/日(1x)	→
	用法:					散 内用	
総合:							
213	小児専門G	精神科	神経症における不安・緊張・抑うつ			女 8歳 9ヶ月	外来・
	安全性:					~	
	有効性:						→
	用法:					錠・カプセル 内用	
総合:							
214	小児専門G	神経科	神経症における不安・緊張・抑うつ			男 8歳 10ヶ月	外来・継続中
	安全性:					~	
	有効性:					4.00mg/日(1x)	→
	用法:					散 内用	
総合:							
215	小児専門G	神経科	適応外使用 不眠時	神経症		男 0歳 11ヶ月	外来・継続中
	安全性:					~	
	有効性:					1.00mg/日(1x)	→
	用法:					散 内用	
総合:							
216	小児専門G	神経科	適応外使用 夜間鎮静(夜泣き)	神経症		男 2歳 10ヶ月	外来・継続中
	安全性:					2003/01/12~	
	有効性:					2.00mg/日(1x)	→
	用法:					水剤 内用	
総合:							
217	小児専門G	神経科	適応外使用	てんかん		男 4歳 0ヶ月	外来・継続中
	安全性:					~	
	有効性:					6.00mg/日(2x)	→
	用法:					散 内用	
総合:							
218	小児専門G	神経科	適応外使用 鎮静・眠剤	その他		女 4歳 7ヶ月	外来・継続中
	安全性:					2003/04/25~	
	有効性:					4.00mg/日(1x)	2.00mg → 4.00mg
	用法:					水剤 内用	
総合:							
219	小児専門G	神経科	適応外使用	てんかん		女 6歳 1ヶ月	外来・継続中
	安全性:					W: 21.4kg	
	有効性:					2002/05/07~	
	用法:					3.00mg/日(2x)	3.00mg → 6.00mg
総合:						散 内用	
220	小児専門G	循環器科	麻酔前投薬			女 0歳 4ヶ月	入院・投与終了
	安全性:					2004/11.02~2004/11.02(1日間)	
	有効性:					1.00mg/日(1x)	→
	用法:					散 内用	
総合:							

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No	施設名 診療科 対象疾患		適応外使用の症状	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント		患者背景 投与量・剤型・投与経路	
221	小児専門G 循環器科 麻酔前投薬			
	安全性:		男 0歳 6ヶ月	
	有効性:		入院・投与終了	
	用法:		2004/11/01 ~ 2004/11/01 (1日間) 4.00mg/日 (1x) → 散 内用	
総合:				
222	小児専門G 循環器科 麻酔前投薬			
	安全性:		男 0歳 6ヶ月	
	有効性:		入院・投与終了	
	用法:		2004/11/24 ~ 2004/11/24 (1日間) 2.00mg/日 (1x) → 散 内用	
総合:				
223	小児専門G 循環器科 麻酔前投薬			
	安全性:		女 0歳 10ヶ月	
	有効性:		入院・投与終了	
	用法:		2004/11/15 ~ 2004/11/15 (1日間) 2.50mg/日 (1x) → 散 内用	
総合:				
224	小児専門G 循環器科 麻酔前投薬			
	安全性:		女 0歳 10ヶ月	
	有効性:		入院・投与終了	
	用法:		2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間) 3.00mg/日 (1x) → 散 内用	
総合:				
225	小児専門G 循環器科 麻酔前投薬			
	安全性:		男 0歳 10ヶ月	
	有効性:		入院・投与終了	
	用法:		2004/11/24 ~ 2004/11/24 (1日間) 4.00mg/日 (1x) → 散 内用	
総合:				
226	小児専門G 循環器科 麻酔前投薬			
	安全性:		男 1歳 0ヶ月	
	有効性:		入院・投与終了	
	用法:		2004/11/24 ~ 2004/11/24 (1日間) 4.00mg/日 (1x) → 散 内用	
総合:				
227	小児専門G 循環器科 麻酔前投薬			
	安全性:		女 1歳 0ヶ月	
	有効性:		入院・投与終了	
	用法:		2004/11/01 ~ 2004/11/01 (1日間) 4.00mg/日 (1x) → 散 内用	
総合:				
228	小児専門G 循環器科 麻酔前投薬			
	安全性:		女 1歳 4ヶ月	
	有効性:		入院・投与終了	
	用法:		2004/11/02 ~ 2004/11/02 (1日間) 3.00mg/日 (1x) → 散 内用	
総合:				
229	小児専門G 心臓血管外科 (循環器科) 麻酔前投薬			
	安全性:		女 3歳 6ヶ月	
	有効性:		入院・投与終了	
	用法:		2004/11/29 ~ 2004/11/29 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 散 内用	
総合:				
230	小児専門G 循環器科 麻酔前投薬			
	安全性:		女 3歳 6ヶ月	
	有効性:		入院・投与終了	
	用法:		2004/11/29 ~ 2004/11/29 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 散 内用	
総合:				
231	小児専門G 循環器科 麻酔前投薬			
	安全性:		女 3歳 9ヶ月	
	有効性:		入院・投与終了	
	用法:		2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 散 内用	
総合:				

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No	施設名 診療科 対象疾患		適応外使用の症状	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			投与量・剤型・投与経路	
232	小児専門G	循環器科	麻酔前投薬		
	安全性:			女	4歳 3ヶ月
	有効性:			入院・投与終了	
	用法:			2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間) 5.00mg/日(1x) →	
総合:			散 内用		
233	小児専門G	循環器科	麻酔前投薬		
	安全性:			男	4歳 4ヶ月
	有効性:			入院・投与終了	
	用法:			2004/11/15 ~ 2004/11/15 (1日間) 5.00mg/日(1x) →	
総合:			散 内用		
234	小児専門G	循環器科	麻酔前投薬		
	安全性:			男	4歳 10ヶ月
	有効性:			入院・投与終了	
	用法:			2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間) 5.00mg/日(1x) →	
総合:			散 内用		
235	小児専門G	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:			男	5歳 8ヶ月
	有効性:			入院・投与終了	
	用法:			2004/11/12 ~ 2004/11/12 (1日間) 5.00mg/日(1x) →	
総合:			散 内用		
236	小児専門G	循環器科	麻酔前投薬		
	安全性:			女	5歳 10ヶ月
	有効性:			入院・投与終了	
	用法:			2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間) 5.00mg/日(1x) →	
総合:			散 内用		
237	小児専門G	循環器科	麻酔前投薬		
	安全性:			女	6歳 0ヶ月
	有効性:			入院・投与終了	
	用法:			2004/11/10 ~ 2004/11/10 (1日間) 8.00mg/日(1x) →	
総合:			散 内用		
238	小児専門G	循環器科	麻酔前投薬		
	安全性:			男	6歳 1ヶ月
	有効性:			入院・投与終了	
	用法:			2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間) 6.00mg/日(1x) →	
総合:			散 内用		
239	小児専門G	循環器科	麻酔前投薬		
	安全性:			男	6歳 5ヶ月
	有効性:			入院・投与終了	
	用法:			2004/11/24 ~ 2004/11/24 (1日間) 6.00mg/日(1x) →	
総合:			散 内用		
240	小児専門G	循環器科	麻酔前投薬		
	安全性:			男	6歳 5ヶ月
	有効性:			入院・投与終了	
	用法:			2004/11/10 ~ 2004/11/10 (1日間) 3.00mg/日(1x) →	
総合:			散 内用		
241	小児専門G	循環器科	麻酔前投薬		
	安全性:			女	6歳 6ヶ月
	有効性:			入院・投与終了	
	用法:			2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間) 5.00mg/日(1x) →	
総合:			散 内用		
242	小児専門G	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:			男	6歳 6ヶ月
	有効性:			入院・投与終了	
	用法:			2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 6.00mg/日(1x) →	
総合:			散 内用		

No	施設名 診療科 対象疾患		適応外使用の症状	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			投与量・剤型・投与経路
243	小児専門G	循環器科	麻酔前投薬	女 6歳 11ヶ月 入院・投与終了
	安全性:			
	有効性:			
	用法:			2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 散 内用
総合:				
244	小児専門G	麻酔科	麻酔前投薬	女 7歳 8ヶ月 外来・投与終了
	安全性:			
	有効性:			
	用法:			2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 7.00mg/日 (1x) → 散 内用
総合:				
245	小児専門G	麻酔科	麻酔前投薬	男 7歳 11ヶ月 入院・投与終了
	安全性:			
	有効性:			
	用法:			2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間) 7.00mg/日 (1x) → 散 内用
総合:				
246	小児専門G	循環器科	麻酔前投薬	男 9歳 3ヶ月 入院・投与終了
	安全性:			
	有効性:			
	用法:			2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 散 内用
総合:				
247	小児専門G	麻酔科	麻酔前投薬	男 10歳 9ヶ月 入院・投与終了
	安全性:			
	有効性:			
	用法:			2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
総合:				
248	小児専門G	麻酔科	麻酔前投薬	男 11歳 5ヶ月 入院・投与終了
	安全性:			
	有効性:			
	用法:			2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
総合:				
249	小児専門G	麻酔科	麻酔前投薬	女 11歳 7ヶ月 入院・投与終了
	安全性:			
	有効性:			
	用法:			2004/11/25 ~ 2004/11/25 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
総合:				
250	小児専門G	麻酔科	麻酔前投薬	男 12歳 3ヶ月 投与終了
	安全性:			
	有効性:			
	用法:			2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
総合:				
251	小児専門G	麻酔科	麻酔前投薬	男 12歳 3ヶ月 入院・投与終了
	安全性:			
	有効性:			
	用法:			2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
総合:				
252	小児専門G	麻酔科	麻酔前投薬	男 12歳 6ヶ月 入院・投与終了
	安全性:			
	有効性:			
	用法:			2004/11/30 ~ 2004/11/30 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
総合:				
253	小児専門H	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)	男 4歳 6ヶ月 外来・継続中
	安全性: 特になし			
	有効性: 有効			
	用法:			2002 12 19 ~ 2.50mg 日 (1x) → 散 内用
総合:				

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の症状	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
254	小児専門H	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 11歳 6ヶ月 外来・継続中	2003/05/20～ 3.00mg/日(1x) 散 内用
	安全性:特になし 有効性:有効					
	用法: 総合:					
255	小児専門H	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 14歳 8ヶ月 W: 37.0kg 外来・継続中	2003/04/10～ 5.00mg/日(1x) 散 内用
	安全性:特になし 有効性:有効					
	用法: 総合:					
256	小児専門H (発達小児科)		神経症における不安・緊張・抑うつ		男 7歳 3ヶ月 H: 120.8cm W: 21.3kg 外来・継続中	0.10mg/日 水剤 内用
	安全性:特になし 有効性:有効					
	用法: 総合:					
257	小児専門H	神経科	神経症における不安・緊張・抑うつ		女 7歳 6ヶ月 H: 120.0cm W: 20.1kg 入院・継続中	2004/01/09～ 2.00mg/日(1x) 散 内用
	安全性:特になし 有効性:有効					
	用法: 総合:					
258	小児専門H (発達小児科)		神経症における不安・緊張・抑うつ		女 12歳 9ヶ月 H: 160.0cm W: 49.0kg 入院・継続中	2004/11/30～ 2.00mg/日 錠・カプセル 内用
	安全性:特になし 有効性:やや有効					
	用法: 総合:					
259	小児専門H	神経科	適応外使用	てんかん	男 9歳 2ヶ月 H: 92.0cm W: 11.9kg 外来・	2.50mg/日(1x) 水剤 内用
	安全性: 有効性:					
	用法: 総合:					
260	小児専門H (小児神経科)	神経科	適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	女 14歳 0ヶ月 H: 147.0cm W: 22.5kg 外来・	5.00mg/日(2x) 散 内用
	安全性: 有効性:					
	用法: 総合:					
261	小児専門H (小児神経科)	神経科	適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	男 15歳 8ヶ月	4.00mg/日(3x) 散 内用
	安全性: 有効性:					
	用法: 総合:					
262	小児専門H	麻酔科	麻酔前投薬		女 6歳 6ヶ月 H: 113.2cm W: 20.3kg 入院・投与終了	2004/11/17～2004/11/17(1日間) 5.00mg/日(1x) 錠・カプセル 内用
	安全性:特になし 有効性:有効					
	用法: 総合:					
263	小児専門H	麻酔科	麻酔前投薬		女 6歳 6ヶ月 H: 112.6cm W: 19.7kg 入院・投与終了	2004/11/17～2004/11/17(1日間) 5.00mg/日(1x) 錠・カプセル 内用
	安全性:特になし 有効性:有効					
	用法: 総合:					
261	小児専門H	麻酔科	麻酔前投薬		男 7歳 1ヶ月 H: 108.7cm W: 15.6kg 入院・投与終了	2004/11/16～2004/11/16(1日間) 5.00mg/日(1x) 錠・カプセル 内用
	安全性:特になし 有効性:有効					
	用法: 総合:					

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路
265	小児専門H	麻酔科	麻酔前投薬		女 9歳 2ヶ月 H: 105.0cm W: 27.3kg 入院・投与終了 2004/11/18 ~ 2004/11/18 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
	安全性: 特になし 有効性: 有効				
	用法: 総合:				
266	小児専門H	麻酔科	麻酔前投薬		女 9歳 9ヶ月 H: 133.0cm W: 24.8kg 入院・投与終了 2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
	安全性: 特になし 有効性: 有効				
	用法: 総合:				
267	小児専門H	麻酔科	麻酔前投薬		男 9歳 11ヶ月 H: 126.2cm W: 24.1kg 入院・投与終了 2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
	安全性: 特になし 有効性: 有効				
	用法: 総合:				
268	小児専門H	麻酔科	麻酔前投薬		男 10歳 0ヶ月 H: 126.5cm W: 23.2kg 入院・投与終了 2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
	安全性: 特になし 有効性: 有効				
	用法: 総合:				
269	小児専門H	麻酔科	麻酔前投薬		男 10歳 8ヶ月 H: 142.4cm W: 35.8kg 入院・投与終了 2004/11/18 ~ 2004/11/18 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
	安全性: 特になし 有効性: 有効				
	用法: 総合:				
270	小児専門H	麻酔科	麻酔前投薬		男 11歳 0ヶ月 H: 123.4cm W: 22.5kg 入院・投与終了 2004/11/25 ~ 2004/11/25 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
	安全性: 特になし 有効性: 有効				
	用法: 総合:				
271	小児専門H	麻酔科	麻酔前投薬		男 12歳 3ヶ月 H: 147.6cm W: 33.1kg 入院・投与終了 2004/11/15 ~ 2004/11/15 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
	安全性: 特になし 有効性: 有効				
	用法: 総合:				
272	小児専門H	麻酔科	麻酔前投薬		男 12歳 6ヶ月 H: 135.4cm W: 32.5kg 入院・投与終了 2004/11/15 ~ 2004/11/15 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
	安全性: 特になし 有効性: 有効				
	用法: 総合:				
273	小児専門H	麻酔科	麻酔前投薬		男 13歳 0ヶ月 H: 165.1cm W: 41.3kg 入院・投与終了 2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
	安全性: 特になし 有効性: 有効				
	用法: 総合:				
274	小児専門H	麻酔科	麻酔前投薬		男 13歳 9ヶ月 H: 152.6cm W: 40.8kg 入院・投与終了 2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
	安全性: 特になし 有効性: 有効				
	用法: 総合:				
275	小児専門H	麻酔科	麻酔前投薬		男 14歳 6ヶ月 H: 160.0cm W: 50.4kg 入院・投与終了 2004/11/24 ~ 2004/11/24 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
	安全性: 特になし 有効性: 有効				
	用法: 総合:				

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			投与量・剤型・投与経路	
276	小児専門H	麻酔科	麻酔前投薬		女 14歳 10ヶ月 H: 142.6cm W: 37.4kg 入院・投与終了 2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 5.00mg/日 → 錠・カプセル 内用
277	小児専門H	麻酔科	麻酔前投薬		女 15歳 3ヶ月 H: 150.4cm W: 43.1kg 入院・投与終了 2004/11/24 ~ 2004/11/24 (1日間) 5.00mg/日 → 錠・カプセル 内用
278	小児専門H	麻酔科	麻酔前投薬		女 15歳 9ヶ月 H: 156.0cm W: 60.9kg 入院・投与終了 2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
279	小児専門I	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 4歳 9ヶ月 H: 106.6cm W: 15.1kg 投与終了 2004/01/22 ~ 2004/11/25 (309日間) 8.00mg/日 (2x) 4.00mg → 12.00mg 散 内用
280	小児専門I	新生児科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		男 9歳 6ヶ月 H: 107.7cm W: 14.9kg 外来・継続中 1998/07/31 ~ 8.00mg/日 (1x) 5.00mg → 8.00mg 散 内用
281	小児専門I		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		男 13歳 8ヶ月 外来・継続中 1998/03/30 ~ 6.00mg/日 (3x) 3.00mg → 6.00mg 散 内用
282	小児専門I	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 14歳 4ヶ月 W: 37.0kg 継続中 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用
283	小児専門I	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		男 16歳 10ヶ月 W: 18.0kg 外来・継続中 2002/04/02 ~ 1.00mg → 4.00mg 散 内用
284	小児専門J	小児科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 1歳 0ヶ月 入院・継続中 2004/06/21 ~ 2.00mg/日 (2x) 2.00mg → 2.40mg 水剤 内用
285	小児専門J	小児科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 3歳 6ヶ月 H: 86.4cm W: 9.5kg 入院・継続中 2004/08/03 ~ 8.00mg/日 (1x) → 散 内用
286	小児専門J	神経科 (精神神経科)	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 5歳 10ヶ月 H: 102.0cm W: 13.0kg 外来・継続中 2004/01/16 ~ 6.00mg/日 (3x) → 散 内用

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の症状	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
287	小児専門J	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			
	安全性:特になし 有効性:やや有効				女 8歳 8ヶ月	
	用法:				H: 110.0cm W: 26.2kg 外来・継続中	
	総合:				2003/12/02 ~ 5.00mg/日 (3x) → 散 内用	
288	小児専門J	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			
	安全性:特になし 有効性:やや有効				男 12歳 11ヶ月	
	用法:				H: 130.0cm W: 13.2kg 外来・継続中	
	総合:				1987/01/17 ~ 4.00mg/日 (2x) → 散 内用	
289	小児専門J	神経科 (精神神経科)	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			
	安全性:特になし 有効性:やや有効				男 13歳 8ヶ月	
	用法:				H: 122.0cm W: 14.3kg 外来・継続中	
	総合:				1998/10/21 ~ 3.00mg/日 (1x) → 散 内用	
290	小児専門J	新生児科	適応外使用 神経症 不穏・啼泣時の安静保持のため、長泣きするとSpO2↓、HR↑してしまうため			
	安全性:特になし 有効性:有効				女 0歳 0ヶ月	
	用法:				H: 42.0cm W: 3.6kg 入院・継続中	
	総合:				2004/04/26 ~ 1.50mg/日 (3x) → 水剤 内用	
291	小児専門J	新生児科	適応外使用 筋痙攣 重症仮死にて出生し、頭蓋内出血後、水頭症を来しけいれん様の動き出現時に内服			
	安全性:特になし 有効性:著効				男 0歳 0ヶ月	
	用法:				H: 58.0cm W: 3.7kg 入院・投与終了	
	総合:				2004/11/03 ~ 2004/11/12 (8日間) 2.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	
292	小児専門J	新生児科	適応外使用 麻酔前投薬 安静の必要があるため			
	安全性:特になし 有効性:有効				男 0歳 10ヶ月	
	用法:				H: 60.0cm W: 4.9kg 入院・継続中	
	総合:				2004/11/01 ~ 2004/11/05 (4日間) 2.50mg/日 (1x) → 水剤 内用	
293	小児専門J	新生児科	適応外使用 不安・興奮・抑うつ軽減:(麻酔前、麻酔導入時、麻酔中、術後)			
	安全性:特になし 有効性:有効				男 1歳 1ヶ月	
	用法:				H: 54.0cm W: 3.1kg 入院・投与終了	
	総合:				2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 1.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	
294	小児専門J	小児科	適応外使用 鎮静のため その他			
	安全性:不明または未判定 有効性:				女 4歳 2ヶ月	
	用法:				H: 69.0cm W: 5.0kg 入院・継続中	
	総合:				~ 1.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	
295	小児専門J	麻酔科	麻酔前投薬			
	安全性:特になし 有効性:やや有効				男 10歳 7ヶ月	
	用法:				W: 22.5kg 入院・投与終了	
	総合:				2004/11/18 ~ 2004/11/18 (1日間) 3.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	
296	小児専門K		うつ病における不安・緊張			
	安全性: 有効性:				女 13歳 7ヶ月	外来・
	用法:				~	
	総合:				2.00mg/日 錠・カプセル 内用	→
297	小児専門K		うつ病における不安・緊張			
	安全性: 有効性:				男 14歳 5ヶ月	外来・
	用法:				~	
	総合:				2.00mg/日 錠・カプセル 内用	→

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No	施設名 診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路
298	小児専門K	心身症における身体症状並びに不安・緊張・抑うつ		女 14歳 5ヶ月 外来・
	安全性:			~
	有効性:			2.00mg/日 →
	用法:			錠・カプセル 内用
299	小児専門K	心身症における身体症状並びに不安・緊張・抑うつ		男 15歳 0ヶ月 外来・
	安全性:			~
	有効性:			5.00mg/日 →
	用法:			錠・カプセル 内用
300	小児専門K 心療内科	心身症における身体症状並びに不安・緊張・抑うつ		男 15歳 6ヶ月
	安全性:			~
	有効性:			錠・カプセル →
	用法:			錠・カプセル 内用
301	小児専門K	心身症における身体症状並びに不安・緊張・抑うつ		女 15歳 7ヶ月 外来・
	安全性:			~
	有効性:			2.00mg/日 →
	用法:			錠・カプセル 内用
302	小児専門K	神経症における不安・緊張・抑うつ		女 11歳 5ヶ月 外来・
	安全性:			~
	有効性:			2.00mg/日 →
	用法:			錠・カプセル 内用
303	小児専門K	神経症における不安・緊張・抑うつ		男 12歳 2ヶ月 外来・
	安全性:			~
	有効性:			2.00mg/日 →
	用法:			錠・カプセル 内用
304	小児専門K	麻酔前投薬		女 9歳 6ヶ月 入院・
	安全性:			~
	有効性:			5.00mg/日 →
	用法:			錠・カプセル 内用
305	小児専門K	麻酔前投薬		女 10歳 8ヶ月 入院・
	安全性:			~
	有効性:			5.00mg/日 →
	用法:			錠・カプセル 内用
306	小児専門K	麻酔前投薬		女 12歳 11ヶ月
	安全性:			~
	有効性:			錠・カプセル →
	用法:			錠・カプセル 内用
307	小児専門L 神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 0歳 6ヶ月 入院・投与終了
	安全性: 特になし			2004/11/06 ~
	有効性: 著効			1.50mg/日(1x) →
	用法: 1.5mg/回 5回分			散 内用
308	小児専門L	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 1歳 4ヶ月 入院・継続中
	安全性:			2004/11/10 ~
	有効性: 有効			2.00mg/日(3x) →
	用法:			散 内用

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
安全性/有効性				投与量・剤型・投与経路	
用法・用量/総合コメント					
309	小児専門L		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性:				女 1歳 5ヶ月
	有効性: 有効				入院・継続中
	用法:				2004/11/04 ~ 1.50mg/日 (2x) → 散 内用
310	小児専門L 神経科		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性: 特になし				男 2歳 2ヶ月
	有効性: 著効				外来・継続中 (30日間)
	用法:				2004/11/10 ~ 3.00mg/日 (1x) → 散 内用
311	小児専門L		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性:				男 2歳 5ヶ月
	有効性: やや有効				外来・継続中 (30日間)
	用法:				2004/11/05 ~ 3.00mg/日 (3x) → 散 内用
312	小児専門L 神経科		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性: 特になし				女 3歳 7ヶ月
	有効性: 有効				外来・継続中 (40日間)
	用法:				2004/11/11 ~ 9.00mg/日 (3x) → 散 内用
313	小児専門L 神経科		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性: 特になし				男 4歳 1ヶ月
	有効性: 有効				外来・継続中 (30日間)
	用法:				2004/11/12 ~ 3.00mg/日 (1x) → 散 内用
314	小児専門L 神経科		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性: 特になし				女 4歳 3ヶ月
	有効性: 有効				外来・継続中
	用法:				2004/11/05 ~ 6.00mg/日 (3x) → 散 内用
315	小児専門L		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性:				男 4歳 8ヶ月
	有効性:				入院・継続中
	用法:				2004/11/09 ~ 6.00mg/日 (3x) → 散 内用
316	小児専門L		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性:				男 5歳 6ヶ月
	有効性: やや有効				外来・継続中 (30日間)
	用法:				2004/11/12 ~ 5.00mg/日 (3x) 5.00mg → 8.00mg 散 内用
317	小児専門L		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性:				女 6歳 7ヶ月
	有効性:				入院・継続中
	用法:				2004/11/12 ~ 6.00mg/日 (2x) → 散 内用
318	小児専門L 外科		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性: 特になし				女 7歳 2ヶ月
	有効性: 有効				W: 22.5kg 外来・継続中 (60日間)
	用法:				2004/11/11 ~ 12.00mg/日 (3x) → 散 内用
319	小児専門L		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性:				男 7歳 11ヶ月
	有効性: 有効				外来・継続中
	用法:				2004/11/12 ~ 15.00mg/日 (3x) → 散 内用

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No	施設名 診療科 対象疾患		適応外使用の症状	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント		患者背景 投与量・剤型・投与経路	
320	小児専門L 筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			
	安全性:		男 8歳 0ヶ月	入院・継続中
	有効性:		2004/11/08 ~	
	用法:		5.00mg/日 (3x)	→
総合:		散	内用	
321	小児専門L 筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			
	安全性: 不明または未判定		女 8歳 2ヶ月	外来・継続中
	有効性:		2004/11/11 ~	(30日間)
	用法:		5.00mg/日 (3x)	→
総合:		散	内用	
322	小児専門L 神経科 筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			
	安全性: 特になし		男 8歳 10ヶ月	外来・継続中
	有効性: 有効		2004/11/08 ~	(30日間)
	用法:		5.00mg/日 (3x)	→
総合:		散	内用	
323	小児専門L 筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			
	安全性:		女 9歳 1ヶ月	外来・継続中
	有効性:		2004/11/12 ~	(60日間)
	用法:		3.00mg/日 (1x)	→
総合:		散	内用	
324	小児専門L 筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			
	安全性:		男 10歳 3ヶ月	外来・継続中
	有効性:		2004/11/05 ~	(30日間)
	用法:		2.00mg/日 (1x)	→
総合:		散	内用	
325	小児専門L 筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			
	安全性:		女 10歳 10ヶ月	外来・継続中
	有効性:		2004/11/12 ~	(30日間)
	用法:		5.00mg/日 (3x)	→
総合:		散	内用	
326	小児専門L 神経科 筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			
	安全性:		男 10歳 11ヶ月	外来・継続中
	有効性: 有効		2004/11/05 ~	(30日間)
	用法:		2.00mg/日 (1x)	→
総合:		散	内用	
327	小児専門L 神経科 筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			
	安全性: 特になし		男 11歳 11ヶ月	外来・継続中
	有効性: 有効		2004/11/02 ~	
	用法:		10.00mg/日 (3x)	→
総合:		散	内用	
328	小児専門L 筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			
	安全性:		女 12歳 6ヶ月	外来・継続中
	有効性:		2004/11/12 ~ 2004/12/11 (30日間)	
	用法:		8.00mg/日 (3x)	→
総合:		散	内用	
329	小児専門L 神経科 筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			
	安全性:		女 12歳 7ヶ月	外来・継続中
	有効性:		2004/11/12 ~	
	用法:		6.00mg/日 (1x)	→
総合:		散	内用	
330	小児専門L 神経科 筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			
	安全性: 特になし		男 12歳 8ヶ月	外来・継続中
	有効性: 有効		2004/11/10 ~	(30日間)
	用法:		4.00mg/日 (1x)	→
総合:		散	内用	

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
	安全性/有効性			患者背景	
	用法・用量/総合コメント			投与量・剤型・投与経路	
331	小児専門L		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性:			男 13歳 0ヶ月	入院・継続中
	有効性:			2004/11/19 ~	→
	用法:			6.00mg/日 (2x)	散 内用
総合:					
332	小児専門L 神経科		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性: 特になし			男 14歳 3ヶ月	外来・継続中
	有効性: 有効			2004/11/12 ~	(14日間) →
	用法: 7mg(2-2-3)/3x30T			7.00mg/日 (3x)	散 内用
総合:					
333	小児専門L		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性:			女 14歳 10ヶ月	入院・投与終了
	有効性:			2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間)	→
	用法:			10.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:					
334	小児専門L 神経科		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性: 特になし			男 15歳 0ヶ月	入院・継続中
	有効性: 有効			2004/11/10 ~	→
	用法:			6.00mg/日 (2x)	散 内用
総合:					
335	小児専門L		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性:			女 15歳 10ヶ月	外来・継続中
	有効性:			2004/11/11 ~	→
	用法:			6.00mg/日 (2x)	散 内用
総合:					
336	小児専門L		神経症における不安・緊張・抑うつ		
	安全性:			女 12歳 2ヶ月	入院・継続中
	有効性:			2004/11/24 ~	→
	用法: 3mg/回 5回分			3.00mg/日	散 内用
総合:					
337	小児専門L 精神科		神経症における不安・緊張・抑うつ		
	安全性:			女 16歳 1ヶ月	外来・継続中
	有効性:			2004/11/01 ~	→
	用法:			2.00mg/日 (1x)	錠・カプセル 内用
総合:					
338	小児専門L		適応外使用	てんかん	
	安全性:			女 0歳 7ヶ月	入院・継続中
	有効性:			2004/11/10 ~	→
	用法:			2.00mg/日 (2x)	散 内用
総合:					
339	小児専門L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	
	安全性:			女 0歳 8ヶ月	入院・継続中
	有効性:			2004/11/24 ~ 2004/11/30 (7日間)	→
	用法:			1.00mg/日 (3x)	散 内用
総合:					
340	小児専門L 外科		適応外使用	不安・興奮・抑うつの軽減:(麻酔前・麻酔導入時・麻酔中・術後)	
	安全性: 特になし			男 0歳 11ヶ月	入院・継続中
	有効性: 有効			W: 4.9kg	→
	用法:			2004/11/19 ~	1.00mg/日 (3x) 散 内用
総合:					
341	小児専門L		適応外使用	神経症	
	安全性: 特になし			男 3歳 3ヶ月	外来・継続中
	有効性: 有効			2004.11.10 ~ 2004.12.09 (30日間)	→
	用法:			0.20mg・日 (1x)	水剤 内用
総合:					

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No	施設名 診療科 対象疾患		適応外使用の症状	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント		患者背景 投与量・剤型・投与経路	
342	小児専門L	適応外使用	不安・興奮・抑うつ軽減:(麻酔前、麻酔導入時、麻酔中、術後)	
	安全性:特になし 有効性:やや有効 用法: 総合:	女 3歳 10ヶ月 外来・継続中 2004/11/01~ 6.00mg/日(3x) 散 内用	→	
343	小児専門L	適応外使用	不安・興奮・抑うつ軽減:(麻酔前、麻酔導入時、麻酔中、術後)	
	安全性:特になし 有効性:やや有効 用法: 総合:	男 4歳 1ヶ月 入院・継続中 2004/11/02~ 7.00mg/日(3x) 散 内用	→	
344	小児専門L	適応外使用	てんかん	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:	男 5歳 0ヶ月 入院・継続中 2004/11/12~ 7.00mg/日(2x) 散 内用	→	
345	小児専門L	適応外使用	不安・興奮・抑うつ軽減:(麻酔前、麻酔導入時、麻酔中、術後)	
	安全性:特になし 有効性:やや有効 用法: 総合:	女 6歳 3ヶ月 外来・継続中 2004/11/10~ 4.00mg/日(2x) 散 内用	→	
346	小児専門L	適応外使用 筋緊張の軽減	筋痙攣	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:	男 11歳 7ヶ月 外来・継続中 2004/11/09~ 3.00mg/日(3x) 散 内用	→	
347	小児専門L	適応外使用 筋緊張の軽減	筋痙攣	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:	男 12歳 1ヶ月 外来・継続中 2004/11/09~ 8.00mg/日(3x) 散 内用	→	
348	小児専門L	適応外使用	てんかん	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:	男 13歳 10ヶ月 入院・継続中 2004/11/12~ 5.00mg/日(4x) 散 内用	→	
349	小児専門L 神経科	適応外使用 自閉症における不安の軽減	うつ病	
	安全性:特になし 有効性:著効 用法: 総合:	男 15歳 1ヶ月 外来・継続中 2004/11/02~ 5.00mg/日(1x) 錠・カプセル 内用	→	
350	小児専門L	適応外使用 筋緊張の軽減	筋痙攣	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:	男 16歳 0ヶ月 外来・継続中 2004/11/02~ 8.00mg/日(3x) 散 内用	→	
351	小児専門L	適応外使用 筋緊張の軽減	筋痙攣	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:	男 16歳 9ヶ月 外来・継続中 2004/11/02~ 9.00mg/日(3x) 散 内用	→	
352	小児専門L	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:	男 0歳 8ヶ月 入院・投与終了 2004/11/26~2004/11/26(1日間) 10.00mg/日(1x) 水剤 内用	→	