

No.	施設名 診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			投与量・剤型・投与経路
353	小児専門L	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:		男 1歳 1ヶ月 2004/11/30 ~ 2004/11/30 (1日間) 5.00mg/日(1x) → 水剤 内用	入院・投与終了
354	小児専門L	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:		男 1歳 1ヶ月 2004/11/11 ~ 2004/11/11 (1日間) 4.50mg/日(1x) → 水剤 内用	入院・投与終了
355	小児専門L	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:		男 1歳 2ヶ月 2004/11/10 ~ 2004/11/10 (1日間) 4.00mg/日(1x) → 水剤 内用	入院・投与終了
356	小児専門L	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:		女 1歳 2ヶ月 2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間) 5.00mg/日(1x) → 水剤 内用	入院・投与終了
357	小児専門L	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:		男 1歳 6ヶ月 2004/11/25 ~ 2004/11/25 (1日間) 4.00mg/日(1x) → 水剤 内用	入院・投与終了
358	小児専門L	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:		男 1歳 8ヶ月 2004/11/11 ~ 2004/11/11 (1日間) 5.50mg/日(1x) → 水剤 内用	入院・投与終了
359	小児専門L	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:		男 1歳 8ヶ月 2004/11/15 ~ 2004/11/15 (1日間) 5.00mg/日(1x) → 水剤 内用	入院・投与終了
360	小児専門L	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:		男 1歳 9ヶ月 2004/11/29 ~ 2004/11/29 (1日間) 7.00mg/日(1x) → 水剤 内用	入院・投与終了
361	小児専門L	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:		男 1歳 10ヶ月 2004/11/18 ~ 2004/11/18 (1日間) 5.00mg/日(1x) → 水剤 内用	入院・投与終了
362	小児専門L	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:		女 1歳 10ヶ月 2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間) 6.00mg/日(1x) → 水剤 内用	入院・投与終了
363	小児専門L	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:		男 1歳 11ヶ月 2004/11/25 ~ 2004/11/25 (1日間) 7.00mg/日(1x) → 水剤 内用	入院・投与終了

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No.	施設名 診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			投与量・剤型・投与経路
364	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 1歳 11ヶ月 入院・投与終了 2004/11/11 ~ 2004/11/11 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
365	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 2歳 3ヶ月 入院・投与終了 2004/11/12 ~ 2004/11/12 (1日間) 6.50mg/日 (1x) → 水剤 内用
366	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 2歳 4ヶ月 入院・投与終了 2004/11/02 ~ 2004/11/02 (1日間) 7.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
367	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 2歳 5ヶ月 入院・投与終了 2004/11/11 ~ 2004/11/11 (1日間) 4.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
368	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 2歳 6ヶ月 入院・投与終了 2004/11/02 ~ 2004/11/02 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
369	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 2歳 7ヶ月 入院・投与終了 2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間) 7.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
370	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 2歳 7ヶ月 入院・投与終了 2004/11/26 ~ 2004/11/26 (1日間) 7.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
371	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 2歳 7ヶ月 入院・投与終了 2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
372	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 2歳 7ヶ月 入院・投与終了 2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
373	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 2歳 9ヶ月 入院・投与終了 2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
374	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 2歳 11ヶ月 入院・投与終了 2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 水剤 内用

No.	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路
375	小児専門L		麻酔前投薬		男 3歳 2ヶ月 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:			2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 7.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	
376	小児専門L		麻酔前投薬		男 3歳 3ヶ月 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:			2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	
377	小児専門L		麻酔前投薬		男 3歳 3ヶ月 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:			2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	
378	小児専門L		麻酔前投薬		男 3歳 6ヶ月 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:			2004/11/26 ~ 2004/11/26 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	
379	小児専門L		麻酔前投薬		男 3歳 6ヶ月 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:			2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	
380	小児専門L		麻酔前投薬		男 3歳 6ヶ月 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:			2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間) 8.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	
381	小児専門L		麻酔前投薬		女 3歳 9ヶ月 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:			2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間) 8.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	
382	小児専門L		麻酔前投薬		男 4歳 0ヶ月 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:			2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間) 8.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	
383	小児専門L		麻酔前投薬		女 4歳 0ヶ月 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:			2004/11/29 ~ 2004/11/29 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	
384	小児専門L		麻酔前投薬		男 4歳 1ヶ月 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:			2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間) 8.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	
385	小児専門L		麻酔前投薬		男 4歳 1ヶ月 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:			2004/11/11 ~ 2004/11/11 (1日間) 7.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No.	施設名 診療科 安全性/有効性 用法・用量/総合コメント	対象疾患 麻酔前投薬	適応外使用の症状	患者背景 投与量・形態・投与経路
386	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 4歳 4ヶ月 入院・投与終了 2004/11/22 ~ 2004/11/22 (1日間) 8.00mg/日(1x) → 水剤 内用
387	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 4歳 5ヶ月 入院・投与終了 2004/11/10 ~ 2004/11/10 (1日間) 7.00mg/日(1x) → 水剤 内用
388	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 4歳 8ヶ月 入院・投与終了 2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 10.00mg/日(1x) → 水剤 内用
389	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 4歳 8ヶ月 入院・投与終了 2004/11/18 ~ 2004/11/18 (1日間) 10.00mg/日(1x) → 水剤 内用
390	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 4歳 10ヶ月 入院・投与終了 2004/11/15 ~ 2004/11/15 (1日間) 7.00mg/日(1x) → 水剤 内用
391	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 5歳 1ヶ月 入院・投与終了 2004/11/24 ~ 2004/11/24 (1日間) 8.00mg/日(1x) → 水剤 内用
392	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 5歳 3ヶ月 入院・投与終了 2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間) 7.00mg/日(1x) → 水剤 内用
393	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 5歳 3ヶ月 入院・投与終了 2004/11/10 ~ 2004/11/10 (1日間) 9.00mg/日(1x) → 水剤 内用
394	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 5歳 4ヶ月 入院・投与終了 2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間) 8.00mg/日(1x) → 水剤 内用
395	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 5歳 4ヶ月 入院・投与終了 2004/11/29 ~ 2004/11/29 (1日間) 9.00mg/日(1x) → 水剤 内用
396	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 5歳 6ヶ月 入院・投与終了 2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間) 7.00mg/日(1x) → 水剤 内用

No.	施設名 診療科	対象疾患	適応外使用の症状		患者背景 投与量・剤型・投与経路
			安全性/有効性 用法・用量/総合コメント		
397	小児専門	麻酔前投薬			
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:		男 5歳 7ヶ月 2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 8.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	入院・投与終了	
398	小児専門	麻酔前投薬			
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:		男 5歳 8ヶ月 2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	入院・投与終了	
399	小児専門	麻酔前投薬			
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:		女 5歳 8ヶ月 2004/11/11 ~ 2004/11/11 (1日間) 8.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	入院・投与終了	
400	小児専門	麻酔前投薬			
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:		男 5歳 9ヶ月 2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	入院・投与終了	
401	小児専門	麻酔前投薬			
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:		男 5歳 10ヶ月 2004/11/26 ~ 2004/11/26 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	入院・投与終了	
402	小児専門	麻酔前投薬			
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:		男 5歳 10ヶ月 2004/11/11 ~ 2004/11/11 (1日間) 8.50mg/日 (1x) → 水剤 内用	入院・投与終了	
403	小児専門	麻酔前投薬			
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:		男 5歳 10ヶ月 2004/11/26 ~ 2004/11/26 (1日間) 9.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	入院・投与終了	
404	小児専門	麻酔前投薬			
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:		男 6歳 0ヶ月 2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	入院・投与終了	
405	小児専門	麻酔前投薬			
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:		男 6歳 0ヶ月 2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 8.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	入院・投与終了	
406	小児専門	麻酔前投薬			
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:		女 6歳 1ヶ月 2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 9.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	入院・投与終了	
407	小児専門	麻酔前投薬			
	安全性: 有効性: 用 法: 総 合:		女 6歳 2ヶ月 2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 9.00mg/日 (1x) → 水剤 内用	入院・投与終了	

No.	施設名 診療科 安全性/有効性 用法・用量/総合コメント	対象疾患 麻酔前投薬	適応外使用の症状	患者背景 投与量・割増・投与経路
408	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 6歳 2ヶ月 入院・投与終了 2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
409	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 6歳 2ヶ月 入院・投与終了 2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 9.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
410	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 6歳 2ヶ月 入院・投与終了 2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 9.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
411	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 6歳 3ヶ月 入院・投与終了 2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
412	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 6歳 9ヶ月 入院・投与終了 2004/11/22 ~ 2004/11/22 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
413	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 6歳 9ヶ月 入院・投与終了 2004/11/02 ~ 2004/11/02 (1日間) 8.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
414	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 6歳 11ヶ月 入院・投与終了 2004/11/22 ~ 2004/11/22 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
415	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 7歳 0ヶ月 入院・投与終了 2004/11/12 ~ 2004/11/12 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 散 内用
416	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 7歳 1ヶ月 入院・投与終了 2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
417	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 7歳 1ヶ月 入院・投与終了 2004/11/22 ~ 2004/11/22 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
418	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 7歳 1ヶ月 入院・投与終了 2004/11/02 ~ 2004/11/02 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用

No	施設名 診療科 安全性/有効性 用法・用量/総合コメント	対象疾患 麻酔前投薬	適応外使用の症状	患者背景 投与量・剤型・投与経路
419	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 7歳 7ヶ月 2004/11/22～2004/11/22 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
420	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 7歳 10ヶ月 2004/11/29～2004/11/29 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
421	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 8歳 1ヶ月 2004/11/29～2004/11/29 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
422	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 8歳 3ヶ月 2004/11/11～2004/11/11 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
423	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 8歳 5ヶ月 2004/11/29～2004/11/29 (1日間) 8.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
424	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 8歳 7ヶ月 2004/11/18～2004/11/18 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
425	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 9歳 0ヶ月 2004/11/17～2004/11/17 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
426	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 9歳 3ヶ月 2004/11/24～2004/11/24 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
427	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 9歳 4ヶ月 2004/11/25～2004/11/25 (1日間) 20.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
428	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 9歳 9ヶ月 2004/11/02～2004/11/02 (1日間) 15.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
429	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 10歳 11ヶ月 2001/11/01～2001/11/01 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用

No	施設名 安全性/ 有効性/ 用法・用量/ 総合コメント	診療科 対象疾患	適応外使用の症状	患者背景 投与量・剤型・投与経路
430	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 10歳 11ヶ月 2004/11/15 ~ 2004/11/15 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
431	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 11歳 4ヶ月 2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
432	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 11歳 5ヶ月 2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
433	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 11歳 5ヶ月 2004/11/26 ~ 2004/11/26 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
434	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 11歳 6ヶ月 2004/11/06 ~ 2004/11/06 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
435	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 11歳 6ヶ月 2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
436	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 12歳 2ヶ月 2004/11/02 ~ 2004/11/02 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
437	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 12歳 4ヶ月 2004/11/22 ~ 2004/11/22 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
438	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		女 12歳 7ヶ月 2004/11/26 ~ 2004/11/26 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 水剤 内用
439	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 12歳 11ヶ月 2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用
440	小児専門L 安全性: 有効性: 用 法: 総 合:	麻酔前投薬		男 13歳 10ヶ月 2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 20.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状		患者背景 投与量・剤型・投与経路
				安全性/有効性 用法・用量/総合コメント		
441	小児専門M	新生児科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			
	安全性:特になし 有効性:やや有効 用法: 総合:				女 0歳 10ヶ月 入院・継続中 0.10mg/日 水剤 内用	~ →
442	小児専門M	新生児科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			
	安全性:特になし 有効性:やや有効 用法: 総合:				男 1歳 7ヶ月 入院・継続中 0.20mg/日 水剤 内用	~ →
443	小児専門M	新生児科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			
	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:				男 3歳 8ヶ月 入院・継続中 0.10mg/日 水剤 内用	~ →
444	小児専門M	麻酔科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)			
	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:				男 8歳 10ヶ月 入院・投与終了 2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間) 15.00mg/日 (1x) 散 内用	→
445	小児専門M	新生児科	適応外使用	てんかん		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:				女 0歳 10ヶ月 入院・継続中 0.40mg/日 水剤 内用	~ →
446	小児専門M	精神科	適応外使用 軽度発達障害・広汎性発達障害	心身症		
	安全性:特になし 有効性:やや有効 用法: 総合:				女 3歳 8ヶ月 外来・継続中 3.50mg/日 散 内用	~ →
447	小児専門M	神経科 (脳神経内科)	適応外使用 睡眠剤	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:やや有効 用法: 総合:				男 7歳 0ヶ月 継続中 4.00mg/日 (1x) 散 内用	~ →
448	小児専門M	神経科 (脳神経内科)	適応外使用	てんかん		
	安全性:特になし 有効性:やや有効 用法: 総合:				女 9歳 11ヶ月 入院・継続中 3.00mg/日 散 内用	~ →
449	小児専門M	精神科	適応外使用 自閉症・不眠・パニック	心身症		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:				女 11歳 6ヶ月 外来・継続中 4.00mg/日 散 内用	~ →
450	小児専門M	血液科	適応外使用 抗がん剤、腫瘍に対する不安・不眠	うつ病		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:				男 13歳 11ヶ月 入院・継続中 3.00mg/日 散 内用	~ →
151	小児専門M	麻酔科	適応外使用	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:				男 0歳 7ヶ月 入院・投与終了 2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 5.00mg/日 (1x) 散 内用	~ →

No.	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
					投与量・剤型・投与経路
452	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		男 0歳 8ヶ月 入院・投与終了
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	2004/11/12 ~ 2004/11/12 (1日間) 5.00mg/日(ix) → 散 内用	
			総 合:		
453	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		男 0歳 10ヶ月 入院・投与終了
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間) 5.00mg/日(ix) → 散 内用	
			総 合:		
454	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		女 0歳 10ヶ月 入院・投与終了
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間) 5.00mg/日(ix) → 散 内用	
			総 合:		
455	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		女 0歳 11ヶ月 入院・投与終了
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	2004/11/25 ~ 2004/11/25 (1日間) 7.00mg/日(ix) → 散 内用	
			総 合:		
456	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		女 1歳 0ヶ月 入院・投与終了
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	2004/11/18 ~ 2004/11/18 (1日間) 5.00mg/日(ix) → 散 内用	
			総 合:		
457	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		女 1歳 0ヶ月 入院・投与終了
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	2004/11/26 ~ 2004/11/26 (1日間) 6.00mg/日(ix) → 散 内用	
			総 合:		
458	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		男 1歳 1ヶ月 入院・投与終了
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間) 6.00mg/日(ix) → 散 内用	
			総 合:		
459	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		男 1歳 1ヶ月 入院・投与終了
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間) 8.00mg/日(ix) → 散 内用	
			総 合:		
460	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		女 1歳 1ヶ月 入院・投与終了
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 5.00mg/日(ix) → 散 内用	
			総 合:		
461	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		男 1歳 2ヶ月 入院・投与終了
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	2004/11/30 ~ 2004/11/30 (1日間) 6.00mg/H(ix) → 散 内用	
			総 合:		
462	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		男 1歳 2ヶ月 入院・投与終了
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間) 6.00mg/H(ix) → 散 内用	
			総 合:		

No.	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			投与量・剤型・投与経路		
463	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬			
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法:			男 1歳 3ヶ月	患者背景	
	総 合:			入院・投与終了		
464	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬			
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法:			女 1歳 3ヶ月	患者背景	
	総 合:			入院・投与終了		
465	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬			
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法:			女 1歳 4ヶ月	患者背景	
	総 合:			入院・投与終了		
466	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬			
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法:			男 1歳 4ヶ月	患者背景	
	総 合:			入院・投与終了		
467	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬			
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法:			男 1歳 5ヶ月	患者背景	
	総 合:			入院・投与終了		
468	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬			
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法:			女 1歳 5ヶ月	患者背景	
	総 合:			入院・投与終了		
469	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬			
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法:			女 1歳 7ヶ月	患者背景	
	総 合:			入院・投与終了		
470	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬			
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法:			女 1歳 7ヶ月	患者背景	
	総 合:			入院・投与終了		
471	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬			
	安全性:特になし 有効性:著効 用 法:			男 1歳 7ヶ月	患者背景	
	総 合:			入院・投与終了		
472	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬			
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法:			男 1歳 7ヶ月	患者背景	
	総 合:			入院・投与終了		
473	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬			
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法:			男 1歳 9ヶ月	患者背景	
	総 合:			入院・投与終了		

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No.	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			投与量・剤型・投与経路	
474	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			男 1歳 9ヶ月 2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間) 8.00mg/日(1x) → 散 内用	入院・投与終了
	総合:				
475	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			女 1歳 9ヶ月 2004/11/22 ~ 2004/11/22 (1日間) 6.00mg/日(1x) → 散 内用	入院・投与終了
	総合:				
476	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			女 1歳 10ヶ月 2004/11/02 ~ 2004/11/02 (1日間) 8.00mg/日(1x) → 散 内用	入院・投与終了
	総合:				
477	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			女 1歳 10ヶ月 2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 5.00mg/日(1x) → 散 内用	入院・投与終了
	総合:				
478	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			男 1歳 11ヶ月 2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 7.00mg/日(1x) → 散 内用	入院・投与終了
	総合:				
479	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			男 2歳 0ヶ月 2004/11/30 ~ 2004/11/30 (1日間) 30.00mg/日(1x) → 散 内用	入院・投与終了
	総合:				
480	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			女 2歳 0ヶ月 2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 7.00mg/日(1x) → 散 内用	入院・投与終了
	総合:				
481	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			女 2歳 0ヶ月 2004/11/02 ~ 2004/11/02 (1日間) 8.00mg/日(1x) → 散 内用	入院・投与終了
	総合:				
482	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			男 2歳 1ヶ月 2004/11/29 ~ 2004/11/29 (1日間) 8.00mg/日(1x) → 散 内用	入院・投与終了
	総合:				
483	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			女 2歳 2ヶ月 2004/11/22 ~ 2004/11/22 (1日間) 8.00mg/日(1x) → 散 内用	入院・投与終了
	総合:				
484	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			女 2歳 2ヶ月 2004/11/02 ~ 2004/11/02 (1日間) 8.00mg/日(1x) → 散 内用	入院・投与終了
	総合:				

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
					投与量・剤型・投与経路
485	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			男 2歳 2ヶ月	入院・投与終了
	総合:			2004/11/22 ~ 2004/11/22 (1日間) 6.00mg/日(1x) → 散 内用	
486	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			女 2歳 2ヶ月	入院・投与終了
	総合:			2004/11/18 ~ 2004/11/18 (1日間) 9.00mg/日(1x) → 散 内用	
487	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			男 2歳 2ヶ月	入院・投与終了
	総合:			2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 7.00mg/日(1x) → 散 内用	
488	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:副作用あり:概要を記載 有効性:有効 用法:			男 2歳 4ヶ月	入院・投与終了
	総合:			2004/11/10 ~ 2004/11/10 (1日間) 7.00mg/日(1x) → 散 内用	
489	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			男 2歳 6ヶ月	入院・投与終了
	総合:			2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間) 8.00mg/日(1x) → 散 内用	
490	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			女 2歳 7ヶ月	入院・投与終了
	総合:			2004/11/10 ~ 2004/11/10 (1日間) 12.00mg/日(1x) → 散 内用	
491	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			女 2歳 7ヶ月	入院・投与終了
	総合:			2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間) 8.00mg/日(1x) → 散 内用	
492	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			男 2歳 7ヶ月	入院・投与終了
	総合:			2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 8.00mg/日(1x) → 散 内用	
493	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			男 2歳 8ヶ月	入院・投与終了
	総合:			2004/11/12 ~ 2004/11/12 (1日間) 8.00mg/日(1x) → 散 内用	
494	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			女 2歳 9ヶ月	入院・投与終了
	総合:			2004/11/02 ~ 2004/11/02 (1日間) 10.00mg/日(1x) → 散 内用	
495	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			男 2歳 9ヶ月	入院・投与終了
	総合:			2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間) 9.00mg/日(1x) → 散 内用	

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
	安全性／有効性 用法・用量／総合コメント			投与量・剤型・投与経路	
496	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			男 2歳 9ヶ月 2004/11/10～2004/11/10 (1日間) 11.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
497	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			男 2歳 10ヶ月 2004/11/29～2004/11/29 (1日間) 9.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
498	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			男 2歳 11ヶ月 2004/11/10～2004/11/10 (1日間) 8.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
499	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			男 2歳 11ヶ月 2004/11/05～2004/11/05 (1日間) 9.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
500	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			男 3歳 0ヶ月 2004/11/08～2004/11/08 (1日間) 0.40mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
501	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			女 3歳 1ヶ月 2004/11/22～2004/11/22 (1日間) 9.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
502	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			男 3歳 4ヶ月 2004/11/04～2004/11/04 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
503	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			男 3歳 4ヶ月 2004/11/04～2004/11/04 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
504	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			女 3歳 5ヶ月 2004/11/08～2004/11/08 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
505	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			男 3歳 5ヶ月 2004/11/02～2004/11/02 (1日間) 8.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
506	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			男 3歳 6ヶ月 2004/11/29～2004/11/29 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了

No.	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路
507	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			女 3歳 11ヶ月	入院・投与終了
	総合:			2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間) 10.00mg/日(1x) → 散 内用	
508	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			女 3歳 11ヶ月	入院・投与終了
	総合:			2004/11/22 ~ 2004/11/22 (1日間) 7.00mg/日(1x) → 散 内用	
509	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:			男 4歳 0ヶ月	入院・投与終了
	総合:			2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間) 13.00mg/日(1x) → 散 内用	
510	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:		—	男 4歳 0ヶ月	入院・投与終了
	総合:		—	2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 11.00mg/日(1x) → 散 内用	
511	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:		—	女 4歳 2ヶ月	入院・投与終了
	総合:		—	2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 11.00mg/日(1x) → 散 内用	
512	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:		—	女 4歳 2ヶ月	入院・投与終了
	総合:		—	2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 10.00mg/日(1x) → 散 内用	
513	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:		—	男 4歳 3ヶ月	入院・投与終了
	総合:		—	2004/11/02 ~ 2004/11/02 (1日間) 15.00mg/日(1x) → 散 内用	
514	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:		—	男 4歳 4ヶ月	入院・投与終了
	総合:		—	2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間) 8.00mg/日(1x) → 散 内用	
515	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:		—	男 4歳 6ヶ月	入院・投与終了
	総合:		—	2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 11.00mg/日(1x) → 散 内用	
516	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:		—	男 4歳 8ヶ月	入院・投与終了
	総合:		—	2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間) 6.00mg/日(1x) → 散 内用	
517	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:		—	男 4歳 9ヶ月	入院・投与終了
	総合:		—	2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 10.00mg/日(1x) → 散 内用	

No.	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
			安全性/有効性 用法・用量/総合コメント		投与量・剤型・投与経路
518	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:	男 4歳 9ヶ月 2004/11/11～2004/11/11 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
519	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:	男 4歳 10ヶ月 2004/11/26～2004/11/26 (1日間) 9.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
520	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:	女 4歳 10ヶ月 2004/11/22～2004/11/22 (1日間) 16.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
521	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:	女 5歳 0ヶ月 2004/11/19～2004/11/19 (1日間) 9.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
522	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:	男 5歳 0ヶ月 2004/11/24～2004/11/24 (1日間) 14.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
523	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:	男 5歳 2ヶ月 2004/11/05～2004/11/05 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
524	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:	女 5歳 3ヶ月 2004/11/15～2004/11/15 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
525	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:	女 5歳 3ヶ月 2004/11/25～2004/11/25 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
526	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:	男 5歳 4ヶ月 2004/11/09～2004/11/09 (1日間) 12.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
527	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:	男 5歳 8ヶ月 2004/11/30～2004/11/30 (1日間) 15.00mg/日 (1x) → 散 内用	投与終了
528	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:	女 5歳 8ヶ月 2004/11/09～2004/11/09 (1日間) 12.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
					投与量・剤型・投与経路
529	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	男 5歳 10ヶ月 2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 13.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
			総 合:		
530	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	男 5歳 10ヶ月 2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
			総 合:		
531	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	女 5歳 11ヶ月 2004/11/22 ~ 2004/11/22 (1日間) 12.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
			総 合:		
532	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	男 6歳 0ヶ月 2004/11/10 ~ 2004/11/10 (1日間) 12.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
			総 合:		
533	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	男 6歳 1ヶ月 2004/11/24 ~ 2004/11/24 (1日間) 14.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
			総 合:		
534	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	男 6歳 2ヶ月 2004/11/30 ~ 2004/11/30 (1日間) 11.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
			総 合:		
535	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	男 6歳 3ヶ月 2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 14.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
			総 合:		
536	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	男 6歳 3ヶ月 2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間) 15.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
			総 合:		
537	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	女 6歳 4ヶ月 2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間) 11.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
			総 合:		
538	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	女 6歳 6ヶ月 2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
			総 合:		
539	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬		
			安全性:特になし 有効性:有効 用 法:	女 6歳 10ヶ月 2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 12.00mg/日 (1x) → 散 内用	入院・投与終了
			総 合:		

No.	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			投与量・剤型・投与経路		
540	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:		
				女 6歳 10ヶ月	入院・投与終了	
				2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 15.00mg/日(1x) → 散 内用		
541	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:		
				女 7歳 6ヶ月	入院・投与終了	
				2004/11/24 ~ 2004/11/24 (1日間) 10.00mg/日(1x) → 散 内用		
542	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:		
				女 7歳 6ヶ月	入院・投与終了	
				2004/11/12 ~ 2004/11/12 (1日間) 10.00mg/日(1x) → 散 内用		
543	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:		
				女 7歳 7ヶ月	入院・投与終了	
				2004/11/10 ~ 2004/11/10 (1日間) 15.00mg/日(1x) → 散 内用		
544	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:		
				男 7歳 10ヶ月	入院・投与終了	
				2004/11/26 ~ 2004/11/26 (1日間) 15.00mg/日(1x) → 散 内用		
545	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:		
				女 8歳 4ヶ月	入院・投与終了	
				2004/11/26 ~ 2004/11/26 (1日間) 15.00mg/日(1x) → 散 内用		
546	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:		
				女 8歳 4ヶ月	入院・投与終了	
				2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 14.00mg/日(1x) → 散 内用		
547	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:		
				男 8歳 4ヶ月	入院・投与終了	
				2004/11/24 ~ 2004/11/24 (1日間) 15.00mg/日(1x) → 散 内用		
548	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:		
				男 8歳 5ヶ月	入院・投与終了	
				2004/11/30 ~ 2004/11/30 (1日間) 15.00mg/日(1x) → 散 内用		
549	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:		
				男 8歳 6ヶ月	入院・投与終了	
				2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 12.00mg/日(1x) → 散 内用		
550	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:		
				女 8歳 7ヶ月	入院・投与終了	
				2004/11/11 ~ 2004/11/11 (1日間) 5.00mg/日(1x) → 散 内用		

No.	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			投与量・剤型・投与経路	
	小児専門M 麻酔科 麻酔前投薬				
551	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			男 8歳 9ヶ月	入院・投与終了
	2004/11/18 ~ 2004/11/18 (1日間) 15.00mg/日(1x) → 散 内用				
552	小児専門M 麻酔科 麻酔前投薬				
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			男 8歳 10ヶ月	入院・投与終了
	2004/11/24 ~ 2004/11/24 (1日間) 10.00mg/日(1x) → 散 内用				
553	小児専門M 麻酔科 麻酔前投薬				
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			男 8歳 10ヶ月	入院・投与終了
	2004/11/24 ~ 2004/11/24 (1日間) 10.00mg/日(1x) → 散 内用				
554	小児専門M 麻酔科 麻酔前投薬				
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			女 9歳 5ヶ月	入院・投与終了
	2004/11/26 ~ 2004/11/26 (1日間) 15.00mg/日(1x) → 散 内用				
555	小児専門M 麻酔科 麻酔前投薬				
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			男 9歳 11ヶ月	入院・投与終了
	2004/11/30 ~ 2004/11/30 (1日間) 15.00mg/日(1x) → 散 内用				
556	小児専門M 麻酔科 麻酔前投薬				
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			男 10歳 11ヶ月	入院・継続中
	2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 10.00mg/日(1x) → 散 内用				
557	小児専門M 麻酔科 麻酔前投薬				
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			女 11歳 0ヶ月	入院・投与終了
	2004/11/25 ~ 2004/11/25 (1日間) 15.00mg/日(1x) → 散 内用				
558	小児専門M 麻酔科 麻酔前投薬				
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			男 11歳 5ヶ月	入院・投与終了
	2004/11/30 ~ 2004/11/30 (1日間) 6.00mg/日(1x) → 散 内用				
559	小児専門M 麻酔科 麻酔前投薬				
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			女 11歳 11ヶ月	入院・投与終了
	2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 10.00mg/日(1x) → 散 内用				
560	小児専門M 麻酔科 麻酔前投薬				
	安全性:特になし 有効性:有効 用 法: 総 合:			女 11歳 11ヶ月	入院・投与終了
	2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間) 15.00mg/日(1x) → 散 内用				
561	小児専門M 麻酔科 麻酔前投薬				
	安全性:特になし 有効性: 用 法: 総 合:			女 12歳 9ヶ月	入院・投与終了
	2004/11/30 ~ 2004/11/30 (1日間) 10.00mg/日(1x) → 散 内用				

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
					投与量・剤型・投与経路
562	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:	女 13歳 0ヶ月 入院・投与終了 2004/11/26 ~ 2004/11/26 (1日間) 15.00mg/日(1x) → 散 内用
563	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:	女 13歳 2ヶ月 入院・投与終了 2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間) 15.00mg/日(1x) → 散 内用
564	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬	安全性:特になし 有効性: 用法: 総合:	男 13歳 3ヶ月 入院・投与終了 2004/11/26 ~ 2004/11/26 (1日間) 15.00mg/日(1x) → 散 内用
565	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:	男 14歳 4ヶ月 入院・投与終了 2004/11/11 ~ 2004/11/11 (1日間) 10.00mg/日(1x) → 散 内用
566	小児専門M	麻酔科	麻酔前投薬	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:	女 15歳 0ヶ月 入院・投与終了 2004/11/30 ~ 2004/11/30 (1日間) 15.00mg/日(1x) → 散 内用
567	小児専門N	神経科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:	男 3歳 1ヶ月 W: 18.0kg 外来・継続中 1998/07/08 ~ 4.00mg/日(2x) → 錠・カプセル 内用
568	小児専門N	神経科	適応外使用 睡眠導入	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:	男 1歳 6ヶ月 H: 55.4cm W: 3.9kg 入院・継続中 2003/06/05 ~ 1.50mg/日(1x) 1.50mg → 3.00mg 散 内用
569	小児専門N	神経科	筋痙攣 筋弛緩、不穏状態の改善(仮死状態で帝王切開、けいれん・ミオクロニー発作あり、13トリソミー)	安全性:特になし 有効性:やや有効 用法: 1日7mg 分2 総合:	女 2歳 1ヶ月 W: 8.3kg 外来・継続中 2003/04/09 ~ 7.00mg/日(2x) → 散 内用
570	小児専門N	神経科	筋痙攣 筋緊張の軽減	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:	男 2歳 7ヶ月 W: 17.0kg 外来・継続中 1997/01/31 ~ 10.00mg/日(3x) → 散 内用
571	小児専門N	神経科	筋痙攣 筋緊張の軽減(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣)	安全性:副作用あり:概要を記載 有効性:有効 用法: 総合:	男 7歳 1ヶ月 W: 24.6kg 外来・継続中 2003/05/31 ~ 9.00mg/日(2x) → 散 内用
572	小児専門N	腎消化器科	適応外使用 不眠時使用	安全性:不明または未判定 有効性:不明または未判定 用法: 1回2mg 10回分 不眠時服用 総合:	男 9歳 5ヶ月 H: 136.0cm W: 35.0kg 外来・継続中 2004/11/15 ~ 2.00mg/日(1x) → 錠・カプセル 内用