

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の症状	患者背景	
	用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
573	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		女 0歳 0ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 52.5cm W: 3.6kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:				2004/11/25 ~ 1.50mg/日 (1x) → 散 内用	
574	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		女 0歳 0ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 51.6cm W: 3.4kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:				2004/11/10 ~ 1.50mg/日 (1x) → 散 内用	
575	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		女 0歳 0ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 52.5cm W: 3.6kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:				2004/11/24 ~ 1.00mg/日 (1x) → 散 内用	
576	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 0歳 0ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 50.4cm W: 2.9kg 入院・	
	用法: 総 合:				2004/11/16 ~ 1.50mg/日 (1x) → 散 内用	
577	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		女 0歳 1ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				W: 4.0kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:				2004/11/09 ~ 3.00mg/日 (1x) → 散 内用	
578	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		女 0歳 2ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 57.7cm W: 5.1kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:				2004/11/18 ~ 5.00mg/日 (1x) → 散 内用	
579	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		女 0歳 2ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				W: 5.0kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:				2004/11/15 ~ 3.00mg/日 (1x) → 散 内用	
580	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 0歳 3ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				W: 6.9kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:				2004/11/22 ~ 5.00mg/日 (1x) → 散 内用	
581	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 0歳 3ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 57.0cm W: 5.4kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:				2004/11/17 ~ 3.00mg/日 (1x) → 散 内用	
582	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 0歳 4ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 62.8cm W: 5.4kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:				2004/11/11 ~ 3.50mg/日 (1x) → 散 内用	
583	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		女 0歳 4ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 81.0cm W: 10.2kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:				2004/11/19 ~ 7.00mg/日 (1x) → 散 内用	

No	施設名 診療科 対象疾患		適応外使用の症状	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			投与量・剤型・投与経路
584	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			男 0歳 4ヶ月 H: 60.0cm W: 5.1kg 入院・投与終了
	用法: 総合:			2004/11/12 ~ 2.50mg/日 (1x) → 散 内用
585	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			女 0歳 4ヶ月 H: 63.5cm W: 6.3kg 入院・投与終了
	用法: 総合:			2004/11/26 ~ 4.00mg/日 (1x) → 散 内用
586	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			男 0歳 4ヶ月 H: 58.1cm W: 4.0kg 入院・投与終了
	用法: 総合:			2004/11/02 ~ 2004/11/02 (1日間) 2.00mg/日 (1x) → 散 内用
587	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			女 0歳 5ヶ月 H: 62.0cm W: 6.4kg 入院・投与終了
	用法: 総合:			2004/12/01 ~ 3.00mg/日 (1x) → 散 内用
588	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			男 0歳 5ヶ月 W: 5.7kg 入院・投与終了
	用法: 総合:			2004/12/01 ~ 3.00mg/日 (1x) → 散 内用
589	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			男 0歳 5ヶ月 W: 4.7kg 入院・投与終了
	用法: 総合:			2004/11/16 ~ 2.50mg/日 (1x) → 散 内用
590	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			女 0歳 10ヶ月 H: 85.0cm W: 10.3kg 入院・投与終了
	用法: 総合:			2004/11/02 ~ 2004/11/02 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 散 内用
591	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			男 0歳 10ヶ月 H: 71.4cm W: 9.7kg 入院・投与終了
	用法: 総合:			2004/12/01 ~ 6.00mg/日 (1x) → 散 内用
592	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			女 0歳 11ヶ月 H: 75.0cm W: 9.1kg 入院・投与終了
	用法: 総合:			2004/11/29 ~ 6.00mg/日 (1x) → 散 内用
593	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			男 1歳 0ヶ月 W: 7.3kg 入院・投与終了
	用法: 総合:			2004/11/15 ~ 5.00mg/日 (1x) → 散 内用
594	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			男 1歳 0ヶ月 H: 68.0cm W: 5.6kg 入院・投与終了
	用法: 総合:			2004/11/24 ~ 2.50mg/日 (1x) → 散 内用

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の症状	患者背景	
	用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
595	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬			男 1歳 0ヶ月 H: 71.5cm W: 9.4kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定					2004/12/01 ~
	用法:					5.00mg/日 (1x) →
	総合:					散 内用
596	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬			男 1歳 0ヶ月 H: 73.6cm W: 11.5kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定					2004/11/08 ~
	用法:					7.00mg/日 (1x) →
	総合:					散 内用
597	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬			男 1歳 1ヶ月 H: 72.5cm W: 9.4kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定					2004/12/01 ~
	用法:					5.00mg/日 (1x) →
	総合:					散 内用
598	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬			女 1歳 2ヶ月 H: 71.2cm W: 9.6kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定					2004/12/01 ~
	用法:					6.00mg/日 (1x) →
	総合:					散 内用
599	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬			男 1歳 2ヶ月 H: 74.0cm W: 9.0kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定					~
	用法:					7.00mg/日 (1x) →
	総合:					散 内用
600	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬			女 1歳 3ヶ月 H: 71.8cm W: 8.9kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定					2004/11/12 ~
	用法:					6.00mg/日 (1x) →
	総合:					散 内用
601	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬			男 1歳 3ヶ月 H: 78.0cm W: 11.1kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定					2003/07/30 ~
	用法:					5.00mg/日 (1x) →
	総合:					散 内用
602	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬			男 1歳 4ヶ月 H: 78.0cm W: 9.7kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定					2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間)
	用法:					6.00mg/日 (1x) →
	総合:					散 内用
603	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬			男 1歳 5ヶ月 H: 73.7cm W: 9.4kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定					2004/12/01 ~
	用法:					5.00mg/日 (1x) →
	総合:					散 内用
604	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬			男 1歳 5ヶ月 H: 82.0cm W: 11.8kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定					2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間)
	用法:					7.00mg/日 (1x) →
	総合:					散 内用
605	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬			男 1歳 6ヶ月 H: 77.7cm W: 9.7kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定					2004 11 10 ~
	用法:					5.00mg/日 (1x) →
	総合:					散 内用

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No	施設名 診療科 対象疾患			適応外使用の症状	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			投与量・剤型・投与経路	
606	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		女 1歳 6ヶ月 H: 84.0cm W: 11.7kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法: 総合:				2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 散 内用
607	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 1歳 6ヶ月 H: 79.4cm W: 11.1kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法: 総合:				2004/12/01 ~ 5.00mg/日 (1x) → 散 内用
608	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		女 1歳 8ヶ月 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法: 総合:				2004/11/29 ~ 6.00mg/日 (1x) → 散 内用
609	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 1歳 9ヶ月 H: 84.0cm W: 13.0kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法: 総合:				2004/11/29 ~ 6.00mg/日 (1x) → 散 内用
610	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 1歳 10ヶ月 H: 82.0cm W: 10.0kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法: 総合:				2004/11/10 ~ 7.00mg/日 (1x) → 散 内用
611	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 1歳 10ヶ月 H: 71.5cm W: 9.0kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法: 総合:				2004/11/02 ~ 2004/11/02 (1日間) 5.00mg/日 (1x) → 散 内用
612	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 1歳 10ヶ月 H: 82.5cm W: 10.5kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法: 総合:				2004/11/15 ~ 5.00mg/日 (1x) → 散 内用
613	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 1歳 11ヶ月 H: 73.8cm W: 12.0kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法: 総合:				2004/11/18 ~ 7.00mg/日 (1x) → 散 内用
614	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		女 2歳 1ヶ月 H: 84.1cm W: 12.0kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法: 総合:				2004/11/25 ~ 6.00mg/日 (1x) → 散 内用
615	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 2歳 2ヶ月 H: 81.0cm W: 11.3kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法: 総合:				2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間) 7.00mg/日 (1x) → 散 内用
616	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 2歳 2ヶ月 H: 81.4cm W: 10.6kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法: 総合:				2004/11/11 ~ 6.00mg/日 (1x) → 散 内用

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の症状	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
617	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 2歳 2ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 81.0cm W: 11.3kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/11 ~ 7.00mg/日 (1x) → 散 内用	
618	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 2歳 3ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				W: 13.0kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/16 ~ 8.00mg/日 (1x) → 散 内用	
619	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 2歳 4ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 90.2cm W: 13.1kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/25 ~ 6.00mg/日 (1x) → 散 内用	
620	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 2歳 4ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 90.6cm W: 13.3kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/24 ~ 6.00mg/日 (1x) → 散 内用	
621	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 2歳 4ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 91.0cm W: 12.8kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/30 ~ 6.00mg/日 (1x) → 散 内用	
622	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 2歳 5ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 92.8cm W: 13.0kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/30 ~ 9.00mg/日 (1x) → 散 内用	
623	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 2歳 6ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 90.0cm W: 14.3kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/29 ~ 6.00mg/日 (1x) → 散 内用	
624	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 2歳 7ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 91.3cm W: 12.0kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/11 ~ 6.00mg/日 (1x) → 散 内用	
625	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 2歳 8ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 87.9cm W: 12.3kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/19 ~ 6.00mg/日 (1x) → 散 内用	
626	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		女 2歳 9ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 89.0cm W: 11.0kg 入院・	
	用法: 総合:				2004/11/18 ~ 7.00mg/日 (1x) → 散 内用	
627	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 2歳 10ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 92.0cm W: 14.2kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/24 ~ 7.50mg/日 (1x) → 散 内用	

No	施設名 診療科 対象疾患			適応外使用の症状	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
628	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 3歳 5ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 95.0cm W: 13.0kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/29 ~ 7.00mg/日 (1x) → 散 内用	
629	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		女 3歳 5ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 94.5cm W: 15.2kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/19 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
630	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		女 3歳 6ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 97.3cm W: 13.0kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/11 ~ 9.00mg/日 (1x) → 散 内用	
631	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		女 3歳 8ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 89.4cm W: 12.2kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/11 ~ 7.00mg/日 (1x) → 散 内用	
632	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		女 3歳 9ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 101.4cm W: 13.8kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/09 ~ 9.00mg/日 (1x) → 散 内用	
633	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 4歳 1ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 106.5cm W: 16.4kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
634	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		女 4歳 4ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				W: 15.5kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/09 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
635	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 4歳 6ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 106.0cm W: 14.2kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/22 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
636	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 4歳 8ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 110.4cm W: 18.0kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
637	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		女 4歳 11ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				W: 20.0kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/30 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
638	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		男 5歳 1ヶ月	
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定				H: 105.0cm W: 16.9kg 入院・投与終了	
	用法: 総合:				2004/11/24 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	

No	施設名 診療科 対象疾患		適応外使用の症状	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			投与量・剤型・投与経路	
639	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			男 5歳 6ヶ月 H: 110.0cm W: 18.0kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:			2004/11/24 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
640	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			男 5歳 10ヶ月 W: 16.5kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:			2004/11/17 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
641	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			男 5歳 11ヶ月 H: 104.0cm W: 15.7kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:			2004/11/18 ~ 7.00mg/日 (1x) → 散 内用	
642	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			女 5歳 11ヶ月 H: 110.2cm W: 18.5kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:			2004/11/22 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
643	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			女 6歳 3ヶ月 H: 119.5cm W: 19.6kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:			2004/11/09 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
644	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			女 6歳 7ヶ月 H: 111.5cm W: 20.6kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:			2004/12/01 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
645	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			男 6歳 11ヶ月 H: 105.0cm W: 15.0kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:			2004/11/24 ~ 7.50mg/日 (1x) → 散 内用	
646	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			女 8歳 0ヶ月 H: 114.5cm W: 19.3kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:			2004/11/29 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
647	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			男 8歳 4ヶ月 H: 104.0cm W: 12.7kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:			2004/11/11 ~ 6.00mg/日 (1x) → 散 内用	
648	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			男 8歳 6ヶ月 W: 20.0kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:			2004/12/01 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
649	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定			女 8歳 7ヶ月 H: 117.7cm W: 20.1kg 入院・投与終了	
	用法: 総 合:			2004/12/02 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No	施設名 診療科 対象疾患		適応外使用の症状	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			投与量・剤型・投与経路	
650	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法:			女 8歳 10ヶ月 H: 130.5cm W: 24.0kg 入院・投与終了	
	総合:			2004/11/30 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
651	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法:			男 9歳 4ヶ月 W: 23.0kg 入院・投与終了	
	総合:			2004/12/02 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
652	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法:			女 9歳 10ヶ月 H: 137.2cm W: 32.4kg 入院・投与終了	
	総合:			2004/11/10 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
653	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法:			女 10歳 11ヶ月 W: 31.0kg 入院・投与終了	
	総合:			2004/11/09 ~ 2.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
654	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法:			男 11歳 0ヶ月 H: 135.5cm W: 25.8kg 入院・投与終了	
	総合:			2004/11/11 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
655	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法:			女 11歳 8ヶ月 H: 123.2cm W: 17.0kg 入院・投与終了	
	総合:			2004/11/10 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
656	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法:			女 11歳 9ヶ月 H: 123.2cm W: 17.0kg 入院・投与終了	
	総合:			2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
657	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法:			女 11歳 9ヶ月 W: 18.3kg 入院・投与終了	
	総合:			2004/11/17 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
658	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法:			男 12歳 5ヶ月 H: 145.3cm W: 34.0kg 入院・投与終了	
	総合:			2004/11/17 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
659	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法:			男 12歳 6ヶ月 H: 143.8cm W: 33.4kg 入院・投与終了	
	総合:			2004/11/24 ~ 10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
660	小児専門N	麻酔科	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 不明または未判定 用法:			男 13歳 7ヶ月 H: 151.7cm W: 46.4kg 入院・投与終了	
	総合:			2004/12/01 ~ 2.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	



No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の症状	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
661	小児専門N 麻酔科		麻酔前投薬		女 13歳 9ヶ月	
	安全性: 特になし				H: 150.7cm W: 60.0kg 入院・投与終了	
	有効性: 不明または未判定				2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間)	
	用法:				10.00mg/日 (1x) → 散 内用	
662	小児専門N 麻酔科		麻酔前投薬		男 14歳 7ヶ月	
	安全性: 特になし				H: 152.4cm W: 41.0kg 入院・投与終了	
	有効性: 不明または未判定				2004/11/18 ~	
	用法:				4.00mg/日 (1x) → 散 内用	
663	小児専門N 麻酔科		麻酔前投薬		男 15歳 11ヶ月	
	安全性: 特になし				H: 151.0cm W: 47.0kg 入院・投与終了	
	有効性: 不明または未判定				2004/11/18 ~	
	用法:				2.00mg/日 (1x) → 錠・カプセル 内用	
664	小児専門O 小児科		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		男 4歳 10ヶ月	
	安全性:				入院・	
	有効性:				~	
	用法:				散 内用	
665	小児専門O 小児科		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 6歳 11ヶ月	
	安全性:				入院・	
	有効性:				~	
	用法:				散 内用	
666	小児専門O 神経科		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		男 9歳 1ヶ月	
	安全性:				入院・	
	有効性:				~	
	用法:				散 内用	
667	小児専門O 神経科		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 9歳 10ヶ月	
	安全性:				入院・	
	有効性:				~	
	用法:				散 内用	
668	小児専門O 神経科		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		男 11歳 8ヶ月	
	安全性:				入院・	
	有効性:				~	
	用法:				散 内用	
669	小児専門O 神経科		筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		男 16歳 6ヶ月	
	安全性:				入院・	
	有効性:				~	
	用法:				水剤 内用	
670	小児専門O 神経科		神経症における不安・緊張・抑うつ		男 13歳 4ヶ月	
	安全性:				入院・	
	有効性:				~	
	用法:				錠 内用	
671	総合病院B 小児科		適応外使用 メンクス症候群	筋痙攣	男 1歳 8ヶ月	
	安全性:				入院・	
	有効性:				~	
	用法:				4.00mg/日 (4x) → 散 内用	

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の症状	患者背景	
	用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
672	総合病院B	小児科	適応外使用 ゴーシェ病	神経症	女	2歳 1ヶ月 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				7.50mg/日(4x)	→
総合:					散 内用	
673	総合病院B	小児科	適応外使用	てんかん	男	3歳 7ヶ月 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				1.00mg/日(2x)	→
総合:					散 内用	
674	総合病院B	小児科	適応外使用 ジストニア	神経症	男	4歳 6ヶ月 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				4.00mg/日(2x)	→
総合:					水剤 内用	
675	総合病院B	小児科	適応外使用	てんかん	男	6歳 11ヶ月 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				8.00mg/日(1x)	→
総合:					散 内用	
676	総合病院B	小児科	適応外使用	てんかん	男	7歳 2ヶ月 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				5.00mg/日(1x)	→
総合:					水剤 内用	
677	総合病院B	小児科	適応外使用	てんかん	男	9歳 6ヶ月 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				8.00mg/日	→
総合:					水剤 内用	
678	総合病院B	小児科	適応外使用 単純型Schizo、てんかん	筋痙攣	女	11歳 2ヶ月 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				10.00mg/日(1x)	→
総合:					水剤 内用	
679	総合病院B	精神科	適応外使用 カウリ性障害	心身症	女	11歳 10ヶ月 入院・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				2.00mg/日(1x)	→
総合:					錠・カプセル 内用	
680	総合病院B	小児科	適応外使用	てんかん	女	12歳 1ヶ月 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				10.00mg/日(2x)	→
総合:					散 内用	
681	総合病院B	小児科	適応外使用	てんかん	男	13歳 2ヶ月 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				6.00mg/日(1x)	→
総合:					錠・カプセル 内用	
682	総合病院B	小児科	適応外使用 ウェスト症候群	筋痙攣	女	15歳 7ヶ月 外来・
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				1.50mg/日(1x)	→
総合:					散 内用	

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
安全性/有効性					患者背景
用法・用量/総合コメント					
683	総合病院B	小児科	適応外使用	その他	男 16歳 5ヶ月 外来・
	アルギノコハク酸尿症				
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				
	12.00mg/日 (2x) 水剤 内用				
684	総合病院C	小児科	神経症における不安・緊張・抑うつ		女 8歳 10ヶ月 外来・投与終了
	安全性: 副作用あり:概要を記載 眠気 有効性: 無効				
	用法: 総合: けいれんや悪夢などの症状もあり、これに対する効果も期待しての投与と思われる。しかし、日中の眠気などあり、テグレートへ変更となりました。				
	2004/09/28 ~ 2004/12/06 (70日間) 2.00mg/日 (1x) 錠・カプセル 内用				
685	総合病院D	小児科	適応外使用	不安・興奮・抑うつの軽減:(麻酔前、麻酔導入時、麻酔中、術後)	女 5歳 11ヶ月 W: 20.4kg 入院・
	安全性: 特になし 有効性: 有効				
	用法: 投与回数: 1~2回/日 投与量: 6mg/回(頓用として処方)				
	2004/11/23 ~ 2004/11/24 (2日間) 6.00mg → 12.00mg 水剤 内用				
686	総合病院D	小児科	適応外使用	不安・興奮・抑うつの軽減:(麻酔前、麻酔導入時、麻酔中、術後)	女 5歳 11ヶ月 W: 20.4kg 入院・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 有効				
	用法: 投与回数: 1~2回/日、投与量: 6mg/回(頓用処方)				
	2004/11/25 ~ 2004/11/26 (2日間) 6.00mg → 12.00mg 水剤 内用				
687	総合病院F	小児科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		男 2歳 10ヶ月 H: 83.0cm W: 12.7kg 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 有効				
	用法: 総合:				
	2003/05/27 ~ 4.00mg/日 (3x) 3.00mg → 4.00mg 散 内用				
688	総合病院F	小児科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 2歳 11ヶ月 H: 87.0cm W: 14.7kg 入院・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 有効				
	用法: 総合:				
	2003/03/17 ~ 3.00mg/日 (3x) 散 内用				
689	総合病院F	小児科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		男 9歳 3ヶ月 W: 13.0kg 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 有効				
	用法: 総合:				
	2000/12/01 ~ 1.30mg/日 (2x) 1.00mg → 1.30mg 散 内用				
690	総合病院F	小児科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 15歳 2ヶ月 W: 20.2kg 外来・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 有効				
	用法: 総合:				
	2001/03/01 ~ 3.50mg/日 (3x) 散 内用				
691	総合病院F	小児科	適応外使用	神経症	女 12歳 8ヶ月 W: 17.6kg 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 有効				
	用法: 総合:				
	2004/11/18 ~ 5.00mg/日 (1x) 散 内用				
692	総合病院G	小児科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		男 0歳 9ヶ月 H: 50.0cm W: 6.4kg 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 著効				
	用法: 総合:				
	2004/05/18 ~ 4.00mg/日 (2x) 散 内用				
693	総合病院G	小児科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 5歳 11ヶ月 入院・継続中
	安全性: 有効性: 著効				
	用法: 総合:				
	2001 07-21 ~ 6.00mg 日 (1x) 散 内用				

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
安全性/有効性				患者背景	
用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
694	総合病院G	小児科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		女 8歳 7ヶ月 H:121.0cm W:22.5kg 入院・継続中
	安全性:副作用あり:概要を記載 有効性:やや有効 用法: 総合:				2004/10/15 ~ 4.00mg/日(3x) → 散 内用
695	総合病院G	小児科	適応外使用	てんかん	女 7歳 2ヶ月 H:122.6cm W:31.0kg 外来・継続中
	安全性: 有効性:有効 用法: 総合:				2004/10/15 ~ 8.00mg/日(3x) → 散 内用
696	総合病院I	麻酔科	麻酔前投薬		男 2歳 10ヶ月 H:100.0cm W:13.9kg 入院・投与終了
	安全性:特になし 有効性:有効 用法:母親が服薬させたが、実際は処方量の80%程度しか内服しなかった様子。 総合:小児薬用量としては、若干多めの処方だが、過度の鎮静や呼吸抑制なく安全に使用でき、いやがることなく顔面にマスクをフィットさせてくれ、円滑な麻酔導入の為に有効であったと考える。				投与後、過度な鎮静作用や呼吸抑制は見られなかった。意識はずっと明瞭だが、手術室内に入っても、泣きわめいたりすることなく、スムーズにマスクを顔面にフィットさせることができ、円滑な導入に結び 2004/11/26 ~ 2004/11/26 (1日間) 6.00mg/日 → 水剤 内用
697	総合病院J	小児科	適応外使用	神経症	女 16歳 11ヶ月 H:140.0cm W:28.9kg 外来・継続中
	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:				2002/01/29 ~ 5.00mg/日(1x) 4.00mg → 5.00mg 散 内用
698	総合病院K	麻酔科	麻酔前投薬		男 1歳 0ヶ月 H:76.0cm W:9.5kg 入院・投与終了
	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:				2004/11/01 ~ 2004/11/01 (1日間) 0.15mg/日(1x) → 水剤 内用
699	総合病院K	麻酔科	麻酔前投薬		女 1歳 1ヶ月 入院・投与終了
	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:				2004/11/15 ~ 2004/11/15 (1日間) 0.15mg/日(1x) → 水剤 内用
700	総合病院K	麻酔科	麻酔前投薬		女 1歳 3ヶ月 H:75.0cm W:7.9kg 入院・投与終了
	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:				2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間) 0.15mg/日(1x) → 水剤 内用
701	総合病院K	麻酔科	麻酔前投薬		男 1歳 7ヶ月 H:79.0cm W:9.6kg 入院・投与終了
	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:				2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 0.15mg/日(1x) → 水剤 内用
702	総合病院K	麻酔科	麻酔前投薬		女 4歳 2ヶ月 H:96.0cm W:12.3kg 入院・投与終了
	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:				2004/11/15 ~ 2004/11/15 (1日間) 0.20mg/日(1x) → 水剤 内用
703	総合病院K	麻酔科	麻酔前投薬		女 5歳 1ヶ月 H:104.0cm W:16.3kg 入院・投与終了
	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:				2004/11/15 ~ 2004/11/15 (1日間) 0.25mg/日(1x) → 水剤 内用
704	総合病院L		心身症における身体症状並びに不安・緊張・抑うつ		女 2歳 0ヶ月 入院・
	安全性:特になし 有効性:有効 用法: 総合:				5.00mg/日 散 内用

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の症状	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
705	総合病院L		心身症における身体症候並びに不安・緊張・抑うつ		女	4歳 0ヶ月
	安全性: 特になし 有効性: 有効					
	用法: 総合:				5.00mg/日 錠・カプセル 内用	→
706	総合病院L		心身症における身体症候並びに不安・緊張・抑うつ		男	5歳 0ヶ月 入院・
	安全性: 特になし 有効性: 有効					
	用法: 総合:				4.00mg/日 水剤 内用	→
707	総合病院L		心身症における身体症候並びに不安・緊張・抑うつ		男	13歳 0ヶ月 外来・
	安全性: 特になし 有効性: 有効					
	用法: 総合:				2.00mg/日 散 内用	→
708	総合病院L		神経症における不安・緊張・抑うつ		男	4歳 0ヶ月 入院・
	安全性: 特になし 有効性: 有効					
	用法: 総合:				5.00mg/日 水剤 内用	→
709	総合病院L		神経症における不安・緊張・抑うつ		男	10歳 0ヶ月 外来・
	安全性: 特になし 有効性: やや有効					
	用法: 総合:				2.00mg/日 錠・カプセル 内用	→
710	総合病院L 小児科		神経症における不安・緊張・抑うつ		女	15歳 11ヶ月 外来・
	安全性: 特になし 有効性: 有効					
	用法: 総合:				4.00mg/日 (2x) 錠・カプセル 内用	→
711	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	男	2歳 0ヶ月 入院・
	安全性: 特になし 有効性: 有効					
	用法: 総合:				8.00mg/日 散 内用	→
712	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	男	2歳 0ヶ月 入院・
	安全性: 特になし 有効性: 有効					
	用法: 総合:				3.00mg/日 散 内用	→
713	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	女	2歳 0ヶ月 外来・
	安全性: 特になし 有効性: やや有効					
	用法: 総合:				5.00mg/日 散 内用	→
714	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	女	2歳 0ヶ月 外来・
	安全性: 特になし 有効性: やや有効					
	用法: 総合:				3.00mg/日 散 内用	→
715	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	男	2歳 0ヶ月 外来・
	安全性: 特になし 有効性: やや有効					
	用法: 総合:				8.00mg/日 散 内用	→

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
	安全性/有効性			用法・用量/総合コメント	投与量・剤型・投与経路
716	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	女 2歳 0ヶ月 入院・
	安全性:特になし 有効性:有効				0.70mg/日 散 内用
	用法: 総合:				→
717	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	女 3歳 0ヶ月 外来・
	安全性:特になし 有効性:やや有効				6.00mg/日 散 内用
	用法: 総合:				→
718	総合病院L		適応外使用	不安・興奮・抑うつ軽減:(麻酔前、麻酔導入時、麻酔中、術後)	女 3歳 0ヶ月 入院・
	安全性:特になし 有効性:有効				4.00mg/日 水剤 内用
	用法: 総合:				→
719	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	男 3歳 0ヶ月 入院・
	安全性:特になし 有効性:				1.00mg/日 散 内用
	用法: 総合:				→
720	総合病院L		適応外使用	不安・興奮・抑うつ軽減:(麻酔前、麻酔導入時、麻酔中、術後)	女 3歳 0ヶ月 入院・
	安全性:特になし 有効性:有効				4.50mg/日 水剤 内用
	用法: 総合:				→
721	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	女 3歳 0ヶ月 外来・
	安全性:特になし 有効性:やや有効				1.00mg/日 散 内用
	用法: 総合:				→
722	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	男 3歳 0ヶ月 外来・
	安全性:特になし 有効性:やや有効				2.50mg/日 散 内用
	用法: 総合:				→
723	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	女 3歳 0ヶ月 入院・
	安全性:特になし 有効性:有効				5.00mg/日 散 内用
	用法: 総合:				→
724	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	男 4歳 0ヶ月 外来・
	安全性:特になし 有効性:やや有効				1.00mg/日 散 内用
	用法: 総合:				→
725	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	男 4歳 0ヶ月 外来・
	安全性:特になし 有効性:やや有効				4.50mg/日 散 内用
	用法: 総合:				→
726	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	男 4歳 0ヶ月 入院・
	安全性:特になし 有効性:有効				4.50mg/日 散 内用
	用法: 総合:				→

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路
727	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	男 5歳 0ヶ月 外来・
	安全性:特になし 有効性:有効				~
	用法: 総合:				2.00mg/日 散 内用 →
728	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	男 5歳 0ヶ月 外来・
	安全性:特になし 有効性:やや有効				~
	用法: 総合:				2.00mg/日 散 内用 →
729	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	男 8歳 0ヶ月 外来・
	安全性:特になし 有効性:有効				~
	用法: 総合:				15.00mg/日 散 内用 →
730	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	男 8歳 0ヶ月 外来・
	安全性:特になし 有効性:有効				~
	用法: 総合:				6.00mg/日 散 内用 →
731	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	女 8歳 0ヶ月 外来・
	安全性:特になし 有効性:やや有効				~
	用法: 総合:				散 内用 →
732	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	男 8歳 0ヶ月 入院・
	安全性:特になし 有効性:有効				~
	用法: 総合:				10.00mg/日 散 内用 →
733	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	男 8歳 0ヶ月 外来・
	安全性:特になし 有効性:やや有効				~
	用法: 総合:				3.00mg/日 散 内用 →
734	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	男 8歳 0ヶ月 外来・
	安全性:特になし 有効性:有効				~
	用法: 総合:				3.00mg/日 散 内用 →
735	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	男 8歳 0ヶ月 外来・
	安全性:特になし 有効性:やや有効				~
	用法: 総合:				6.00mg/日 水剤 内用 →
736	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	男 8歳 0ヶ月 外来・
	安全性:特になし 有効性:やや有効				~
	用法: 総合:				8.00mg/日 水剤 内用 →
737	総合病院L		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	男 9歳 0ヶ月 入院・
	安全性:特になし 有効性:有効				~
	用法: 総合:				5.00mg/日 散 内用 →

No	施設名 診療科 対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント		投与量・剤型・投与経路
738	総合病院L	適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)
	安全性:特になし 有効性:やや有効		女 11歳 0ヶ月 外来・
	用法: 総合:		5.00mg/日 水剤 内用 →
739	総合病院L	適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)
	安全性:特になし 有効性:有効		男 13歳 0ヶ月 入院・
	用法: 総合:		8.00mg/日 散 内用 →
740	総合病院L	適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)
	安全性:特になし 有効性:有効		男 14歳 0ヶ月 外来・
	用法: 総合:		4.00mg/日 散 内用 →
741	総合病院L	麻酔前投薬	
	安全性:特になし 有効性:有効		女 0歳 3ヶ月 入院・
	用法: 総合:		3.00mg/日 水剤 内用 →
742	総合病院L	麻酔前投薬	
	安全性:特になし 有効性:有効		男 0歳 8ヶ月 入院・
	用法: 総合:		4.00mg/日 水剤 内用 →
743	総合病院L	麻酔前投薬	
	安全性:特になし 有効性:有効		男 0歳 9ヶ月 入院・
	用法: 総合:		2.00mg/日 水剤 内用 →
744	総合病院L	麻酔前投薬	
	安全性:特になし 有効性:有効		女 0歳 11ヶ月 入院・
	用法: 総合:		9.00mg/日 水剤 内用 →
745	総合病院L	麻酔前投薬	
	安全性:特になし 有効性:有効		男 1歳 0ヶ月 入院・
	用法: 総合:		1.00mg/日 水剤 内用 →
746	総合病院L	麻酔前投薬	
	安全性:特になし 有効性:有効		男 1歳 0ヶ月 入院・
	用法: 総合:		3.00mg/日 水剤 内用 →
747	総合病院L	麻酔前投薬	
	安全性:特になし 有効性:有効		女 1歳 0ヶ月 入院・
	用法: 総合:		3.00mg/日 水剤 内用 →
718	総合病院L	麻酔前投薬	
	安全性:特になし 有効性:有効		男 1歳 0ヶ月 入院・
	用法: 総合:		4.00mg/日 水剤 内用 →



処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No	施設名 診療科 対象疾患		適応外使用の症状		患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
749	総合病院L 麻酔前投薬				男 1歳 0ヶ月 入院・	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 3.00mg/日 水剤 内用	
	総合:				→	
750	総合病院L 麻酔前投薬				男 1歳 0ヶ月 入院・	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 4.00mg/日 水剤 内用	
	総合:				→	
751	総合病院L 麻酔前投薬				男 2歳 0ヶ月 入院・	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 4.00mg/日 水剤 内用	
	総合:				→	
752	総合病院L 麻酔前投薬				男 2歳 0ヶ月 入院・	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 4.80mg/日 水剤 内用	
	総合:				→	
753	総合病院L 麻酔前投薬				女 2歳 0ヶ月 入院・	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 4.00mg/日 水剤 内用	
	総合:				→	
754	総合病院L 麻酔前投薬				女 3歳 0ヶ月 入院・	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 4.00mg/日 水剤 内用	
	総合:				→	
755	総合病院L 麻酔前投薬				男 3歳 0ヶ月 入院・	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 5.00mg/日 水剤 内用	
	総合:				→	
756	総合病院L 麻酔前投薬				男 3歳 0ヶ月 入院・	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 3.60mg/日 水剤 内用	
	総合:				→	
757	総合病院L 麻酔前投薬				男 3歳 0ヶ月 入院・	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 5.00mg/日 水剤 内用	
	総合:				→	
758	総合病院L 麻酔前投薬				女 3歳 0ヶ月 入院・	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 4.50mg/日 水剤 内用	
	総合:				→	
759	総合病院L 麻酔前投薬				男 3歳 0ヶ月 入院・	
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 5.00mg/日 水剤 内用	
	総合:				→	

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路
760	総合病院L		麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 有効				男 4歳 0ヶ月 入院・
	用法: 総合:				~ 6.00mg/日 水剤 内用 →
761	総合病院L		麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 有効				女 4歳 0ヶ月 入院・
	用法: 総合:				~ 2.00mg/日 水剤 内用 →
762	総合病院L		麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 有効				男 4歳 0ヶ月 入院・
	用法: 総合:				~ 3.00mg/日 水剤 内用 →
763	総合病院L		麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 有効				男 4歳 0ヶ月 入院・
	用法: 総合:				~ 6.00mg/日 水剤 内用 →
764	総合病院L		麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 有効				女 5歳 0ヶ月 入院・
	用法: 総合:				~ 5.00mg/日 水剤 内用 →
765	総合病院L		麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 有効				女 5歳 0ヶ月 入院・
	用法: 総合:				~ 5.00mg/日 水剤 内用 →
766	総合病院L		麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 有効				女 6歳 0ヶ月 入院・
	用法: 総合:				~ 7.00mg/日 水剤 内用 →
767	総合病院L		麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 有効				男 6歳 0ヶ月 入院・
	用法: 総合:				~ 3.00mg/日 水剤 内用 →
768	総合病院L		麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 有効				男 6歳 0ヶ月 入院・
	用法: 総合:				~ 8.00mg/日 水剤 内用 →
769	総合病院L		麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 有効				男 6歳 0ヶ月 入院・
	用法: 総合:				~ 5.00mg/日 水剤 内用 →
770	総合病院L		麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 有効				男 6歳 0ヶ月 入院・
	用法: 総合:				~ 5.00mg/日 錠・カプセル 内用 →

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路
771	総合病院L		麻酔前投薬		女 6歳 0ヶ月 入院・
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 7.00mg/日 水剤 内用
	総合:				→
772	総合病院L		麻酔前投薬		女 6歳 0ヶ月 入院・
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 7.00mg/日 水剤 内用
	総合:				→
773	総合病院L		麻酔前投薬		男 7歳 0ヶ月
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 5.00mg/日 錠・カプセル 内用
	総合:				→
774	総合病院L		麻酔前投薬		男 7歳 0ヶ月
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 2.00mg/日 (1x) 錠・カプセル 内用
	総合:				→
775	総合病院L		麻酔前投薬		女 7歳 0ヶ月 入院・
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 4.00mg/日 水剤 内用
	総合:				→
776	総合病院L		麻酔前投薬		女 8歳 0ヶ月 入院・
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 10.00mg/日 水剤 内用
	総合:				→
777	総合病院L		麻酔前投薬		男 8歳 0ヶ月 入院・
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 10.00mg/日 水剤 内用
	総合:				→
778	総合病院L		麻酔前投薬		男 9歳 0ヶ月 入院・
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 8.00mg/日 水剤 内用
	総合:				→
779	総合病院L		麻酔前投薬		女 10歳 0ヶ月
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 5.00mg/日 錠・カプセル 内用
	総合:				→
780	総合病院L		麻酔前投薬		男 10歳 0ヶ月 入院・
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 5.00mg/日 錠・カプセル 内用
	総合:				→
781	総合病院L		麻酔前投薬		男 11歳 0ヶ月 入院・
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法:				~ 5.00mg/日 錠・カプセル 内用
	総合:				→

処方実績調査データ

ジアゼパム内服(錠・散・シロップ)

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の症状	患者背景
安全性/有効性				投与量・剤型・投与経路	
用法・用量/総合コメント					
782	総合病院L		麻酔前投薬		男 13歳 0ヶ月
	安全性: 特になし 有効性: 有効				~
	用法: 総合:				錠・カプセル 内用
783	総合病院L		麻酔前投薬		女 14歳 0ヶ月
	安全性: 特になし 有効性: 有効				~
	用法: 総合:				2.00mg/日 錠・カプセル 内用
784	総合病院M	小児科	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		男 14歳 10ヶ月 W: 19.0kg 入院・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 有効				2004/11/07 ~ (28日間)
	用法: 総合:				5.00mg/日 (2x) 散 内用
785	総合病院M	外科	適応外使用 鎮静	その他	男 1歳 4ヶ月 H: 85.0cm W: 11.2kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 著効				2004/11/25 ~ 2004/11/25 (1日間)
	用法: 総合:				0.15mg/日 (1x) 水剤 内用
786	総合病院M	外科	適応外使用 鎮静	その他	女 3歳 0ヶ月 H: 93.5cm W: 16.0kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 有効				2004/11/26 ~ 2004/11/26 (1日間)
	用法: 総合:				0.25mg/日 (1x) 水剤 内用
787	総合病院M	小児科	適応外使用 周期性ACTH-ADH放出症候群	その他	女 12歳 5ヶ月 H: 148.6cm W: 34.0kg 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: やや有効				2004/11/30 ~ (30日間)
	用法: 総合:				14.00mg/日 (2x) 錠 内用