

処方実績調査データ

ジアゼパム坐剤

No.	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の疾病名	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路
122	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				女 0歳 6ヶ月
	有効性:				H: 67.0cm W: 6.8kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/29 ~ 2004/11/29 (1日間) 4.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
総合:					
123	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				女 0歳 6ヶ月
	有効性:				H: 69.0cm W: 8.8kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/25 ~ 2004/11/25 (1日間) 4.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
総合:					
124	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				男 0歳 6ヶ月
	有効性:				H: 69.0cm W: 7.3kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/29 ~ 2004/11/29 (1日間) 4.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
総合:					
125	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				男 0歳 6ヶ月
	有効性:				H: 73.0cm W: 10.2kg 外来・投与終了
	用法:				2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 4.00mg/日 → 坐剤 外用
総合:					
126	小児専門B		適応外使用	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)	
	安全性:				女 0歳 7ヶ月
	有効性:				H: 54.0cm W: 5.2kg 入院・継続中
	用法:	同日ダイアアップ使用4mg			2004/11/28 ~ (1日間) 14.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
総合:					
127	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				女 0歳 7ヶ月
	有効性:				H: 65.0cm W: 7.8kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/25 ~ 2004/11/25 (1日間) 4.00mg/日 → 坐剤 外用
総合:					
128	小児専門B		適応外使用 けいれん	痙攣発作	
	安全性:				女 0歳 7ヶ月
	有効性:				H: 53.0cm W: 5.1kg 入院・
	用法:				~ → 坐剤 外用
総合:					
129	小児専門B		適応外使用	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)	
	安全性:				女 0歳 7ヶ月
	有効性:				H: 53.0cm W: 4.5kg 外来・
	用法:				~ → 2.00mg/日 坐剤 外用
総合:					
130	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				男 0歳 8ヶ月
	有効性:				H: 68.0cm W: 8.3kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
総合:					
131	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				男 0歳 8ヶ月
	有効性:				H: 67.0cm W: 8.1kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/10 ~ 2004/11/10 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
総合:					
132	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				男 0歳 9ヶ月
	有効性:				H: 72.0cm W: 9.8kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/30 ~ 2004/11/30 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
総合:					

No	施設名 診療科 対象疾患		適応外使用の実績名		
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			患者背景 投与量・剤型・投与経路	
133	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性:			女 0歳 9ヶ月	
	用法:			H: 71.8cm W: 8.6kg 入院・投与終了	
	総合:			2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
134	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性:			男 0歳 9ヶ月	
	用法:			H: 65.0cm W: 6.9kg 入院・	
	総合:			2004/12/01 ~ 2004/12/01 (1日間) 4.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
135	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性:			女 0歳 10ヶ月	
	用法:			H: 65.9cm W: 7.0kg 入院・投与終了	
	総合:			2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 4.00mg/日 → 坐剤 外用	
136	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性:			男 1歳 0ヶ月	
	用法:			H: 75.0cm W: 9.3kg 入院・投与終了	
	総合:			2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
137	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性:			女 1歳 0ヶ月	
	用法:			H: 73.0cm W: 8.9kg 入院・投与終了	
	総合:			2004/11/02 ~ 2004/11/02 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
138	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性:			男 1歳 0ヶ月	
	用法:			H: 75.8cm W: 10.1kg 入院・投与終了	
	総合:			~ 6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
139	小児専門B	適応外使用 痙攣	痙攣発作		
	安全性: 有効性:			女 1歳 0ヶ月	
	用法:			H: 60.0cm W: 8.7kg 入院・	
	総合:			~ 4.00mg/日 → 坐剤 外用	
140	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性:			女 1歳 0ヶ月	
	用法:			H: 69.8cm W: 8.0kg 入院・投与終了	
	総合:			2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
141	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性:			男 1歳 0ヶ月	
	用法:			H: 73.0cm W: 6.6kg 入院・投与終了	
	総合:			2004/11/22 ~ 2004/11/22 (1日間) 4.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
142	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性:			女 1歳 0ヶ月	
	用法:			H: 74.0cm W: 8.8kg 入院・投与終了	
	総合:			2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
143	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬		
	安全性: 有効性:			女 1歳 1ヶ月	
	用法:			H: 72.4cm W: 10.3kg 入院・投与終了	
	総合:			2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路
144	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				男 1歳 3ヶ月
	有効性:				H: 79.8cm W: 10.4kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/25 ~ 2004/11/25 (1日間)
総合:				6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
145	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				女 1歳 3ヶ月
	有効性:				H: 77.3cm W: 8.6kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/11 ~ 2004/11/11 (1日間)
総合:				6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
146	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				男 1歳 3ヶ月
	有効性:				H: 68.4cm W: 8.4kg 外来・投与終了
	用法:				2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間)
総合:				4.00mg/日 → 坐剤 外用	
147	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				女 1歳 4ヶ月
	有効性:				H: 76.5cm W: 9.8kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/30 ~ 2004/11/30 (1日間)
総合:				6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
148	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				男 1歳 4ヶ月
	有効性:				H: 75.8cm W: 10.2kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/24 ~ 2004/11/24 (1日間)
総合:				6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
149	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				男 1歳 5ヶ月
	有効性:				H: 81.5cm W: 9.4kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間)
総合:				6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
150	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				女 1歳 5ヶ月
	有効性:				H: 76.2cm W: 7.6kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/02 ~ 2004/11/02 (1日間)
総合:				4.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
151	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				男 1歳 5ヶ月
	有効性:				H: 66.3cm W: 6.5kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/02 ~ 2004/11/02 (1日間)
総合:				4.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
152	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				男 1歳 5ヶ月
	有効性:				H: 79.3cm W: 11.4kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間)
総合:				6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
153	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				男 1歳 5ヶ月
	有効性:				H: 81.0cm W: 10.2kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/26 ~ 2004/11/26 (1日間)
総合:				6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
154	小児専門B		適応外使用 インフルエンザワクチン接種後の発熱に使用	痙攣発作	
	安全性:				女 1歳 6ヶ月
	有効性:				H: 73.0cm W: 7.8kg 入院・
	用法:				~
総合:				1.00mg/日 → 坐剤 外用	

処方実績調査データ ジアゼパム坐剤

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の薬病名	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路
155	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	女 1歳 7ヶ月 H: 78.0cm W: 8.8kg 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用法:				2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間)
	総合:				6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
156	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	男 1歳 7ヶ月 H: 84.8cm W: 11.9kg 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用法:				2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間)
	総合:				6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
157	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	女 1歳 7ヶ月 H: 80.0cm W: 10.2kg 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用法:				2004/11/18 ~ 2004/11/18 (1日間)
	総合:				6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
158	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	男 1歳 8ヶ月 H: 87.5cm W: 14.6kg 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用法:				2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間)
	総合:				6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
159	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	男 1歳 8ヶ月 H: 81.1cm W: 10.2kg 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用法:				2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間)
	総合:				6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
160	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	女 1歳 8ヶ月 H: 81.9cm W: 10.0kg 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用法:				2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間)
	総合:				4.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
161	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	男 1歳 9ヶ月 H: 83.8cm W: 11.5kg 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用法:				2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間)
	総合:				8.00mg/日 → 坐剤 外用
162	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	女 1歳 9ヶ月 H: 76.5cm W: 9.3kg 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用法:				2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間)
	総合:				6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
163	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	女 1歳 9ヶ月 H: 79.9cm W: 11.3kg 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用法:				2004/11/30 ~ 2004/11/30 (1日間)
	総合:				6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
164	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	女 1歳 9ヶ月 H: 82.8cm W: 11.5kg 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用法:				2004/12/01 ~ 2004/12/01 (1日間)
	総合:				6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
165	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	男 1歳 9ヶ月 H: 80.0cm W: 10.8kg 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用法:				2004/11/15 ~ 2004/11/15 (1日間)
	総合:				4.00mg/日 → 坐剤 外用

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景		
	用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路		
166	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬			
	安全性:					男 1歳 10ヶ月	
	有効性:					H: 79.1cm W: 10.8kg 入院・投与終了	
	用法:					2004/11/29 ~ 2004/11/29 (1日間)	
総合:					6.00mg/日 (1x) →	坐剤 外用	
167	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬			
	安全性:					女 1歳 10ヶ月	
	有効性:					H: 80.5cm W: 10.6kg 入院・投与終了	
	用法:					2004/11/25 ~ 2004/11/25 (1日間)	
総合:					6.00mg/日 (1x) →	坐剤 外用	
168	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬			
	安全性:					男 1歳 10ヶ月	
	有効性:					H: 82.3cm W: 10.8kg 入院・投与終了	
	用法:					2004/11/26 ~ 2004/11/26 (1日間)	
総合:					6.00mg/日 (1x) →	坐剤 外用	
169	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬			
	安全性:					女 1歳 11ヶ月	
	有効性:					H: 81.9cm W: 10.1kg 入院・投与終了	
	用法:					2004/11/18 ~ 2004/11/18 (1日間)	
総合:					6.00mg/日 (1x) →	坐剤 外用	
170	小児専門B	麻酔科	適応外使用	麻酔前投薬			
	安全性:					女 1歳 11ヶ月	
	有効性:					H: 78.8cm W: 10.6kg 入院・投与終了	
	用法:					2004/11/10 ~ 2004/11/10 (1日間)	
総合:					4.00mg/日 (1x) →	坐剤 外用	
171	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬			
	安全性:					女 2歳 0ヶ月	
	有効性:					H: 76.6cm W: 8.8kg 入院・	
	用法:					~	
総合:					→	坐剤 外用	
172	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬			
	安全性:					男 2歳 0ヶ月	
	有効性:					H: 84.4cm W: 12.7kg 入院・投与終了	
	用法:					2004/11/29 ~ 2004/11/29 (1日間)	
総合:					6.00mg/日 (1x) →	坐剤 外用	
173	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬			
	安全性:					男 2歳 0ヶ月	
	有効性:					H: 81.1cm W: 12.0kg 入院・投与終了	
	用法:					2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間)	
総合:					6.00mg/日 (1x) →	坐剤 外用	
174	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬			
	安全性:					男 2歳 0ヶ月	
	有効性:					H: 83.0cm W: 9.7kg 入院・投与終了	
	用法:					2004/12/01 ~ 2004/12/01 (1日間)	
総合:					6.00mg/日 (1x) →	坐剤 外用	
175	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬			
	安全性:					男 2歳 0ヶ月	
	有効性:					H: 91.0cm W: 15.3kg 入院・投与終了	
	用法:					2004/11/10 ~ 2004/11/10 (1日間)	
総合:					10.00mg/日 (1x) →	坐剤 外用	
176	小児専門B		適応外使用 けいれん 不穏	痙攣発作			
	安全性:					女 2歳 1ヶ月	
	有効性:					H: 78.0cm W: 8.5kg 入院・	
	用法:					~	
総合:					3.00mg/日 →	坐剤 外用	

処方実績調査データ

ジアゼパム坐剤

No	施設名 診療科 対象疾患		適応外使用の実病名	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント		患者背景 投与量・剤型・投与経路	
177	小児専門B	適応外使用	不安・興奮・抑うつ軽減:(麻酔前、麻酔導入時、麻酔中、術後)	
	安全性:		女 2歳 1ヶ月	入院・投与終了
	有効性:		~	
	用法:	セルシン散8mgも併用	3.00mg/日	→ 坐剤 外用
178	小児専門B	適応外使用 痙攣四肢麻痺 二次性てんかん	痙攣発作	
	安全性:		女 2歳 1ヶ月	入院・
	有効性:		H: 78.0cm W: 8.5kg	
	用法:	セルシン散8mgを併用	3.00mg/日(1x)	→ 坐剤 外用
179	小児専門B	適応外使用 痙攣	痙攣発作	
	安全性:		女 2歳 1ヶ月	入院・
	有効性:		W: 9.7kg	
	用法:	Rett症候群	4.00mg/日	→ 坐剤 外用
180	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:		男 2歳 1ヶ月	入院・投与終了
	有効性:		H: 77.6cm W: 10.8kg	
	用法:		2004/11/29 ~ 2004/11/29 (1日間)	4.00mg/日(1x) → 坐剤 外用
181	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:		男 2歳 3ヶ月	入院・投与終了
	有効性:		H: 92.9cm W: 14.9kg	
	用法:		2004/11/11 ~ 2004/11/11 (1日間)	6.00mg/日(1x) → 坐剤 外用
182	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:		男 2歳 4ヶ月	入院・投与終了
	有効性:		H: 92.0cm W: 12.5kg	
	用法:		2004/11/10 ~ 2004/11/10 (1日間)	6.00mg/日(1x) → 坐剤 外用
183	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:		男 2歳 5ヶ月	入院・投与終了
	有効性:		H: 89.3cm W: 12.4kg	
	用法:		2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間)	6.00mg/日(1x) → 坐剤 外用
184	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:		男 2歳 5ヶ月	入院・投与終了
	有効性:		H: 85.5cm W: 12.0kg	
	用法:		2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間)	6.00mg/日(1x) → 坐剤 外用
185	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:		男 2歳 6ヶ月	入院・投与終了
	有効性:		H: 91.0cm W: 13.6kg	
	用法:		2004/11/12 ~ 2004/11/12 (1日間)	6.00mg/日(1x) → 坐剤 外用
186	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:		男 2歳 7ヶ月	投与終了
	有効性:		H: 93.6cm W: 14.1kg	
	用法:		2004/11/10 ~ 2004/11/10 (1日間)	10.00mg/日(1x) → 坐剤 外用
187	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:		女 2歳 7ヶ月	入院・投与終了
	有効性:		H: 92.0cm W: 15.3kg	
	用法:		2001.12.01 ~ 2001.12.01 (1日間)	10.00mg/日(1x) → 坐剤 外用

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			投与量・剤型・投与経路	
188	小児専門B		適応外使用 けいれん	痙攣発作	女 2歳 8ヶ月 H: 78.9cm W: 7.0kg 入院・
	安全性: 有効性: 用法: 6mgの半分をけいれん時に 総合:				~ 3.00mg/日 坐剤 外用 →
189	小児専門B		適応外使用	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)	女 2歳 8ヶ月 H: 89.0cm W: 13.2kg 外来・継続中
	安全性: 有効性: 用法: セルシン散3mgネル前を併用 総合:				~ 6.00mg/日 坐剤 外用 →
190	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	男 2歳 8ヶ月 H: 87.8cm W: 11.4kg 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				2004/11/29 ~ 2004/11/29 (1日間) 6.00mg/日 (1x) 坐剤 外用 →
191	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	男 2歳 8ヶ月 H: 86.0cm W: 13.0kg 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				2004/11/24 ~ 2004/11/24 (1日間) 6.00mg/日 (1x) 坐剤 外用 →
192	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	女 2歳 9ヶ月 H: 94.0cm W: 14.3kg 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				2004/11/12 ~ 2004/11/12 (1日間) 10.00mg/日 (1x) 坐剤 外用 →
193	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	男 2歳 10ヶ月 H: 76.9cm W: 7.9kg 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 4.00mg/日 (1x) 坐剤 外用 →
194	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	男 2歳 10ヶ月 H: 70.5cm W: 14.2kg 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間) 4.00mg/日 (1x) 坐剤 外用 →
195	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	女 2歳 10ヶ月 H: 95.5cm W: 13.8kg 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				2004/11/15 ~ 2004/11/15 (1日間) 6.00mg/日 (1x) 坐剤 外用 →
196	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	女 2歳 10ヶ月 H: 81.0cm W: 13.7kg 入院・投与終了
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				2004/11/24 ~ 2004/11/24 (1日間) 10.00mg/日 (1x) 坐剤 外用 →
197	小児専門B		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重複状態)	男 2歳 11ヶ月 H: 91.4cm W: 13.0kg 外来・
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				~ 4.00mg/日 坐剤 外用 →
198	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	男 3歳 2ヶ月 H: 80.4cm W: 10.9kg 外来・
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				~ 6.00mg 日 (1x) 坐剤 外用 →

処方実績調査データ

ジアゼパム坐剤

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路
199	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				女 3歳 2ヶ月
	有効性:				H: 86.0cm W: 13.4kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/24 ~ 2004/11/24 (1日間) 10.00mg/日 (1x) →
総合:				坐剤 外用	
200	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				男 3歳 3ヶ月
	有効性:				H: 90.2cm W: 12.9kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/10 ~ 2004/11/10 (1日間) 6.00mg/日 (1x) →
総合:				坐剤 外用	
201	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				男 3歳 3ヶ月
	有効性:				H: 96.1cm W: 15.7kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 10.00mg/日 (1x) →
総合:				坐剤 外用	
202	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				女 3歳 4ヶ月
	有効性:				H: 97.6cm W: 14.3kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/24 ~ 2004/11/24 (1日間) 10.00mg/日 (1x) →
総合:				坐剤 外用	
203	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				女 3歳 5ヶ月
	有効性:				H: 81.5cm W: 8.7kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/15 ~ 2004/11/15 (1日間) 4.00mg/日 →
総合:				坐剤 外用	
204	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				女 3歳 6ヶ月
	有効性:				H: 92.7cm W: 12.0kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間) 8.00mg/日 →
総合:				坐剤 外用	
205	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				男 3歳 7ヶ月
	有効性:				H: 101.0cm W: 16.7kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 6.00mg/日 (1x) →
総合:				坐剤 外用	
206	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				女 3歳 8ヶ月
	有効性:				H: 99.1cm W: 14.0kg 投与終了
	用法:				2004/11/11 ~ 2004/11/11 (1日間) 10.00mg/日 (1x) →
総合:				坐剤 外用	
207	小児専門B		適応外使用	痙攣の抑制:(てんかん様重積状態)	
	安全性:				男 3歳 8ヶ月
	有効性:				W: 15.6kg 入院・継続中
	用法:				痙攣時 ~
総合:				6.00mg/日 坐剤 外用	
208	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				男 3歳 10ヶ月
	有効性:				H: 94.0cm W: 13.3kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/10 ~ 2004/11/10 (1日間) 6.00mg/日 (1x) →
総合:				坐剤 外用	
209	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:				男 3歳 10ヶ月
	有効性:				H: 98.3cm W: 16.1kg 入院・投与終了
	用法:				2004/11/10 ~ 2004/11/10 (1日間) 6.00mg/日 (1x) →
総合:				坐剤 外用	

No	施設名 診療科 対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景 投与量・剤型・投与経路
210	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬
	安全性:		女 3歳 11ヶ月
	有効性:		H: 99.5cm W: 16.1kg 入院・投与終了
	用法:		2004/11/01 ~ 2004/11/01 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
総合:			
211	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬
	安全性:		女 3歳 11ヶ月
	有効性:		H: 99.5cm W: 16.1kg 入院・
	用法:		~ 6.00mg/日 → 坐剤 外用
総合:			
212	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬
	安全性:		男 4歳 0ヶ月
	有効性:		H: 101.2cm W: 14.8kg 投与終了
	用法:		2004/11/18 ~ 2004/11/18 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
総合:			
213	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬
	安全性:		男 4歳 0ヶ月
	有効性:		入院・
	用法:		~ 4.00mg/日 → 坐剤 外用
総合:			
214	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬
	安全性:		女 4歳 0ヶ月
	有効性:		H: 101.1cm W: 17.1kg 入院・投与終了
	用法:		2004/11/15 ~ 2004/11/15 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
総合:			
215	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬
	安全性:		男 4歳 1ヶ月
	有効性:		H: 105.3cm W: 17.1kg 投与終了
	用法:		2004/11/12 ~ 2004/11/12 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
総合:			
216	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬
	安全性:		男 4歳 1ヶ月
	有効性:		H: 103.4cm W: 16.9kg 入院・投与終了
	用法:		2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
総合:			
217	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬
	安全性:		男 4歳 1ヶ月
	有効性:		H: 105.3cm W: 17.1kg 投与終了
	用法:		2004/11/12 ~ (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
総合:			
218	小児専門B	適応外使用	神経症における不安・緊張・抑うつ
	安全性:		男 4歳 1ヶ月
	有効性:		W: 10.5kg 入院・
	用法:	不認	~ 4.00mg/日 → 坐剤 外用
総合:			
219	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬
	安全性:		女 4歳 2ヶ月
	有効性:		H: 99.2cm W: 16.2kg 入院・投与終了
	用法:		2004/11/25 ~ 2004/11/25 (1日間) → 坐剤 外用
総合:			
220	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬
	安全性:		男 4歳 2ヶ月
	有効性:		H: 98.2cm W: 14.1kg 入院・投与終了
	用法:		2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
総合:			

処方実績調査データ

ジアゼパム坐剤

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実績名	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路
221	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	男 4歳 2ヶ月 H: 99.0cm W: 15.0kg 入院・投与終了
	安全性:				2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
222	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	男 4歳 3ヶ月 H: 101.6cm W: 15.6kg 入院・
	安全性:				10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
223	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	男 4歳 3ヶ月 H: 103.8cm W: 16.1kg 入院・投与終了
	安全性:				2004/11/18 ~ 2004/11/18 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
224	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	男 4歳 4ヶ月 H: 105.7cm W: 17.0kg 投与終了
	安全性:				2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
225	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	男 4歳 7ヶ月 H: 95.0cm W: 15.2kg 入院・投与終了
	安全性:				2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
226	小児専門B		適応外使用 人工呼吸器管理の為	その他	女 4歳 8ヶ月 入院・継続中
	安全性:				16.00mg/日 4.00mg → 7.50mg 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
227	小児専門B		適応外使用	筋緊張の軽減: (脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)	女 4歳 8ヶ月 H: 109.0cm W: 14.2kg 入院・
	安全性:				40.00mg/日 (4x) → 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
228	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	男 4歳 8ヶ月 H: 95.0cm W: 15.2kg 入院・投与終了
	安全性:				2004/11/25 ~ (1日間) 6.00mg/日 → 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
229	小児専門B		適応外使用 けいれん	痙攣発作	女 4歳 9ヶ月 H: 100.0cm W: 14.2kg
	安全性:				~ 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
230	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	女 4歳 9ヶ月 H: 100.8cm W: 15.7kg 入院・投与終了
	安全性:				2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
231	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	女 4歳 9ヶ月 H: 107.0cm W: 17.4kg 入院・
	安全性:				2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					

処方実績調査データ

ジアゼパム坐剤

No	施設名 診療科 対象疾患		適応外使用の実病名	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント		患者背景 投与量・剤型・投与経路	
232	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:		男 4歳 10ヶ月	
	有効性:		H: 106.8cm W: 19.3kg 投与終了	
	用法:		2004/11/15 ~ (1日間) 10.00mg/日 (1x) →	
総合:		坐剤 外用		
233	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:		男 4歳 10ヶ月	
	有効性:		H: 106.3cm W: 19.3kg 投与終了	
	用法:		2004/11/15 ~ 2004/11/15 (1日間) 10.00mg/日 (1x) →	
総合:		坐剤 外用		
234	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:		女 4歳 10ヶ月	
	有効性:		H: 106.6cm W: 16.4kg 入院・投与終了	
	用法:		2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間) 6.00mg/日 (1x) →	
総合:		坐剤 外用		
235	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:		男 4歳 10ヶ月	
	有効性:		H: 105.3cm W: 18.4kg 投与終了	
	用法:		2004/11/12 ~ (1日間) 10.00mg/日 (1x) →	
総合:		坐剤 外用		
236	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:		男 4歳 10ヶ月	
	有効性:		H: 105.3cm W: 18.4kg 投与終了	
	用法:		2004/11/12 ~ 2004/11/12 (1日間) 10.00mg/日 (1x) →	
総合:		坐剤 外用		
237	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:		女 4歳 11ヶ月	
	有効性:		H: 109.0cm W: 20.2kg 投与終了	
	用法:		2004/11/09 ~ (1日間) 10.00mg/日 (1x) →	
総合:		坐剤 外用		
238	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:		女 4歳 11ヶ月	
	有効性:		H: 99.0cm W: 14.6kg 入院・投与終了	
	用法:		2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間) 6.00mg/日 (1x) →	
総合:		坐剤 外用		
239	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:		女 4歳 11ヶ月	
	有効性:		H: 109.0cm W: 20.2kg 投与終了	
	用法:		2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 10.00mg/日 (1x) →	
総合:		坐剤 外用		
240	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:		女 5歳 0ヶ月	
	有効性:		H: 104.9cm W: 17.6kg 入院・投与終了	
	用法:		2004/11/18 ~ 2004/11/18 (1日間) 10.00mg/日 (1x) →	
総合:		坐剤 外用		
241	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:		男 5歳 2ヶ月	
	有効性:		H: 111.8cm W: 23.9kg 投与終了	
	用法:		2004/11/09 ~ 2004/11/09 (1日間) 10.00mg/日 (1x) →	
総合:		坐剤 外用		
242	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:		男 5歳 3ヶ月	
	有効性:		H: 106.3cm W: 17.9kg 入院・投与終了	
	用法:		2001/11/18 ~ 2001/11/18 (1日間) 10.00mg/日 (1x) →	
総合:		坐剤 外用		

処方実績調査データ

ジアゼパム坐剤

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実称名	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント			患者背景 投与量・剤型・投与経路	
243	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:			男 5歳 5ヶ月	
	有効性:			H: 117.5cm W: 23.1kg 入院・投与終了	
	用法:			2004/11/26 ~ 2004/11/26 (1日間)	
総合:			10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用		
244	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:			男 5歳 5ヶ月	
	有効性:			H: 108.3cm W: 19.8kg 入院・投与終了	
	用法:			2004/11/24 ~ 2004/11/24 (1日間)	
総合:			10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用		
245	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:			男 5歳 6ヶ月	
	有効性:			H: 117.9cm W: 26.6kg 入院・投与終了	
	用法:			2004/11/05 ~ 2004/11/05 (1日間)	
総合:			10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用		
246	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:			男 5歳 6ヶ月	
	有効性:			H: 117.9cm W: 26.2kg 入院・投与終了	
	用法:			2004/11/05 ~ (1日間)	
総合:			10.00mg/日 → 坐剤 外用		
247	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:			女 5歳 7ヶ月	
	有効性:			H: 107.7cm W: 16.3kg 入院・投与終了	
	用法:			2004/11/02 ~ 2004/11/02 (1日間)	
総合:			10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用		
248	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:			女 5歳 7ヶ月	
	有効性:			H: 107.7cm W: 16.3kg 入院・投与終了	
	用法:			2004/11/02 ~ (1日間)	
総合:			10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用		
249	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:			女 5歳 7ヶ月	
	有効性:			H: 118.2cm W: 23.4kg 入院・投与終了	
	用法:			2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間)	
総合:			10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用		
250	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:			女 5歳 8ヶ月	
	有効性:			H: 98.0cm W: 14.5kg 入院・投与終了	
	用法:			2004/11/04 ~ (1日間)	
総合:			10.00mg/日 → 坐剤 外用		
251	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:			女 5歳 8ヶ月	
	有効性:			H: 98.0cm W: 14.5kg 入院・	
	用法:			2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間)	
総合:			10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用		
252	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:			女 5歳 8ヶ月	
	有効性:			H: 113.0cm W: 18.1kg 入院・投与終了	
	用法:			2004/11/15 ~ 2004/11/15 (1日間)	
総合:			6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用		
253	小児専門B		適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性:			男 5歳 8ヶ月	
	有効性:			H: 115.2cm W: 20.0kg 入院・投与終了	
	用法:			2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間)	
総合:			10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用		

処方実績調査データ

ジアゼパム坐剤

No	施設名 診療科 対象疾患		適応外使用の実病名	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント		患者背景 投与量・剤型・投与経路	
254	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:		女 5歳 8ヶ月 H:108.3cm W:17.1kg 入院・投与終了 2004/11/24 ~ 2004/11/24 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:		女 5歳 9ヶ月 H:104.7cm W:12.5kg 入院・投与終了 2004/11/22 ~ 2004/11/22 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
256	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:		男 5歳 9ヶ月 H:113.7cm W:21.3kg 入院・ 2004/11/04 ~ 2004/11/04 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:		男 5歳 9ヶ月 H:110.9cm W:17.5kg 入院・投与終了 2004/11/19 ~ 2004/11/19 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
258	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:		男 5歳 9ヶ月 H:113.7cm W:21.3kg 入院・投与終了 2004/11/04 ~ (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:		男 5歳 11ヶ月 H:111.2cm W:17.2kg 入院・投与終了 2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
260	小児専門B	適応外使用 吐き気時	その他	
	安全性: 有効性: 用法: セルシン散8mg分2を併用中 総合:		女 9歳 4ヶ月 H:131.9cm W:27.9kg 入院・継続中 ~ → 坐剤 外用	
	小児専門B	適応外使用	麻酔前投薬	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:		女 12歳 0ヶ月 H:131.0cm W:34.0kg 入院・投与終了 2004/11/30 ~ 2004/11/30 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
262	小児専門C	神経科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:		女 1歳 7ヶ月 ~ → 坐剤 外用	
	小児専門C (総合診療科)	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 総合:		女 2歳 6ヶ月 外来・ ~ → 坐剤 外用	
264	小児専門C	神経科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善	
	安全性: 有効性: 用法: 総合:		女 3歳 0ヶ月 ~ → 坐剤 外用	

処方実績調査データ

ジアゼパム坐剤

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実績名	患者背景
	安全性/有効性			投与量・剤型・投与経路	
	用法・用量/総合コメント				
265	小児専門C	(総合診療科)	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		女 3歳 6ヶ月 H: 102.0cm W: 13.5kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 有効				2004/11/20 ~ 2004/11/20 (1日間)
	用法: 熱性けいれんで0.5mg/kg/回投与し、8時間後同量を投与した。 総合:				12.00mg/日 (2x) → 坐剤 外用
266	小児専門C	神経科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		男 5歳 4ヶ月 H: 102.0cm W: 12.9kg 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 有効				~
	用法: 総合:				4.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
267	小児専門C	神経科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		女 5歳 6ヶ月 外来・継続中
	安全性: 有効性:				~
	用法: 総合:				10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
268	小児専門C	外科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		女 6歳 10ヶ月 H: 100.0cm W: 11.5kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 著効				2004/11/18 ~ 2004/11/26 (9日間)
	用法: 総合:				8.00mg/日 (2x) → 坐剤 外用
269	小児専門C	神経科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		女 10歳 9ヶ月
	安全性: 有効性:				~
	用法: 総合:				坐剤 外用
270	小児専門C	神経科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		男 11歳 4ヶ月 H: 135.0cm W: 29.6kg 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 著効				~
	用法: 総合:				10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
271	小児専門C		小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		男 12歳 1ヶ月
	安全性: 有効性:				~
	用法: 総合:				坐剤 外用
272	小児専門C	神経科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		男 12歳 5ヶ月 H: 149.1cm W: 38.3kg 外来・継続中
	安全性: 特になし 有効性: 著効				~
	用法: 総合:				10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
273	小児専門C	麻酔科	適応外使用	麻酔前投薬	男 0歳 6ヶ月 H: 66.2cm W: 7.8kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 著効				2004/11/16 ~ 2004/11/16 (1日間)
	用法: 麻酔前投薬 総合:				4.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
274	小児専門C	麻酔科	適応外使用	麻酔前投薬	女 0歳 7ヶ月 H: 63.7cm W: 5.7kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 有効				2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間)
	用法: 麻酔前投薬 総合:				4.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用
275	小児専門C	麻酔科	適応外使用	麻酔前投薬	女 0歳 11ヶ月 H: 68.3cm W: 6.3kg 入院・投与終了
	安全性: 特になし 有効性: 有効				2004/11/08 ~ 2004/11/08 (1日間)
	用法: 麻酔前投薬 総合:				4.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用

No	施設名 診療科 対象疾患			適応外使用の実病名	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
276	小児専門C	麻酔科	適応外使用	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 著効 用法: 麻酔前投薬 総合:				女 1歳 8ヶ月 H: 80.3cm W: 9.8kg 入院・投与終了 2004/12/01 ~ 2004/12/01 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
277	小児専門C	麻酔科	適応外使用	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 麻酔前投薬 総合:				男 2歳 0ヶ月 H: 85.8cm W: 11.3kg 入院・投与終了 2004/11/17 ~ 2004/11/17 (1日間) 6.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
278	小児専門C	麻酔科	適応外使用	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 著効 用法: 麻酔前投薬 総合:				女 3歳 6ヶ月 H: 96.5cm W: 14.1kg 入院・投与終了 2004/11/30 ~ 2004/11/30 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
279	小児専門C	麻酔科	適応外使用	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 著効 用法: 麻酔前投薬 総合:				男 4歳 3ヶ月 H: 94.7cm W: 14.5kg 入院・投与終了 2004/11/11 ~ 2004/11/11 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
280	小児専門C (総合診療科)		適応外使用	心身症における身体症状並びに不安・緊張・抑うつ		
	安全性: 特になし 有効性: やや有効 用法: 0.5mg/kg/回を1日2回投与 総合:				男 4歳 10ヶ月 H: 97.2cm W: 13.1kg 入院・投与終了 2004/11/18 ~ 2004/11/26 (9日間) 12.00mg/日 (2x) → 坐剤 外用	
281	小児専門C	麻酔科	適応外使用	麻酔前投薬		
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 麻酔前投薬 総合:				男 7歳 3ヶ月 H: 118.0cm W: 19.4kg 入院・投与終了 2004/11/29 ~ 2004/11/29 (1日間) 10.00mg/日 (1x) → 坐剤 外用	
282	小児専門C	神経科	適応外使用	筋緊張の軽減:(脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛)		
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				女 8歳 1ヶ月 ~ → 坐剤 外用	
283	小児専門D	小児科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善			
	安全性: 不明または未判定 有効性: 不明または未判定 用法: 11/4mg 頓用 総合:				男 0歳 11ヶ月 W: 10.0kg 外来・継続中 2004/11/09 ~ → 坐剤 外用	
284	小児専門D	神経科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善			
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 11/4mg 頓用 総合:				男 1歳 1ヶ月 W: 10.6kg 外来・継続中 ~ → 坐剤 外用	
285	小児専門D	神経科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善			
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 11/4mg 頓用 総合:				女 1歳 9ヶ月 W: 9.7kg 外来・継続中 2004-07-31 ~ → 坐剤 外用	
286	小児専門D	神経科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善			
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 11/4mg 頓用 総合:				女 2歳 1ヶ月 H: 79.2cm W: 9.5kg 外来・継続中 2001-08-31 ~ → 坐剤 外用	

処方実績調査データ

ジアゼパム坐剤

No	施設名 診療科		対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景	
	用法・用量／総合コメント				投与量・剤型・投与経路	
287	小児専門D	小児科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		男 2歳 1ヶ月 H: 84.5cm W: 12.0kg 外来・	2004/11/05 ~ → 坐剤 外用
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 1回4mg 頓用 総合: 投与継続するかは不明					
288	小児専門D	小児科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		男 3歳 0ヶ月 W: 13.0kg 外来・投与終了 2004/11/07 ~ 2004/11/07 (1日間)	→ 坐剤 外用
	安全性: 不明または未判定 有効性: 不明または未判定 用法: 1回6mg 頓用 総合: 当直帯で来院し、来院時すでにけいれんは治まっていた。予防のため使用し、その後帰宅したため有効性未判定。					
289	小児専門D	小児科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		男 3歳 3ヶ月 H: 86.3cm W: 9.9kg 外来・	2003/08/28 ~ → 坐剤 外用
	安全性: 不明または未判定 有効性: 不明または未判定 用法: 1回4mg 頓用 総合:					
290	小児専門D	循環器科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		女 4歳 2ヶ月 H: 92.6cm W: 10.9kg 外来・継続中 2004/10/27 ~	→ 坐剤 外用
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 1回6mg 頓用 総合:					
291	小児専門D	小児科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		女 4歳 4ヶ月 W: 18.7kg 外来・投与終了 2004/11/02 ~ 2004/11/02 (1日間)	→ 坐剤 外用
	安全性: 特になし 有効性: 著効 用法: 1回10mg 頓用 総合:					
292	小児専門D	神経科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		男 5歳 6ヶ月 H: 105.5cm W: 19.5kg 外来・ ~	→ 坐剤 外用
	安全性: 不明または未判定 有効性: 不明または未判定 用法: 1回6mg 頓用 総合: 以前熱性けいれんを起こしたことがあるため、母親からの要望により処方。投与継続に関して、医師は年齢的にそろそろ終了時期と考えている。					
293	小児専門D	神経科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		男 5歳 8ヶ月 H: 105.0cm W: 22.0kg 外来・継続中 2004/08/24 ~	→ 坐剤 外用
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 1回10mg 頓用 総合: 2002年6月4日から1回6mg投与					
294	小児専門D	神経科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		男 5歳 10ヶ月 W: 10.5kg 外来・継続中 1999/02/20 ~	→ 坐剤 外用
	安全性: 副作用あり: 概要を記載 有効性: 有効 用法: 1回4mg 頓用 総合:					
295	小児専門D	神経科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		女 9歳 7ヶ月 外来・継続中 2003/05/06 ~	→ 坐剤 外用
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 1回10mg 頓用 総合: 1998年3月22日から1回6mg投与					
296	小児専門D	神経科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		女 10歳 3ヶ月 H: 129.6cm W: 38.1kg 外来・継続中 1998/07/24 ~	→ 坐剤 外用
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 1回10mg 頓用 総合: 1998年6月28日から1回6mg投与					
297	小児専門D	小児科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		男 11歳 2ヶ月 W: 15.0kg 外来・継続中 2003/11/07 ~	→ 坐剤 外用
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 1回6mg 頓用 総合: 1996年7月18日から1回4mg投与					

処方実績調査データ

ジアゼパム坐剤

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路
298	小児専門D	神経科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		男 11歳 9ヶ月 H: 95.0cm W: 9.1kg 外来・継続中 2003/07/08 ~ → 坐剤 外用
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 1回4mg 頓用 総合: 1996年7月29日から1回2mg1日2回投与				
299	小児専門D	小児科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		女 12歳 1ヶ月 W: 21.0kg 外来・継続中 ~ → 坐剤 外用
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 1回10mg 頓用 総合:				
300	小児専門D	神経科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		男 13歳 11ヶ月 H: 146.9cm W: 40.6kg 外来・継続中 1994/12/16 ~ → 坐剤 外用
	安全性: 特になし 有効性: 有効 用法: 1回10mg 頓用 総合: 1993年6月10日から1回6mg投与				
301	小児専門D	腎臓科	適応外使用 レッシュナイン症候群(興奮による自傷行為を抑制するため)	その他	男 6歳 0ヶ月 W: 13.0kg 外来・継続中 ~ → 坐剤 外用
	安全性: 特になし 有効性: やや有効 用法: 1回6mg 頓用 総合: 投与開始時期 2000年9月ごろ 1回4mg投与				
302	小児専門E		小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		男 0歳 6ヶ月 ~ → 坐剤 外用
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				
303	小児専門E		小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		男 0歳 8ヶ月 ~ → 坐剤 外用
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				
304	小児専門E		小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		男 0歳 10ヶ月 ~ → 坐剤 外用
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				
305	小児専門E		小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		女 0歳 11ヶ月 ~ → 坐剤 外用
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				
306	小児専門E		小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		男 0歳 11ヶ月 ~ → 坐剤 外用
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				
307	小児専門E		小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		男 1歳 3ヶ月 ~ → 坐剤 外用
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				
308	小児専門E		小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善		男 1歳 3ヶ月 ~ → 坐剤 外用
	安全性: 有効性: 用法: 総合:				

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景	
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量	剤型・投与経路
309	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				男	1歳 4ヶ月
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				~	→
総合:					坐剤 外用	
310	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				男	1歳 5ヶ月
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				~	→
総合:					坐剤 外用	
311	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				男	1歳 8ヶ月
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				~	→
総合:					坐剤 外用	
312	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				男	1歳 11ヶ月
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				~	→
総合:					坐剤 外用	
313	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				男	2歳 1ヶ月
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				~	→
総合:					坐剤 外用	
314	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				女	2歳 1ヶ月
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				~	→
総合:					坐剤 外用	
315	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				男	2歳 10ヶ月
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				~	→
総合:					坐剤 外用	
316	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				男	3歳 2ヶ月
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				~	→
総合:					坐剤 外用	
317	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				男	3歳 3ヶ月
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				~	→
総合:					坐剤 外用	
318	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				男	3歳 3ヶ月
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				~	→
総合:					坐剤 外用	
319	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				男	3歳 4ヶ月
	安全性:					
	有効性:					
	用法:				~	→
総合:					坐剤 外用	

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景
	安全性/有効性 用法・用量/総合コメント				投与量・剤型・投与経路
320	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				女 3歳 5ヶ月
	安全性:				~ → 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
321	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				男 3歳 6ヶ月
	安全性:				~ → 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
322	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				女 4歳 3ヶ月
	安全性:				~ → 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
323	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				男 4歳 3ヶ月
	安全性:				~ → 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
324	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				女 5歳 6ヶ月
	安全性:				~ → 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
325	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				女 5歳 8ヶ月
	安全性:				~ → 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
326	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				男 5歳 8ヶ月
	安全性:				~ → 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
327	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				男 6歳 10ヶ月
	安全性:				~ → 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
328	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				女 7歳 11ヶ月
	安全性:				~ → 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
329	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				男 8歳 10ヶ月
	安全性:				~ → 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					
330	小児専門E 小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善				男 9歳 9ヶ月
	安全性:				~ → 坐剤 外用
	有効性:				
	用法:				
総合:					

処方実績調査データ

ジアゼパム坐剤

No	施設名	診療科	対象疾患	適応外使用の実病名	患者背景 投与量・剤型・投与経路
331	小児専門E			小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善	
	安全性:				男 10歳 10ヶ月
	有効性:				~
	用法:				~
総合:				坐剤 外用	
332	小児専門E			小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善	
	安全性:				男 11歳 0ヶ月
	有効性:				~
	用法:				~
総合:				坐剤 外用	
333	小児専門E			小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善	
	安全性:				女 14歳 4ヶ月
	有効性:				~
	用法:				~
総合:				坐剤 外用	
334	小児専門E			小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善	
	安全性:				男 16歳 5ヶ月
	有効性:				~
	用法:				~
総合:				坐剤 外用	
335	小児専門F		小児科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善	
	安全性: 不明または未判定				男 0歳 7ヶ月
	有効性: 不明または未判定				W: 13.0kg 外来・
	用法: 1回6mg 2回分				~
総合:				坐剤 外用	
336	小児専門F		小児科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善	
	安全性:				男 0歳 11ヶ月
	有効性:				W: 7.8kg 外来・
	用法: 1回3mg 3回分				2004/11/11 ~
総合:				坐剤 外用	
337	小児専門F		小児科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善	
	安全性:				女 1歳 2ヶ月
	有効性:				W: 11.0kg 外来・
	用法: 1回4mg 2回分				~
総合:				坐剤 外用	
338	小児専門F		小児科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善	
	安全性:				男 1歳 3ヶ月
	有効性:				W: 11.3kg 外来・
	用法: 1回4mg 5回分				2004/11/20 ~
総合:				坐剤 外用	
339	小児専門F		小児科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善	
	安全性:				男 1歳 4ヶ月
	有効性:				W: 10.0kg 外来・
	用法: 1回4mg 5回分				~
総合:				坐剤 外用	
340	小児専門F		小児科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善	
	安全性:				女 1歳 8ヶ月
	有効性:				W: 8.0kg 外来・
	用法: 1回4mg 2回分				2004/11/21 ~
総合:				坐剤 外用	
341	小児専門F		小児科	小児に対する熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善	
	安全性:				女 1歳 8ヶ月
	有効性:				W: 8.0kg 外来・
	用法: 1回4mg 4回分				2004/11/21 ~
総合:				坐剤 外用	