

表3 BMIの状況(性・年齢階級別)

年齢階級	総数	やせ (<18.5)	普通(18.5-25)	軽度肥満(25-30)	肥満(30kg/m ² ≦)	人(%)
男						
-29歳	38 (100.0)	6 (15.8)	21 (55.3)	9 (23.7)	2 (5.3)	
30-39	80 (100.0)	2 (2.5)	46 (57.5)	27 (33.8)	5 (6.3)	
40-44	114 (100.0)	4 (3.5)	78 (68.4)	27 (23.7)	5 (4.4)	
45-49	145 (100.0)	2 (1.4)	90 (62.1)	46 (31.7)	7 (4.8)	
50-54	286 (100.0)	2 (0.7)	166 (58.0)	108 (37.8)	10 (3.5)	
55-59	316 (100.0)	4 (1.3)	178 (56.3)	114 (36.1)	20 (6.3)	
60-64	585 (100.0)	9 (1.5)	347 (59.3)	208 (35.6)	21 (3.6)	
65-69	792 (100.0)	18 (2.3)	494 (62.4)	259 (32.7)	21 (2.7)	
70-74	705 (100.0)	17 (2.4)	450 (63.8)	215 (30.5)	23 (3.3)	
75-79	470 (100.0)	18 (3.8)	303 (64.5)	140 (29.8)	9 (1.9)	
80歳以上	143 (100.0)	8 (5.6)	106 (74.1)	29 (20.3)	0 (0.0)	
計	3,674 (100.0)	90 (2.4)	2,279 (62.0)	1,182 (32.2)	123 (3.3)	

年齢階級	総数	やせ (<18.5)	普通(18.5-25)	軽度肥満(25-30)	肥満(30kg/m ² ≦)	人(%)
女						
-29歳	100 (100.0)	15 (15.0)	71 (71.0)	7 (7.0)	7 (7.0)	
30-39	299 (100.0)	28 (9.4)	212 (70.9)	48 (16.1)	11 (3.7)	
40-44	279 (100.0)	17 (6.1)	189 (67.7)	63 (22.6)	10 (3.6)	
45-49	434 (100.0)	18 (4.1)	296 (68.2)	98 (22.6)	22 (5.1)	
50-54	731 (100.0)	17 (2.3)	500 (68.4)	175 (23.9)	39 (5.3)	
55-59	859 (100.0)	23 (2.7)	515 (60.0)	275 (32.0)	46 (5.4)	
60-64	1,222 (100.0)	31 (2.5)	725 (59.3)	401 (32.8)	65 (5.3)	
65-69	1,258 (100.0)	34 (2.7)	712 (56.6)	436 (34.7)	76 (6.0)	
70-74	997 (100.0)	33 (3.3)	572 (57.4)	330 (33.1)	62 (6.2)	
75-79	510 (100.0)	23 (4.5)	282 (55.3)	175 (34.3)	30 (5.9)	
80歳以上	172 (100.0)	6 (3.5)	106 (61.6)	53 (30.8)	7 (4.1)	
計	6,861 (100.0)	245 (3.6)	4,180 (60.9)	2,061 (30.0)	375 (5.5)	

表4 BMIの平均値、標準偏差および分布(性・年齢階級別)

年齢階級	男						女						kg/m ²		
	人数	平均値(SD)	パーセンタイル					人数	平均値(SD)	パーセンタイル					
			5	25	50	75	95			5	25	50		75	95
29歳以下	38	22.6 (3.9)	16.5	19.5	22.3	25.8	30.3	100	21.6 (4.4)	17.0	19.3	20.5	22.3	31.5	
30-39	80	24.2 (3.8)	19.1	21.4	23.9	26.6	32.1	299	22.1 (3.4)	17.6	19.7	21.5	23.7	29.3	
40-44	114	23.7 (3.1)	18.8	21.9	23.7	25.4	30.0	279	23.1 (3.6)	18.3	20.7	22.5	25.1	29.3	
45-49	145	24.5 (3.1)	20.0	22.3	24.1	26.0	29.9	434	23.5 (3.7)	18.6	20.9	23.0	25.5	30.1	
50-54	286	24.4 (2.8)	19.9	22.3	24.4	26.4	29.4	731	23.7 (3.4)	19.0	21.4	23.3	25.4	30.1	
55-59	316	24.7 (3.2)	20.1	22.5	24.4	26.5	30.7	859	24.1 (3.3)	19.3	21.8	23.8	26.1	30.4	
60-64	585	24.3 (3.0)	19.6	22.3	24.2	26.2	29.5	1,222	24.2 (3.4)	19.3	21.9	24.0	26.3	30.1	
65-69	792	24.0 (2.8)	19.6	22.1	24.0	25.9	29.0	1,258	24.4 (3.4)	19.3	22.1	24.1	26.4	30.2	
70-74	705	23.8 (2.9)	19.4	21.9	23.7	25.7	28.7	997	24.2 (3.4)	19.1	21.9	24.1	26.4	30.3	
75-79	470	23.6 (3.1)	18.6	21.6	23.7	25.5	28.9	510	24.3 (3.6)	18.7	21.8	24.1	26.7	30.3	
80歳以上	143	23.0 (2.7)	18.3	21.1	22.9	24.5	27.4	172	24.1 (3.9)	18.9	21.5	24.1	25.9	29.6	
計	3,674	24.0 (3.0)	19.4	22.0	23.9	25.9	29.3	6,861	24.0 (3.5)	18.9	21.5	23.7	26.1	30.1	

表5 血圧の状況 (当日服薬者除く, 性・年齢階級別)

年齢階級	男							人 (%)
	総数	至適血圧	正常血圧	正常高値血圧	軽症高血圧	中等症高血圧	重症高血圧	
-29歳	38 (100.0)	26 (68.4)	7 (18.4)	5 (13.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39	79 (100.0)	48 (60.8)	10 (12.7)	10 (12.7)	8 (10.1)	2 (2.5)	1 (1.3)	1 (1.3)
40-44	109 (100.0)	60 (55.0)	19 (17.4)	18 (16.5)	9 (8.3)	3 (2.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
45-49	134 (100.0)	57 (42.5)	29 (21.6)	22 (16.4)	20 (14.9)	4 (3.0)	2 (1.5)	2 (1.5)
50-54	267 (100.0)	97 (36.3)	55 (20.6)	40 (15.0)	53 (19.9)	12 (4.5)	10 (3.7)	10 (3.7)
55-59	285 (100.0)	99 (34.7)	51 (17.9)	45 (15.8)	70 (24.6)	16 (5.6)	4 (1.4)	4 (1.4)
60-64	482 (100.0)	168 (34.9)	93 (19.3)	59 (12.2)	114 (23.7)	38 (7.9)	10 (2.1)	10 (2.1)
65-69	650 (100.0)	182 (28.0)	111 (17.1)	122 (18.8)	165 (25.4)	58 (8.9)	12 (1.8)	12 (1.8)
70-74	558 (100.0)	122 (21.9)	107 (19.2)	93 (16.7)	173 (31.0)	50 (9.0)	13 (2.3)	13 (2.3)
75-79	374 (100.0)	78 (20.9)	81 (21.7)	68 (18.2)	112 (29.9)	27 (7.2)	8 (2.1)	8 (2.1)
80歳以上	106 (100.0)	21 (19.8)	14 (13.2)	23 (21.7)	32 (30.2)	12 (11.3)	4 (3.8)	4 (3.8)
計	3,082 (100.0)	958 (31.1)	577 (18.7)	505 (16.4)	756 (24.5)	222 (7.2)	64 (2.1)	64 (2.1)

年齢階級	女							人 (%)
	総数	至適血圧	正常血圧	正常高値血圧	軽症高血圧	中等症高血圧	重症高血圧	
-29歳	98 (100.0)	91 (92.9)	6 (6.1)	1 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39	298 (100.0)	266 (89.3)	18 (6.0)	3 (1.0)	9 (3.0)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)
40-44	276 (100.0)	210 (76.1)	30 (10.9)	24 (8.7)	10 (3.6)	2 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
45-49	414 (100.0)	287 (69.3)	59 (14.3)	35 (8.5)	27 (6.5)	6 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
50-54	676 (100.0)	395 (58.4)	99 (14.6)	71 (10.5)	83 (12.3)	22 (3.3)	6 (0.9)	6 (0.9)
55-59	753 (100.0)	390 (51.8)	122 (16.2)	107 (14.2)	106 (14.1)	23 (3.1)	5 (0.7)	5 (0.7)
60-64	1,043 (100.0)	450 (43.1)	189 (18.1)	170 (16.3)	186 (17.8)	41 (3.9)	7 (0.7)	7 (0.7)
65-69	1,010 (100.0)	315 (31.2)	174 (17.2)	207 (20.5)	252 (25.0)	48 (4.8)	14 (1.4)	14 (1.4)
70-74	762 (100.0)	232 (30.4)	130 (17.1)	158 (20.7)	200 (26.2)	32 (4.2)	10 (1.3)	10 (1.3)
75-79	363 (100.0)	103 (28.4)	74 (20.4)	61 (16.8)	85 (23.4)	30 (8.3)	10 (2.8)	10 (2.8)
80歳以上	120 (100.0)	28 (23.3)	23 (19.2)	22 (18.3)	30 (25.0)	14 (11.7)	3 (2.5)	3 (2.5)
計	5,813 (100.0)	2,767 (47.6)	924 (15.9)	859 (14.8)	988 (17.0)	219 (3.8)	56 (1.0)	56 (1.0)

※連続2回測定の平均値

表6 最高血圧の平均値、標準偏差および分布（当日服薬者除く、性・年齢階級別）

年齢階級	パーセンタイル					人数	平均値 (SD)	パーセンタイル						
	mmHg							mmHg						
	5	25	50	75	95			5	25	50	75	95		
29歳以下	38	113.9 (11.6)	96.4	104.0	112.0	123.1	133.6	98	101.2 (10.9)	84.9	93.9	101.5	106.0	122.6
30-39	79	119.5 (18.3)	96.0	107.5	114.0	130.0	159.5	298	105.4 (13.0)	88.0	96.9	104.0	111.5	129.0
40-44	109	120.0 (14.9)	95.8	110.5	117.0	131.3	150.0	276	110.9 (14.1)	91.0	100.5	108.5	119.5	137.6
45-49	134	123.7 (16.3)	101.3	110.0	122.3	134.1	154.9	414	114.3 (15.6)	94.0	103.0	112.0	122.5	147.0
50-54	267	128.0 (19.5)	101.0	113.5	125.5	139.5	164.9	676	118.8 (19.7)	92.4	104.5	115.0	130.0	156.5
55-59	285	128.2 (19.6)	99.2	114.0	127.0	143.0	160.5	753	121.2 (18.8)	94.5	107.8	118.5	132.5	156.8
60-64	482	128.9 (19.8)	100.0	114.5	127.0	142.1	163.9	1,043	124.5 (19.3)	96.0	110.0	123.0	137.0	158.0
65-69	650	132.2 (19.8)	102.0	117.5	131.0	145.5	165.5	1,010	129.9 (19.2)	99.5	116.5	130.0	142.5	161.2
70-74	558	135.5 (20.2)	105.5	120.5	134.3	150.0	170.0	762	130.6 (19.2)	101.0	116.5	130.8	143.5	161.0
75-79	374	134.4 (19.4)	101.9	121.9	133.0	148.0	164.0	363	133.2 (21.1)	101.5	118.0	129.5	147.0	172.5
80歳以上	106	138.7 (20.1)	109.2	121.0	137.0	152.5	177.0	120	136.0 (20.6)	105.0	120.0	133.8	150.5	171.9
計	3,082	130.7 (19.9)	101.0	115.5	128.8	144.5	164.0	5,813	123.2 (20.2)	94.5	108.0	120.5	136.5	159.0

※連続2回測定 of 平均値

表7 最低血圧の平均値、標準偏差および分布（当日服薬者除く、性・年齢階級別）

年齢階級	パーセンタイル					人数	平均値 (SD)	パーセンタイル						
	mmHg							mmHg						
	5	25	50	75	95			5	25	50	75	95		
29歳以下	38	64.1 (7.9)	51.4	57.0	65.0	68.8	82.6	98	59.3 (7.3)	48.5	54.0	57.8	65.5	73.5
30-39	79	72.4 (12.3)	57.5	63.5	69.5	78.5	95.5	298	63.2 (9.7)	51.5	56.5	61.5	68.1	80.5
40-44	109	75.1 (10.2)	58.5	68.3	75.0	82.5	90.5	276	66.9 (10.3)	53.0	59.0	64.8	73.0	87.5
45-49	134	77.6 (10.6)	60.9	70.8	76.5	83.5	97.1	414	69.8 (10.3)	54.5	62.5	69.0	75.5	89.6
50-54	267	80.9 (12.5)	63.5	71.5	80.5	89.0	102.5	676	72.4 (11.6)	55.4	63.5	71.5	80.5	92.5
55-59	285	80.9 (12.1)	64.2	72.0	80.0	89.5	99.4	753	73.5 (11.1)	56.0	65.3	72.5	81.0	93.0
60-64	482	80.4 (11.7)	63.0	72.0	78.8	88.5	101.0	1,043	74.7 (10.8)	57.5	67.0	74.5	82.0	93.4
65-69	650	80.1 (10.8)	64.0	72.5	80.0	87.1	99.0	1,010	75.9 (10.6)	59.0	68.0	75.5	83.0	94.0
70-74	558	79.2 (10.7)	63.0	72.0	79.0	86.0	97.0	762	75.1 (10.3)	58.1	68.0	75.5	82.5	90.5
75-79	374	77.6 (10.5)	59.8	70.5	78.0	84.0	95.1	363	74.7 (10.8)	57.0	67.5	74.0	82.0	93.4
80歳以上	106	77.7 (10.3)	62.0	71.0	77.5	83.8	96.6	120	74.4 (10.0)	58.0	66.4	74.0	82.4	91.5
計	3,082	79.1 (11.4)	62.0	71.0	78.5	86.5	98.0	5,813	73.0 (11.3)	55.5	64.5	72.5	80.5	92.0

※連続2回測定 of 平均値

表8 脈拍数の状況(当日服薬者除く、性・年齢階級別)

年齢階級	総数					人 (%)				
	-59	60-69	70-79	80-89	90-99	100bpm以上				
男										
-29歳	38 (100.0)	9 (23.7)	15 (39.5)	9 (23.7)	1 (2.6)	1 (2.6)				
30-39	79 (100.0)	29 (36.7)	19 (24.1)	13 (16.5)	5 (6.3)	1 (1.3)				
40-44	109 (100.0)	37 (33.9)	34 (31.2)	17 (15.6)	4 (3.7)	3 (2.8)				
45-49	133 (100.0)	43 (32.3)	37 (27.8)	20 (15.0)	3 (2.3)	4 (3.0)				
50-54	267 (100.0)	91 (34.1)	84 (31.5)	29 (10.9)	13 (4.9)	3 (1.1)				
55-59	285 (100.0)	75 (26.3)	70 (24.6)	31 (10.9)	7 (2.5)	4 (1.4)				
60-64	482 (100.0)	118 (24.5)	120 (24.9)	39 (8.1)	19 (3.9)	9 (1.9)				
65-69	650 (100.0)	178 (27.4)	170 (26.2)	47 (7.2)	28 (4.3)	7 (1.1)				
70-74	558 (100.0)	144 (25.8)	131 (23.5)	51 (9.1)	18 (3.2)	5 (0.9)				
75-79	374 (100.0)	80 (21.4)	93 (24.9)	40 (10.7)	12 (3.2)	9 (2.4)				
80歳以上	106 (100.0)	19 (17.9)	25 (23.6)	11 (10.4)	5 (4.7)	2 (1.9)				
計	3,081 (100.0)	716 (23.2)	1,097 (35.6)	307 (10.0)	115 (3.7)	48 (1.6)				

年齢階級	総数					人 (%)				
	-59	60-69	70-79	80-89	90-99	100bpm以上				
女										
-29歳	97 (100.0)	19 (19.6)	34 (35.1)	26 (26.8)	6 (6.2)	9 (9.3)				
30-39	298 (100.0)	78 (26.2)	108 (36.2)	67 (22.5)	20 (6.7)	12 (4.0)				
40-44	276 (100.0)	91 (33.0)	98 (35.5)	50 (18.1)	15 (5.4)	6 (2.2)				
45-49	414 (100.0)	27 (6.5)	153 (37.0)	58 (14.0)	27 (6.5)	14 (3.4)				
50-54	676 (100.0)	56 (8.3)	243 (35.9)	102 (15.1)	28 (4.1)	16 (2.4)				
55-59	753 (100.0)	78 (10.4)	251 (33.3)	113 (15.0)	44 (5.8)	7 (0.9)				
60-64	1,043 (100.0)	114 (10.9)	346 (33.2)	134 (12.8)	51 (4.9)	26 (2.5)				
65-69	1,009 (100.0)	117 (11.6)	338 (33.5)	153 (15.2)	65 (6.4)	16 (1.6)				
70-74	762 (100.0)	84 (11.0)	254 (33.3)	99 (13.0)	38 (5.0)	14 (1.8)				
75-79	363 (100.0)	29 (8.0)	111 (30.6)	78 (21.5)	25 (6.9)	6 (1.7)				
80歳以上	120 (100.0)	5 (4.2)	48 (40.0)	28 (23.3)	5 (4.2)	4 (3.3)				
計	5,811 (100.0)	542 (9.3)	1,922 (33.1)	908 (15.6)	324 (5.6)	130 (2.2)				

※連続2回測定の平均値

表9 脈拍数の平均値、標準偏差および分布（当日服薬者除く、性・年齢階級別）

年齢階級	男											女										
	パーセンタイル						平均値 (SD)	パーセンタイル						平均値 (SD)	パーセンタイル							
	人数	5	25	50	75	95		人数	5	25	50	75	95									
29歳以下	38	74.3 (10.9)	53.0	67.5	73.8	81.1	91.8	97	78.6 (12.2)	60.5	70.3	77.5	85.8	104.5								
30-39	79	71.4 (11.5)	54.0	64.0	69.5	78.5	94.0	298	76.3 (11.5)	60.0	68.5	75.3	82.5	98.0								
40-44	109	72.1 (10.9)	57.5	64.3	71.0	78.3	94.0	276	74.0 (10.7)	58.4	66.5	72.5	80.4	93.5								
45-49	133	70.1 (11.6)	54.0	61.3	69.0	77.8	93.4	414	74.2 (12.3)	57.8	66.0	72.0	79.5	95.3								
50-54	267	70.5 (11.3)	54.2	63.5	69.5	76.5	91.5	676	73.0 (11.3)	58.0	65.5	71.0	78.0	92.5								
55-59	285	68.0 (11.8)	52.0	59.5	66.0	75.5	87.1	753	72.3 (10.5)	57.5	65.0	71.5	78.5	91.7								
60-64	482	68.2 (11.7)	52.5	60.0	66.5	74.5	91.4	1,043	72.0 (11.5)	56.5	64.0	71.0	77.5	93.0								
65-69	650	67.5 (11.8)	51.5	59.0	66.0	74.5	90.0	1,009	72.3 (11.4)	55.5	64.8	71.0	78.5	93.5								
70-74	558	67.2 (11.2)	51.5	59.5	65.5	74.0	88.0	762	72.1 (11.0)	55.5	65.0	71.0	78.0	92.0								
75-79	374	68.8 (12.1)	52.4	60.5	67.5	74.6	90.5	363	73.9 (11.5)	57.5	65.0	72.5	81.5	94.4								
80歳以上	106	69.5 (11.3)	54.9	62.4	67.3	75.3	92.5	120	75.3 (11.3)	60.0	67.5	75.8	81.0	93.9								
計	3,081	68.6 (11.7)	52.5	60.0	67.0	75.0	90.0	5,811	73.0 (11.4)	57.0	65.5	71.5	79.0	93.5								

※連続2回測定の平均値

表10 家族歴の状況 (性・年齢階級別)

年齢階級	総数	家族歴ありと答えた者					脳卒中	高脂血症	糖尿病
		がん	心筋梗塞	心臓病	脳卒中	高脂血症			
-29歳	38	8 (21.1)	1 (2.6)	4 (10.5)	5 (13.2)	2 (5.3)	6 (15.8)		
30-39	80	29 (36.3)	4 (5.0)	5 (6.3)	17 (21.3)	2 (2.5)	11 (13.8)		
40-44	114	43 (37.7)	7 (6.1)	8 (7.0)	22 (19.3)	4 (3.5)	18 (15.8)		
45-49	145	45 (31.0)	13 (9.0)	11 (7.6)	41 (28.3)	4 (2.8)	16 (11.0)		
50-54	286	98 (34.3)	19 (6.6)	21 (7.3)	81 (28.3)	5 (1.7)	44 (15.4)		
55-59	317	127 (40.1)	21 (6.6)	16 (5.0)	80 (25.2)	2 (0.6)	38 (12.0)		
60-64	585	205 (35.0)	38 (6.5)	33 (5.6)	151 (25.8)	13 (2.2)	68 (11.6)		
65-69	793	265 (33.4)	33 (4.2)	39 (4.9)	227 (28.6)	6 (0.8)	64 (8.1)		
70-74	705	205 (29.1)	32 (4.5)	26 (3.7)	185 (26.2)	6 (0.9)	64 (9.1)		
75-79	470	140 (29.8)	29 (6.2)	13 (2.8)	112 (23.8)	3 (0.6)	32 (6.8)		
80歳以上	143	33 (23.1)	6 (4.2)	4 (2.8)	40 (28.0)	3 (2.1)	3 (2.1)		
計	3,676	1,198 (32.6)	203 (5.5)	180 (4.9)	961 (26.1)	50 (1.4)	364 (9.9)		

男

年齢階級	総数	家族歴ありと答えた者					脳卒中	高脂血症	糖尿病
		がん	心筋梗塞	心臓病	脳卒中	高脂血症			
-29歳	100	38 (38.0)	9 (9.0)	6 (6.0)	14 (14.0)	7 (7.0)	24 (24.0)		
30-39	299	125 (41.8)	22 (7.4)	15 (5.0)	64 (21.4)	11 (3.7)	68 (22.7)		
40-44	279	114 (40.9)	28 (10.0)	19 (6.8)	64 (22.9)	11 (3.9)	53 (19.0)		
45-49	434	176 (40.6)	36 (8.3)	29 (6.7)	107 (24.7)	13 (3.0)	71 (16.4)		
50-54	731	329 (45.0)	62 (8.5)	55 (7.5)	203 (27.8)	16 (2.2)	132 (18.1)		
55-59	860	338 (39.3)	75 (8.7)	63 (7.3)	259 (30.1)	21 (2.4)	108 (12.6)		
60-64	1,222	452 (37.0)	100 (8.2)	80 (6.5)	355 (29.1)	17 (1.4)	145 (11.9)		
65-69	1,258	432 (34.3)	74 (5.9)	68 (5.4)	361 (28.7)	15 (1.2)	123 (9.8)		
70-74	999	308 (30.8)	73 (7.3)	40 (4.0)	252 (25.2)	6 (0.6)	95 (9.5)		
75-79	512	159 (31.1)	31 (6.1)	30 (5.9)	131 (25.6)	5 (1.0)	40 (7.8)		
80歳以上	173	43 (24.9)	11 (6.4)	9 (5.2)	40 (23.1)	0 (0.0)	16 (9.2)		
計	6,867	2,514 (36.6)	521 (7.6)	414 (6.0)	1,850 (26.9)	122 (1.8)	875 (12.7)		

女

表11 既往歴の状況（性・年齢階級別）

年齢階級	総数	既往ありと答えた者					人 (%)
		高血圧	狭心症	心筋梗塞	脳卒中	糖尿病	
-29歳	38	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.6)
30-39	80	1 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.3)	4 (5.0)
40-44	114	4 (3.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (2.6)	3 (2.6)
45-49	145	12 (8.3)	1 (0.7)	0 (0.0)	1 (0.7)	2 (1.4)	7 (4.8)
50-54	286	36 (12.6)	2 (0.7)	0 (0.0)	5 (1.7)	13 (4.5)	9 (3.1)
55-59	317	60 (18.9)	1 (0.3)	0 (0.0)	10 (3.2)	17 (5.4)	12 (3.8)
60-64	585	167 (28.5)	14 (2.4)	3 (0.5)	21 (3.6)	41 (7.0)	26 (4.4)
65-69	793	255 (32.2)	14 (1.8)	7 (0.9)	46 (5.8)	70 (8.8)	28 (3.5)
70-74	705	257 (36.5)	15 (2.1)	12 (1.7)	52 (7.4)	64 (9.1)	29 (4.1)
75-79	470	182 (38.7)	21 (4.5)	8 (1.7)	40 (8.5)	33 (7.0)	22 (4.7)
80歳以上	143	66 (46.2)	5 (3.5)	3 (2.1)	12 (8.4)	6 (4.2)	7 (4.9)
計	3,676	1,040 (28.3)	73 (2.0)	33 (0.9)	187 (5.1)	250 (6.8)	148 (4.0)

男

年齢階級	総数	既往ありと答えた者					人 (%)
		高血圧	狭心症	心筋梗塞	脳卒中	糖尿病	
-29歳	100	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39	299	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	4 (1.3)	3 (1.0)
40-44	279	8 (2.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	2 (0.7)	3 (1.1)
45-49	434	37 (8.5)	3 (0.7)	0 (0.0)	2 (0.5)	5 (1.2)	6 (1.4)
50-54	731	95 (13.0)	3 (0.4)	0 (0.0)	9 (1.2)	14 (1.9)	46 (6.3)
55-59	860	181 (21.0)	9 (1.0)	1 (0.1)	15 (1.7)	28 (3.3)	83 (9.7)
60-64	1,222	296 (24.2)	17 (1.4)	0 (0.0)	25 (2.0)	50 (4.1)	134 (11.0)
65-69	1,258	413 (32.8)	20 (1.6)	5 (0.4)	40 (3.2)	50 (4.0)	133 (10.6)
70-74	999	419 (41.9)	29 (2.9)	5 (0.5)	55 (5.5)	51 (5.1)	101 (10.1)
75-79	512	252 (49.2)	22 (4.3)	7 (1.4)	36 (7.0)	28 (5.5)	46 (9.0)
80歳以上	173	85 (49.1)	5 (2.9)	3 (1.7)	12 (6.9)	12 (6.9)	7 (4.0)
計	6,867	1,787 (26.0)	108 (1.6)	21 (0.3)	196 (2.9)	244 (3.6)	562 (8.2)

女

表12 喫煙の状況（性・年齢階級別）

年齢階級	総数	禁煙			現在喫煙			人 (%)	
		非喫煙		本数記載なし		-20本/日			21本/日以上
		-20本/日	21本/日以上	-20本/日	21本/日以上	-20本/日	21本/日以上		
-29歳	38 (100.0)	20 (52.6)	1 (2.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (44.7)	0 (0.0)		
30-39	80 (100.0)	30 (37.5)	13 (16.3)	3 (3.8)	0 (0.0)	25 (31.3)	9 (11.3)		
40-44	114 (100.0)	31 (27.2)	21 (18.4)	2 (1.8)	0 (0.0)	46 (40.4)	14 (12.3)		
45-49	145 (100.0)	39 (26.9)	27 (18.6)	11 (7.6)	0 (0.0)	46 (31.7)	22 (15.2)		
50-54	286 (100.0)	80 (28.0)	59 (20.6)	24 (8.4)	0 (0.0)	87 (30.4)	36 (12.6)		
55-59	317 (100.0)	129 (40.7)	54 (17.0)	29 (9.1)	0 (0.0)	80 (25.2)	25 (7.9)		
60-64	585 (100.0)	219 (37.4)	141 (24.1)	60 (10.3)	0 (0.0)	127 (21.7)	38 (6.5)		
65-69	793 (100.0)	366 (46.2)	157 (19.8)	80 (10.1)	0 (0.0)	164 (20.7)	26 (3.3)		
70-74	705 (100.0)	318 (45.1)	197 (27.9)	43 (6.1)	0 (0.0)	135 (19.1)	12 (1.7)		
75-79	470 (100.0)	187 (39.8)	174 (37.0)	37 (7.9)	0 (0.0)	71 (15.1)	1 (0.2)		
80歳以上	143 (100.0)	72 (50.3)	44 (30.8)	9 (6.3)	0 (0.0)	18 (12.6)	0 (0.0)		
計	3,676 (100.0)	1,491 (40.6)	888 (24.2)	298 (8.1)	0 (0.0)	816 (22.2)	183 (5.0)		

年齢階級	総数	禁煙			現在喫煙			人 (%)	
		非喫煙		本数記載なし		-20本/日			21本/日以上
		-20本/日	21本/日以上	-20本/日	21本/日以上	-20本/日	21本/日以上		
-29歳	100 (100.0)	71 (71.0)	12 (12.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (17.0)	0 (0.0)		
30-39	299 (100.0)	226 (75.6)	30 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	43 (14.4)	0 (0.0)		
40-44	279 (100.0)	249 (89.2)	9 (3.2)	1 (0.4)	0 (0.0)	20 (7.2)	0 (0.0)		
45-49	434 (100.0)	398 (91.7)	19 (4.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (3.9)	0 (0.0)		
50-54	731 (100.0)	691 (94.5)	14 (1.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	24 (3.3)	2 (0.3)		
55-59	860 (100.0)	833 (96.9)	6 (0.7)	1 (0.1)	0 (0.0)	18 (2.1)	2 (0.2)		
60-64	1,222 (100.0)	1,197 (98.0)	10 (0.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (1.2)	0 (0.0)		
65-69	1,258 (100.0)	1,239 (98.5)	8 (0.6)	1 (0.1)	0 (0.0)	10 (0.8)	0 (0.0)		
70-74	999 (100.0)	978 (97.9)	9 (0.9)	2 (0.2)	0 (0.0)	10 (1.0)	0 (0.0)		
75-79	512 (100.0)	506 (98.8)	2 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.6)	1 (0.2)		
80歳以上	173 (100.0)	173 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
計	6,867 (100.0)	6,561 (95.5)	119 (1.7)	5 (0.1)	0 (0.0)	177 (2.6)	5 (0.1)		

表13 飲酒の状況（性・年齢階級別）

年齢階級	総数	飲酒				2合/日以上*	人 (%)
		非飲酒	禁酒	機会飲酒	2合/日未満*		
男							
-29歳	38 (100.0)	16 (42.1)	1 (2.6)	8 (21.1)	11 (28.9)	2 (5.3)	
30-39	80 (100.0)	22 (27.5)	7 (8.8)	14 (17.5)	24 (30.0)	13 (16.3)	
40-44	114 (100.0)	18 (15.8)	0 (0.0)	9 (7.9)	40 (35.1)	47 (41.2)	
45-49	145 (100.0)	27 (18.6)	7 (4.8)	13 (9.0)	45 (31.0)	53 (36.6)	
50-54	286 (100.0)	53 (18.5)	6 (2.1)	29 (10.1)	92 (32.2)	106 (37.1)	
55-59	317 (100.0)	58 (18.3)	25 (7.9)	28 (8.8)	98 (30.9)	108 (34.1)	
60-64	585 (100.0)	120 (20.5)	48 (8.2)	46 (7.9)	204 (34.9)	167 (28.5)	
65-69	793 (100.0)	178 (22.4)	83 (10.5)	56 (7.1)	292 (36.8)	184 (23.2)	
70-74	705 (100.0)	182 (25.8)	85 (12.1)	50 (7.1)	281 (39.9)	107 (15.2)	
75-79	470 (100.0)	140 (29.8)	60 (12.8)	32 (6.8)	194 (41.3)	44 (9.4)	
80歳以上	143 (100.0)	60 (42.0)	21 (14.7)	12 (8.4)	39 (27.3)	11 (7.7)	
計	3,676 (100.0)	874 (23.8)	343 (9.3)	297 (8.1)	1,320 (35.9)	842 (22.9)	

年齢階級	総数	飲酒				2合/日以上*	人 (%)
		非飲酒	禁酒	機会飲酒	2合/日未満*		
女							
-29歳	100 (100.0)	52 (52.0)	8 (8.0)	25 (25.0)	11 (11.0)	4 (4.0)	
30-39	299 (100.0)	146 (48.8)	12 (4.0)	66 (22.1)	67 (22.4)	8 (2.7)	
40-44	279 (100.0)	164 (58.8)	7 (2.5)	56 (20.1)	46 (16.5)	6 (2.2)	
45-49	434 (100.0)	281 (64.7)	5 (1.2)	64 (14.7)	77 (17.7)	7 (1.6)	
50-54	731 (100.0)	515 (70.5)	16 (2.2)	77 (10.5)	115 (15.7)	8 (1.1)	
55-59	860 (100.0)	663 (77.1)	10 (1.2)	76 (8.8)	97 (11.3)	14 (1.6)	
60-64	1,222 (100.0)	1,000 (81.8)	15 (1.2)	74 (6.1)	121 (9.9)	12 (1.0)	
65-69	1,258 (100.0)	1,077 (85.6)	11 (0.9)	55 (4.4)	106 (8.4)	9 (0.7)	
70-74	999 (100.0)	886 (88.7)	14 (1.4)	35 (3.5)	59 (5.9)	5 (0.5)	
75-79	512 (100.0)	462 (90.2)	5 (1.0)	14 (2.7)	30 (5.9)	1 (0.2)	
80歳以上	173 (100.0)	152 (87.9)	3 (1.7)	6 (3.5)	12 (6.9)	0 (0.0)	
計	6,867 (100.0)	5,398 (78.6)	106 (1.5)	548 (8.0)	741 (10.8)	74 (1.1)	

*日本酒換算アルコール量(合)×週あたりの飲酒日数÷7として算出

表14 尿糖の状況 (性・年齢階級別)

男	年齢階級	総数				人 (%)		
		(-)	(±)	(+)	(2+)	(3+)		
	-29歳	38 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	30-39	80 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	40-44	114 (100.0)	1 (0.9)	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	45-49	145 (100.0)	1 (0.7)	2 (1.4)	2 (1.4)	1 (0.7)		
	50-54	285 (100.0)	4 (1.4)	5 (1.8)	2 (0.7)	4 (1.4)		
	55-59	316 (100.0)	3 (0.9)	2 (0.6)	5 (1.6)	10 (3.2)		
	60-64	584 (100.0)	14 (2.4)	10 (1.7)	6 (1.0)	11 (1.9)		
	65-69	789 (100.0)	16 (2.0)	15 (1.9)	14 (1.8)	18 (2.3)		
	70-74	703 (100.0)	14 (2.0)	9 (1.3)	9 (1.3)	13 (1.8)		
	75-79	468 (100.0)	18 (3.8)	9 (1.9)	4 (0.9)	4 (0.9)		
	80歳以上	138 (100.0)	8 (5.8)	3 (2.2)	2 (1.4)	0 (0.0)		
	計	3,660 (100.0)	79 (2.2)	56 (1.5)	44 (1.2)	61 (1.7)		

女	年齢階級	総数				人 (%)		
		(-)	(±)	(+)	(2+)	(3+)		
	-29歳	100 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	30-39	297 (100.0)	0 (0.0)	2 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	40-44	276 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	45-49	431 (100.0)	1 (0.2)	3 (0.7)	2 (0.5)	0 (0.0)		
	50-54	728 (100.0)	4 (0.5)	1 (0.1)	2 (0.3)	1 (0.1)		
	55-59	858 (100.0)	2 (0.2)	2 (0.2)	3 (0.3)	2 (0.2)		
	60-64	1,220 (100.0)	2 (0.2)	8 (0.7)	5 (0.4)	7 (0.6)		
	65-69	1,254 (100.0)	6 (0.5)	5 (0.4)	6 (0.5)	2 (0.2)		
	70-74	997 (100.0)	4 (0.4)	4 (0.4)	1 (0.1)	5 (0.5)		
	75-79	510 (100.0)	7 (1.4)	2 (0.4)	4 (0.8)	3 (0.6)		
	80歳以上	168 (100.0)	2 (1.2)	1 (0.6)	1 (0.6)	1 (0.6)		
	計	6,839 (100.0)	28 (0.4)	28 (0.4)	24 (0.4)	21 (0.3)		

表15 尿蛋白の状況 (性・年齢階級別)

男	年齢階級	総数				人 (%)		
		(-)	(±)	(+)	(2+)	(3+)		
	-29歳	38 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	30-39	80 (100.0)	74 (92.5)	4 (5.0)	2 (2.5)	0 (0.0)		
	40-44	114 (100.0)	114 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	45-49	145 (100.0)	141 (97.2)	2 (1.4)	1 (0.7)	1 (0.7)		
	50-54	285 (100.0)	274 (96.1)	4 (1.4)	3 (1.1)	0 (0.0)		
	55-59	316 (100.0)	302 (95.6)	9 (2.8)	3 (0.9)	2 (0.6)		
	60-64	584 (100.0)	545 (93.3)	16 (2.7)	19 (3.3)	4 (0.7)		
	65-69	789 (100.0)	733 (92.9)	29 (3.7)	17 (2.2)	7 (0.9)		
	70-74	703 (100.0)	649 (92.3)	30 (4.3)	13 (1.8)	10 (1.4)		
	75-79	468 (100.0)	425 (90.8)	18 (3.8)	20 (4.3)	4 (0.9)		
	80歳以上	138 (100.0)	118 (85.5)	10 (7.2)	7 (5.1)	3 (2.2)		
	計	3,660 (100.0)	3,413 (93.3)	118 (3.2)	88 (2.4)	33 (0.9)		

女	年齢階級	総数				人 (%)		
		(-)	(±)	(+)	(2+)	(3+)		
	-29歳	100 (100.0)	98 (98.0)	1 (1.0)	1 (1.0)	0 (0.0)		
	30-39	297 (100.0)	292 (98.3)	3 (1.0)	2 (0.7)	0 (0.0)		
	40-44	276 (100.0)	271 (98.2)	5 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	45-49	431 (100.0)	417 (96.8)	6 (1.4)	5 (1.2)	1 (0.2)		
	50-54	728 (100.0)	717 (98.5)	5 (0.7)	4 (0.5)	2 (0.3)		
	55-59	858 (100.0)	841 (98.0)	8 (0.9)	6 (0.7)	3 (0.3)		
	60-64	1,220 (100.0)	1,197 (98.1)	10 (0.8)	9 (0.7)	4 (0.3)		
	65-69	1,254 (100.0)	1,213 (96.7)	14 (1.1)	20 (1.6)	5 (0.4)		
	70-74	997 (100.0)	953 (95.6)	24 (2.4)	14 (1.4)	5 (0.5)		
	75-79	510 (100.0)	482 (94.5)	13 (2.5)	11 (2.2)	3 (0.6)		
	80歳以上	168 (100.0)	150 (89.3)	9 (5.4)	6 (3.6)	3 (1.8)		
	計	6,839 (100.0)	6,631 (97.0)	98 (1.4)	78 (1.1)	26 (0.4)		

表16 尿潜血の状況 (性・年齢階級別)

年齢階級	総数			人 (%)		
	(-)	(+)	(3+)	(-)	(+)	(3+)
男						
-29歳	38 (100.0)	2 (5.3)	0 (0.0)	36 (94.7)	2 (5.3)	0 (0.0)
30-39	80 (100.0)	3 (3.8)	0 (0.0)	77 (96.3)	3 (3.8)	0 (0.0)
40-44	114 (100.0)	6 (5.3)	0 (0.0)	108 (94.7)	6 (5.3)	0 (0.0)
45-49	145 (100.0)	6 (4.1)	1 (0.7)	132 (91.0)	6 (4.1)	1 (0.7)
50-54	285 (100.0)	14 (4.9)	0 (0.0)	267 (93.7)	14 (4.9)	0 (0.0)
55-59	316 (100.0)	24 (7.6)	0 (0.0)	290 (91.8)	24 (7.6)	0 (0.0)
60-64	584 (100.0)	49 (8.4)	2 (0.3)	530 (90.8)	49 (8.4)	2 (0.3)
65-69	789 (100.0)	62 (7.9)	2 (0.3)	721 (91.4)	62 (7.9)	2 (0.3)
70-74	703 (100.0)	58 (8.3)	2 (0.3)	642 (91.3)	58 (8.3)	2 (0.3)
75-79	468 (100.0)	57 (12.2)	1 (0.2)	408 (87.2)	57 (12.2)	1 (0.2)
80歳以上	138 (100.0)	21 (15.2)	2 (1.4)	113 (81.9)	21 (15.2)	2 (1.4)
計	3,660 (100.0)	302 (8.3)	10 (0.3)	3,244 (90.8)	302 (8.3)	10 (0.3)

年齢階級	総数			人 (%)		
	(-)	(+)	(3+)	(-)	(+)	(3+)
女*						
-29歳	88 (100.0)	2 (2.3)	0 (0.0)	85 (96.6)	2 (2.3)	0 (0.0)
30-39	250 (100.0)	11 (4.4)	1 (0.4)	237 (94.8)	11 (4.4)	1 (0.4)
40-44	251 (100.0)	22 (8.8)	0 (0.0)	226 (90.0)	22 (8.8)	0 (0.0)
45-49	393 (100.0)	54 (13.7)	3 (0.8)	324 (82.4)	54 (13.7)	3 (0.8)
50-54	709 (100.0)	88 (12.4)	3 (0.4)	605 (85.3)	88 (12.4)	3 (0.4)
55-59	858 (100.0)	122 (14.2)	2 (0.2)	716 (83.4)	122 (14.2)	2 (0.2)
60-64	1,220 (100.0)	201 (16.5)	2 (0.2)	990 (81.1)	201 (16.5)	2 (0.2)
65-69	1,254 (100.0)	275 (21.9)	7 (0.6)	943 (75.2)	275 (21.9)	7 (0.6)
70-74	997 (100.0)	212 (21.3)	4 (0.4)	757 (75.9)	212 (21.3)	4 (0.4)
75-79	510 (100.0)	125 (24.5)	2 (0.4)	366 (71.8)	125 (24.5)	2 (0.4)
80歳以上	168 (100.0)	39 (23.2)	1 (0.6)	119 (70.8)	39 (23.2)	1 (0.6)
計	6,698 (100.0)	1,151 (17.2)	25 (0.4)	5,368 (80.1)	1,151 (17.2)	25 (0.4)

*生理中の者を除く

表17 血清総コレステロールの状況 (性・年齢階級別)

年齢階級	総数							人 (%)	
	-179	180-199	200-219	220-239	240-259	260mg/dl以上			
男									
-29歳	38 (100.0)	11 (28.9)	0 (0.0)	1 (2.6)	0 (0.0)	1 (2.6)			
30-39	80 (100.0)	17 (21.3)	13 (16.3)	6 (7.5)	2 (2.5)	5 (6.3)			
40-44	114 (100.0)	26 (22.8)	21 (18.4)	13 (11.4)	9 (7.9)	1 (0.9)			
45-49	145 (100.0)	36 (24.8)	29 (20.0)	16 (11.0)	7 (4.8)	3 (2.1)			
50-54	286 (100.0)	88 (30.8)	59 (20.6)	34 (11.9)	17 (5.9)	9 (3.1)			
55-59	317 (100.0)	115 (36.3)	62 (19.6)	41 (12.9)	9 (2.8)	12 (3.8)			
60-64	585 (100.0)	235 (40.2)	117 (20.0)	65 (11.1)	19 (3.2)	11 (1.9)			
65-69	793 (100.0)	324 (40.9)	138 (17.4)	96 (12.1)	32 (4.0)	17 (2.1)			
70-74	705 (100.0)	287 (40.7)	130 (18.4)	65 (9.2)	34 (4.8)	6 (0.9)			
75-79	470 (100.0)	188 (40.0)	77 (16.4)	52 (11.1)	13 (2.8)	8 (1.7)			
80歳以上	143 (100.0)	67 (46.9)	25 (17.5)	19 (13.3)	1 (0.7)	1 (0.7)			
計	3,676 (100.0)	1,464 (39.8)	671 (18.3)	408 (11.1)	143 (3.9)	74 (2.0)			

年齢階級	総数							人 (%)	
	-179	180-199	200-219	220-239	240-259	260mg/dl以上			
女									
-29歳	100 (100.0)	17 (17.0)	9 (9.0)	5 (5.0)	1 (1.0)	0 (0.0)			
30-39	299 (100.0)	64 (21.4)	40 (13.4)	15 (5.0)	4 (1.3)	1 (0.3)			
40-44	279 (100.0)	88 (31.5)	43 (15.4)	12 (4.3)	3 (1.1)	4 (1.4)			
45-49	434 (100.0)	120 (27.6)	98 (22.6)	41 (9.4)	17 (3.9)	12 (2.8)			
50-54	731 (100.0)	152 (20.8)	172 (23.5)	122 (16.7)	79 (10.8)	55 (7.5)			
55-59	860 (100.0)	128 (14.9)	224 (26.0)	176 (20.5)	92 (10.7)	47 (5.5)			
60-64	1,220 (100.0)	158 (13.0)	316 (25.9)	261 (21.4)	143 (11.7)	79 (6.5)			
65-69	1,258 (100.0)	220 (17.5)	340 (27.0)	243 (19.3)	118 (9.4)	67 (5.3)			
70-74	998 (100.0)	184 (18.4)	227 (22.7)	187 (18.7)	81 (8.1)	54 (5.4)			
75-79	512 (100.0)	101 (19.7)	119 (23.2)	94 (18.4)	49 (9.6)	18 (3.5)			
80歳以上	173 (100.0)	39 (22.5)	49 (28.3)	23 (13.3)	15 (8.7)	6 (3.5)			
計	6,864 (100.0)	1,499 (21.8)	1,675 (24.4)	1,179 (17.2)	602 (8.8)	343 (5.0)			

表18 血清総コレステロールの平均値、標準偏差および分布（性・年齢階級別）

年齢階級	mg/dl													
	男					女								
	人数	平均値(SD)	パーセンタイル				人数	平均値(SD)	パーセンタイル					
5			25	50	75	95			5	25	50	75	95	
29歳以下	38	168.2 (30.8)	121.0	151.5	165.0	191.5	234.6	100	165.8 (30.0)	123.1	144.0	163.0	185.8	221.0
30-39	80	187.1 (38.1)	133.1	156.3	184.0	211.5	260.0	299	175.9 (27.8)	132.0	157.0	174.0	195.0	224.0
40-44	114	192.0 (32.4)	144.3	166.0	188.0	213.0	250.3	279	181.2 (28.0)	140.0	164.0	182.0	197.0	224.0
45-49	145	189.9 (34.0)	142.3	167.0	190.0	209.5	256.0	434	193.5 (29.5)	148.0	173.8	193.0	211.0	245.8
50-54	286	195.3 (31.9)	144.4	174.0	193.0	215.0	251.3	731	208.3 (35.2)	154.0	184.0	206.0	230.0	268.8
55-59	317	193.1 (31.4)	146.0	173.0	190.0	212.5	254.1	860	210.3 (30.8)	164.1	190.0	209.0	229.0	262.9
60-64	585	189.1 (31.7)	141.0	166.0	188.0	210.0	240.0	1,220	212.5 (31.3)	164.0	191.0	211.0	232.0	266.0
65-69	793	189.4 (31.9)	142.0	167.0	187.0	212.0	243.0	1,258	208.6 (31.0)	161.0	188.0	207.5	228.0	260.1
70-74	705	187.1 (31.0)	135.3	166.0	186.0	207.5	241.7	998	207.0 (31.5)	157.0	186.0	205.0	226.0	262.0
75-79	470	187.3 (31.6)	136.0	165.0	187.0	205.3	237.5	512	204.9 (29.9)	156.0	184.3	203.0	225.0	255.0
80歳以上	143	183.1 (31.9)	131.4	159.0	184.0	208.0	236.8	173	200.5 (34.1)	142.0	181.0	202.0	221.5	255.3
計	3,676	189.0 (32.0)	140.0	166.0	187.0	210.0	243.0	6,864	204.6 (32.9)	153.0	183.0	204.0	225.0	259.8

表19 血清HDL-Cコレステロールの状況 (性・年齢階級別)

年齢階級	総数	人 (%)			
		-39	40-59	60-79	80-99
-29歳	38 (100.0)	11 (28.9)	22 (57.9)	4 (10.5)	1 (2.6)
30-39	80 (100.0)	10 (12.5)	46 (57.5)	23 (28.8)	1 (1.3)
40-44	114 (100.0)	13 (11.4)	54 (47.4)	35 (30.7)	9 (7.9)
45-49	145 (100.0)	17 (11.7)	76 (52.4)	41 (28.3)	8 (5.5)
50-54	286 (100.0)	30 (10.5)	149 (52.1)	81 (28.3)	25 (8.7)
55-59	317 (100.0)	36 (11.4)	168 (53.0)	98 (30.9)	11 (3.5)
60-64	585 (100.0)	76 (13.0)	308 (52.6)	169 (28.9)	25 (4.3)
65-69	793 (100.0)	97 (12.2)	423 (53.3)	223 (28.1)	39 (4.9)
70-74	705 (100.0)	83 (11.8)	358 (50.8)	218 (30.9)	38 (5.4)
75-79	470 (100.0)	59 (12.6)	256 (54.5)	121 (25.7)	25 (5.3)
80歳以上	143 (100.0)	16 (11.2)	83 (58.0)	41 (28.7)	3 (2.1)
計	3,676 (100.0)	448 (12.2)	1,943 (52.9)	1,054 (28.7)	185 (5.0)

年齢階級	総数	人 (%)			
		-39	40-59	60-79	80-99
-29歳	100 (100.0)	3 (3.0)	51 (51.0)	38 (38.0)	6 (6.0)
30-39	299 (100.0)	9 (3.0)	124 (41.5)	135 (45.2)	31 (10.4)
40-44	279 (100.0)	10 (3.6)	118 (42.3)	124 (44.4)	24 (8.6)
45-49	434 (100.0)	8 (1.8)	172 (39.6)	202 (46.5)	48 (11.1)
50-54	731 (100.0)	22 (3.0)	283 (38.7)	339 (46.4)	77 (10.5)
55-59	860 (100.0)	31 (3.6)	387 (45.0)	359 (41.7)	69 (8.0)
60-64	1,220 (100.0)	57 (4.7)	578 (47.4)	474 (38.9)	98 (8.0)
65-69	1,258 (100.0)	75 (6.0)	611 (48.6)	473 (37.6)	86 (6.8)
70-74	998 (100.0)	63 (6.3)	469 (47.0)	376 (37.7)	79 (7.9)
75-79	512 (100.0)	38 (7.4)	260 (50.8)	159 (31.1)	52 (10.2)
80歳以上	173 (100.0)	14 (8.1)	83 (48.0)	67 (38.7)	8 (4.6)
計	6,864 (100.0)	330 (4.8)	3,136 (45.7)	2,746 (40.0)	578 (8.4)

表20 血清HDL-Cコレステロールの平均値、標準偏差および分布（性・年齢階級別）

年齢階級	男						女						mg/dl		
	人数	平均値(SD)	パーセンタイル					人数	平均値(SD)	パーセンタイル					
			5	25	50	75	95			5	25	50		75	95
29歳以下	38	48.8 (12.3)	31.9	39.0	49.0	57.5	68.3	100	60.2 (13.7)	41.1	50.0	58.0	69.0	83.9	
30-39	80	53.2 (12.9)	34.0	44.0	52.0	63.8	77.0	299	62.1 (13.3)	41.0	52.0	62.0	71.0	85.0	
40-44	114	58.1 (17.7)	36.8	45.8	54.0	69.0	88.8	279	61.5 (13.5)	41.0	51.0	61.0	69.0	88.0	
45-49	145	56.4 (17.2)	34.3	45.5	54.0	64.0	88.4	434	63.2 (14.6)	43.0	53.0	62.0	71.0	87.0	
50-54	286	56.6 (15.5)	34.4	45.0	55.0	65.3	86.7	731	63.6 (13.8)	43.0	54.0	63.0	72.0	88.0	
55-59	317	54.9 (14.5)	35.9	43.0	53.0	64.0	79.2	860	61.5 (13.9)	41.0	52.0	60.0	70.0	86.0	
60-64	585	55.3 (14.8)	35.0	45.0	54.0	64.0	80.0	1,220	60.3 (14.0)	40.0	50.0	59.0	69.0	84.0	
65-69	793	55.2 (15.0)	34.0	45.0	53.0	64.0	82.0	1,258	59.4 (14.2)	39.0	49.0	58.0	67.0	84.0	
70-74	705	55.6 (14.5)	36.0	45.0	54.0	64.0	83.7	998	59.5 (14.5)	38.0	49.0	58.0	68.0	84.0	
75-79	470	55.3 (15.5)	35.0	44.0	53.0	63.0	83.5	512	58.8 (14.8)	37.0	49.0	57.0	67.0	86.0	
80歳以上	143	54.2 (12.4)	34.2	46.0	53.0	62.0	75.8	173	58.1 (13.3)	37.0	48.0	58.0	67.0	82.0	
計	3,676	55.4 (15.0)	35.0	45.0	53.0	64.0	82.0	6,864	60.7 (14.2)	40.0	51.0	59.0	69.0	85.0	

表21 血清LDL-Cコレステロールの状況 (性・年齢階級別)

年齢階級	総数	人 (%)						
		-99	100-119	120-139	140-159	160-179	180mg/dl以上	
男								
-29歳	38 (100.0)	22 (57.9)	9 (23.7)	5 (13.2)	1 (2.6)	0 (0.0)	1 (2.6)	
30-39	80 (100.0)	32 (40.0)	17 (21.3)	10 (12.5)	15 (18.8)	2 (2.5)	4 (5.0)	
40-44	114 (100.0)	44 (38.6)	30 (26.3)	16 (14.0)	15 (13.2)	7 (6.1)	2 (1.8)	
45-49	145 (100.0)	52 (35.9)	31 (21.4)	34 (23.4)	21 (14.5)	6 (4.1)	1 (0.7)	
50-54	286 (100.0)	83 (29.0)	78 (27.3)	67 (23.4)	31 (10.8)	20 (7.0)	7 (2.4)	
55-59	316 (100.0)	97 (30.7)	81 (25.6)	80 (25.3)	36 (11.4)	18 (5.7)	4 (1.3)	
60-64	580 (100.0)	202 (34.8)	153 (26.4)	125 (21.6)	68 (11.7)	24 (4.1)	8 (1.4)	
65-69	788 (100.0)	263 (33.4)	223 (28.3)	156 (19.8)	95 (12.1)	37 (4.7)	14 (1.8)	
70-74	697 (100.0)	229 (32.9)	209 (30.0)	144 (20.7)	84 (12.1)	24 (3.4)	7 (1.0)	
75-79	463 (100.0)	149 (32.2)	144 (31.1)	93 (20.1)	56 (12.1)	15 (3.2)	6 (1.3)	
80歳以上	143 (100.0)	52 (36.4)	35 (24.5)	33 (23.1)	18 (12.6)	5 (3.5)	0 (0.0)	
計	3,650 (100.0)	1,225 (33.6)	1,010 (27.7)	763 (20.9)	440 (12.1)	158 (4.3)	54 (1.5)	

年齢階級	総数	人 (%)					
		-99	100-119	120-139	140-159	160-179	180mg/dl以上
女							
-29歳	100 (100.0)	60 (60.0)	24 (24.0)	8 (8.0)	7 (7.0)	0 (0.0)	1 (1.0)
30-39	299 (100.0)	153 (51.2)	83 (27.8)	41 (13.7)	14 (4.7)	7 (2.3)	1 (0.3)
40-44	279 (100.0)	116 (41.6)	79 (28.3)	64 (22.9)	15 (5.4)	4 (1.4)	1 (0.4)
45-49	433 (100.0)	120 (27.7)	140 (32.3)	101 (23.3)	49 (11.3)	14 (3.2)	9 (2.1)
50-54	726 (100.0)	137 (18.9)	176 (24.2)	187 (25.8)	126 (17.4)	64 (8.8)	36 (5.0)
55-59	851 (100.0)	118 (13.9)	209 (24.6)	245 (28.8)	174 (20.4)	69 (8.1)	36 (4.2)
60-64	1,213 (100.0)	151 (12.4)	282 (23.2)	346 (28.5)	253 (20.9)	119 (9.8)	62 (5.1)
65-69	1,244 (100.0)	191 (15.4)	288 (23.2)	371 (29.8)	241 (19.4)	105 (8.4)	48 (3.9)
70-74	993 (100.0)	143 (14.4)	268 (27.0)	293 (29.5)	176 (17.7)	77 (7.8)	36 (3.6)
75-79	510 (100.0)	90 (17.6)	145 (28.4)	134 (26.3)	79 (15.5)	50 (9.8)	12 (2.4)
80歳以上	173 (100.0)	38 (22.0)	41 (23.7)	51 (29.5)	29 (16.8)	9 (5.2)	5 (2.9)
計	6,821 (100.0)	1,317 (19.3)	1,735 (25.4)	1,841 (27.0)	1,163 (17.1)	518 (7.6)	247 (3.6)

表22 血清LDL-Cコレステロールの平均値、標準偏差および分布（性・年齢階級別）

年齢階級	男						女						mg/dl		
	人数	平均値(SD)	パーセンタイル					人数	平均値(SD)	パーセンタイル					
			5	25	50	75	95			5	25	50		75	95
29歳以下	38	101.2 (28.1)	59.4	87.0	94.5	115.0	157.0	100	95.0 (27.8)	54.1	72.0	93.0	111.8	147.9	
30-39	80	114.0 (36.1)	68.1	85.3	112.5	141.8	182.3	299	101.5 (25.4)	64.0	84.0	99.0	115.0	151.0	
40-44	114	112.6 (30.4)	66.5	89.5	111.5	129.0	165.0	279	106.4 (25.5)	69.0	89.0	104.0	122.0	150.0	
45-49	145	112.4 (29.8)	61.0	88.5	113.0	133.5	159.4	433	114.9 (26.5)	76.7	97.0	112.0	131.5	161.0	
50-54	286	116.2 (29.9)	68.4	96.0	114.0	133.0	168.7	726	126.3 (31.4)	79.0	105.0	124.0	146.0	179.7	
55-59	316	115.5 (27.6)	73.4	94.0	115.0	132.8	166.0	851	128.6 (29.0)	84.6	110.0	128.0	146.0	176.4	
60-64	580	112.3 (28.9)	69.0	91.0	111.0	131.0	163.0	1,213	131.1 (28.3)	88.0	111.0	131.0	149.0	180.0	
65-69	788	113.1 (29.5)	68.0	93.0	112.0	131.0	164.0	1,244	128.1 (28.2)	85.0	109.0	127.0	145.8	175.0	
70-74	697	112.1 (27.3)	69.0	94.0	110.0	129.0	158.0	993	126.9 (27.5)	86.0	109.5	125.0	143.0	174.3	
75-79	463	112.9 (27.5)	71.0	94.0	111.0	132.0	156.0	510	124.7 (27.9)	82.0	104.8	123.0	142.0	173.0	
80歳以上	143	110.0 (28.6)	65.2	89.0	111.0	131.0	158.2	173	122.1 (28.2)	76.7	104.0	123.0	139.0	170.9	
計	3,650	112.9 (28.8)	68.0	93.0	112.0	131.0	163.0	6,821	124.5 (29.4)	80.0	105.0	123.0	143.0	175.0	

表23 血清中性脂肪の状況 (性・年齢階級別)

年齢階級	総数						人 (%)	
	-39	40-99	100-149	150-199	200-239	240mg/dl以上		
男								
-29歳	38 (100.0)	15 (39.5)	8 (21.1)	11 (28.9)	1 (2.6)	2 (5.3)		
30-39	80 (100.0)	38 (47.5)	18 (22.5)	9 (11.3)	3 (3.8)	8 (10.0)		
40-44	114 (100.0)	37 (32.5)	29 (25.4)	21 (18.4)	7 (6.1)	17 (14.9)		
45-49	145 (100.0)	62 (42.8)	38 (26.2)	23 (15.9)	8 (5.5)	13 (9.0)		
50-54	286 (100.0)	115 (40.2)	87 (30.4)	33 (11.5)	15 (5.2)	32 (11.2)		
55-59	317 (100.0)	129 (40.7)	92 (29.0)	45 (14.2)	13 (4.1)	28 (8.8)		
60-64	585 (100.0)	277 (47.4)	147 (25.1)	77 (13.2)	32 (5.5)	36 (6.2)		
65-69	793 (100.0)	388 (48.9)	228 (28.8)	91 (11.5)	28 (3.5)	41 (5.2)		
70-74	705 (100.0)	399 (56.6)	177 (25.1)	66 (9.4)	20 (2.8)	28 (4.0)		
75-79	470 (100.0)	253 (53.8)	131 (27.9)	35 (7.4)	17 (3.6)	15 (3.2)		
80歳以上	143 (100.0)	94 (65.7)	30 (21.0)	9 (6.3)	4 (2.8)	4 (2.8)		
計	3,676 (100.0)	1,807 (49.2)	985 (26.8)	420 (11.4)	148 (4.0)	224 (6.1)		

年齢階級	総数						人 (%)	
	-39	40-99	100-149	150-199	200-239	240mg/dl以上		
女								
-29歳	100 (100.0)	67 (67.0)	11 (11.0)	1 (1.0)	1 (1.0)	3 (3.0)		
30-39	299 (100.0)	200 (66.9)	37 (12.4)	15 (5.0)	9 (3.0)	8 (2.7)		
40-44	279 (100.0)	177 (63.4)	47 (16.8)	15 (5.4)	8 (2.9)	8 (2.9)		
45-49	434 (100.0)	283 (65.2)	73 (16.8)	42 (9.7)	8 (1.8)	8 (1.8)		
50-54	731 (100.0)	419 (57.3)	192 (26.3)	52 (7.1)	19 (2.6)	23 (3.1)		
55-59	860 (100.0)	450 (52.3)	230 (26.7)	87 (10.1)	33 (3.8)	40 (4.7)		
60-64	1,220 (100.0)	594 (48.7)	366 (30.0)	145 (11.9)	44 (3.6)	40 (3.3)		
65-69	1,258 (100.0)	593 (47.1)	389 (30.9)	141 (11.2)	53 (4.2)	56 (4.5)		
70-74	998 (100.0)	513 (51.4)	306 (30.7)	118 (11.8)	18 (1.8)	35 (3.5)		
75-79	512 (100.0)	256 (50.0)	157 (30.7)	57 (11.1)	21 (4.1)	15 (2.9)		
80歳以上	173 (100.0)	99 (57.2)	44 (25.4)	20 (11.6)	6 (3.5)	4 (2.3)		
計	6,864 (100.0)	3,651 (53.2)	1,852 (27.0)	693 (10.1)	220 (3.2)	240 (3.5)		