

た母親は、3, 4か月児で19.0%, 1歳6か月児で25.6%, 3歳児で29.9%であった。ベースライン値(1歳6か月児で27.7%, 3歳児で29.0%)とほぼ同じ値であった。

#### 10) 虐待についての自覚(表3-10)

自分が虐待しているのではないかと思うことが「ある」と答えた母親は、3, 4か月児で4.3%, 1歳6か月児で11.5%, 3歳児で17.7%であった。ベースライン値(1歳6か月児で13.9%, 3歳児で22.1%)との比較では、いずれも低下傾向にあった。

平成12年頃は児童虐待の言葉に対して過敏になっていた親も少なくなかったが、マスコミや子ども雑誌などからの情報により、児童虐待に関する知識や理解が深まり、冷静に判断できていることも関係していると考えられる。

また、後述する父親に代表される周囲のサポートや「子育てにやさしい社会の創生」に向けた行政や民間等のさまざまな取り組みの成果が出ているといえよう。

ゆったりとした気分で子どもと過ごす時間が「ある」と答えた母親は減り、育児に自信を持ってないことが「ある」と答えた母親はあまり変わらず、虐待しているのではないかと思う母親は減っていた。これらの母親の育児不安の状況を評価する指標の推移が三者三様になったことはこれらの指標の性格の違いを物語るとともに、育児不安の評価の難しさを表している。

#### 11) 虐待の内容(表3-11)

虐待の内容として挙げられたものは、感情的な言葉、たたく、しつけのし過ぎの順で、子ど

もの月齢による差を認めず、ベースライン値とほぼ同様な結果であった。

#### 12) 父親の育児(表3-12)

父親が育児を「よくやっている」と答えた母親は、3, 4か月児で50.3%, 1歳6か月児で45.4%, 3歳児で39.8%であった。ベースライン値(1歳6か月児で40.9%, 3歳児で35.5%)との比較では、いずれも4.5ポイント程度改善していた。

育児を「よくやっている」父親が増えたにもかかわらず、ゆったりとした気分で子どもと過ごす時間が「ある」と答えた母親が減っていたことは、父親が育児を手伝うという手段的な支援だけでは、母親の負担感の軽減が難しいことを示唆しているといえよう。

#### 13) 父親が子どもと遊ぶか(表3-13)

父親が子どもと「よく遊んでいる」と答えた母親は、3, 4か月児で61.2%, 1歳6か月児で55.4%, 3歳児で48.1%であった。ベースライン値(1歳6か月児で55.5%, 3歳児で47.8%)とほぼ同じであった。

#### 14) 日常の育児の相談相手(表3-14)

相談相手がないと答えた母親は、ベースライン値と同様に1%未満であった。

日常の育児の相談相手として挙げられていたのは多い順に、夫婦、祖父母、友人、保育士・幼稚園教諭、近所の人であった。

保育士・幼稚園教諭は1歳6か月で12.6%, 3歳児で18.3%とベースライン値(1歳6か月で8.1%, 3歳児で14.4%)より、4ポイントほど多くなっていた。

近所の方はベースライン値では約 20%であったが、今回の調査では約 10%と半減していた。5年間の間のこの変化は携帯メールの普及など母親のコミュニケーション方法の変化が影響しているのではないかと考えられる。

保健師・助産師を挙げた母親は、3, 4か月児で 6.9%, 1歳6か月児で 2.0%, 3歳児で 1.2%と子どもの成長につれて減っていた。

インターネットを挙げた母親は3, 4か月児で 7.3%と他の月齢より高くなっていた。携帯のサイトも含めれば、もっと多くの母親が活用しているのではないかとと思われる。

#### 15) 乳幼児健康診査の受診状況 (表 3-15)

保健センターなどで健康診査を受けた児の割合は1歳6か月児で 73.6%, 3歳児で 87.8%であった。

#### 16) 健診を受けた感想 (表 3-16)

保健センターなどで健診を受けた児の母親の感想として多かったのは、「勉強になった」「信頼できて安心」「決まりだから受けた」「形式的だった」「栄養士の話が良かった」の順であった。

「信頼できて安心」とこたえた母親は、1歳6か月で 32.4%, 3歳児で 30.0%とベースライン値 (1歳6か月で 30.5%, 3歳児で 29.2%) とほぼ同じであった。

#### 17) BCGの接種状況 (表 3-17)

1歳までにBCG接種を終えていたのは、92.3%で、目標値である 95%には届かなかったものの、ベースライン値である 86.3%を上回っていた。

#### 18) 三種混合の接種状況 (表 3-18)

1歳半までに三種混合のI期3回を終えていたのは 85.7%で、ベースライン値である 87.5%を少し下回っていたが、ベースライン値の対象者が1歳6か月から2歳までの児であることを考慮すれば、接種率が低下した訳ではないと考えられる。

#### 19) 麻疹予防接種の状況 (表 3-19)

1歳半までに麻疹の予防接種を終えていたのは 85.4%で、ベースライン値である 70.4%を大きく上回り、日本小児科医会をはじめとする各種団体や自治体の予防接種率向上の取り組みの成果と考えられた。

#### 20) 寝かせつけ方 (表 3-20)

1歳までの寝かせつけ方として、うつぶせ寝をさせているのは、3, 4か月児で 1.2%, 1歳6か月児で 3.3%, 3歳児で 2.4%であった。ベースライン値 (1歳6か月児で 4.0%, 3歳児で 3.5%) との比較では、いずれもわずかに改善していた。

#### 21) 妊娠判明時の喫煙 (表 3-21)

妊娠判明時に喫煙をしていた母親は、3, 4か月児で 19.2%, 1歳6か月児で 19.2%, 3歳児で 18.9%と、いずれの月齢も 19%前後であった。

#### 22) 妊娠中の喫煙 (表 3-22)

妊娠中に喫煙をしていた母親は、3, 4か月児で 7.3%, 1歳6か月児で 7.9%, 3歳児で 8.3%と、いずれの月齢でもベースライン値である 10.0%を下回っていた。

妊娠判明時の喫煙率との比較から、半数以上

の妊婦が妊娠判明後に禁煙していると考えられる。

### 23) 母親の現在の喫煙 (表 3-23)

現在、喫煙をしている母親は、3, 4か月児で 11.5%, 1歳6か月児で 16.5%, 3歳児で 18.1%と、児の月齢が上がるほど、母親の喫煙率が高くなっていった。ベースライン値である 22.3%よりは低くなっているものの、妊娠中に禁煙した母親も出産後は徐々に喫煙を再開していると考えられた。

### 24) 父親の現在の喫煙 (表 3-24)

現在、喫煙をしている父親は、3, 4か月児で 54.9%, 1歳6か月児で 55.9%, 3歳児で 54.5%と、いずれの月齢でも 55%前後であり、ベースライン値である 52.2%より高くなっていた。

### 25) 妊娠判明時の飲酒 (表 3-25)

妊娠判明時に飲酒をしていた母親は、3, 4か月児で 31.4%, 1歳6か月児で 30.0%, 3歳児で 29.5%と、いずれの月齢も 30%前後であった。飲酒頻度としては、月に 1~2回がその半数を占めていた。

### 26) 妊娠中の飲酒 (表 3-26)

妊娠中に飲酒をしていた母親は、3, 4か月児で 14.9%, 1歳6か月児で 16.6%, 3歳児で 16.7%と、いずれの月齢も 15%前後で、ベースライン値である 18.1%より減少していた。飲酒頻度としては、妊娠中に 10 回未満が飲酒者の 6割を占めていた。

### 27) かかりつけ医の有無 (表 3-27)

かかりつけ医を持っているのは、1歳6か月

児で 86.3%, 3歳児で 86.4%と、ベースライン値(1歳6か月児で 80.7%, 3歳児で 81.3%)よりも 5ポイントほど高くなっていた。

### 28) 救急医療機関を知っているか (表 3-28)

休日や夜間に診察をしてもらえる医療機関を知っていると答えた母親は、1歳6か月児で 87.8%, 3歳児で 89.9%と、ベースライン値とほぼ同様であった。

### 29) 心肺蘇生法を知っているか (表 3-29)

心肺蘇生法を知っていると答えた母親は、1歳6か月児で 15.3%, 3歳児で 16.2%と、ベースライン値(1歳6か月児で 19.8%, 3歳児で 21.3%)よりも 5ポイントほど低くなっていた。「少し知っている」を加えると 60%を超え、ベースライン値とほぼ同レベルになるが、心肺蘇生法は「少し知っている」程度では役にあまり立たないことから、心肺蘇生法についての普及啓発がさらに必要と考えられた。

### 30) 不慮の事故の重大性の認識 (表 3-30)

1~14歳の死因の第1位が不慮の事故であることを知っていると言った母親は、1歳6か月児で 56.7%, 3歳児で 55.5%であった。

### 31) 緊急時の連絡先 (表 3-31)

かかりつけの医療機関や緊急時の連絡先をすぐにわかるようにしていると答えた母親は、1歳6か月児で 78.3%, 3歳児で 74.4%であった。

### 32) 個々の事故対策の実践状況 (表 3-32)

チャイルドシートを後部座席に取り付けて使用していると回答したのは、1歳6か月児で 84.4%, 3歳児で 67.8% (該当しない者を除く)

と、3歳児では15ポイント以上減少していた。

子どもが1人で開けられないように浴室のドアを工夫していると回答したのは、1歳6か月児で32.0%にとどまり、3歳児では15.1%とさらに低率であった。

タバコや灰皿を子どもの手の届かないところに置いていると答えたのは、1歳6か月児で66.6%、3歳児では56.2%と、3歳児では10ポイントほど減少していた。

ピーナッツや飴玉などを子どもの手の届かないところに置いていると答えたのは、1歳6か月児では92.1%と高率であったが、3歳児では68.5%と、3歳児では20ポイント以上減少していた。

同様に医薬品、化粧品、洗剤などを子どもの手の届かないところにおいていると答えたのは、1歳6か月児で82.0%、3歳児で64.1%と、3歳児では15ポイント以上減少していた。

ポットや炊飯器などを子どもの手の届かないところにおいていると答えたのは、1歳6か月児で83.2%、3歳児で93.0%と、3歳児では10ポイントほど増加していた。

暖房器具を柵で囲うなどやけどをしないようにしていると答えたのは、1歳6か月児で78.3%、3歳児で57.1%と、3歳児では20ポイント以上減少していた。

### 33) 1歳6か月児の事故対策実施率の推移 (表3-33)

平成13年度の調査結果との比較では、暖房器具を柵で囲うなどやけどをしないようにしていると答えた者の割合が、75.6%から86.3%

へと10ポイント以上改善していた以外は、いずれの項目もほぼ同様な結果であった。

事故対策の実施状況を100点満点で得点化した数値の比較では、78.8点から77.9点へとわずかながら減少していた。100点満点の者の割合は4.2%から4.5%とわずかに増えていた。

以上の結果から、1歳6か月児の事故対策実施状況は平成13年度と比較して、ほとんど改善していないと考えられた。

### 34) 3歳児の事故対策実施率の推移 (表3-34)

平成13年度の調査結果との比較では、チャイルドシートを後部座席で使用していると答えた者の割合が、81.5%から67.8%へと10ポイント以上低下していた。一方、ピーナッツや飴玉などを子どもの手の届かないところに置いていると答えた者の割合は、53.0%から69.1%へ15ポイント以上改善していた。同様に、暖房器具を柵で囲うなどやけどをしないようにしていると答えた者の割合が、51.7%から66.1%へと15ポイントほど改善していた。

これらの3項目以外は、いずれの項目もほぼ同様な結果であった。

事故対策の実施状況を100点満点で得点化した数値の比較では、77.8点から76.6点へとわずかながら減少していた。100点満点の者の割合は1.8%から2.9%とわずかに増えていた。

以上の結果から、3歳児の事故対策実施状況は平成13年度と比較して、ほとんど改善していないと考えられた。

## D. 結 語

1) ベースライン値と比較して改善していた項目は、妊娠出産に満足している母親の割合、自分が虐待をしていると自覚している母親の割合、育児をする父親の割合、子どもと遊ぶ父親の割合、BCGの1歳までの接種率、麻疹予防接種の1歳6か月までの接種率、うつぶせ寝の割合、妊娠中の喫煙率、妊娠中の飲酒率、かかりつけ医を持っている割合であった。

2) ベースライン値とほぼ同じであった項目は、日常の育児の相談相手がいる母親の割合、乳幼児健康診査に対する満足度、三種混合予防接種の1歳6か月までの接種率、子育て中の母親の喫煙率、救急医療機関を知っている親の割合、事故対策を実践している親の割合であった。

3) 悪化していた項目は、ゆったりとした気分で子どもと過ごす時間がある母親の割合、育児に自信が持てないことがある母親の割合、子育て中の父親の喫煙率、心配蘇生法を知っている親の割合であった。

4) 乳幼児健康診査の際に自記式調査で、実態調査を行ったが、ベースライン値である平成12年度の乳幼児身体発育調査の会場で行われた調査結果と比較可能なものであった。

乳幼児身体発育調査は国勢調査地区のなかの3,000地区内の調査実施日において生後14日以上2歳未満の乳幼児及び3,000地区のうちから抽出した900地区内の2歳以上小学校就学前の幼児を調査の客体として、10年に1回行われるものである。客体の代表性という点では申し分ないが、調査に要するコストや労力は

莫大なものであり、モニタリングのために頻繁に実施できる調査方法ではない。

今回、用いた調査方法は全ての自治体で、毎年実施することが可能であり、各地域における「健やか親子 21」のモニタリングの方法として有効と考えられた。

## 【文 献】

- 1) 健やか親子 21 検討会：健やか親子 21 検討会報告書－母子保健の 2010 年までの国民運動計画－. 2000.
- 2) 日本小児保健協会：平成 12 年度用事健康度調査報告書. 2001.
- 3) 田中哲郎：家庭における事故対策の現状と子どもの事故経験（平成 13 年度厚生科学研究「子どもの事故防止と市町村への事故対策支援に関する研究（主任研究者：田中哲郎）. 2002.
- 4) 大井田隆：わが国における妊産婦の喫煙・飲酒の実態と母子への健康影響に関する疫学的研究（平成 13 年度厚生科学研究）. 2002.

表1 健やか親子21中間評価のための実態調査対象者の概要

	自治体数	対象者数	有効回答数	回収率
3, 4ヶ月児	126	7,782	6,109	78.5%
1歳6ヶ月児	139	9,965	7,490	75.2%
3歳児	138	9,567	7,460	78.0%

表2 調査対象者の属性

表2-1 記入者の続柄

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
母親	5,988	98.0	7,239	96.6	7,176	96.2
父親	47	0.8	87	1.2	116	1.6
祖父母	11	0.2	36	0.5	52	0.7
その他	6	0.1	6	0.1	10	0.1
無回答	57	0.9	122	1.6	106	1.4
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

表2-2 出生順

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
第1子	3,027	49.5	3,681	49.1	3,771	50.5
第2子	2,219	36.3	2,767	36.9	2,646	35.5
第3子	694	11.4	878	11.7	865	11.6
第4子以降	152	2.5	146	1.9	163	2.2
無回答	17	0.3	18	0.2	15	0.2
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

表2-3 性別

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
男	3,060	50.1	3,828	51.1	3,827	51.3
女	3,039	49.7	3,635	48.5	3,622	48.6
無回答	10	0.2	27	0.4	11	0.1
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

### 表3 実態調査結果（ベースライン値との比較）

表3-1 出産場所

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
病院	3,895	63.8	5,099	68.1	5,040	67.6
診療所	2,123	34.8	2,250	30.0	2,298	30.8
助産所	49	0.8	67	0.9	65	0.9
その他	13	0.2	17	0.2	11	0.1
無回答	29	0.5	57	0.8	46	0.6
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

表3-2 母児同室

	3, 4ヶ月児	%
24時間同室	3,237	53.0
日中のみ同室	1,224	20.0
別室	1,512	24.8
無回答	136	2.2
合計	6,109	100.0

表3-3 妊娠・出産満足度

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
とても満足	2,312	37.8	2,539	33.9	2,442	32.7
満足している	3,392	55.5	4,289	57.3	4,276	57.3
満足していない	322	5.3	473	6.3	496	6.6
全く満足していない	30	0.5	74	1.0	86	1.2
無回答	53	0.9	115	1.5	160	2.1
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

平成12年度 幼児健康度調査	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児 <sup>*</sup>	%	3歳児 <sup>**</sup>	%
満足している			1,191	85.6	731	84.3
満足していない			185	13.3	121	14.0
無回答			16	1.1	15	1.7
合計			1,392	100.0	867	100.0

\* 実際には1歳6ヶ月～2歳が対象であり、今回の対象より月齢が上

\*\* 実際には3歳以上4歳未満

表3-4 満足,不満足の内容(3,4ヶ月児のみ)

	満足している	空欄	少し不満	満足していない
妊娠中の頑張り	64.0	17.2	0.8	18.1
分娩中の頑張り	75.6	15.9	0.3	8.1
産科施設情報	58.8	25.5	0.3	15.4
継続的な関わり	59.9	25.7	0.3	14.0
産科医の技術	76.1	20.0	0.2	3.8
産科医の指導・対応	75.7	16.3	0.3	7.7
助産師の技術	73.8	22.7	0.2	3.4
助産師の指導・対応	76.2	18.0	0.2	5.5
その他スタッフの技術	69.3	26.8	0.2	3.7
その他スタッフの対応	71.1	22.1	0.4	6.4
産科施設アメニティ	71.3	16.6	0.5	11.7
保健センターサービス	56.2	34.3	0.4	9.1
夫の理解や対応	77.9	13.3	0.7	8.1
他の家族の理解や対応	81.4	14.0	0.3	4.3
友人の理解や対応	78.0	20.6	0.1	1.3
職場の理解や対応	44.2	45.7	0.2	10.0
社会の理解や対応	43.3	39.6	0.6	16.5
受動喫煙への配慮	45.4	28.2	0.5	25.9

表3-5 次の妊娠・出産の意向(3,4ヶ月児のみ)

	第1子	%	第2子	%	第3子以降	%
産みたい	1,798	60.2%	325	14.9%	50	6.0%
どちらかといえば、産みたい	785	26.3%	592	27.1%	101	12.2%
どちらかといえば、産みたくない	290	9.7%	680	31.2%	197	23.8%
産みたくない	114	3.8%	584	26.8%	480	58.0%
合計	2,987	100.0%	2,181	100.0%	828	100.0%

表3-6 生後1ヶ月時の栄養法

	3,4ヶ月児	%
母乳	2,885	47.2
人工乳	412	6.7
混合	2,789	45.7
無回答	23	0.4
合計	6,109	100.0

平成12年度 乳幼児身体発育調査	0~6歳児	%
母乳		44.8
人工乳		11.2
混合		44.0
合計		100.0



表 3-7 子育ての満足度

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
満足している	2,588	42.4	2,285	30.5	2,016	27.0
まあ満足している	3,103	50.8	4,406	58.8	4,404	59.0
あまり満足していない	313	5.1	651	8.7	851	11.4
満足していない	36	0.6	69	0.9	115	1.5
無回答	69	1.1	79	1.1	74	1.0
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

表 3-8 ゆったりとした気分で子どもと過ごす時間がある

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい	4,727	77.4	5,165	69.0	4,349	58.3
いいえ	222	3.6	373	5.0	539	7.2
何ともいえない	1,116	18.3	1,902	25.4	2,531	33.9
無回答	44	0.7	50	0.7	41	0.5
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

  

平成12年度 幼児健康度調査	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい	1,046	74.8	1,050	75.4	550	63.4
いいえ	90	6.4	81	5.8	74	8.5
何ともいえない	218	15.6	232	16.7	218	25.1
無回答	44	3.1	29	2.1	25	2.9
合計	1,398	100.0	1,392	100.0	867	100.0

表 3-9 育児に自信をもてないことがあるか

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい	1,161	19.0	1,914	25.6	2,227	29.9
いいえ	2,223	36.4	2,433	32.5	2,042	27.4
何ともいえない	2,667	43.7	3,078	41.1	3,110	41.7
無回答	58	0.9	65	0.9	81	1.1
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

平成12年度 幼児健康度調査	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい	326	23.3	385	27.7	251	29.0
いいえ	529	37.8	490	35.2	282	32.5
何ともいえない	536	38.3	507	36.4	325	37.5
無回答	7	0.5	10	0.7	9	1.0
合計	1,398	100.0	1,392	100.0	867	100.0

表3-10 虐待についての自覚

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい	265	4.3	863	11.5	1,319	17.7
いいえ	5,237	85.7	5,457	72.9	4,655	62.4
何ともいえない	548	9.0	1,105	14.8	1,427	19.1
無回答	59	1.0	65	0.9	59	0.8
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

平成12年度 幼児健康度調査	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい	173	12.4	194	13.9	192	22.1
いいえ	1,036	74.1	985	70.8	511	58.9
何ともいえない	178	12.7	196	14.1	145	16.7
無回答	11	0.8	17	1.2	19	2.2
合計	1,398	100.0	1,392	100.0	867	100.0

表3-11 虐待の内容

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
たたくなど	112	42.3	406	47.0	600	45.5
食事の制限など	7	2.6	7	0.8	4	0.3
しつけのし過ぎ	36	13.6	124	14.4	181	13.7
感情的な言葉	176	66.4	602	69.8	1032	78.2
その他の虐待	9	3.4	30	3.5	21	1.6

平成12年度 幼児健康度調査	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
たたくなど	84	48.6	102	52.6	96	50.0
食事の制限など	1	0.6	1	0.5	2	1.0
しつけのし過ぎ	28	16.2	28	14.4	39	20.3
感情的な言葉	126	72.8	143	73.7	160	83.3
その他の虐待	11	6.4	7	3.6	3	1.6

表3-12 父親の育児

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
よくやっている	3,075	50.3	3,399	45.4	2,972	39.8
時々やっている	2,384	39.0	3,025	40.4	3,246	43.5
ほとんどしない	411	6.7	678	9.1	725	9.7
何ともいえない	143	2.3	199	2.7	208	2.8
無回答	96	1.6	189	2.5	309	4.1
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

平成12年度 幼児健康度調査	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
よくやっている	585	41.8	569	40.9	308	35.5
時々やっている	600	42.9	631	45.3	383	44.2
ほとんどしない	146	10.4	124	8.9	107	12.3
何ともいえない	36	2.6	32	2.3	28	3.2
無回答	31	2.2	36	2.6	41	4.7
合計	1,398	100.0	1,392	100.0	867	100.0

表3-13 父親が子どもと遊ぶか

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
よく遊んでいる	3,740	61.2	4,147	55.4	3,589	48.1
時々遊ぶことがある	2,019	33.0	2,819	37.6	3,139	42.1
ほとんど遊ばない	243	4.0	327	4.4	403	5.4
無回答	107	1.8	197	2.6	329	4.4
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

平成12年度 幼児健康度調査	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
よく遊んでいる	797	57.0	773	55.5	414	47.8
時々遊ぶことがある	510	36.5	521	37.4	350	40.4
ほとんど遊ばない	56	4.0	65	4.7	60	6.9
無回答	35	2.5	33	2.4	43	5.0
合計	1,398	100.0	1,392	100.0	867	100.0

表3-14 日常の育児の相談相手

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
夫 婦	4,479	73.3	5,338	71.3	5,233	70.1
祖父母	4,158	68.1	4,195	56.0	3,803	51.0
近所の人	628	10.3	790	10.5	784	10.5
友 人	3,230	52.9	3,360	44.9	3,477	46.6
かかりつけ医	438	7.2	253	3.4	208	2.8
保健師・助産師	422	6.9	150	2.0	87	1.2
保育士・幼稚園教諭	425	7.0	944	12.6	1,364	18.3
電話相談	90	1.5	28	0.4	24	0.3
インターネット	447	7.3	172	2.3	118	1.6
その他	546	8.9	516	6.9	432	5.8
いる(合計)	5,451	89.2	7,404	98.9	7,362	98.7
いない	22	0.4	43	0.6	64	0.9
無回答	636	10.4	43	0.6	34	0.5

平成12年度 幼児健康度調査	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
夫 婦	1,011	72.3	1,019	73.2	626	72.2
祖父母	794	56.8	767	55.1	420	48.4
近所の人	234	16.7	281	20.2	181	20.9
友 人	678	48.5	665	47.8	423	48.8
かかりつけ医	112	8.0	87	6.3	66	7.6
保健師・助産師	65	4.6	47	3.4	27	3.1
保育士・幼稚園教諭	105	7.5	113	8.1	125	14.4
電話相談	15	1.1	19	1.4	5	0.6
インターネット	18	1.3	16	1.1	4	0.5
その他	109	7.8	97	7.0	61	7.0
いる(合計)	1,383	98.9	1,373	98.6	860	99.2
いない	12	0.9	10	0.7	3	0.3
無回答	3	0.2	9	0.6	4	0.5

表 3-15 乳幼児健康診査の受診状況

			1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
受けた			7,392	98.7	7,378	98.9
保健センターなど			5,514	73.6	6,547	87.8
開業医・診療所			1,768	23.6	1,089	14.6
病院			1,591	21.2	1,010	13.5
その他の健診			26	0.3	36	0.5
受けていない			41	0.5	18	0.2
無回答			57	0.8	64	0.9
合計			7,490	100.0	7,460	100.0

平成12年度 幼児健康度調査			1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
受けた			1,391	99.9	864	99.7
保健センターなど			1,126	80.9	773	89.2
開業医・診療所			372	26.7	184	21.2
病院			578	41.5	309	35.6
その他の健診			25	1.8	14	1.6
受けていない			1	0.1	3	0.3
合計			1,392	100.0	867	100.0

表 3-16 健診を受けた感想（保健センターや保健所で受けた者）

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
信頼できて安心			1,787	32.4	1,962	30.0
勉強になった			1,822	33.0	2,070	31.6
栄養士の話が良かった			964	17.5	855	13.1
心理士の相談が良かった			60	1.1	128	2.0
もっと時間が欲しい			570	10.3	606	9.3
個別の相談がしたかった			215	3.9	223	3.4
決まりだから受けた			861	15.6	1,266	19.3
知っていることばかり			190	3.4	236	3.6
形式的だった			875	15.9	1,230	18.8
友達ができた			329	6.0	293	4.5
その他の感想			283	5.1	323	4.9
合計			5,514		6,547	

平成12年度 幼児健康度調査	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
信頼できて安心			343	30.5	226	29.2
勉強になった			376	33.4	243	31.4
栄養士の話が良かった			191	17.0	119	15.4
心理士の相談が良かった			7	0.6	20	2.6
もっと時間が欲しい			140	12.4	83	10.7
個別の相談がしたかった			40	3.6	25	3.2
決まりだから受けた			222	19.7	191	24.7
知っていることばかり			40	3.6	38	4.9
形式的だった			232	20.6	165	21.3
友達ができた			73	6.5	26	3.4
その他の感想			118	10.5	64	8.3
合計			1,126		773	

表 3-17 BCGの接種状況

			1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
接種済み			7,256	96.9		
生後6ヶ月以内			3,937	52.6	}	*
6ヶ月～1歳			2,260	30.2		
1歳以降			384	5.1		
接種時期不明			675	9.0		
未接種			130	1.7		
無回答			104	1.4		
合計			7,490	100.0		

\* 無回答や不明を除いて集計すると, 92.3%

平成12年度 幼児健康度調査	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
接種済み	1,206	86.3	1,295	93.0		
未接種	187	13.4	92	6.6		
無回答	5	0.4	5	0.4		
合計	1,398	100.0	1,392	100.0		

表 3-18 三種混合の接種状況

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
接種済み			6,428	85.8		
1歳まで			4,751	63.4	}	*
1歳～1歳6ヶ月			1,185	15.8		
1歳6ヶ月以上			89	1.2		
接種時期不明			492	6.6		
未接種			904	12.1		
無回答			158	2.1		
合計			7,490	100.0		

\* 無回答や不明を除いて集計すると, 85.7%

平成12年度 幼児健康度調査			1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
接種済み			1,214	87.2	*	
未接種			173	12.4		
無回答			5	0.4		
合計			1,392	100.0		

\* 無回答を除いて集計すると, 87.5%

表 3-19 麻疹予防接種の状況

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
接種済み			6,353	84.8		
1歳まで			360	4.8	}	*
1歳～1歳3ヶ月			4,588	61.3		
1歳3ヶ月～1歳6ヶ月			1,057	14.1		
1歳6ヶ月以上			33	0.4		
接種時期不明			315	4.2		
未接種			995	13.3		
無回答			142	1.9		
合計			7,490	100.0		

\* 無回答や不明を除いて集計すると, 85.4%

平成12年度 幼児健康度調査			1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
接種済み			976	70.1	*	
未接種			411	29.5		
無回答			5	0.4		
合計			1,392	100.0		

\* 不明を除いて集計すると, 70.4%

表 3-20 寝かせつけ方

(1歳までの寝かせつけ方)

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
あおむけ寝	5,476	89.6	4,112	54.9	5,683	76.2
うつぶせ寝	72	1.2	248	3.3	180	2.4
決めていない	391	6.4	2,827	37.7	1,458	19.5
その他	100	1.6	263	3.5	87	1.2
無回答	70	1.1	40	0.5	52	0.7
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

平成13年度厚生科学 研究(田中班)*	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
あおむけ寝			2,447	71.7	2,665	82.0
うつぶせ寝			135	4.0	114	3.5
決めていない			729	21.4	389	12.0
その他			93	2.7	73	2.2
無回答			10	0.3	8	0.2
合計			3,414	100.0	3,249	100.0

表 3-21 妊娠判明時の喫煙

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
喫煙あり	1,170	19.2	1,438	19.2	1,410	18.9
10本以下	684	11.2	893	11.9	843	11.3
11本以上	429	7.0	483	6.4	508	6.8
不明	57	0.9	62	0.8	59	0.8
喫煙なし	4,916	80.5	6,028	80.5	6,021	80.7
無回答	23	0.4	24	0.3	29	0.4
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

表 3-22 妊娠中の喫煙

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
妊娠中の喫煙あり	446	7.3	589	7.9	619	8.3
10本以下	360	5.9	480	6.4	512	6.9
11本以上	63	1.0	78	1.0	79	1.1
不明	23	0.4	31	0.4	28	0.4
なし	5,646	92.4	6,867	91.7	6,811	91.3
無回答	17	0.3	34	0.5	30	0.4
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

平成12年度 乳幼児身体発育調査	0~6歳児	%
妊娠中の喫煙あり	1,005	10.0
10本以下	776	7.7
11本以上	217	2.2
喫煙本数不明	12	0.1
喫煙なし	8,999	89.8
無回答	17	0.2
合計	10,021	100.0

表 3-23 母親の現在の喫煙

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
あり	705	11.5	1,237	16.5	1,348	18.1
なし	5,355	87.7	6,208	82.9	6,065	81.3
無回答	49	0.8	45	0.6	47	0.6
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

表 3-24 父親の現在の喫煙

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
あり	3,352	54.9	4,187	55.9	4,063	54.5
なし	2,643	43.3	3,107	41.5	3,075	41.2
無回答	114	1.9	196	2.6	322	4.3
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

表 3-25 妊娠判明時の飲酒

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
飲酒あり	1,916	31.4	2,245	30.0	2,197	29.5
月に1～2回	868	14.2	1,069	14.3	1,055	14.1
週に1～2回	567	9.3	615	8.2	634	8.5
週に3回以上	439	7.2	474	6.3	423	5.7
飲酒頻度不明	42	0.7	87	1.2	85	1.1
なし	4,177	68.4	5,222	69.7	5,235	70.2
無回答	16	0.3	23	0.3	28	0.4
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

表 3-26 妊娠中の飲酒

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
妊娠中の飲酒あり	911	14.9	1,246	16.6	1,243	16.7
妊娠中に10回未満	562	9.2	726	9.7	666	8.9
月に1～2回	209	3.4	313	4.2	336	4.5
週に1～2回	93	1.5	141	1.9	167	2.2
週に3回以上	37	0.6	38	0.5	45	0.6
飲酒頻度不明	10	0.2	28	0.4	29	0.4
なし	5,176	84.7	6,208	82.9	6,169	82.7
無回答	22	0.4	36	0.5	48	0.6
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

平成12年度 乳幼児身体発育調査	0～6歳児	%
妊娠中の飲酒あり	1,817	18.1
妊娠中に10回未満	930	9.3
月に1～2回	448	4.5
週に1～2回	261	2.6
週に3回以上	141	1.4
飲酒頻度不明	37	0.4
飲酒なし	8,191	81.7
無回答	13	0.1
合計	10,021	100.0



表 3-27 かかりつけ医の有無

			1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			6,462	86.3	6,445	86.4
いいえ			445	5.9	448	6.0
何ともいえない			564	7.5	550	7.4
無回答			19	0.3	17	0.2
合計			7,490	100.0	7,460	100.0

平成12年度 幼児健康度調査	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			1,124	80.7	705	81.3
いいえ			72	5.2	57	6.6
何ともいえない			189	13.6	101	11.6
無回答			7	0.5	4	0.5
合計			1,392	100.0	867	100.0

表 3-28 救急医療機関を知っているか

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
知っている			6,579	87.8	6,704	89.9
知らない			882	11.8	714	9.6
無回答			29	0.4	42	0.6
合計			7,490	100.0	7,460	100.0

平成13年度厚生科学 研究(田中班)	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
知っている			2,957	86.6	2,884	88.8
知らない			437	12.8	338	10.4
無回答			20	0.6	27	0.8
合計			3,414	100.0	3,249	100.0

表 3-29 心肺蘇生法を知っているか

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
知っている			1,144	15.3	1,209	16.2
少し知っている			3,543	47.3	3,420	45.8
知らない			2,766	36.9	2,777	37.2
無回答			37	0.5	54	0.7
合計			7,490	100.0	7,460	100.0

平成13年度厚生科学 研究(田中班)	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
知っている			675	19.8	691	21.3
少し知っている			1,495	43.8	1,406	43.3
知らない			1,233	36.1	1,147	35.3
無回答			11	0.3	5	0.2
合計			3,414	100.0	3,249	100.0

表 3-30 事故死の重要性

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			4,247	56.7	4,141	55.5
いいえ			3,180	42.5	3,289	44.1
無回答			63	0.8	30	0.4
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				57.2		55.7

表 3-31 緊急時の連絡先

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			5,862	78.3	5,550	74.4
いいえ			1,561	20.8	1,841	24.7
無回答			67	0.9	69	0.9
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				79.0		75.1

表 3-32 個々の事故対策の実践状況

おもちゃの安全性を重視

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			5,253	70.1		
いいえ			2,098	28.0		
無回答			139	1.9		
合計			7,490	100.0		
実施率(正解率)				71.5		

子どもを一人にしない

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			836	11.2	902	12.1
いいえ			6,452	86.1	6,399	85.8
該当しない			136	1.8	114	1.5
無回答			66	0.9	45	0.6
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				88.5		87.6

チャイルドシートの適正使用

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			5,919	79.0	4,724	63.3
いいえ			1,094	14.6	2,247	30.1
該当しない			378	5.0	417	5.6
無回答			99	1.3	72	1.0
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				84.4		67.8

水をためておくこと

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			969	12.9		
いいえ			6,444	86.0		
無回答			77	1.0		
合計			7,490	100.0		
実施率(正解率)				86.9		

浴槽に水をためない

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			4,912	65.6	4,862	65.2
いいえ			2,190	29.2	2,310	31.0
該当しない			283	3.8	249	3.3
無回答			105	1.4	39	0.5
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				69.2		67.8

浴室のドアの工夫

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			2,303	30.7	1,126	15.1
いいえ			4,884	65.2	6,137	82.3
該当しない			202	2.7	162	2.2
無回答			101	1.3	35	0.5
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				32.0		15.5

固めの敷布団

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			6,175	82.4		
いいえ			1,162	15.5		
無回答			153	2.0		
合計			7,490	100.0		
実施率(正解率)				84.2		

タバコや灰皿を片付ける

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			4,986	66.6	4,190	56.2
いいえ			275	3.7	933	12.5
該当しない			2,124	28.4	2,263	30.3
無回答			105	1.4	74	1.0
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				94.8		81.8

ピーナッツなどを置かない

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			6,895	92.1	5,107	68.5
いいえ			513	6.8	2,279	30.5
無回答			82	1.1	74	1.0
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				93.1		69.1

硬貨などの小物を置かない

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			7,015	93.7		
いいえ			395	5.3		
無回答			80	1.1		
合計			7,490	100.0		
実施率(正解率)				94.7		

医薬品などを置かない

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			6,144	82.0	4,780	64.1
いいえ			1,263	16.9	2,614	35.0
無回答			83	1.1	66	0.9
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				82.9		64.6

テーブルクロスの使用

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			915	12.2		
いいえ			6,499	86.8		
無回答			76	1.0		
合計			7,490	100.0		
実施率(正解率)				87.7		

ポットを届かない所に

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			6,231	83.2	6,937	93.0
いいえ			1,161	15.5	466	6.2
無回答			98	1.3	57	0.8
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				84.3		93.7

暖房器具の配慮

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			5,866	78.3	4,256	57.1
いいえ			930	12.4	2,183	29.3
該当しない			604	8.1	955	12.8
無回答			90	1.2	66	0.9
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				86.3		66.1