

200500663A

ポリオ及び麻疹の現状とその予防接種の効果 に関する研究（H15－新興－21）

平成 17 年度報告書

厚生労働科学研究費補助金

新興・再興感染症研究事業

主任研究者 加藤達夫 聖マリアンナ医科大学

分担研究者 宮村達男 国立感染症研究所

高山直秀 都立駒込病院

研究協力者（順不同）

庵原 俊昭
岡田 賢司
一戸 貞人
斉加志津子
内海 裕美
柴田 雄介
蘭部 友良
高橋菜穂子
細部 千晴
松永 貞一
三輪 操子
稻葉 憲之
庄田亜紀子
岡崎 隆行
西川 正能
大島 教子
池田 緩子
寺田 喜平
山田 正興
越田 理恵
川島ひろ子

厚生労働科学研究費補助金

新興・再興感染症研究事業

研究課題名：ポリオ及び麻疹の現状とその予防接種の効果に関する研究（H15－新興－21）

17年度報告書

主任研究者 加藤 達夫（聖マリアンナ医科大学小児科教授）

研究趣旨

1. 1994年にWHOアメリカ地域、2000年にWHO西太平洋地域、2002年にWHOヨーロッパ地域に於いてポリオの根絶宣言が出された。この様に世界各地域でポリオは根絶されつつあるものの、北インド、アフリカ大陸の一部にはポリオが未だ存在する。従って疾患は排除されつつあるもののワクチンの継続が国際的に必要な代表的疾患はポリオである。現在の我が国でのポリオワクチンの接種率は高いと推定されるが各年齢群での接種率を把握しておく必要がある。又、偶発的に分離されるポリオウイルスは野生株でないことを確認しておくことは極めて重要である。
2. 麻しんは先進国においては排除された疾患であるにもかかわらず我が国での年間発生数は10万人を越えると推定されていた。1歳からの予防接種という啓発運動により2004年からサーベイランスでの報告例は減少しつつあるものの未だ排除された疾患ではない。又風疹も年間4万人の患者が発生し、先天性風疹症候群は年間10例の報告がある。この原因を探る為には一定年齢児におけるワクチン接種率を把握しておくことが先ず必要である。その上で、接種率の向上、高年齢児更には成人麻しんの撲滅、0歳未満児の麻疹発生阻止等を実施するために、2回接種法も考慮に入れ、よりよい麻しんワクチン接種実施計画を検討すべきである。麻しん、風しんワクチンの2回接種は現在迄、日本において経験がなく本研究ではこの2回接種での安全性、有効性、必要性を研究課題として加えた。

1. ポリオワクチン

我が国においてポリオは1980年に1例発生したのを最後にその発生は見られない。また2000年には我が国を含むWHO西太平洋地域ではポリオは根絶宣言がなされた。しかし我が国では1960年

5,600人を越える流行があり多くのポリオ患者が発生した。しかし、1961年経口生ワクチンが導入され、4年後にはポリオ研によるセービン生ワクチンが導入された結果、患者は激減し、3年後には100人を下回った。生ワクチンの効果が絶大

であったことが判る。このようにしてポリオは根絶されたが我が国では依然として生ワクチンを接種している。生ワクチンの接種は約 440 万人に 1 人の割合でワクチン由来の麻痺が起こることが知られ又、被接種者からの 2 次的な感染により 580 万人に 1 人の割合で麻痺が起こることが知られている。したがってポリオのワクチン接種は不要との考えも成り立つ。しかし世界を見ると WHO が当初目標としていた 2000 年にも、また再度設定した 2002 年にも又更に目標とした 2005 年においても世界レベルでの根絶はなされていない。逆に 2004 年には報告患者数がアフリカ諸国で急増し、2005 年にはインドネシアにも発生がみられた。これらのことからその後計画している WHO での全世界におけるポリオワクチン接種廃止時期についての目処は立っていない。一方、我が国でポリオが根絶されていること、生ワクチンによる麻痺を起こす例がみられることなどから現行のワクチン接種率が低下すれば、2001 年ブルガリアなど海外でみられたようにポリオが輸入され再び大流行が起きないとはいえない。

①ポリオワクチンの不活化ワクチンへの変更について

2000 年 8 月の公衆衛生審議会感染症分科会ポリオ予防接種検討小委員会では、近い将来、ポリオ根絶がなされ、その後、ポリオの予防接種が廃止されることを前提に、わが国では、当面、生ワクチンを継続し、不活化ワクチン導入については検討事項とすることを提言している。世界的な根絶が遅れ、今後ポリオの予防接種を中止する期日

が明確化されていない現在、ポリオの予防接種を中止することはできない。しかし、ポリオ生ワクチンを使用し続けることは、すでにポリオが根絶された我が国においては、頻度が非常に低いとはいえ、ワクチン由来のポリオ麻痺の発生する可能性が続くこととなる。わが国において、ポリオワクチン接種の継続は必要であり、生ポリオワクチン由来による麻痺を防止する方策として、不活化ワクチンの導入が必須である。

②そこで、近い将来、我が国におけるポリオの予防接種を生ワクチンから不活化ワクチンに変更することを前提とし、円滑な移行が行われるように具体的な準備を早急に始めるべきであることを提案する。一方、不活化ワクチンが導入されると接種時期は DPT ワクチンと重なるため、今後の開発には DPT、不活化ポリオの 4 種混合ワクチンの導入が必須である。

2. 麻 痺

我が国では約 50 年前には数千人が麻疹によって死亡していた。これに比較すると近年では年間約 20 人ほどの死亡であり、2004 年からは麻疹による死亡の報告は無く、減少していることは確かである。しかし未だに麻疹罹患者数は 1~3 万人と推定されており先進国では考えられないことである。何故我が国が他の先進国の様に、麻疹の排除が出来ないかを考える必要がある。

わが国における今後の方策

選択できる接種方法としては、①定期接種1回法（現行の方策）②定期接種2回法（先進国型）③定期接種1回法＋補足的予防接種（発展途上国型）を考えられるが、現在の日本に早急に必要な方法は定期接種1回法の徹底であり、この中で1歳児（12～15ヶ月）の接種率の向上を目指すことが最優先される方策であると考える。過去2年間の研究発表の結果接種率は向上し、罹患報告者も減少しつつある。

また、併せて、麻疹感受性者を減じるために、1歳児以外の麻しんの定期予防接種を受けるべき者に対しても、積極的に麻しんの予防接種を受けることを推奨する必要がある。

今後しなければならない研究・調査課題

1) 今後、上記施策を推進する一方、その成果を確認し、必要な施策の変更、改善について継続して検討する必要がある。そのために、低年齢層を含めた麻しんの罹患者状況、正確な接種状況、正確な免疫獲得状況を把握し、短期戦略による成果（罹患者の減少状況）の評価を行っていかなければならない。

また、1歳未満の乳児への予防接種を行う是非についても、効果・副反応を調査・研究することで、検討していく必要がある。

2) 低年齢層での罹患者を減少させ、国内における流行の発生を防ぐことが現在の目的ではあるが、その

成果があがるほど、麻しんによる予防接種被接種者への追加免疫効果が弱まり、予防接種によって付与した免疫力が低下することが米国の経験から予測される。また、ワクチン効果が100%ではないことから、接種したにも拘わらず、免疫が獲得されない者が数%づつ累積される。

そこで、低年齢層での麻疹の予防接種率が向上し、罹患者が減少したときを想定して、1) Primary vaccine failure 2) Secondary vaccine failure 3) 接種機会の確保を念頭に入れ麻しん、風しんを我が国から排除することを目的とし現在の米国等先進諸国および他の国々と同様に、複数回接種を導入することについて今から、検討しておく必要がある。我が国においては麻しん、風しんワクチンの複数回接種の経験がない。本研究では、既に麻しん、風しんの単抗原ワクチンを接種した者に再接種すること、MR2種混合ワクチンを接種することで、その安全性、有効性、必要性を検討した。

ポリオワクチン

厚生労働科学研究費補助金（新興・再興感染症研究事業）

分担研究報告書

ポリオの現状と予防接種効果

分担研究者 宮村達男 国立感染症研究所ウイルス第二部 部長

研究要旨 昨年にひき続き満3歳に達した小児のポリオ生ワクチン(OPV)累積接種率を月齢別に全国レベルで調査し、極めて高い接種率が保たれていることを確認した。さらに年齢別の健康人における1型および2型ポリオウイルス中和抗体保有率はワクチン接種直後の年齢群(2~3歳)で、それぞれ95%および98%と高く、日本における高いOPV接種率を反映していると考えられた。3型に対する2~3歳での中和抗体保有率(82%)は、1型および2型に比較すると低く、以前の感受性調査と同様の結果であった。本年度の感染症発生動向調査事業の感染源調査により富山県の健常児の糞便検体から分離された2型ポリオウイルスは、ワクチン株Sabin2型と比較して1.0%以上の変異を有するワクチン由来ポリオウイルスに該当したが、ワクチン由来ポリオウイルスの伝播およびポリオ症例の発生は認められなかった。日本では、高いポリオワクチン接種率により、野生株およびワクチン由来ポリオウイルスの伝播がない状態が維持されていることが確認された。

A. 研究目的

世界のポリオ根絶計画を見据え、将来的にはポリオ生ワクチン(OPV)の廃止を視野に入れた、ポリオワクチンによるわが国のポリオコントロール体制を確立する。予防接種の効果を判断する為に、社会レベルの免疫状態を知ると共に、野生株およびワクチン由来ポリオウイルスの伝播動態を解析する。

B. 研究方法

(1) 平成16年度調査を担当したのは北海道、宮城県、山形県、富山県、愛知県、山口県、愛媛県の7道県である。0~1歳、2~3歳、4~6歳、7~9歳、10~14歳、15~19歳、20~24歳、25~29歳、30~39歳、40歳以上の

10区分より各20名ずつ合計200人程度を目安として検体を採取した。検体採取は、原則として、2004年5月から12月までの間実施した。上記調査対象者から採血を行い、血清中のポリオウイルス型別中和抗体価を測定した。検査方法は、「感染症流行予測調査事業検査術式(平成14年6月)、厚生労働省健康局結核感染症課、国立感染症研究所感染症流行予測調査事業委員会」に準じたマイクロ法によった。

(2) 平成17年度に満3歳に達した小児のポリオ生ワクチン累積接種率を月齢別に全国レベルで調査する。月齢別累積接種率は「調査対象となる月齢人口」を分母とし、分子は「調査対象の月齢に達したときまでにワクチン接

種を済ませている者の数」で求める。本年度は麻疹ワクチン及び風疹ワクチンについても同時に調査する。

(3) ポリオ疑似例患者ならびに偶発的にヒトから分離されたポリオウイルス、環境中から分離されたウイルスの性状や遺伝子を解析し、野生株およびワクチン由来ポリオウイルスの伝播動態を調査する。

(倫理面への配慮)

感染症研究所の研究倫理審査委員会に研究の目的、趣旨を示し、審査をうける。抗体測定の為の血清提供者（健常人）に対する人権の配慮、個人情報の確保保全には万全を期す。

C. 研究結果

(1) 2004 年度 年齢別中和抗体保有状況：

各血清型に対するポリオ中和抗体保有状況を年齢別にまとめた<図 1>。従来の感受性調査の結果と同様、1 型および 2 型に対する中和抗体（4 倍以上）保有率は、OPV 接種直後の年齢群（2～3 歳）で、それぞれ 95% および 98% と高く、高いワクチン接種率を反映していると考えられる。3 型に対する 2～3 歳での中和抗体保有率（82%）は、1 型および 2 型に比較すると低く、以前の感受性調査と同様の結果であった。

次にポリオ中和抗体保有状況を年齢群別に比較した<図 2>。かねてから 1 型に対する抗体保有率が低い点が問題とされていた世代（昭和 50～52 年生まれ、2004 年時点では 28 歳前後）の 1 型中和抗体保有率を本年度の調査結果により再検討すると、年齢別で見ると、27, 28, 29 歳における 1 型中和抗体保有率は、それぞれ 66%, 72% および 60% であり、他の年齢より中和抗体保有率が低い傾向が認められた。さらに、年齢群別に見ると 25～29 歳の

年齢群の 1 型抗体保有率（76%）は、前後の年齢群（20～24 歳； 97%, 30～39 歳； 88%）と比較して、明らかに低い抗体保有率を示した。更に予防接種歴別が明らかな検体についての血清型別の中和抗体保有状況をまとめた（図 3）。以前の調査結果と同様に、1 型および 2 型に対する中和抗体保有率は、初回接種で効率良く上昇し（80%以上）、2 回目接種後に 100% 近くまで上昇する。一方、3 型に対する抗体保有率は、初回接種には 40%程度に過ぎず、2 回目接種後に顕著な抗体保有率の上昇が認められるものの 90%には到らない。

2005 年度の調査については現在集計中である。

(2) ポリオ生ワクチン接種率の調査：

1) 回収率：全国 47 都道府県、1258 カ所の市区町村に調査依頼状を発送し、うち 1053 カ所の自治体から回答が得られた（回収率 65.8%）。また、標本ベースでは 5000 名でそのうち 4140 名からのデータが得られた。（回収率 82.8%）。

ポリオ生ワクチン累積接種率：平成 17 年度に満 3 歳に達した小児におけるポリオ生ワクチン 1 回目及び 2 回目接種の接種者数と累積接種率曲線を図 3 に示す。ポリオ生ワクチン 1 回目の累積接種率曲線は生後 3 カ月から立ち上がり生後 6 カ月、7 カ月で急速に上昇する。生後 8 カ月から 11 カ月では上昇は緩やかになっている。生後 12 カ月～13 カ月で上昇が再び急になりそれ以降はゆっくりと上昇している。生後 6 カ月までは 44%，12 カ月までは 85%，24 カ月までは 94%，36 カ月までは 95% の小児が少なくとも一回のポリオ生ワクチンを受けている。この数字は同様に実施した昨年度とほぼ同じである。

一方ポリオ生ワクチン 2 回目の累積接種率曲線は生後 8 カ月から徐々に立ち上がり、生

後11カ月から13カ月で急速に上昇する。生後13カ月から17カ月では上昇は緩やかになっているが、生後17カ月から19カ月で上昇が再び急になり、それ以降は、生後23カ月から25カ月までがやや急になるものの、その後ゆっくりと上昇する。生後12ヶ月までの2回累積摂取率は12カ月までは42%，18カ月までは76%，24カ月までは87%，36カ月までは92%に達した。この数字も一昨年、昨年度よりやや高い。ポリオ生ワクチンは極めて高い接種率が保たれている。

(3) ポリオ生ワクチン接種率：表1に厚労省統計情報部で公開されている地域保健・老人保健事業報告の全国、県、市のポリオ接種者数を対象者数で除したものから接種率を算定した。平成14年、平成15年の数字がえられたが、全国では平成14年1回目86.3%、2回目83.2%。平成15年1回目86.4%、2回目82.9%であった。概ね高い接種率が得られたが、県別では沖縄県（平成14年：66.4%，67.4%，平成15年：60.8%，57.1%）市では新潟市（平成14年：71.4%，69.2%，平成15年：64.6%，62.9%）が低い。また個別接種の方が集団接種より多い地域もある（三重県など）。

(4) 2004年には表2に示すように、4株のポリオウイルスが AFP 患者および非 AFP 患者から分離された。そのうち2株は、感染症発症動向調査事業により非 AFP 患者から分離されたポリオウイルスであり、通常の2型ワクチン株と同定された。また、発熱・下痢・左下肢麻痺の症状が報告されている男性から、2型ポリオウイルスが分離され、通常の2型ワクチン株と同定された。

感染症発症動向調査事業のポリオ感染源調査により富山県の健常児の糞便検体から分離された2型ポリオウイルス1株は、VP1領域の塩基配列が親株である Sabin 2 株と比較し

て 1.2%の変異を有していたため、WHO の基準によるワクチン由来ポリオウイルス (vaccine-derived poliovirus; VDPV) と同定された。分離された2型 VDPV が家族内あるいは地域内に伝播していないことは、当該地域における追加サーベイランスにより確認された。また、本人および家族から継続的にポリオウイルスが分離されていないことから、ポリオウイルスワクチン株持続感染者が存在する可能性は低い。さらに、当該地域および周辺地域において、高い OPV 接種率が維持されていることから、同地域における VDPV によるポリオ流行のリスクは、きわめて低いことが示唆された。

D. 考察

前年度までの本研究班による調査に引き続き、低年齢層における1型および2型ポリオウイルスに対する高い中和抗体保有率が維持されていることが血清疫学的に確認された。3型に対する中和抗体保有率は、以前の調査と同様、1型および2型と比較して低く、初回免疫による中和抗体誘導が十分でない点も以前から指摘されているとおりである。本年度の調査により、現在20歳代後半の年齢群（昭和50～52年生まれ、28歳前後）における1型抗体保有率が他の年齢群と比較して低い傾向が再確認された。昨年度の本研究班による調査では、20歳代後半の年齢群の1型抗体保有率の低い傾向は、必ずしも顕著ではなかった。本年度の調査により、20歳代後半の年齢群における1型抗体保有率が低い傾向が再確認されたことは、毎年継続して中和抗体保有率調査を実施することが、ポリオ感染のリスク集団を把握する上で重要であることを示している。IPV の導入前後には、さらに継続して中和抗体保有率の推移を検討していく必要がある。

ポリオ生ワクチンはきわめて高い接種率が保たれている。一回目接種率が生後6～7カ月と生後12～13カ月で上昇が急になるのはポリオ生ワクチンが年2回の集団接種方式で行われている地域が多いためと考えられる。同様に2回目接種も生後11～13カ月と生後17～19カ月で上昇が急になっている。生ワクチンとしてポリオワクチンが生後はじめて投与されるワクチンであるが、生後一年を機に麻疹をはじめ他のワクチンの接種が開始されるので2回目以降は他のワクチンとのバランスを考慮することの必要性を示している。不活化ワクチンに変換されればこの問題は解消される。

一部でワクチン接種率の低い地域があったが、対象者数をどう算定するかでこの数字は変わってくる。また接種率をあげるのには個別接種の利点もあるがVDPVのことを考えると、集団接種には意味がある。

OPVを使用している地域では、世界中どこでもVDPVによるポリオ流行の潜在的リスクを有しており、ポリオウイルスワクチン株は健康人やポリオ以外の疾患の患者からも偶発的に分離される。WHOのポリオ実験室ネットワークでは、カプシドVP1領域の塩基配列が親株と比較して1.0%以上の変異を有するポリオウイルス分離株をVDPVと分類し、 AFP患者からVDPVが分離された場合は、速やかにWHOに報告することを義務づけている。親株から10%以上の変異は1年程度のウイルス伝播の可能性を示しており、当該地域におけるワクチン接種率が低い場合は、VDPVに由来するポリオ流行が発生するリスクが存在する。本年度、富山県の健常児から検出された2型VDPVは、ポリオ感染源調査においてVDPVが検出された初めての事例であるが、同地域および日本全体でみても高いOPV接種率が維持されていることから、

VDPV流行のリスクはきわめて小さいと考えられる。感染源調査は、日本のポリオフリーを証明する病原体サーベイランスシステムの一環として適切に機能しており、今後も他のサーベイランスシステムと組みあわせることにより、野生株およびVDPVの伝播がない状態の証明を継続していく必要がある。また、すでに多くの先進国・中進国で導入が進められている不活化ポリオワクチンを日本でも早急に導入することにより、ワクチン由来麻痺の発生及びVDPVによるポリオ流行のリスクを低下させることができると期待される。

E. 結論

ポリオ生ワクチンは現在、極めて高い接種率が保たれ、中和抗体保有率も高く維持されている。この高い接種率を保ちつつ、他の必要なウイルス生ワクチンの接種率を高め、かつポリオ根絶をはかるためには、我が国においても早急に不活化ポリオワクチンが採用されること、そして変換後も高いポリオワクチン接種率を保つことが必要である。そうすればポリオの真の根絶が達成されワクチンを廃止することができる。

F. 健康危険情報

感染症予防法で規定されている2類感染症としての野生株ウイルスによるポリオの発生はなかった。

G. 研究発表

論文発表

- 1) Arita M, Shimizu H, Nagata N, Ami Y, Suzaki Y, Sata T, Iwasaki T, Miyamura T: Temperature-sensitive mutants of enterovirus 71 show attenuation in cynomolgus monkeys. *J Gen Virol*

- 2005;86: 1391-1401.
- 2) Huang QS, Greening G, Baker MG, Grimwood K, Hewitt J, Hulston D, van Duin L, Fitzsimons A, Garrett N, Graham D, Lennon D, Shimizu H, Miyamura T, Pallansch MA: Persistence of oral polio vaccine virus after its removal from the immunisation schedule in New Zealand. *Lancet* 2005;366: 394-396.
- 3) Arita M, Zhu SL, Yoshida H, Yoneyama T, Miyamura T, Shimizu H: A Sabin 3-derived poliovirus recombinant contained a sequence homologous with indigenous human enterovirus species C in the viral polymerase coding region. *J Virol* 2005; 79:12650-12657.
- 4) Yang CF, Chen HY, Jorba J, Sun HC, Yang SJ, Lee HC, Huang YC, Lin TY, Chen PJ, Shimizu H, Nishimura Y, Utama A, Pallansch M, Miyamura T, Kew O, Yang JY: Intratypic recombination among lineages of type 1 vaccine-derived poliovirus emerging during chronic infection of an immunodeficient patient. *J Virol* 2005;79: 12623-12634.
- 5) 清水博之、武田直和、宮村達男: 不活化ポリオワクチン、*総合臨床* 53:1860-1865, 2004
- 6) 岩井雅恵、松浦久美子、長谷川澄代、小原真弓、堀元栄詞、永井美之、田中有易知、吉田弘、清水博之: ポリオ流行予測調査感染源調査においてワクチン由来ポリオウイルスが検出された一例について. *富山県衛生研究所年報* 28, 80-84, 2005
- 7) 清水博之、武田直和、宮村達男: ポリオワクチン、*臨床と微生物* 32:441-444, 2005

H. 知的所有権の出願・登録状況
なし

表1 平成14年度 地域保健・老人保健事業報告(地域保健編)市区町村表

	第1回 接種者数 (個別)	(集団)	第2回			(集)	合計 (2回目)	対象者数 接種率 %
			対象者数 合計 (1回目)	接種率 %	接種者数 (個)			
全 国	88563	1071189	1159752	86.3	87896	1048274	1136170	1365808 83.2
01 北海道	4122	20916	25038	60.5	4116	20265	24381	41746 58.4
02 青森県	34	13548	13582	77.2	37	13105	13142	19362 67.9
03 岩手県	155	11870	12025	77.9	143	11734	11877	15088 78.7
04 宮城県	133	11475	11608	81.9	130	11109	11239	14046 80.0
05 秋田県	196	5830	6026	80.9	160	5702	5862	7705 76.1
06 山形県	481	10060	10541	94.8	484	10243	10727	11439 93.8
07 福島県	417	12587	13004	74.8	410	12091	12501	18212 68.6
08 茨城県	714	26784	27498	77.7	695	25725	26420	36965 71.5
09 栃木県	361	13635	13996	14720	95.1	346	13294	13640 14338 95.1
10 群馬県	16	19099	19115	22897	83.5	12	18763	18775 23159 81.1
11 埼玉県	2686	51690	54376	61007	89.1	2798	50036	52834 61067 86.5
12 千葉県	42	45233	45275	53132	85.2	43	43945	43988 58608 75.1
13 東京都	8622	25268	33890	37037	91.5	8944	24897	33841 37199 91.0
14 神奈川県	-	25160	25160	26355	95.5	-	24717	24717 26554 93.1
15 新潟県	82	16413	16495	19644	84.0	80	15878	15958 20467 78.0
16 富山県	-	7038	7038	8764	80.3	-	7135	7135 8675 82.2
17 石川県	44	6592	6636	7746	85.7	23	6122	6145 8097 75.9
18 福井県	1	7632	7633	9759	78.2	-	7774	7774 9777 79.5
19 山梨県	3	8230	8233	11382	72.3	7	8212	8219 11374 72.3
20 長野県	177	17119	17296	19433	89.0	146	16838	16984 20117 84.4
21 岐阜県	190	15538	15728	18523	84.9	201	15293	15494 18898 82.0
22 静岡県	4068	21329	25397	27600	92.0	4147	20955	25102 27902 90.0
23 愛知県	2202	43010	45212	59851	75.5	2121	42081	44202 61157 72.3
24 三重県	10921	6617	17538	21523	81.5	11142	6540	17682 21211 83.4
25 滋賀県	1	13987	13988	16399	85.3	-	13708	13708 16597 82.6
26 京都府	2	10580	10582	9893	107.0	3	10107	10110 9692 104.3
27 大阪府	5500	42012	47512	53890	88.2	5464	41214	46678 56237 83.0
28 兵庫県	-	25154	25154	29505	85.3	-	24992	24992 30542 81.8
29 奈良県	10	9415	9425	11107	84.9	4	9163	9167 11434 80.2
30 和歌山县	75	5518	5593	6907	81.0	66	5723	5789 7122 81.3
31 鳥取県	-	5300	5300	5750	92.2	-	5269	5269 5933 88.8
32 島根県	31	6252	6283	8099	77.6	26	6220	6246 8112 77.0
33 岡山県	405	6650	7055	10924	64.6	402	6594	6996 10248 68.3
34 広島県	983	8232	9215	11280	81.7	997	8152	9149 11835 77.3
35 山口県	4738	6151	10889	14002	77.8	4734	6024	10758 13614 79.0
36 徳島県	544	6290	6834	8636	79.1	492	6270	6762 8645 78.2
37 香川県	1	5762	5763	6635	86.9	1	5856	5857 6757 86.7
38 愛媛県	1	8102	8103	10506	77.1	2	8331	8333 10779 77.3
39 高知県	38	3374	3412	4575	74.6	43	3426	3469 4731 73.3
40 福岡県	2	23036	23038	29360	78.5	-	22992	22992 30313 75.8
41 佐賀県	147	8208	8355	10862	76.9	143	8436	8579 11834 72.5
42 長崎県	612	7175	7787	9492	82.0	602	6989	7591 9620 78.9
43 熊本県	148	9911	10059	13126	76.6	163	9916	10079 13072 77.1
44 大分県	1623	4436	6059	7318	82.8	1566	4102	5668 7476 75.8
45 宮崎県	2854	4717	7571	8912	85.0	2841	4411	7252 9263 78.3
46 鹿児島県	-	10222	10222	15823	64.6	-	10197	10197 15110 67.5
47 沖縄県	2	17533	17535	26397	66.4	1	17142	17143 25433 67.4

<http://www.dbtk.mhlw.go.jp/toukei/cgi/sse_kensaku>

表1 平成14年度 地域保健・老人保健事業報告(地域保健編)市区町村表

	第1回		第2回						
	接種者数 (個別)	(集団)	対象者数 合計 (1回目)	接種率 %	接種者数 (個)	(集)	対象者数 合計 (2回目)	接種率 %	
14大都市(別掲)									
東京区部(別)	-	63306	63306	96.4	-	61583	61583	65376	94.2
札幌市(別)	-	15798	15798	102.6	-	15410	15410	15404	100.0
仙台市(別)	-	10084	10084	97.15	-	9969	9969	9715	102.6
千葉市(別)	-	9204	9204	8650	-	8216	8216	8650	95.0
横浜市(別)	-	33352	33352	32720	101.9	-	32416	32416	32720
川崎市(別)	327	12931	13258	97.8	23	12960	12983	13323	97.4
名古屋市(別)	-	19627	19627	98.8	-	18755	18755	19866	94.4
京都市(別)	-	12561	12561	12609	99.6	-	11965	11965	12609
大阪市(別)	-	22099	22099	24817	89.0	-	21972	21972	24840
神戸市(別)	-	13109	13109	13219	99.2	-	13070	13070	13109
広島市(別)	-	11834	11834	12405	95.4	-	11536	11536	13394
北九州市(別)	-	8941	8941	8691	102.9	-	8703	8703	8861
福岡市(別)	-	12655	12655	13006	97.3	-	13063	13063	13006
中核市(別掲)									
旭川市(別)	2915	-	2915	2883	101.1	2979	-	2979	2883
秋田市(別)	-	2773	2773	2845	97.5	-	2606	2606	2727
郡山市(別)	-	3604	3604	4124	87.4	-	3550	3550	4980
いわき市(別)	3209	-	3209	3286	97.7	2954	-	2954	3286
宇都宮市(別)	-	4610	4610	4598	100.3	-	4105	4105	4598
横須賀市(別)	-	3532	3532	3685	95.8	-	3426	3426	3732
新潟市(別)	-	4764	4764	6676	71.4	-	4622	4622	6676
富山市(別)	-	3085	3085	3120	98.9	-	3009	3009	3049
金沢市(別)	-	4626	4626	4553	101.6	-	4625	4625	4529
長野市(別)	-	3663	3663	3740	97.9	-	3573	3573	3740
岐阜市(別)	-	3833	3833	3716	103.1	-	3760	3760	3716
静岡市(別)	1	4299	4300	4500	95.6	2	4179	4181	4500
浜松市(別)	-	6431	6431	6500	98.9	-	6385	6385	6500
豊橋市(別)	-	3709	3709	4230	87.7	-	3882	3882	4157
豊田市(別)	-	4076	4076	4157	98.1	-	4089	4089	4254
堺市(別)	-	7305	7305	7892	92.6	-	7662	7662	7892
姫路市(別)	-	5253	5253	11811	44.5	-	5107	5107	11820
奈良市(別)	-	2975	2975	3289	90.5	-	2903	2903	3318
和歌山市(別)	-	3478	3478	3900	89.2	-	3464	3464	3900
岡山市(別)	6984	-	6984	7580	92.1	6580	-	6580	7580
倉敷市(別)	4675	-	4675	5452	85.7	4533	-	4533	5452
福山市(別)	-	4096	4096	3925	104.4	-	4163	4163	3925
高松市(別)	-	3582	3582	3629	98.7	-	3448	3448	3554
松山市(別)	-	4783	4783	4517	105.9	-	4482	4482	4517
高知市(別)	-	3058	3058	3168	96.5	-	2978	2978	3168
長崎市(別)	-	3712	3712	3470	107.0	-	3567	3567	3470
熊本市(別)	9	6606	6615	6674	99.1	4	6191	6191	6674
大分市(別)	4584	-	4584	4500	101.9	4665	-	4665	5000
宮崎市(別)	-	3078	3078	3118	98.7	-	3164	3164	3118
鹿児島市(別)	-	5742	5742	5936	96.7	-	4390	4390	4883
その他政令市(別掲)									
函館市(別)	-	2081	2081	2069	100.6	-	1984	1984	2075
小樽市(別)	-	956	956	999	95.7	-	1024	1024	999
さいたま市(別)	10477	-	10477	12379	84.6	10366	-	10366	14665
相模原市(別)	2	5821	5823	6500	89.6	4	5912	5916	6500
東大阪市(別)	-	5085	5085	4874	104.3	-	4900	4900	4874
尼崎市(別)	-	4518	4518	4349	103.9	-	4048	4048	4318
西宮市(別)	-	4954	4954	5300	93.5	-	4863	4863	5300
吳市(別)	-	1776	1776	1739	102.1	-	1760	1760	1739
下関市(別)	1996	-	1996	2092	95.4	2051	-	2051	2092
大牟田市(別)	-	1016	1016	963	105.5	-	1014	1014	963
佐世保市(別)	-	2118	2118	2250	94.1	-	2133	2133	2250
政令市(再)	35179	380499	415678	435331	95.5	34161	370586	404747	438246
									92.4

表1 平成15年度 市区町村が実施した急性灰白髄炎の予防接種の対象者数・接種者数・接種率
都道府県—14大都市—中核市—その他政令市別

	第1回					第2回				
	接種者数			対象者数	接種率(%)	接種者数			対象者数	接種率(%)
	(個別)	(集団)	合計			(A+B)/C	D	E		
全国	99240	1036244	1135484	1313965	86.4	97672	1015565	1113237	1342692	82.9
北海道	6997	38213	45210	64441	70.2	6765	37593	44358	65132	68.1
青森	32	12824	12856	16255	79.1	31	12742	12773	18707	68.3
岩手	181	11490	11671	14739	79.2	202	11787	11989	14776	81.1
宮城	316	20715	21031	23326	90.2	320	20464	20784	23256	89.4
秋田	153	8392	8545	10098	84.6	161	7935	8096	10014	80.8
山形	-	10296	10296	10711	96.1	-	10081	10081	11091	90.9
福島	3629	15572	19201	23069	83.2	3478	15057	18535	25487	72.7
茨城	3543	23640	27183	33222	81.8	3174	23276	26450	36622	72.2
栃木	705	18208	18913	18688	101.2	679	17832	18511	18676	99.1
群馬	13	18752	18765	22928	81.8	13	18597	18610	23743	78.4
埼玉	12930	51061	63991	71254	89.8	13193	49737	62930	74180	84.8
千葉	1283	49362	50645	60628	83.5	1162	48743	49905	65802	75.8
東京	11791	85089	96880	101029	95.9	11340	82151	93491	100631	92.9
神奈川	411	80557	80968	83171	97.4	63	78396	78459	83290	94.2
新潟	1068	18936	20004	25550	78.3	1118	19248	20366	27049	75.3
富山	-	9575	9575	11173	85.7	-	9781	9781	10564	92.6
石川	1	10699	10700	11637	91.9	-	10319	10319	11954	86.3
福井	1	7701	7702	9155	84.1	-	7675	7675	9072	84.6
山梨	5	7696	7701	11013	69.9	9	7462	7471	11042	67.7
長野	236	19682	19918	22208	89.7	251	19783	20034	22941	87.3
岐阜	184	19655	19839	22402	88.6	184	19689	19873	22785	87.2
静岡	2231	31658	33889	37709	89.9	2271	32185	34456	37774	91.2
愛知	2384	68213	70597	85998	82.1	2370	67345	69715	88617	78.7
三重	10540	6470	17010	19449	87.5	10823	6437	17260	20112	85.8
滋賀	2	14060	14062	16681	84.3	1	13795	13796	17159	80.4
京都	1	22955	22956	22627	101.5	1	22206	22207	22000	100.9
大阪	5337	75341	80678	87520	92.2	5166	71895	77061	89837	85.8
兵庫	28	52176	52204	56559	92.3	20	50484	50504	56322	89.7
奈良	-	12647	12647	13818	91.5	3	11980	11983	14416	83.1
和歌山	126	8990	9116	10523	86.6	92	8790	8882	10722	82.8
鳥取	66	5120	5186	5558	93.3	80	4990	5070	5722	88.6
島根	54	6046	6100	7693	79.3	35	6071	6106	8028	76.1
岡山	12363	5459	17822	28315	62.9	12045	5525	17570	28175	62.4
広島	872	25438	26310	28076	93.7	878	24965	25843	28057	92.1
山口	6482	5854	12336	15214	81.1	6505	5998	12503	15519	80.6
徳島	647	6107	6754	8455	79.9	588	6059	6647	8452	78.6
香川	-	9303	9303	9837	94.6	-	9285	9285	10203	91.0
愛媛	4716	7919	12635	14456	87.4	4776	7968	12744	14732	86.5
高知	11	6419	6430	7708	83.4	19	6332	6351	7752	81.9
福岡	1	47813	47814	53490	89.4	1	47645	47646	55014	86.6
佐賀	236	7741	7977	11720	68.1	206	7574	7780	12322	63.1
長崎	63	12629	12692	14297	88.8	57	12730	12787	14378	88.9
熊本	14	16294	16308	19732	82.6	18	15767	15785	19593	80.6
大分	5891	4410	10301	12019	85.7	6101	4430	10531	12706	82.9
宮崎	2817	7301	10118	11088	91.3	2640	7246	9886	11237	88.0
鹿児島	879	14388	15267	20167	75.7	833	13759	14592	19436	75.1
沖縄	-	17378	17378	28559	60.8	-	15756	15756	27593	57.1

資料：平成15年度地域保健・老人保健事業報告

表1 平成15年度 市区町村が実施した急性灰白髄炎の予防接種の対象者数・接種者数・接種率
都道府県—14大都市—中核市—その他政令市別

	第1回					第2回						
	接種者数		対象者数	接種率(%)	(個別)	接種者数		対象者数	接種率(%)			
	(個別)	(集団)				合計	C					
(個別)	A	B	A+B	C	(A+B)/C	(個別)	D	(集団)	E	D+E	F	(D+E)/F
14大都市(再掲)												
東京都区部	4189	58368	62557	64858	96.5	4015	55987	60002	64635	92.8		
札幌市	-	15234	15234	15304	99.5	-	14898	14898	15304	97.3		
仙台市	-	9551	9551	9450	101.1	-	9739	9739	9450	103.1		
さいたま市	10125	-	10125	11913	85.0	10464	-	10464	14565	71.8		
千葉市	-	5581	5581	8750	63.8	-	5816	5816	8750	66.5		
横浜市	-	32775	32775	33500	97.8	-	31642	31642	33500	94.5		
川崎市	388	12914	13302	13577	98.0	36	12974	13010	13468	96.6		
名古屋市	-	19061	19061	19489	97.8	-	18190	18190	19489	93.3		
京都市	-	12197	12197	12284	99.3	-	11956	11956	12284	97.3		
大阪市	-	22548	22548	24114	93.5	-	20661	20661	24279	85.1		
神戸市	-	13179	13179	13182	100.0	-	12554	12554	13179	95.3		
広島市	-	11404	11404	11119	102.6	-	11464	11464	11019	104.0		
北九州市	-	8873	8873	8395	105.7	-	8790	8790	8661	101.5		
福岡市	-	15143	15143	15292	99.0	-	15396	15396	15292	100.7		
中核市(再掲)												
旭川市	2879	-	2879	5770	49.9	2835	-	2835	5770	49.1		
秋田市	-	2906	2906	3003	96.8	-	2548	2548	2611	97.6		
郡山市	-	3456	3456	3981	86.8	-	3328	3328	3976	83.7		
いわき市	3235	-	3235	3212	100.7	3064	-	3064	3212	95.4		
宇都宮市	-	4484	4484	4614	97.2	-	4398	4398	4614	95.3		
川越市	-	3020	3020	3400	88.8	-	2978	2978	3400	87.6		
船橋市	-	5592	5592	5471	102.2	-	5691	5691	5471	104.0		
横須賀市	-	3371	3371	3694	91.3	-	3316	3316	3635	91.2		
相模原市	6	6012	6018	6500	92.6	8	5670	5678	6500	87.4		
新潟市	-	4572	4572	7074	64.6	-	4448	4448	7074	62.9		
富山市	-	2939	2939	2936	100.1	-	3024	3024	3055	99.0		
金沢市	-	4432	4432	4451	99.6	-	4336	4336	4473	96.9		
長野市	-	3576	3576	3740	95.6	-	3576	3576	3740	95.6		
岐阜市	4	3861	3865	3747	103.1	4	3749	3753	3747	100.2		
静岡市	1961	3884	5845	6486	90.1	1976	3875	5851	6486	90.2		
浜松市	-	5792	5792	6450	89.8	-	6183	6183	6450	95.9		
豊橋市	-	3561	3561	4189	85.0	-	3895	3895	4280	91.0		
豊田市	-	4017	4017	4176	96.2	-	3946	3946	4277	92.3		
岡崎市	-	3825	3825	4857	78.8	-	3854	3854	4857	79.3		
堺市	-	7467	7467	7752	96.3	-	7320	7320	7752	94.4		
高槻市	-	3293	3293	3516	93.7	-	3195	3195	3519	90.8		
姫路市	-	5222	5222	5254	99.4	-	5095	5095	5254	97.0		
奈良市	-	3263	3263	3198	102.0	-	2924	2924	3182	91.9		
和歌山市	-	3388	3388	3295	102.8	-	3311	3311	3295	100.5		
岡山市	6738	-	6738	13002	51.8	6636	-	6636	13002	51.0		
倉敷市	4628	-	4628	4581	101.0	4413	-	4413	4581	96.3		
福山市	-	3926	3926	3925	100.0	-	3674	3674	3925	93.6		
高松市	-	3534	3534	3439	102.8	-	3512	3512	3587	97.9		
松山市	4686	-	4686	4469	104.9	4750	-	4750	4469	106.3		
高知市	-	3178	3178	3052	104.1	-	3007	3007	3052	98.5		
長崎市	-	3378	3378	3266	103.4	-	3482	3482	3266	106.6		
熊本市	7	6690	6697	6695	100.0	2	6061	6063	6695	90.6		
大分市	4312	-	4312	4500	95.8	4485	-	4485	5000	89.7		
宮崎市	-	2904	2904	3022	96.1	-	2799	2799	3022	92.6		
鹿児島市	-	5056	5056	4962	101.9	-	4865	4865	4968	97.9		
その他政令市(再掲)												
函館市	-	1935	1935	2023	95.7	-	1875	1875	1969	95.2		
小樽市	-	879	879	976	90.1	-	928	928	976	95.1		
東大阪市	-	4697	4697	4666	100.7	-	4748	4748	4666	101.8		
尼崎市	-	4667	4667	5607	83.2	-	4127	4127	4890	84.4		
西宮市	-	4820	4820	4727	102.0	-	4760	4760	4727	100.7		
吳市	-	1649	1649	1626	101.4	-	1608	1608	1626	98.9		
下関市	1955	-	1955	1987	98.4	1918	-	1918	1987	96.5		
大牟田市	-	962	962	965	99.7	-	970	970	965	100.5		
佐世保市	-	2084	2084	2250	92.6	-	2052	2052	2250	91.2		

資料：平成15年度地域保健・老人保健事業報告

表2 2004年に我が国で分離されたポリオウイルスの性状

検体番号	地域	年令	性別	直近のワクチン接種日	発症日	採便日	臨床診断名	ウイルス型	ポリオウイルスの型内鑑別
1	大阪市	8ヶ月	女	未接種	04年6月4日	6月28日	上気道炎、肝機能障害	ポリオ2型	ワクチン株
2	新潟県	7ヶ月	女	04年5月25日	04年7月29日	8月2日	胃腸炎	ポリオ2型	ワクチン株
3	大阪市	34歳	男	未接種*	04年9月5日	9月29日	AFP	ポリオ2型	ワクチン株
4	富山県	9ヶ月	男	04年5月27日		9月9日	健常児	ポリオ2型	2型ワクチン由来ポリオウイルス

* 同一家族内の児のワクチン接種日 04年9月1日

図1. 年齢別ポリオ中和抗体保有状況 ($\geq 1:4$) の年度別比較
感染症流行予測調査より




図2. 年齢群別水リ才中和抗体保有状況、2004年
感染症流行予測調査より





図3. 全国ポリオワクチン累積接種率調査

全国の自治体から5,000人の3歳児を無作為抽出して
ワクチン接種月齢を調査した。



麻 痹