

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号3 重症筋無力症 Myasthenia gravis

| | 死亡数 | | | 粗死亡率 (/100万) | | | 年齢調整死亡率 (/100万) | |
|------|-----|----|----|-----------------|------|------|--------------------|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1972 | 54 | 17 | 37 | 0.50 | 0.32 | 0.68 | 0.34 | 0.68 |
| 1973 | 87 | 34 | 53 | 0.80 | 0.64 | 0.96 | 0.69 | 0.98 |
| 1974 | 81 | 32 | 49 | 0.74 | 0.59 | 0.87 | 0.73 | 0.94 |
| 1975 | 75 | 32 | 43 | 0.67 | 0.58 | 0.76 | 0.66 | 0.82 |
| 1976 | 76 | 31 | 45 | 0.67 | 0.56 | 0.78 | 0.60 | 0.84 |
| 1977 | 65 | 26 | 39 | 0.57 | 0.46 | 0.67 | 0.49 | 0.72 |
| 1978 | 82 | 29 | 53 | 0.71 | 0.51 | 0.91 | 0.56 | 0.97 |
| 1979 | 77 | 34 | 43 | 0.66 | 0.59 | 0.73 | 0.66 | 0.80 |
| 1980 | 85 | 35 | 50 | 0.73 | 0.61 | 0.84 | 0.65 | 0.90 |
| 1981 | 74 | 22 | 52 | 0.63 | 0.38 | 0.87 | 0.41 | 0.92 |
| 1982 | 68 | 27 | 41 | 0.57 | 0.46 | 0.68 | 0.49 | 0.70 |
| 1983 | 78 | 26 | 52 | 0.65 | 0.44 | 0.86 | 0.46 | 0.89 |
| 1984 | 59 | 18 | 41 | 0.49 | 0.30 | 0.67 | 0.31 | 0.69 |
| 1985 | 65 | 26 | 39 | 0.54 | 0.44 | 0.63 | 0.44 | 0.63 |
| 1986 | 44 | 24 | 20 | 0.36 | 0.40 | 0.32 | 0.39 | 0.32 |
| 1987 | 56 | 21 | 35 | 0.46 | 0.35 | 0.56 | 0.34 | 0.54 |
| 1988 | 57 | 19 | 38 | 0.46 | 0.31 | 0.61 | 0.30 | 0.57 |
| 1989 | 57 | 23 | 34 | 0.46 | 0.38 | 0.54 | 0.35 | 0.49 |
| 1990 | 59 | 23 | 36 | 0.48 | 0.38 | 0.57 | 0.33 | 0.51 |
| 1991 | 40 | 11 | 29 | 0.32 | 0.18 | 0.46 | 0.18 | 0.41 |
| 1992 | 44 | 9 | 35 | 0.35 | 0.15 | 0.55 | 0.14 | 0.47 |
| 1993 | 68 | 25 | 43 | 0.55 | 0.41 | 0.68 | 0.34 | 0.57 |
| 1994 | 54 | 21 | 33 | 0.43 | 0.34 | 0.52 | 0.27 | 0.43 |
| 1995 | 52 | 26 | 26 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.32 |
| 1996 | 46 | 14 | 32 | 0.37 | 0.23 | 0.50 | 0.16 | 0.38 |
| 1997 | 50 | 16 | 34 | 0.40 | 0.26 | 0.53 | 0.22 | 0.38 |
| 1998 | 50 | 17 | 33 | 0.40 | 0.27 | 0.51 | 0.23 | 0.38 |
| 1999 | 46 | 16 | 30 | 0.36 | 0.26 | 0.46 | 0.19 | 0.33 |
| 2000 | 39 | 13 | 26 | 0.31 | 0.21 | 0.40 | 0.16 | 0.27 |
| 2001 | 58 | 20 | 38 | 0.46 | 0.32 | 0.58 | 0.21 | 0.39 |
| 2002 | 57 | 15 | 42 | 0.45 | 0.24 | 0.64 | 0.17 | 0.42 |
| 2003 | 46 | 15 | 31 | 0.36 | 0.24 | 0.47 | 0.13 | 0.27 |
| 2004 | 51 | 11 | 40 | 0.40 | 0.18 | 0.61 | 0.09 | 0.30 |

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号4 全身性エリテマトーデス Systemic lupus erythematosus

| | 死亡数 | | | 粗死亡率 (/100万) | | | 年齢調整死亡率 (/100万) | |
|------|-----|----|-----|-----------------|------|------|--------------------|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1972 | 354 | 50 | 304 | 3.30 | 0.95 | 5.56 | 0.99 | 5.19 |
| 1973 | 445 | 48 | 397 | 4.09 | 0.90 | 7.17 | 0.93 | 6.85 |
| 1974 | 457 | 61 | 396 | 4.15 | 1.13 | 7.07 | 1.19 | 6.81 |
| 1975 | 460 | 47 | 413 | 4.11 | 0.85 | 7.26 | 0.92 | 7.02 |
| 1976 | 511 | 51 | 460 | 4.52 | 0.92 | 8.01 | 0.92 | 7.68 |
| 1977 | 447 | 49 | 398 | 3.92 | 0.87 | 6.87 | 0.94 | 6.72 |
| 1978 | 451 | 45 | 406 | 3.92 | 0.79 | 6.94 | 0.82 | 6.79 |
| 1979 | 416 | 43 | 373 | 3.58 | 0.75 | 6.33 | 0.78 | 6.26 |
| 1980 | 485 | 56 | 429 | 4.14 | 0.97 | 7.21 | 1.03 | 7.12 |
| 1981 | 426 | 49 | 377 | 3.61 | 0.84 | 6.30 | 0.88 | 6.26 |
| 1982 | 457 | 54 | 403 | 3.85 | 0.92 | 6.68 | 0.96 | 6.71 |
| 1983 | 425 | 48 | 377 | 3.56 | 0.82 | 6.21 | 0.83 | 6.18 |
| 1984 | 432 | 42 | 390 | 3.59 | 0.71 | 6.39 | 0.73 | 6.42 |
| 1985 | 435 | 54 | 381 | 3.59 | 0.91 | 6.19 | 0.91 | 6.19 |
| 1986 | 354 | 45 | 309 | 2.91 | 0.75 | 4.99 | 0.74 | 4.98 |
| 1987 | 367 | 47 | 320 | 3.00 | 0.78 | 5.15 | 0.77 | 5.09 |
| 1988 | 358 | 59 | 299 | 2.92 | 0.98 | 4.79 | 0.92 | 4.73 |
| 1989 | 403 | 60 | 343 | 3.27 | 0.99 | 5.47 | 0.92 | 5.34 |
| 1990 | 374 | 52 | 322 | 3.03 | 0.86 | 5.12 | 0.81 | 4.98 |
| 1991 | 373 | 59 | 314 | 3.01 | 0.97 | 4.97 | 0.87 | 4.81 |
| 1992 | 371 | 57 | 314 | 2.98 | 0.93 | 4.96 | 0.82 | 4.75 |
| 1993 | 351 | 59 | 292 | 2.81 | 0.96 | 4.60 | 0.80 | 4.31 |
| 1994 | 355 | 47 | 308 | 2.84 | 0.77 | 4.83 | 0.69 | 4.49 |
| 1995 | 358 | 59 | 299 | 2.85 | 0.96 | 4.67 | 0.80 | 4.34 |
| 1996 | 357 | 66 | 291 | 2.84 | 1.07 | 4.53 | 0.88 | 4.18 |
| 1997 | 368 | 78 | 290 | 2.92 | 1.26 | 4.51 | 1.00 | 4.00 |
| 1998 | 348 | 60 | 288 | 2.75 | 0.97 | 4.46 | 0.79 | 3.83 |
| 1999 | 355 | 69 | 286 | 2.80 | 1.11 | 4.42 | 0.88 | 3.83 |
| 2000 | 338 | 59 | 279 | 2.66 | 0.95 | 4.30 | 0.74 | 3.63 |
| 2001 | 287 | 59 | 228 | 2.25 | 0.95 | 3.51 | 0.67 | 2.90 |
| 2002 | 328 | 68 | 260 | 2.57 | 1.09 | 3.99 | 0.77 | 3.24 |
| 2003 | 337 | 69 | 268 | 2.64 | 1.11 | 4.10 | 0.75 | 3.30 |
| 2004 | 282 | 54 | 228 | 2.21 | 0.87 | 3.49 | 0.59 | 2.76 |

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号5 スモン SMON

| | 死亡数 | | | 粗死亡率 (/100万) | | | 年齢調整死亡率 (/100万) | |
|------|-----|---|----|-----------------|------|------|--------------------|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 9 | 3 | 6 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
| 1996 | 13 | 0 | 13 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.11 |
| 1997 | 5 | 1 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
| 1998 | 7 | 2 | 5 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
| 1999 | 5 | 0 | 5 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.04 |
| 2000 | 1 | 1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2001 | 5 | 0 | 5 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.03 |
| 2002 | 6 | 0 | 6 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.03 |
| 2003 | 2 | 0 | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 2004 | 6 | 0 | 6 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.04 |

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号5 薬物誘発性多発ニューロパチー Drug-induced polyneuropathy (スモンを含む)

| | 死亡数 | | | 粗死亡率 (/100万) | | | 年齢調整死亡率 (/100万) | |
|------|-----|---|----|-----------------|------|------|--------------------|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 28 | 9 | 19 | 0.24 | 0.16 | 0.32 | 0.18 | 0.38 |
| 1980 | 22 | 3 | 19 | 0.19 | 0.05 | 0.32 | 0.06 | 0.38 |
| 1981 | 19 | 5 | 14 | 0.16 | 0.09 | 0.23 | 0.09 | 0.28 |
| 1982 | 20 | 7 | 13 | 0.17 | 0.12 | 0.22 | 0.14 | 0.24 |
| 1983 | 16 | 6 | 10 | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.11 | 0.18 |
| 1984 | 14 | 5 | 9 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.09 | 0.16 |
| 1985 | 20 | 8 | 12 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.19 |
| 1986 | 20 | 4 | 16 | 0.16 | 0.07 | 0.26 | 0.07 | 0.25 |
| 1987 | 9 | 3 | 6 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.08 |
| 1988 | 8 | 1 | 7 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.10 |
| 1989 | 11 | 3 | 8 | 0.09 | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.11 |
| 1990 | 9 | 2 | 7 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.09 |
| 1991 | 17 | 4 | 13 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.06 | 0.16 |
| 1992 | 4 | 1 | 3 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| 1993 | 11 | 3 | 8 | 0.09 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.09 |
| 1994 | 4 | 0 | 4 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| 1995 | 9 | 3 | 6 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
| 1996 | 14 | 0 | 14 | 0.11 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.12 |
| 1997 | 5 | 1 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
| 1998 | 7 | 2 | 5 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
| 1999 | 5 | 0 | 5 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.04 |
| 2000 | 1 | 1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2001 | 5 | 0 | 5 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.03 |
| 2002 | 6 | 0 | 6 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.03 |
| 2003 | 2 | 0 | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 2004 | 6 | 0 | 6 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.04 |

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号6 再生不良性貧血 Aplastic anemia

| | 死亡数 | | | 粗死亡率 (/100万) | | | 年齢調整死亡率 (/100万) | |
|------|------|-----|-----|-----------------|------|-------|--------------------|-------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1972 | 970 | 411 | 559 | 9.04 | 7.81 | 10.22 | 9.19 | 11.84 |
| 1973 | 1150 | 520 | 630 | 10.58 | 9.75 | 11.38 | 11.34 | 13.31 |
| 1974 | 1187 | 505 | 682 | 10.79 | 9.35 | 12.17 | 10.90 | 14.29 |
| 1975 | 1068 | 484 | 584 | 9.54 | 8.79 | 10.27 | 10.16 | 11.88 |
| 1976 | 938 | 446 | 492 | 8.29 | 8.01 | 8.57 | 9.22 | 9.98 |
| 1977 | 822 | 433 | 389 | 7.20 | 7.70 | 6.71 | 8.81 | 7.64 |
| 1978 | 834 | 390 | 444 | 7.24 | 6.88 | 7.59 | 7.66 | 8.65 |
| 1979 | 885 | 435 | 450 | 7.62 | 7.61 | 7.63 | 8.52 | 8.60 |
| 1980 | 869 | 433 | 436 | 7.42 | 7.52 | 7.33 | 8.25 | 8.12 |
| 1981 | 851 | 433 | 418 | 7.22 | 7.47 | 6.98 | 8.04 | 7.64 |
| 1982 | 870 | 425 | 445 | 7.33 | 7.28 | 7.38 | 7.66 | 7.92 |
| 1983 | 881 | 412 | 469 | 7.37 | 7.01 | 7.73 | 7.32 | 8.13 |
| 1984 | 876 | 455 | 421 | 7.29 | 7.69 | 6.89 | 7.87 | 7.09 |
| 1985 | 936 | 458 | 478 | 7.73 | 7.70 | 7.77 | 7.70 | 7.77 |
| 1986 | 882 | 409 | 473 | 7.25 | 6.84 | 7.65 | 6.69 | 7.45 |
| 1987 | 896 | 436 | 460 | 7.33 | 7.26 | 7.40 | 6.91 | 7.03 |
| 1988 | 903 | 469 | 434 | 7.35 | 7.77 | 6.95 | 7.21 | 6.40 |
| 1989 | 920 | 447 | 473 | 7.46 | 7.38 | 7.55 | 6.75 | 6.74 |
| 1990 | 900 | 436 | 464 | 7.28 | 7.18 | 7.38 | 6.38 | 6.42 |
| 1991 | 877 | 422 | 455 | 7.07 | 6.93 | 7.21 | 5.95 | 6.00 |
| 1992 | 877 | 401 | 476 | 7.05 | 6.56 | 7.51 | 5.52 | 6.07 |
| 1993 | 766 | 351 | 415 | 6.14 | 5.73 | 6.53 | 4.67 | 5.18 |
| 1994 | 896 | 395 | 501 | 7.17 | 6.44 | 7.86 | 5.08 | 5.91 |
| 1995 | 874 | 374 | 500 | 6.96 | 6.07 | 7.81 | 4.65 | 5.65 |
| 1996 | 881 | 400 | 481 | 7.00 | 6.48 | 7.49 | 4.87 | 5.28 |
| 1997 | 919 | 408 | 511 | 7.28 | 6.60 | 7.94 | 4.72 | 5.27 |
| 1998 | 875 | 348 | 527 | 6.92 | 5.62 | 8.16 | 3.83 | 5.29 |
| 1999 | 852 | 358 | 494 | 6.73 | 5.78 | 7.63 | 3.90 | 4.79 |
| 2000 | 812 | 374 | 438 | 6.40 | 6.02 | 6.76 | 3.92 | 4.04 |
| 2001 | 775 | 316 | 459 | 6.09 | 5.08 | 7.06 | 3.15 | 4.19 |
| 2002 | 789 | 337 | 452 | 6.19 | 5.41 | 6.93 | 3.17 | 3.79 |
| 2003 | 757 | 328 | 429 | 5.93 | 5.26 | 6.57 | 3.02 | 3.31 |
| 2004 | 787 | 336 | 451 | 6.16 | 5.39 | 6.90 | 3.04 | 3.40 |

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号7 サルコイドーシス Sarcoidosis

| | 死亡数 | | | 粗死亡率 (/100万) | | | 年齢調整死亡率 (/100万) | |
|------|-----|----|----|-----------------|------|------|--------------------|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1972 | 27 | 9 | 18 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.21 | 0.40 |
| 1973 | 38 | 19 | 19 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.44 | 0.45 |
| 1974 | 31 | 13 | 18 | 0.28 | 0.24 | 0.32 | 0.29 | 0.41 |
| 1975 | 33 | 15 | 18 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.38 |
| 1976 | 24 | 9 | 15 | 0.21 | 0.16 | 0.26 | 0.17 | 0.31 |
| 1977 | 33 | 15 | 18 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.36 |
| 1978 | 29 | 14 | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| 1979 | 26 | 11 | 15 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.28 |
| 1980 | 28 | 13 | 15 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| 1981 | 25 | 11 | 14 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.26 |
| 1982 | 25 | 10 | 15 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.18 | 0.26 |
| 1983 | 34 | 9 | 25 | 0.28 | 0.15 | 0.41 | 0.16 | 0.43 |
| 1984 | 16 | 5 | 11 | 0.13 | 0.08 | 0.18 | 0.09 | 0.18 |
| 1985 | 23 | 10 | 13 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.21 |
| 1986 | 34 | 13 | 21 | 0.28 | 0.22 | 0.34 | 0.21 | 0.33 |
| 1987 | 26 | 16 | 10 | 0.21 | 0.27 | 0.16 | 0.26 | 0.16 |
| 1988 | 30 | 11 | 19 | 0.24 | 0.18 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 1989 | 33 | 8 | 25 | 0.27 | 0.13 | 0.40 | 0.12 | 0.36 |
| 1990 | 33 | 11 | 22 | 0.27 | 0.18 | 0.35 | 0.17 | 0.31 |
| 1991 | 47 | 14 | 33 | 0.38 | 0.23 | 0.52 | 0.21 | 0.46 |
| 1992 | 36 | 12 | 24 | 0.29 | 0.20 | 0.38 | 0.17 | 0.32 |
| 1993 | 52 | 20 | 32 | 0.42 | 0.33 | 0.50 | 0.26 | 0.42 |
| 1994 | 48 | 20 | 28 | 0.38 | 0.33 | 0.44 | 0.26 | 0.35 |
| 1995 | 70 | 34 | 36 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.45 | 0.44 |
| 1996 | 65 | 22 | 43 | 0.52 | 0.36 | 0.67 | 0.28 | 0.53 |
| 1997 | 61 | 20 | 41 | 0.48 | 0.32 | 0.64 | 0.28 | 0.49 |
| 1998 | 64 | 25 | 39 | 0.51 | 0.40 | 0.60 | 0.30 | 0.47 |
| 1999 | 69 | 27 | 42 | 0.54 | 0.44 | 0.65 | 0.34 | 0.46 |
| 2000 | 83 | 31 | 52 | 0.65 | 0.50 | 0.80 | 0.40 | 0.52 |
| 2001 | 73 | 20 | 53 | 0.57 | 0.32 | 0.81 | 0.22 | 0.55 |
| 2002 | 92 | 34 | 58 | 0.72 | 0.55 | 0.89 | 0.37 | 0.63 |
| 2003 | 100 | 42 | 58 | 0.78 | 0.67 | 0.89 | 0.50 | 0.57 |
| 2004 | 81 | 29 | 52 | 0.63 | 0.47 | 0.80 | 0.32 | 0.50 |

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号8 筋萎縮性側索硬化症 Amyotrophic lateral sclerosis

| | 死亡数 | | | 粗死亡率 (/100万) | | | 年齢調整死亡率 (/100万) | |
|------|------|-----|-----|-----------------|-------|------|--------------------|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1972 | 253 | 164 | 89 | 2.36 | 3.12 | 1.63 | 3.95 | 2.01 |
| 1973 | 272 | 171 | 101 | 2.50 | 3.21 | 1.82 | 4.06 | 2.26 |
| 1974 | 327 | 217 | 110 | 2.97 | 4.02 | 1.96 | 4.92 | 2.39 |
| 1975 | 393 | 237 | 156 | 3.51 | 4.30 | 2.74 | 5.32 | 3.24 |
| 1976 | 381 | 241 | 140 | 3.37 | 4.33 | 2.44 | 5.16 | 2.92 |
| 1977 | 414 | 249 | 165 | 3.63 | 4.43 | 2.85 | 5.23 | 3.33 |
| 1978 | 443 | 266 | 177 | 3.85 | 4.69 | 3.03 | 5.52 | 3.52 |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 1031 | 579 | 452 | 8.21 | 9.40 | 7.06 | 7.23 | 5.60 |
| 1996 | 1166 | 658 | 508 | 9.26 | 10.67 | 7.92 | 7.91 | 6.14 |
| 1997 | 1144 | 634 | 510 | 9.07 | 10.26 | 7.92 | 7.46 | 5.94 |
| 1998 | 1179 | 666 | 513 | 9.32 | 10.76 | 7.95 | 7.49 | 5.83 |
| 1999 | 1181 | 673 | 508 | 9.32 | 10.86 | 7.85 | 7.37 | 5.66 |
| 2000 | 1202 | 666 | 536 | 9.47 | 10.72 | 8.27 | 7.01 | 5.72 |
| 2001 | 1225 | 692 | 533 | 9.62 | 11.12 | 8.19 | 7.20 | 5.60 |
| 2002 | 1337 | 761 | 576 | 10.49 | 12.22 | 8.84 | 7.55 | 5.81 |
| 2003 | 1338 | 749 | 589 | 10.48 | 12.02 | 9.02 | 7.32 | 5.66 |
| 2004 | 1370 | 786 | 584 | 10.73 | 12.62 | 8.93 | 7.34 | 5.56 |

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年) モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号9 強皮症 Systemic sclerosis

| | 死亡数 | | | 粗死亡率 (/100万) | | | 年齢調整死亡率 (/100万) | |
|------|-----|----|-----|-----------------|------|------|--------------------|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1972 | 77 | 15 | 62 | 0.72 | 0.28 | 1.13 | 0.37 | 1.25 |
| 1973 | 106 | 23 | 83 | 0.98 | 0.43 | 1.50 | 0.55 | 1.64 |
| 1974 | 103 | 23 | 80 | 0.94 | 0.43 | 1.43 | 0.52 | 1.57 |
| 1975 | 114 | 10 | 104 | 1.02 | 0.18 | 1.83 | 0.21 | 2.08 |
| 1976 | 118 | 23 | 95 | 1.04 | 0.41 | 1.65 | 0.46 | 1.80 |
| 1977 | 132 | 30 | 102 | 1.16 | 0.53 | 1.76 | 0.64 | 1.96 |
| 1978 | 111 | 22 | 89 | 0.96 | 0.39 | 1.52 | 0.43 | 1.62 |
| 1979 | 139 | 24 | 115 | 1.20 | 0.42 | 1.95 | 0.46 | 2.08 |
| 1980 | 152 | 20 | 132 | 1.30 | 0.35 | 2.22 | 0.37 | 2.35 |
| 1981 | 148 | 33 | 115 | 1.26 | 0.57 | 1.92 | 0.62 | 2.04 |
| 1982 | 140 | 27 | 113 | 1.18 | 0.46 | 1.87 | 0.50 | 1.97 |
| 1983 | 144 | 33 | 111 | 1.21 | 0.56 | 1.83 | 0.59 | 1.90 |
| 1984 | 170 | 38 | 132 | 1.41 | 0.64 | 2.16 | 0.65 | 2.19 |
| 1985 | 149 | 32 | 117 | 1.23 | 0.54 | 1.90 | 0.54 | 1.90 |
| 1986 | 149 | 26 | 123 | 1.22 | 0.43 | 1.99 | 0.43 | 1.95 |
| 1987 | 165 | 27 | 138 | 1.35 | 0.45 | 2.22 | 0.43 | 2.13 |
| 1988 | 176 | 35 | 141 | 1.43 | 0.58 | 2.26 | 0.53 | 2.14 |
| 1989 | 159 | 42 | 117 | 1.29 | 0.69 | 1.87 | 0.64 | 1.74 |
| 1990 | 177 | 39 | 138 | 1.43 | 0.64 | 2.19 | 0.57 | 2.00 |
| 1991 | 168 | 33 | 135 | 1.35 | 0.54 | 2.14 | 0.46 | 1.91 |
| 1992 | 176 | 44 | 132 | 1.41 | 0.72 | 2.08 | 0.60 | 1.80 |
| 1993 | 195 | 51 | 144 | 1.56 | 0.83 | 2.27 | 0.68 | 1.93 |
| 1994 | 233 | 58 | 175 | 1.86 | 0.95 | 2.75 | 0.76 | 2.29 |
| 1995 | 81 | 20 | 61 | 0.65 | 0.32 | 0.95 | 0.25 | 0.80 |
| 1996 | 94 | 26 | 68 | 0.75 | 0.42 | 1.06 | 0.33 | 0.85 |
| 1997 | 72 | 26 | 46 | 0.57 | 0.42 | 0.71 | 0.30 | 0.56 |
| 1998 | 73 | 11 | 62 | 0.58 | 0.18 | 0.96 | 0.13 | 0.74 |
| 1999 | 70 | 12 | 58 | 0.55 | 0.19 | 0.90 | 0.14 | 0.68 |
| 2000 | 58 | 13 | 45 | 0.46 | 0.21 | 0.69 | 0.13 | 0.52 |
| 2001 | 35 | 9 | 26 | 0.27 | 0.14 | 0.40 | 0.11 | 0.26 |
| 2002 | 25 | 7 | 18 | 0.20 | 0.11 | 0.28 | 0.07 | 0.20 |
| 2003 | 31 | 6 | 25 | 0.24 | 0.10 | 0.38 | 0.06 | 0.24 |
| 2004 | 14 | 4 | 10 | 0.11 | 0.06 | 0.15 | 0.04 | 0.10 |

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号10 特発性血小板減少性紫斑病 Idiopathic thrombocytopenic purpura

| | 死亡数 | | | 粗死亡率 (/100万) | | | 年齢調整死亡率 (/100万) | |
|------|-----|----|-----|-----------------|------|------|--------------------|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1972 | 163 | 51 | 112 | 1.52 | 0.97 | 2.05 | 1.13 | 2.22 |
| 1973 | 189 | 70 | 119 | 1.74 | 1.31 | 2.15 | 1.49 | 2.25 |
| 1974 | 177 | 60 | 117 | 1.61 | 1.11 | 2.09 | 1.24 | 2.38 |
| 1975 | 174 | 66 | 108 | 1.55 | 1.20 | 1.90 | 1.39 | 2.09 |
| 1976 | 185 | 64 | 121 | 1.64 | 1.15 | 2.11 | 1.24 | 2.35 |
| 1977 | 167 | 60 | 107 | 1.46 | 1.07 | 1.85 | 1.20 | 1.99 |
| 1978 | 200 | 79 | 121 | 1.74 | 1.39 | 2.07 | 1.55 | 2.26 |
| 1979 | 122 | 43 | 79 | 1.05 | 0.75 | 1.34 | 0.82 | 1.49 |
| 1980 | 130 | 40 | 90 | 1.11 | 0.69 | 1.51 | 0.75 | 1.65 |
| 1981 | 126 | 53 | 73 | 1.07 | 0.91 | 1.22 | 0.95 | 1.31 |
| 1982 | 134 | 43 | 91 | 1.13 | 0.74 | 1.51 | 0.75 | 1.60 |
| 1983 | 136 | 51 | 85 | 1.14 | 0.87 | 1.40 | 0.89 | 1.46 |
| 1984 | 125 | 50 | 75 | 1.04 | 0.85 | 1.23 | 0.87 | 1.25 |
| 1985 | 142 | 58 | 84 | 1.17 | 0.97 | 1.36 | 0.97 | 1.36 |
| 1986 | 132 | 57 | 75 | 1.08 | 0.95 | 1.21 | 0.94 | 1.18 |
| 1987 | 135 | 56 | 79 | 1.10 | 0.93 | 1.27 | 0.89 | 1.22 |
| 1988 | 134 | 53 | 81 | 1.09 | 0.88 | 1.30 | 0.81 | 1.22 |
| 1989 | 164 | 71 | 93 | 1.33 | 1.17 | 1.48 | 1.07 | 1.35 |
| 1990 | 169 | 60 | 109 | 1.37 | 0.99 | 1.73 | 0.86 | 1.51 |
| 1991 | 161 | 60 | 101 | 1.30 | 0.99 | 1.60 | 0.82 | 1.33 |
| 1992 | 161 | 70 | 91 | 1.29 | 1.15 | 1.44 | 0.93 | 1.17 |
| 1993 | 142 | 53 | 89 | 1.14 | 0.87 | 1.40 | 0.72 | 1.12 |
| 1994 | 200 | 84 | 116 | 1.60 | 1.37 | 1.82 | 1.07 | 1.37 |
| 1995 | 182 | 75 | 107 | 1.45 | 1.22 | 1.67 | 0.90 | 1.28 |
| 1996 | 146 | 62 | 84 | 1.16 | 1.01 | 1.31 | 0.73 | 0.92 |
| 1997 | 175 | 78 | 97 | 1.39 | 1.26 | 1.51 | 0.88 | 1.02 |
| 1998 | 196 | 78 | 118 | 1.55 | 1.26 | 1.83 | 0.79 | 1.22 |
| 1999 | 165 | 70 | 95 | 1.30 | 1.13 | 1.47 | 0.75 | 0.91 |
| 2000 | 202 | 75 | 127 | 1.59 | 1.21 | 1.96 | 0.75 | 1.20 |
| 2001 | 174 | 64 | 110 | 1.37 | 1.03 | 1.69 | 0.56 | 0.92 |
| 2002 | 183 | 72 | 111 | 1.44 | 1.16 | 1.70 | 0.60 | 0.98 |
| 2003 | 165 | 77 | 88 | 1.29 | 1.24 | 1.35 | 0.65 | 0.71 |
| 2004 | 188 | 83 | 105 | 1.47 | 1.33 | 1.61 | 0.66 | 0.81 |

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号11 結節性動脈周囲炎 Polyarteritis nodosa

| | 死亡数 | | | 粗死亡率 (/100万) | | | 年齢調整死亡率 (/100万) | |
|------|-----|-----|-----|-----------------|------|------|--------------------|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1972 | 34 | 18 | 16 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.40 | 0.35 |
| 1973 | 50 | 31 | 19 | 0.46 | 0.58 | 0.34 | 0.69 | 0.39 |
| 1974 | 27 | 13 | 14 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.30 |
| 1975 | 34 | 22 | 12 | 0.30 | 0.40 | 0.21 | 0.48 | 0.25 |
| 1976 | 45 | 27 | 18 | 0.40 | 0.49 | 0.31 | 0.51 | 0.34 |
| 1977 | 52 | 29 | 23 | 0.46 | 0.52 | 0.40 | 0.61 | 0.44 |
| 1978 | 56 | 29 | 27 | 0.49 | 0.51 | 0.46 | 0.55 | 0.50 |
| 1979 | 47 | 26 | 21 | 0.40 | 0.45 | 0.36 | 0.50 | 0.39 |
| 1980 | 50 | 28 | 22 | 0.43 | 0.49 | 0.37 | 0.54 | 0.39 |
| 1981 | 46 | 27 | 19 | 0.39 | 0.47 | 0.32 | 0.51 | 0.34 |
| 1982 | 62 | 28 | 34 | 0.52 | 0.48 | 0.56 | 0.51 | 0.59 |
| 1983 | 65 | 37 | 28 | 0.54 | 0.63 | 0.46 | 0.65 | 0.47 |
| 1984 | 63 | 36 | 27 | 0.52 | 0.61 | 0.44 | 0.62 | 0.45 |
| 1985 | 74 | 44 | 30 | 0.61 | 0.74 | 0.49 | 0.74 | 0.49 |
| 1986 | 69 | 27 | 42 | 0.57 | 0.45 | 0.68 | 0.44 | 0.67 |
| 1987 | 73 | 38 | 35 | 0.60 | 0.63 | 0.56 | 0.61 | 0.54 |
| 1988 | 70 | 32 | 38 | 0.57 | 0.53 | 0.61 | 0.49 | 0.57 |
| 1989 | 71 | 34 | 37 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.50 | 0.53 |
| 1990 | 82 | 49 | 33 | 0.66 | 0.81 | 0.52 | 0.73 | 0.47 |
| 1991 | 85 | 40 | 45 | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.57 | 0.62 |
| 1992 | 107 | 57 | 50 | 0.86 | 0.93 | 0.79 | 0.76 | 0.65 |
| 1993 | 117 | 59 | 58 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.75 | 0.74 |
| 1994 | 127 | 68 | 59 | 1.02 | 1.11 | 0.93 | 0.86 | 0.72 |
| 1995 | 132 | 75 | 57 | 1.05 | 1.22 | 0.89 | 0.90 | 0.66 |
| 1996 | 140 | 74 | 66 | 1.11 | 1.20 | 1.03 | 0.88 | 0.76 |
| 1997 | 170 | 87 | 83 | 1.35 | 1.41 | 1.29 | 0.98 | 0.89 |
| 1998 | 217 | 115 | 102 | 1.72 | 1.86 | 1.58 | 1.29 | 1.08 |
| 1999 | 210 | 103 | 107 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.06 | 1.11 |
| 2000 | 232 | 128 | 104 | 1.83 | 2.06 | 1.60 | 1.30 | 1.05 |
| 2001 | 224 | 97 | 127 | 1.76 | 1.56 | 1.95 | 0.95 | 1.23 |
| 2002 | 244 | 129 | 115 | 1.91 | 2.07 | 1.76 | 1.22 | 1.05 |
| 2003 | 208 | 116 | 92 | 1.63 | 1.86 | 1.41 | 1.03 | 0.79 |
| 2004 | 187 | 87 | 100 | 1.46 | 1.40 | 1.53 | 0.74 | 0.82 |

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号12 潰瘍性大腸炎 Ulcerative colitis

| | 死亡数 | | | 粗死亡率 (/100万) | | | 年齢調整死亡率 (/100万) | |
|------|-----|-----|-----|-----------------|------|------|--------------------|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1972 | 266 | 116 | 150 | 2.48 | 2.20 | 2.74 | 2.84 | 3.78 |
| 1973 | 259 | 117 | 142 | 2.38 | 2.19 | 2.56 | 2.82 | 3.54 |
| 1974 | 241 | 94 | 147 | 2.19 | 1.74 | 2.62 | 2.19 | 3.50 |
| 1975 | 258 | 116 | 142 | 2.30 | 2.11 | 2.50 | 2.64 | 3.31 |
| 1976 | 223 | 106 | 117 | 1.97 | 1.90 | 2.04 | 2.34 | 2.72 |
| 1977 | 215 | 105 | 110 | 1.88 | 1.87 | 1.90 | 2.33 | 2.42 |
| 1978 | 215 | 102 | 113 | 1.87 | 1.80 | 1.93 | 2.15 | 2.44 |
| 1979 | 186 | 82 | 104 | 1.60 | 1.43 | 1.76 | 1.66 | 2.12 |
| 1980 | 185 | 89 | 96 | 1.58 | 1.55 | 1.61 | 1.81 | 1.90 |
| 1981 | 180 | 87 | 93 | 1.53 | 1.50 | 1.55 | 1.67 | 1.78 |
| 1982 | 156 | 71 | 85 | 1.31 | 1.22 | 1.41 | 1.33 | 1.57 |
| 1983 | 160 | 63 | 97 | 1.34 | 1.07 | 1.60 | 1.12 | 1.71 |
| 1984 | 131 | 69 | 62 | 1.09 | 1.17 | 1.02 | 1.20 | 1.05 |
| 1985 | 147 | 59 | 88 | 1.21 | 0.99 | 1.43 | 0.99 | 1.43 |
| 1986 | 116 | 51 | 65 | 0.95 | 0.85 | 1.05 | 0.84 | 1.02 |
| 1987 | 87 | 44 | 43 | 0.71 | 0.73 | 0.69 | 0.68 | 0.65 |
| 1988 | 111 | 45 | 66 | 0.90 | 0.75 | 1.06 | 0.68 | 0.95 |
| 1989 | 93 | 35 | 58 | 0.75 | 0.58 | 0.93 | 0.53 | 0.82 |
| 1990 | 97 | 46 | 51 | 0.78 | 0.76 | 0.81 | 0.68 | 0.72 |
| 1991 | 94 | 33 | 61 | 0.76 | 0.54 | 0.97 | 0.49 | 0.81 |
| 1992 | 99 | 46 | 53 | 0.80 | 0.75 | 0.84 | 0.62 | 0.70 |
| 1993 | 102 | 59 | 43 | 0.82 | 0.96 | 0.68 | 0.80 | 0.51 |
| 1994 | 100 | 43 | 57 | 0.80 | 0.70 | 0.89 | 0.55 | 0.68 |
| 1995 | 98 | 46 | 52 | 0.78 | 0.75 | 0.81 | 0.61 | 0.59 |
| 1996 | 98 | 45 | 53 | 0.78 | 0.73 | 0.83 | 0.55 | 0.61 |
| 1997 | 96 | 52 | 44 | 0.76 | 0.84 | 0.68 | 0.61 | 0.50 |
| 1998 | 116 | 65 | 51 | 0.92 | 1.05 | 0.79 | 0.79 | 0.54 |
| 1999 | 109 | 64 | 45 | 0.86 | 1.03 | 0.70 | 0.74 | 0.46 |
| 2000 | 109 | 67 | 42 | 0.86 | 1.08 | 0.65 | 0.77 | 0.45 |
| 2001 | 106 | 58 | 48 | 0.83 | 0.93 | 0.74 | 0.60 | 0.47 |
| 2002 | 119 | 72 | 47 | 0.93 | 1.16 | 0.72 | 0.71 | 0.43 |
| 2003 | 115 | 67 | 48 | 0.90 | 1.08 | 0.73 | 0.71 | 0.40 |
| 2004 | 111 | 63 | 48 | 0.87 | 1.01 | 0.73 | 0.61 | 0.40 |

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号13 大動脈炎症候群(高安病) Aortic arch syndrome [Takayasu]

| | 死亡数 | | | 粗死亡率 (/100万) | | | 年齢調整死亡率 (/100万) | |
|------|-----|----|----|-----------------|------|------|--------------------|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1972 | 28 | 9 | 19 | 0.26 | 0.17 | 0.35 | 0.20 | 0.37 |
| 1973 | 39 | 9 | 30 | 0.36 | 0.17 | 0.54 | 0.20 | 0.56 |
| 1974 | 54 | 15 | 39 | 0.49 | 0.28 | 0.70 | 0.34 | 0.79 |
| 1975 | 60 | 17 | 43 | 0.54 | 0.31 | 0.76 | 0.40 | 0.85 |
| 1976 | 53 | 14 | 39 | 0.47 | 0.25 | 0.68 | 0.27 | 0.71 |
| 1977 | 59 | 11 | 48 | 0.52 | 0.20 | 0.83 | 0.24 | 0.90 |
| 1978 | 62 | 21 | 41 | 0.54 | 0.37 | 0.70 | 0.41 | 0.74 |
| 1979 | 45 | 13 | 32 | 0.39 | 0.23 | 0.54 | 0.25 | 0.57 |
| 1980 | 70 | 19 | 51 | 0.60 | 0.33 | 0.86 | 0.35 | 0.93 |
| 1981 | 70 | 16 | 54 | 0.59 | 0.28 | 0.90 | 0.29 | 0.96 |
| 1982 | 38 | 6 | 32 | 0.32 | 0.10 | 0.53 | 0.11 | 0.55 |
| 1983 | 50 | 12 | 38 | 0.42 | 0.20 | 0.63 | 0.21 | 0.65 |
| 1984 | 63 | 15 | 48 | 0.52 | 0.25 | 0.79 | 0.26 | 0.80 |
| 1985 | 60 | 11 | 49 | 0.50 | 0.18 | 0.80 | 0.18 | 0.80 |
| 1986 | 51 | 9 | 42 | 0.42 | 0.15 | 0.68 | 0.15 | 0.67 |
| 1987 | 57 | 11 | 46 | 0.47 | 0.18 | 0.74 | 0.18 | 0.71 |
| 1988 | 60 | 10 | 50 | 0.49 | 0.17 | 0.80 | 0.16 | 0.76 |
| 1989 | 48 | 11 | 37 | 0.39 | 0.18 | 0.59 | 0.16 | 0.54 |
| 1990 | 52 | 12 | 40 | 0.42 | 0.20 | 0.64 | 0.17 | 0.59 |
| 1991 | 57 | 11 | 46 | 0.46 | 0.18 | 0.73 | 0.16 | 0.66 |
| 1992 | 77 | 11 | 66 | 0.62 | 0.18 | 1.04 | 0.16 | 0.92 |
| 1993 | 49 | 10 | 39 | 0.39 | 0.16 | 0.61 | 0.14 | 0.53 |
| 1994 | 74 | 7 | 67 | 0.59 | 0.11 | 1.05 | 0.09 | 0.94 |
| 1995 | 14 | 4 | 10 | 0.11 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.13 |
| 1996 | 60 | 12 | 48 | 0.48 | 0.19 | 0.75 | 0.16 | 0.62 |
| 1997 | 65 | 12 | 53 | 0.52 | 0.19 | 0.82 | 0.18 | 0.68 |
| 1998 | 48 | 10 | 38 | 0.38 | 0.16 | 0.59 | 0.11 | 0.46 |
| 1999 | 48 | 4 | 44 | 0.38 | 0.06 | 0.68 | 0.05 | 0.52 |
| 2000 | 54 | 6 | 48 | 0.43 | 0.10 | 0.74 | 0.07 | 0.57 |
| 2001 | 43 | 8 | 35 | 0.34 | 0.13 | 0.54 | 0.10 | 0.42 |
| 2002 | 51 | 7 | 44 | 0.40 | 0.11 | 0.68 | 0.09 | 0.46 |
| 2003 | 51 | 7 | 44 | 0.40 | 0.11 | 0.67 | 0.08 | 0.46 |
| 2004 | 39 | 8 | 31 | 0.31 | 0.13 | 0.47 | 0.08 | 0.32 |

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年(1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号14 バージャー病(ビュルガー病) Thromboangitis obliterans [Buerger]

| | 死亡数 | | | 粗死亡率 (/100万) | | | 年齢調整死亡率 (/100万) | |
|------|-----|----|----|-----------------|------|------|--------------------|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1972 | 67 | 50 | 17 | 0.62 | 0.95 | 0.31 | 1.33 | 0.49 |
| 1973 | 63 | 48 | 15 | 0.58 | 0.90 | 0.27 | 1.27 | 0.41 |
| 1974 | 66 | 47 | 19 | 0.60 | 0.87 | 0.34 | 1.20 | 0.48 |
| 1975 | 71 | 50 | 21 | 0.63 | 0.91 | 0.37 | 1.20 | 0.56 |
| 1976 | 66 | 52 | 14 | 0.58 | 0.93 | 0.24 | 1.24 | 0.34 |
| 1977 | 55 | 43 | 12 | 0.48 | 0.77 | 0.21 | 0.98 | 0.29 |
| 1978 | 76 | 53 | 23 | 0.66 | 0.93 | 0.39 | 1.16 | 0.55 |
| 1979 | 29 | 25 | 4 | 0.25 | 0.44 | 0.07 | 0.50 | 0.09 |
| 1980 | 32 | 27 | 5 | 0.27 | 0.47 | 0.08 | 0.53 | 0.10 |
| 1981 | 32 | 24 | 8 | 0.27 | 0.41 | 0.13 | 0.46 | 0.16 |
| 1982 | 44 | 33 | 11 | 0.37 | 0.57 | 0.18 | 0.60 | 0.21 |
| 1983 | 44 | 33 | 11 | 0.37 | 0.56 | 0.18 | 0.60 | 0.20 |
| 1984 | 46 | 33 | 13 | 0.38 | 0.56 | 0.21 | 0.58 | 0.22 |
| 1985 | 41 | 34 | 7 | 0.34 | 0.57 | 0.11 | 0.57 | 0.11 |
| 1986 | 34 | 24 | 10 | 0.28 | 0.40 | 0.16 | 0.39 | 0.15 |
| 1987 | 28 | 20 | 8 | 0.23 | 0.33 | 0.13 | 0.31 | 0.12 |
| 1988 | 33 | 25 | 8 | 0.27 | 0.41 | 0.13 | 0.38 | 0.11 |
| 1989 | 43 | 35 | 8 | 0.35 | 0.58 | 0.13 | 0.49 | 0.10 |
| 1990 | 41 | 26 | 15 | 0.33 | 0.43 | 0.24 | 0.36 | 0.18 |
| 1991 | 30 | 17 | 13 | 0.24 | 0.28 | 0.21 | 0.24 | 0.15 |
| 1992 | 36 | 28 | 8 | 0.29 | 0.46 | 0.13 | 0.36 | 0.09 |
| 1993 | 25 | 21 | 4 | 0.20 | 0.34 | 0.06 | 0.26 | 0.04 |
| 1994 | 28 | 20 | 8 | 0.22 | 0.33 | 0.13 | 0.25 | 0.08 |
| 1995 | 25 | 15 | 10 | 0.20 | 0.24 | 0.16 | 0.19 | 0.08 |
| 1996 | 31 | 27 | 4 | 0.25 | 0.44 | 0.06 | 0.30 | 0.03 |
| 1997 | 32 | 20 | 12 | 0.25 | 0.32 | 0.19 | 0.24 | 0.10 |
| 1998 | 20 | 13 | 7 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 0.06 |
| 1999 | 16 | 11 | 5 | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.12 | 0.04 |
| 2000 | 21 | 16 | 5 | 0.17 | 0.26 | 0.08 | 0.17 | 0.05 |
| 2001 | 29 | 24 | 5 | 0.23 | 0.39 | 0.08 | 0.25 | 0.03 |
| 2002 | 20 | 12 | 8 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.06 |
| 2003 | 12 | 9 | 3 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.02 |
| 2004 | 16 | 9 | 7 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年(1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号15 天疱瘡 Pemphigus

| | 死亡数 | | | 粗死亡率 (/100万) | | | 年齢調整死亡率 (/100万) | |
|------|-----|----|----|-----------------|------|------|--------------------|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1972 | 56 | 27 | 29 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.82 | 0.82 |
| 1973 | 58 | 21 | 37 | 0.53 | 0.39 | 0.67 | 0.58 | 0.96 |
| 1974 | 50 | 26 | 24 | 0.45 | 0.48 | 0.43 | 0.66 | 0.61 |
| 1975 | 43 | 21 | 22 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.50 | 0.55 |
| 1976 | 58 | 29 | 29 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.70 | 0.68 |
| 1977 | 52 | 23 | 29 | 0.46 | 0.41 | 0.50 | 0.55 | 0.69 |
| 1978 | 61 | 36 | 25 | 0.53 | 0.63 | 0.43 | 0.81 | 0.56 |
| 1979 | 41 | 16 | 25 | 0.35 | 0.28 | 0.42 | 0.33 | 0.57 |
| 1980 | 49 | 30 | 19 | 0.42 | 0.52 | 0.32 | 0.62 | 0.40 |
| 1981 | 34 | 20 | 14 | 0.29 | 0.34 | 0.23 | 0.40 | 0.28 |
| 1982 | 33 | 17 | 16 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.30 |
| 1983 | 40 | 21 | 19 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.38 | 0.34 |
| 1984 | 30 | 14 | 16 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.28 |
| 1985 | 21 | 10 | 11 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| 1986 | 27 | 15 | 12 | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.19 |
| 1987 | 29 | 16 | 13 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.25 | 0.19 |
| 1988 | 23 | 9 | 14 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.13 | 0.20 |
| 1989 | 18 | 7 | 11 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.10 | 0.15 |
| 1990 | 24 | 10 | 14 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.13 | 0.17 |
| 1991 | 28 | 13 | 15 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.17 | 0.18 |
| 1992 | 34 | 14 | 20 | 0.27 | 0.23 | 0.32 | 0.19 | 0.24 |
| 1993 | 27 | 13 | 14 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.17 |
| 1994 | 25 | 13 | 12 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.13 |
| 1995 | 35 | 10 | 25 | 0.28 | 0.16 | 0.39 | 0.10 | 0.24 |
| 1996 | 30 | 13 | 17 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.15 | 0.17 |
| 1997 | 23 | 10 | 13 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.09 | 0.12 |
| 1998 | 39 | 15 | 24 | 0.31 | 0.24 | 0.37 | 0.14 | 0.22 |
| 1999 | 25 | 12 | 13 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.12 |
| 2000 | 25 | 7 | 18 | 0.20 | 0.11 | 0.28 | 0.08 | 0.16 |
| 2001 | 26 | 9 | 17 | 0.20 | 0.14 | 0.26 | 0.08 | 0.13 |
| 2002 | 20 | 4 | 16 | 0.16 | 0.06 | 0.25 | 0.03 | 0.12 |
| 2003 | 17 | 8 | 9 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.06 |
| 2004 | 15 | 9 | 6 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号16 脊髄小脳変性症 Spinocerebellar degeneration

| | 死亡数 | | | 粗死亡率 (/100万) | | | 年齢調整死亡率 (/100万) | |
|------|-----|-----|-----|-----------------|------|------|--------------------|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 110 | 55 | 55 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 1.09 | 1.02 |
| 1980 | 121 | 72 | 49 | 1.03 | 1.25 | 0.82 | 1.39 | 0.91 |
| 1981 | 147 | 87 | 60 | 1.25 | 1.50 | 1.00 | 1.62 | 1.06 |
| 1982 | 164 | 89 | 75 | 1.38 | 1.52 | 1.24 | 1.65 | 1.31 |
| 1983 | 183 | 99 | 84 | 1.53 | 1.68 | 1.38 | 1.75 | 1.43 |
| 1984 | 219 | 131 | 88 | 1.82 | 2.21 | 1.44 | 2.27 | 1.46 |
| 1985 | 251 | 126 | 125 | 2.07 | 2.12 | 2.03 | 2.12 | 2.03 |
| 1986 | 263 | 138 | 125 | 2.16 | 2.31 | 2.02 | 2.25 | 1.98 |
| 1987 | 275 | 157 | 118 | 2.25 | 2.61 | 1.90 | 2.48 | 1.82 |
| 1988 | 303 | 164 | 139 | 2.47 | 2.72 | 2.23 | 2.49 | 2.11 |
| 1989 | 354 | 190 | 164 | 2.87 | 3.14 | 2.62 | 2.81 | 2.42 |
| 1990 | 394 | 216 | 178 | 3.19 | 3.56 | 2.83 | 3.14 | 2.53 |
| 1991 | 372 | 209 | 163 | 3.00 | 3.43 | 2.58 | 2.89 | 2.29 |
| 1992 | 421 | 254 | 167 | 3.38 | 4.16 | 2.64 | 3.48 | 2.29 |
| 1993 | 484 | 264 | 220 | 3.88 | 4.31 | 3.46 | 3.44 | 2.94 |
| 1994 | 507 | 270 | 237 | 4.05 | 4.40 | 3.72 | 3.47 | 3.09 |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - |

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年) モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号17 クローン病(限局性腸炎) Crohn's disease [regional enteritis]

| | 死亡数 | | | 粗死亡率 (/100万) | | | 年齢調整死亡率 (/100万) | |
|------|-----|----|----|-----------------|------|------|--------------------|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1972 | 23 | 12 | 11 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.29 | 0.26 |
| 1973 | 35 | 20 | 15 | 0.32 | 0.38 | 0.27 | 0.43 | 0.34 |
| 1974 | 29 | 16 | 13 | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.36 | 0.27 |
| 1975 | 44 | 23 | 21 | 0.39 | 0.42 | 0.37 | 0.47 | 0.45 |
| 1976 | 35 | 21 | 14 | 0.31 | 0.38 | 0.24 | 0.44 | 0.29 |
| 1977 | 58 | 32 | 26 | 0.51 | 0.57 | 0.45 | 0.62 | 0.55 |
| 1978 | 51 | 35 | 16 | 0.44 | 0.62 | 0.27 | 0.68 | 0.31 |
| 1979 | 42 | 28 | 14 | 0.36 | 0.49 | 0.24 | 0.54 | 0.25 |
| 1980 | 53 | 34 | 19 | 0.45 | 0.59 | 0.32 | 0.64 | 0.35 |
| 1981 | 41 | 25 | 16 | 0.35 | 0.43 | 0.27 | 0.47 | 0.28 |
| 1982 | 40 | 18 | 22 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 0.33 | 0.39 |
| 1983 | 48 | 26 | 22 | 0.40 | 0.44 | 0.36 | 0.45 | 0.37 |
| 1984 | 37 | 21 | 16 | 0.31 | 0.35 | 0.26 | 0.36 | 0.27 |
| 1985 | 42 | 21 | 21 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
| 1986 | 33 | 18 | 15 | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.23 |
| 1987 | 44 | 29 | 15 | 0.36 | 0.48 | 0.24 | 0.47 | 0.23 |
| 1988 | 34 | 18 | 16 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.24 |
| 1989 | 32 | 15 | 17 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.25 |
| 1990 | 43 | 25 | 18 | 0.35 | 0.41 | 0.29 | 0.39 | 0.25 |
| 1991 | 32 | 18 | 14 | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.28 | 0.20 |
| 1992 | 40 | 27 | 13 | 0.32 | 0.44 | 0.21 | 0.41 | 0.18 |
| 1993 | 38 | 18 | 20 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
| 1994 | 38 | 23 | 15 | 0.30 | 0.38 | 0.24 | 0.33 | 0.21 |
| 1995 | 42 | 26 | 16 | 0.33 | 0.42 | 0.25 | 0.37 | 0.23 |
| 1996 | 42 | 24 | 18 | 0.33 | 0.39 | 0.28 | 0.36 | 0.24 |
| 1997 | 48 | 27 | 21 | 0.38 | 0.44 | 0.33 | 0.37 | 0.25 |
| 1998 | 38 | 27 | 11 | 0.30 | 0.44 | 0.17 | 0.36 | 0.15 |
| 1999 | 55 | 29 | 26 | 0.43 | 0.47 | 0.40 | 0.44 | 0.30 |
| 2000 | 45 | 28 | 17 | 0.35 | 0.45 | 0.26 | 0.39 | 0.24 |
| 2001 | 46 | 30 | 16 | 0.36 | 0.48 | 0.25 | 0.41 | 0.17 |
| 2002 | 37 | 25 | 12 | 0.29 | 0.40 | 0.18 | 0.34 | 0.13 |
| 2003 | 60 | 31 | 29 | 0.47 | 0.50 | 0.44 | 0.39 | 0.34 |
| 2004 | 35 | 21 | 14 | 0.27 | 0.34 | 0.21 | 0.27 | 0.18 |

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号18 劇症肝炎 Fulminant hepatitis (acute and subacute hepatic failure/necrosis)

| | 死亡数 | | | 粗死亡率 (/100万) | | | 年齢調整死亡率 (/100万) | |
|------|------|-----|-----|-----------------|-------|-------|--------------------|-------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1972 | 1790 | 902 | 888 | 16.68 | 17.14 | 16.24 | 22.62 | 22.39 |
| 1973 | 1735 | 868 | 867 | 15.96 | 16.28 | 15.66 | 21.27 | 21.33 |
| 1974 | 1731 | 861 | 870 | 15.73 | 15.94 | 15.52 | 20.52 | 21.35 |
| 1975 | 1450 | 699 | 751 | 12.95 | 12.69 | 13.21 | 16.09 | 17.97 |
| 1976 | 1260 | 650 | 610 | 11.14 | 11.68 | 10.62 | 14.85 | 14.13 |
| 1977 | 1167 | 600 | 567 | 10.22 | 10.68 | 9.78 | 13.08 | 12.66 |
| 1978 | 1115 | 562 | 553 | 9.68 | 9.91 | 9.46 | 11.94 | 11.95 |
| 1979 | 977 | 491 | 486 | 8.41 | 8.59 | 8.24 | 10.05 | 10.16 |
| 1980 | 919 | 475 | 444 | 7.85 | 8.25 | 7.47 | 9.47 | 8.93 |
| 1981 | 903 | 470 | 433 | 7.66 | 8.10 | 7.23 | 9.07 | 8.32 |
| 1982 | 802 | 388 | 414 | 6.76 | 6.64 | 6.87 | 7.20 | 7.59 |
| 1983 | 834 | 466 | 368 | 6.98 | 7.93 | 6.06 | 8.36 | 6.52 |
| 1984 | 763 | 418 | 345 | 6.35 | 7.07 | 5.65 | 7.27 | 5.87 |
| 1985 | 744 | 376 | 368 | 6.15 | 6.32 | 5.98 | 6.32 | 5.98 |
| 1986 | 703 | 386 | 317 | 5.78 | 6.45 | 5.12 | 6.28 | 4.96 |
| 1987 | 615 | 337 | 278 | 5.03 | 5.61 | 4.47 | 5.32 | 4.17 |
| 1988 | 625 | 336 | 289 | 5.09 | 5.57 | 4.63 | 5.11 | 4.20 |
| 1989 | 623 | 335 | 288 | 5.05 | 5.53 | 4.60 | 5.04 | 4.03 |
| 1990 | 596 | 357 | 239 | 4.82 | 5.88 | 3.80 | 5.11 | 3.17 |
| 1991 | 518 | 263 | 255 | 4.18 | 4.32 | 4.04 | 3.66 | 3.20 |
| 1992 | 546 | 302 | 244 | 4.39 | 4.94 | 3.85 | 4.06 | 2.96 |
| 1993 | 529 | 285 | 244 | 4.24 | 4.65 | 3.84 | 3.77 | 2.87 |
| 1994 | 502 | 268 | 234 | 4.01 | 4.37 | 3.67 | 3.40 | 2.61 |
| 1995 | 487 | 252 | 235 | 3.88 | 4.09 | 3.67 | 3.10 | 2.42 |
| 1996 | 447 | 225 | 222 | 3.55 | 3.65 | 3.46 | 2.71 | 2.33 |
| 1997 | 462 | 260 | 202 | 3.66 | 4.21 | 3.14 | 2.99 | 2.00 |
| 1998 | 455 | 244 | 211 | 3.60 | 3.94 | 3.27 | 2.72 | 1.94 |
| 1999 | 430 | 237 | 193 | 3.39 | 3.82 | 2.98 | 2.56 | 1.77 |
| 2000 | 445 | 249 | 196 | 3.51 | 4.01 | 3.02 | 2.53 | 1.72 |
| 2001 | 445 | 247 | 198 | 3.50 | 3.97 | 3.04 | 2.51 | 1.65 |
| 2002 | 388 | 216 | 172 | 3.04 | 3.47 | 2.64 | 2.02 | 1.47 |
| 2003 | 383 | 219 | 164 | 3.00 | 3.52 | 2.51 | 2.11 | 1.29 |
| 2004 | 416 | 221 | 195 | 3.26 | 3.55 | 2.98 | 1.96 | 1.42 |

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号18 劇症肝炎 Fulminant hepatitis (viral hepatitis with hepatic coma)

| | 死亡数 | | | 粗死亡率 (/100万) | | | 年齢調整死亡率 (/100万) | |
|------|------|-----|-----|-----------------|-------|------|--------------------|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 1004 | 567 | 437 | 8.65 | 9.92 | 7.41 | 10.71 | 8.10 |
| 1980 | 973 | 548 | 425 | 8.31 | 9.51 | 7.15 | 10.33 | 7.74 |
| 1981 | 1066 | 584 | 482 | 9.04 | 10.07 | 8.05 | 10.66 | 8.52 |
| 1982 | 988 | 545 | 443 | 8.32 | 9.33 | 7.35 | 9.75 | 7.66 |
| 1983 | 1059 | 622 | 437 | 8.86 | 10.58 | 7.20 | 10.92 | 7.46 |
| 1984 | 1086 | 605 | 481 | 9.03 | 10.23 | 7.87 | 10.40 | 8.01 |
| 1985 | 1073 | 591 | 482 | 8.86 | 9.93 | 7.83 | 9.93 | 7.83 |
| 1986 | 1005 | 556 | 449 | 8.26 | 9.30 | 7.26 | 9.14 | 7.14 |
| 1987 | 960 | 522 | 438 | 7.85 | 8.69 | 7.04 | 8.42 | 6.81 |
| 1988 | 893 | 495 | 398 | 7.27 | 8.20 | 6.38 | 7.84 | 6.08 |
| 1989 | 847 | 458 | 389 | 6.87 | 7.56 | 6.21 | 7.08 | 5.77 |
| 1990 | 798 | 433 | 365 | 6.46 | 7.13 | 5.80 | 6.54 | 5.34 |
| 1991 | 757 | 423 | 334 | 6.10 | 6.95 | 5.29 | 6.28 | 4.74 |
| 1992 | 727 | 393 | 334 | 5.84 | 6.43 | 5.27 | 5.72 | 4.67 |
| 1993 | 703 | 374 | 329 | 5.63 | 6.11 | 5.18 | 5.46 | 4.56 |
| 1994 | 650 | 351 | 299 | 5.20 | 5.72 | 4.69 | 4.96 | 4.14 |
| 1995 | 912 | 533 | 379 | 7.26 | 8.66 | 5.92 | 7.31 | 4.80 |
| 1996 | 849 | 483 | 366 | 6.75 | 7.83 | 5.70 | 6.47 | 4.58 |
| 1997 | 884 | 511 | 373 | 7.01 | 8.27 | 5.80 | 6.71 | 4.70 |
| 1998 | 814 | 475 | 339 | 6.44 | 7.67 | 5.25 | 6.14 | 4.00 |
| 1999 | 828 | 488 | 340 | 6.54 | 7.87 | 5.25 | 6.27 | 4.12 |
| 2000 | 817 | 499 | 318 | 6.44 | 8.03 | 4.91 | 6.28 | 3.60 |
| 2001 | 750 | 438 | 312 | 5.89 | 7.04 | 4.80 | 5.37 | 3.53 |
| 2002 | 718 | 433 | 285 | 5.63 | 6.96 | 4.37 | 5.16 | 3.07 |
| 2003 | 716 | 446 | 270 | 5.61 | 7.16 | 4.13 | 5.30 | 2.79 |
| 2004 | 676 | 409 | 267 | 5.29 | 6.57 | 4.08 | 4.65 | 2.74 |

注1) 疾患番号とは特定疾患治療研究対象疾患に付された番号

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号19 悪性関節リウマチ Malignant rheumatoid arthritis

| | 死亡数 | | | 粗死亡率 (/100万) | | | 年齢調整死亡率 (/100万) | |
|------|-----|-----|-----|-----------------|------|------|--------------------|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 274 | 115 | 159 | 2.18 | 1.87 | 2.48 | 1.35 | 1.88 |
| 1996 | 539 | 199 | 340 | 4.28 | 3.23 | 5.30 | 2.29 | 3.92 |
| 1997 | 551 | 224 | 327 | 4.37 | 3.62 | 5.08 | 2.48 | 3.58 |
| 1998 | 575 | 215 | 360 | 4.55 | 3.47 | 5.58 | 2.33 | 3.85 |
| 1999 | 570 | 230 | 340 | 4.50 | 3.71 | 5.25 | 2.40 | 3.52 |
| 2000 | 605 | 229 | 376 | 4.77 | 3.69 | 5.80 | 2.28 | 3.69 |
| 2001 | 584 | 236 | 348 | 4.59 | 3.79 | 5.35 | 2.25 | 3.33 |
| 2002 | 629 | 218 | 411 | 4.94 | 3.50 | 6.31 | 2.02 | 3.71 |
| 2003 | 578 | 203 | 375 | 4.53 | 3.26 | 5.74 | 1.78 | 3.29 |
| 2004 | 594 | 238 | 356 | 4.65 | 3.82 | 5.44 | 2.02 | 3.03 |

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号20(1) 進行性核上性麻痺 Progressive supranuclear ophthalmoplegia

| | 死亡数 | | | 粗死亡率 (/100万) | | | 年齢調整死亡率 (/100万) | |
|------|-----|-----|----|-----------------|------|------|--------------------|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 87 | 49 | 38 | 0.69 | 0.80 | 0.59 | 0.59 | 0.44 |
| 1996 | 108 | 71 | 37 | 0.86 | 1.15 | 0.58 | 0.82 | 0.42 |
| 1997 | 112 | 69 | 43 | 0.89 | 1.12 | 0.67 | 0.76 | 0.47 |
| 1998 | 122 | 69 | 53 | 0.96 | 1.11 | 0.82 | 0.72 | 0.55 |
| 1999 | 160 | 107 | 53 | 1.26 | 1.73 | 0.82 | 1.11 | 0.54 |
| 2000 | 163 | 100 | 63 | 1.28 | 1.61 | 0.97 | 0.96 | 0.61 |
| 2001 | 194 | 121 | 73 | 1.52 | 1.94 | 1.12 | 1.12 | 0.69 |
| 2002 | 164 | 110 | 54 | 1.29 | 1.77 | 0.83 | 0.99 | 0.50 |
| 2003 | 239 | 160 | 79 | 1.87 | 2.57 | 1.21 | 1.36 | 0.68 |
| 2004 | 244 | 173 | 71 | 1.91 | 2.78 | 1.09 | 1.44 | 0.59 |

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口