

| | | | | | |
|----|-------|----|------|-------|------|
| 30 | 外傷 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 31 | 急性中毒 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 32 | 誤飲、誤嚥 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 33 | 熱傷 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 34 | 自殺企図 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |

疾患（複数の疾患を含む項目は、そのひとつでも経験すれば1例と数え、合計数をご回答ください）

| | | | | | |
|----|--|----|------|-------|------|
| 35 | 貧血（鉄欠乏性貧血、二次性貧血） | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 36 | 脳・脊髄血管障害（脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血） | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 37 | 湿疹・皮膚炎群（接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎） | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 38 | 蕁麻疹 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 39 | 皮膚感染症 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 40 | 骨折 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 41 | 関節の脱臼、亜脱臼、捻挫、靭帯損傷 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 42 | 骨粗鬆症 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 43 | 脊柱障害（腰椎椎間板ヘルニア） | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 44 | 心不全 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 45 | 狭心症、心筋梗塞 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 46 | 不整脈（主要な頻脈性、徐脈性不整脈） | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 47 | 動脈疾患（動脈硬化症、大動脈瘤） | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 48 | 高血圧症（本態性、二次性高血圧症） | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 49 | 呼吸不全 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 50 | 呼吸器感染症（急性上気道炎、気管支炎、肺炎） | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 51 | 閉塞性・拘束性肺疾患（気管支喘息、気管支拡張症） | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 52 | 食道・胃・十二指腸疾患（食道静脈瘤、胃癌、消化性潰瘍、胃・十二指腸炎） | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 53 | 小腸・大腸疾患（イレウス、急性虫垂炎、痔核・痔漏） | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 54 | 肝疾患（ウイルス性肝炎、急性・慢性肝炎、肝硬変、肝癌、アルコール性肝障害、薬物性肝障害） | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 55 | 横隔膜・腹壁・腹膜（腹膜炎、急性腹症、ヘルニア） | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 56 | 腎不全（急性・慢性腎不全、透析） | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 57 | 泌尿器科的腎・尿路疾患（尿路結石、尿路感染症） | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 58 | 妊娠分娩（正常妊娠、流産、早産、正常分娩、産科出血、乳腺炎、産褥） | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 59 | 男性生殖器疾患（前立腺疾患、勃起障害、精巣腫瘍） | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |

| | | | | | |
|----|--|----|------|-------|------|
| 60 | 糖代謝異常(糖尿病、糖尿病の合併症、低血糖) | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 61 | 高脂血症 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 62 | 屈折異常(近視、遠視、乱視) | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 63 | 角結膜炎 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 64 | 白内障 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 65 | 緑内障 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 66 | 中耳炎 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 67 | アレルギー性鼻炎 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 68 | 痴呆(血管性痴呆を含む) | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 69 | うつ病 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 70 | 統合失調症(精神分裂病) | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 71 | 身体表現性障害、ストレス関連障害 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 72 | ウイルス感染症(インフルエンザ、麻疹、風疹、水痘、ヘルペス、流行性耳下腺炎) | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 73 | 細菌感染症(ブドウ球菌、MRSA、A群連鎖球菌、クラミジア) | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 74 | 結核 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 75 | 慢性関節リウマチ | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 76 | アレルギー疾患 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 77 | 熱傷 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 78 | 小児けいれん性疾患 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 79 | 小児ウイルス感染症(麻疹、流行性耳下腺炎、水痘、突発性発疹、インフルエンザ) | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 80 | 小児喘息 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 81 | 高齢者の栄養摂取障害 | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |
| 82 | 老年症候群(誤嚥、転倒、失禁、褥瘡) | 0例 | 1～5例 | 6～10例 | 11例～ |

医療記録

| | | | | | |
|----|---------------|----|------|-------|------|
| 83 | 死亡診断書 | 0通 | 1～5通 | 6～10通 | 11通～ |
| 84 | 死体検案書 | 0通 | 1・2通 | 3・4通 | 5通～ |
| 85 | CPCレポート(剖検報告) | 0例 | 1・2例 | 3・4例 | 5例～ |
| 86 | 紹介状 | 0通 | 1～5通 | 6～10通 | 11通～ |

質問は以上で終わりです。

ご協力、誠にありがとうございました

病院調査票

この調査票は、特に定めのあるものを除き 3月1日現在で作成してください。

| | | | | | |
|-------|----|----|-----------------|----|----|
| 研修責任者 | 役職 | 氏名 | 作成者 | 所属 | 氏名 |
| 病院名 | | | 所在地・電話番号 Tel | | |

1. 貴院にいま現在勤務されている、卒業臨床研修2年目の研修医は何人ですか。()人
 貴院所属であっても、いま現在、他院へ派遣されている者は除きます。

2. 研修医個人ごとの研修記録

研修医個人ごとの研修記録はどのようにしていますか。該当する記号に○

a 研修医手帳を配布し、記載させている。
 b 病院独自ソフトまたはシステムで個人記録を電子情報として入力させている。
 c UMIN 大学病院医療情報ネットワークセンター提供のインターネットを利用した研修評価システム (EPOC) を使用して個人記録を電子情報として入力させている。
 d 医療研修推進財団提供によるシステムを使用して個人記録を電子情報として入力させている。
 e 上記以外のソフトまたはシステムで個人記録を電子情報として入力させている。

3. 研修の評価

以下の項目で、一定の形式による評価システムがあり実施されているものにつき、その記号に○を記入

| | 知識 | 技能 | 態度 | 病歴記載 | 退院時要約 | その他 (内容記載) | 総合評価 |
|-------|----|----|----|------|-------|------------|------|
| 自己評価 | a | b | c | d | e | f () | g |
| 指導医評価 | h | i | j | k | l | m () | n |

評価時期はどのように設定していますか。該当する記号に○

a 診療科単位で評価している。 b 一定期間を設定して評価している。 c 時期を設定せず随時評価を行っている。
 d 最終段階の総合的評価のみを行っている。 e その他

4. 厚生労働省承認の臨床研修指導医養成ワークショップ・研修の修了指導医数 (厚生労働省承認とは修了証書に厚生労働省医政局長印があるものを指す。)

() 人

5. 研修期間において以下の内容の教育・研修はいかになされていますか

| | |
|---|-----------------------|
| 以下の項目で独立に時間をとって実施指導・研修を行っていますか。該当する記号に○ | |
| 1) 検査計画のたてかた | a 行っている b 行っていない |
| 2) 患者・家族の面接・教育の技法 | a 行っている b 行っていない |
| 3) 診療録の記入 | a 行っている b 行っていない |
| 4) 退院時要約の記入 | a 行っている b 行っていない |
| 5) 文献検索の方法 | a 行っている b 行っていない |
| 6) 診療点数・保険制度について | a 行っている b 行っていない |
| 7) 死亡診断書の記入 | a 行っている b 行っていない |
| 8) 死体検案について | a 行っている b 行っていない |

別紙調査結果表

表1 基本的な臨床知識、技術、態度

| 対象者数 | 2418 (100.0) | 対象者数 | 2418 (100.0) |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| 患者の解剖モデルを聞きだすことができる | | 術後起こりうる合併症及び異常に対して基本的な対処ができる | |
| 確実にできる、自信がある | 534 (22.1) | 確実にできる、自信がある | 348 (14.4) |
| だいたいできる、たぶんできる | 1688 (69.8) | だいたいできる、たぶんできる | 927 (38.3) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 144 (6.0) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 795 (32.9) |
| できない | 20 (0.8) | できない | 331 (13.7) |
| 未回答 | 32 (1.3) | 未回答 | 17 (0.7) |
| 患者の病歴を系統的に聴取できる | | 術前患者の不安に対し、心理的配慮をした処置ができる | |
| 確実にできる、自信がある | 637 (26.3) | 確実にできる、自信がある | 510 (21.1) |
| だいたいできる、たぶんできる | 1649 (68.2) | だいたいできる、たぶんできる | 1288 (53.3) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 109 (4.5) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 473 (19.6) |
| できない | 7 (0.3) | できない | 132 (5.5) |
| 未回答 | 16 (0.7) | 未回答 | 15 (0.6) |
| 患者と非言語的コミュニケーションができる | | 心マッサージができる | |
| 確実にできる、自信がある | 547 (22.6) | 確実にできる、自信がある | 1227 (50.7) |
| だいたいできる、たぶんできる | 1578 (65.3) | だいたいできる、たぶんできる | 935 (38.7) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 231 (9.6) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 561 (23.1) |
| できない | 33 (1.4) | できない | 46 (1.9) |
| 未回答 | 29 (1.2) | 未回答 | 14 (0.6) |
| バイタルサインを取ることができる | | 気管挿管ができる | |
| 確実にできる、自信がある | 1299 (53.7) | 確実にできる、自信がある | 897 (37.1) |
| だいたいできる、たぶんできる | 1029 (42.6) | だいたいできる、たぶんできる | 973 (40.2) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 71 (2.9) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 376 (15.6) |
| できない | 3 (0.1) | できない | 158 (6.5) |
| 未回答 | 16 (0.7) | 未回答 | 14 (0.6) |
| 皮膚の所見を記述できる | | レスピレーターを装着し、調節できる | |
| 確実にできる、自信がある | 203 (8.4) | 確実にできる、自信がある | 617 (25.5) |
| だいたいできる、たぶんできる | 1137 (47.0) | だいたいできる、たぶんできる | 939 (38.8) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 941 (38.9) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 576 (23.8) |
| できない | 115 (4.8) | できない | 274 (11.3) |
| 未回答 | 22 (0.9) | 未回答 | 12 (0.5) |
| 眼底所見により、動脈硬化の有無を判定できる | | 電気的除細動の適応を挙げ、実施できる | |
| 確実にできる、自信がある | 97 (4.0) | 確実にできる、自信がある | 533 (22.0) |
| だいたいできる、たぶんできる | 180 (7.4) | だいたいできる、たぶんできる | 948 (39.2) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 670 (27.7) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 681 (28.2) |
| できない | 1456 (60.2) | できない | 240 (9.9) |
| 未回答 | 15 (0.6) | 未回答 | 16 (0.7) |
| 鼓膜を観察し、異常の有無を判定できる | | 救急患者の重傷度および緊急度を判断できる | |
| 確実にできる、自信がある | 114 (4.7) | 確実にできる、自信がある | 395 (16.3) |
| だいたいできる、たぶんできる | 435 (18.0) | だいたいできる、たぶんできる | 1153 (47.3) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 844 (34.9) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 756 (31.7) |
| できない | 1010 (41.8) | できない | 158 (6.5) |
| 未回答 | 15 (0.6) | 未回答 | 16 (0.7) |
| 甲状腺の触診ができる | | ショックの診断と治療ができる | |
| 確実にできる、自信がある | 251 (10.4) | 確実にできる、自信がある | 315 (13.0) |
| だいたいできる、たぶんできる | 1173 (48.5) | だいたいできる、たぶんできる | 1063 (44.0) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 840 (34.7) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 861 (35.6) |
| できない | 139 (5.7) | できない | 158 (6.5) |
| 未回答 | 15 (0.6) | 未回答 | 21 (0.9) |
| 心尖拍動を触知できる | | 末期患者の家族に病気を説明し、家族の心理的不安を受け止めることができる | |
| 確実にできる、自信がある | 664 (27.5) | 確実にできる、自信がある | 345 (14.3) |
| だいたいできる、たぶんできる | 1207 (49.9) | だいたいできる、たぶんできる | 1131 (46.8) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 441 (18.2) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 787 (32.5) |
| できない | 89 (3.7) | できない | 141 (5.8) |
| 未回答 | 17 (0.7) | 未回答 | 14 (0.6) |
| 心雑音を聴取し、記載できる | | 在宅医療を希望する末期患者のために、環境整備を指導できる | |
| 確実にできる、自信がある | 359 (14.8) | 確実にできる、自信がある | 137 (5.7) |
| だいたいできる、たぶんできる | 1196 (49.5) | だいたいできる、たぶんできる | 622 (25.7) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 713 (29.5) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 1094 (45.2) |
| できない | 139 (5.7) | できない | 582 (22.8) |
| 未回答 | 11 (0.5) | 未回答 | 13 (0.5) |
| ラ音を聴取し、記載できる | | 緩和ケア (WHO方式がん疼痛治療法を含む) のチーム医療に参加できる | |
| 確実にできる、自信がある | 461 (19.1) | 確実にできる、自信がある | 147 (6.1) |
| だいたいできる、たぶんできる | 1389 (57.4) | だいたいできる、たぶんできる | 612 (25.3) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 484 (20.0) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 1033 (42.7) |
| できない | 71 (2.9) | できない | 613 (25.4) |
| 未回答 | 13 (0.5) | 未回答 | 13 (0.5) |
| 筋性防御の有無を判定できる | | 患者の身体的側面だけでなく、心理社会的側面に配慮した治療ができる | |
| 確実にできる、自信がある | 686 (28.4) | 確実にできる、自信がある | 333 (13.8) |
| だいたいできる、たぶんできる | 1312 (54.3) | だいたいできる、たぶんできる | 1356 (56.1) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 349 (14.4) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 656 (27.1) |
| できない | 57 (2.4) | できない | 53 (2.2) |
| 未回答 | 14 (0.6) | 未回答 | 20 (0.8) |
| 直腸診で前立腺の異常を判断できる | | 医療費や社会福祉サービスに関する患者、家族の相談に応じ、解決法を指導できる | |
| 確実にできる、自信がある | 184 (7.6) | 確実にできる、自信がある | 192 (7.9) |
| だいたいできる、たぶんできる | 579 (23.9) | だいたいできる、たぶんできる | 923 (38.2) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 879 (36.4) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 1027 (42.5) |
| できない | 764 (31.6) | できない | 523 (21.6) |
| 未回答 | 12 (0.5) | 未回答 | 23 (1.0) |
| 妊娠の初期兆候を把握できる | | インフォームドコンセントをとることが実施できる | |
| 確実にできる、自信がある | 122 (5.0) | 確実にできる、自信がある | 651 (26.9) |
| だいたいできる、たぶんできる | 359 (14.8) | だいたいできる、たぶんできる | 1425 (58.9) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 959 (39.7) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 301 (12.4) |
| できない | 965 (39.9) | できない | 22 (0.9) |
| 未回答 | 13 (0.5) | 未回答 | 19 (0.8) |
| 双手診により女性付属器の腫脹を触知できる | | 指導医や専門医に適切なタイミングでコンサルテーションができる | |
| 確実にできる、自信がある | 77 (3.2) | 確実にできる、自信がある | 518 (21.4) |
| だいたいできる、たぶんできる | 189 (7.8) | だいたいできる、たぶんできる | 1564 (64.7) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 528 (21.8) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 296 (12.2) |
| できない | 1611 (66.6) | できない | 22 (0.9) |
| 未回答 | 13 (0.5) | 未回答 | 18 (0.7) |
| 関節可動域を検査できる | | 糖尿病患者への健康教育 (健康相談および指導) ができる | |
| 確実にできる、自信がある | 233 (9.6) | 確実にできる、自信がある | 233 (9.6) |
| だいたいできる、たぶんできる | 577 (23.9) | だいたいできる、たぶんできる | 929 (38.4) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 983 (40.7) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 936 (38.7) |
| できない | 611 (25.3) | できない | 301 (12.4) |
| 未回答 | 14 (0.6) | 未回答 | 19 (0.8) |
| 膵臓刺激所見をとることができる | | 日常よく行う処置、検査等の保険点数を知っている | |
| 確実にできる、自信がある | 590 (24.4) | 確実にできる、自信がある | 66 (2.7) |
| だいたいできる、たぶんできる | 1224 (50.6) | だいたいできる、たぶんできる | 366 (15.1) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 453 (18.7) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 1010 (41.8) |
| できない | 139 (5.7) | できない | 959 (39.7) |
| 未回答 | 12 (0.5) | 未回答 | 17 (0.7) |
| 小児の精神運動発達異常を判断できる | | ソーシャルワーカーの役割を理解し、協同して患者ケアを行える | |
| 確実にできる、自信がある | 82 (3.4) | 確実にできる、自信がある | 219 (9.1) |
| だいたいできる、たぶんできる | 408 (16.9) | だいたいできる、たぶんできる | 914 (37.8) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 968 (40.0) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 936 (38.7) |
| できない | 948 (39.2) | できない | 327 (13.5) |
| 未回答 | 12 (0.5) | 未回答 | 22 (0.9) |
| うつ病の診断基準を述べることができる | | 禁煙指導ができる | |
| 確実にできる、自信がある | 161 (6.7) | 確実にできる、自信がある | 272 (11.2) |
| だいたいできる、たぶんできる | 326 (13.5) | だいたいできる、たぶんできる | 982 (40.6) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 669 (27.7) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 823 (34.0) |
| できない | 1247 (51.6) | できない | 321 (13.3) |
| 未回答 | 15 (0.6) | 未回答 | 20 (0.8) |

表1 基本的な臨床知識、技術、態度

| 対象者数 | 2418 (100.0) | 対象者数 | 2418 (100.0) |
|---------------------------------------|--------------|--|--------------|
| 骨折、脱臼、捻挫の鑑別診断ができる | 182 (7.5) | 患者の知識や関心のレベルに応じた健康教育ができる | 227 (9.4) |
| 確実にできる、自信がある | 535 (22.1) | 確実にできる、自信がある | 1266 (52.4) |
| だいたいできる、たぶんできる | 910 (37.6) | だいたいできる、たぶんできる | 782 (32.3) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 773 (32.0) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 123 (5.1) |
| できない | 18 (0.7) | できない | 20 (0.8) |
| 未回答 | | 未回答 | |
| 原沈渣の鏡検で、赤血球、白血球、円柱を区別できる | 327 (13.5) | 在宅医療の適応の判断ができる | 131 (5.4) |
| 確実にできる、自信がある | 528 (21.8) | 確実にできる、自信がある | 721 (29.8) |
| だいたいできる、たぶんできる | 681 (28.6) | だいたいできる、たぶんできる | 1117 (46.2) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 859 (35.5) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 420 (17.4) |
| できない | 13 (0.5) | できない | 29 (1.2) |
| 未回答 | | 未回答 | |
| 便の過血反応を実施し、結果を解釈することができる | 625 (25.8) | 地域の医療資源を活用し、入院患者の退院後も継続性のある医療を提供できるよう調整することができる | 164 (6.8) |
| 確実にできる、自信がある | 992 (41.0) | 確実にできる、自信がある | 846 (35.0) |
| だいたいできる、たぶんできる | 473 (19.6) | だいたいできる、たぶんできる | 1020 (42.2) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 315 (13.0) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 360 (14.9) |
| できない | 13 (0.5) | できない | 28 (1.2) |
| 未回答 | | 未回答 | |
| 血液ガス分析の適応が判断でき、結果の解釈ができる | 863 (35.7) | 社会福祉施設等の役割について理解し、連携をとることができる | 131 (5.4) |
| 確実にできる、自信がある | 1292 (53.4) | 確実にできる、自信がある | 721 (29.8) |
| だいたいできる、たぶんできる | 210 (8.7) | だいたいできる、たぶんできる | 1117 (46.2) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 40 (1.7) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 420 (17.4) |
| できない | 13 (0.5) | できない | 29 (1.2) |
| 未回答 | | 未回答 | |
| 血算・白血球分画検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる | 856 (35.4) | 診療上湧き上がってきた疑問点について、Medlineで文献検索ができる | 654 (27.0) |
| 確実にできる、自信がある | 1294 (53.5) | 確実にできる、自信がある | 1250 (51.7) |
| だいたいできる、たぶんできる | 215 (8.9) | だいたいできる、たぶんできる | 403 (16.7) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 40 (1.7) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 91 (3.8) |
| できない | 13 (0.5) | できない | 20 (0.8) |
| 未回答 | | 未回答 | |
| 血液生化学的検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる | 795 (32.9) | カンファレンス等で簡潔に受診患者のプレゼンテーションができる | 602 (24.9) |
| 確実にできる、自信がある | 1418 (58.6) | 確実にできる、自信がある | 1493 (61.7) |
| だいたいできる、たぶんできる | 171 (7.1) | だいたいできる、たぶんできる | 282 (11.7) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 23 (1.0) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 23 (1.0) |
| できない | 11 (0.5) | できない | 18 (0.7) |
| 未回答 | | 未回答 | |
| 血液凝固機構に関する検査を指示し、結果を判定できる | 663 (27.4) | 診療録(退院時サマリーを含む)をPOS(Problem Oriented System)に従って記載し管理できる | 692 (28.6) |
| 確実にできる、自信がある | 1409 (58.3) | 確実にできる、自信がある | 1390 (57.5) |
| だいたいできる、たぶんできる | 305 (12.6) | だいたいできる、たぶんできる | 279 (11.5) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 28 (1.2) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 38 (1.6) |
| できない | 13 (0.5) | できない | 19 (0.8) |
| 未回答 | | 未回答 | |
| 簡易検査(血糖、電解質、尿窒素素など)の適応が判断でき、結果の解釈ができる | 797 (33.0) | 研究デザインを理解して、論文を読むことができる | 313 (12.9) |
| 確実にできる、自信がある | 1391 (57.5) | 確実にできる、自信がある | 1094 (45.2) |
| だいたいできる、たぶんできる | 195 (8.1) | だいたいできる、たぶんできる | 846 (35.0) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 22 (0.9) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 144 (6.0) |
| できない | 13 (0.5) | できない | 21 (0.9) |
| 未回答 | | 未回答 | |
| 血液免疫血清学的検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる | 366 (15.1) | 学会で症例報告ができる | 440 (18.2) |
| 確実にできる、自信がある | 1247 (51.6) | 確実にできる、自信がある | 1041 (43.1) |
| だいたいできる、たぶんできる | 675 (27.9) | だいたいできる、たぶんできる | 747 (30.9) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 114 (4.7) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 173 (7.2) |
| できない | 16 (0.7) | できない | 17 (0.7) |
| 未回答 | | 未回答 | |
| 内分泌学的検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる | 176 (7.3) | データの種類に応じて適切な統計学的解析ができる | 102 (4.2) |
| 確実にできる、自信がある | 995 (41.1) | 確実にできる、自信がある | 490 (20.3) |
| だいたいできる、たぶんできる | 1054 (43.6) | だいたいできる、たぶんできる | 1116 (46.2) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 178 (7.4) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 688 (28.5) |
| できない | 15 (0.6) | できない | 22 (0.9) |
| 未回答 | | 未回答 | |
| グラム染色を行い、結果の解釈ができる | 158 (6.5) | 医療上の安全確認の基本的な考え方を理解し、実施できる | 345 (14.3) |
| 確実にできる、自信がある | 600 (24.8) | 確実にできる、自信がある | 1393 (57.6) |
| だいたいできる、たぶんできる | 915 (37.8) | だいたいできる、たぶんできる | 564 (23.3) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 734 (30.4) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 73 (3.0) |
| できない | 11 (0.5) | できない | 43 (1.8) |
| 未回答 | | 未回答 | |
| 髄液検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる | 334 (13.8) | 医療事故防止及び事故後の対応について、マニュアルなどに沿って行動できる | 355 (14.7) |
| 確実にできる、自信がある | 953 (39.4) | 確実にできる、自信がある | 1380 (56.1) |
| だいたいできる、たぶんできる | 768 (31.8) | だいたいできる、たぶんできる | 601 (24.9) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 349 (14.4) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 82 (3.4) |
| できない | 14 (0.6) | できない | 20 (0.8) |
| 未回答 | | 未回答 | |
| 心電図検査を自ら実施し、不整脈の鑑別診断ができる | 412 (17.0) | 院内感染対策(Standard Precautionsを含む)の基本を理解し、実施できる | 341 (14.1) |
| 確実にできる、自信がある | 1178 (48.7) | 確実にできる、自信がある | 1357 (56.1) |
| だいたいできる、たぶんできる | 712 (29.4) | だいたいできる、たぶんできる | 627 (25.9) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 102 (4.2) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 73 (3.0) |
| できない | 14 (0.6) | できない | 20 (0.8) |
| 未回答 | | 未回答 | |
| 肺機能検査で閉塞性換気障害の判定ができる | 601 (24.9) | 高齢者の聴力・視力・認知面での障害の有無に配慮した、病歴聴取を行うことができる | 435 (18.0) |
| 確実にできる、自信がある | 1126 (46.6) | 確実にできる、自信がある | 1465 (60.6) |
| だいたいできる、たぶんできる | 513 (21.2) | だいたいできる、たぶんできる | 440 (18.2) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 162 (6.7) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 58 (2.4) |
| できない | 16 (0.7) | できない | 20 (0.8) |
| 未回答 | | 未回答 | |
| 超音波検査を自ら実施し、胆管拡張の判定ができる | 296 (12.2) | 高齢者の症状が非特異的、非典型的であることを理解して、身体所見をとることができる | 341 (14.1) |
| 確実にできる、自信がある | 688 (28.5) | 確実にできる、自信がある | 1357 (56.1) |
| だいたいできる、たぶんできる | 769 (31.8) | だいたいできる、たぶんできる | 627 (25.9) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 652 (27.0) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 73 (3.0) |
| できない | 13 (0.5) | できない | 20 (0.8) |
| 未回答 | | 未回答 | |
| 胸部単純X線でシレットサインを判定できる | 592 (24.5) | 高齢者の身体的、精神的、社会的活動性をできるだけ良好に維持するような治療法を提示することができる | 291 (12.0) |
| 確実にできる、自信がある | 1154 (47.7) | 確実にできる、自信がある | 1260 (52.1) |
| だいたいできる、たぶんできる | 557 (23.0) | だいたいできる、たぶんできる | 737 (30.5) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 100 (4.1) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 105 (4.3) |
| できない | 15 (0.6) | できない | 25 (1.0) |
| 未回答 | | 未回答 | |
| 腹部単純X線でイレウスを判定できる | 813 (33.6) | 小児の精神運動発達を異常を判断できる | 92 (3.8) |
| 確実にできる、自信がある | 1196 (49.5) | 確実にできる、自信がある | 446 (18.4) |
| だいたいできる、たぶんできる | 345 (14.3) | だいたいできる、たぶんできる | 1089 (45.0) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 51 (2.1) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 768 (31.8) |
| できない | 13 (0.5) | できない | 23 (1.0) |
| 未回答 | | 未回答 | |
| 胸部CTで肺癌による所見を見出すことができる | 373 (15.4) | 小児の採血、点滴ができる | 428 (17.7) |
| 確実にできる、自信がある | 1092 (45.2) | 確実にできる、自信がある | 800 (33.1) |
| だいたいできる、たぶんできる | 760 (31.4) | だいたいできる、たぶんできる | 737 (30.5) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 179 (7.4) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 433 (17.9) |
| できない | 14 (0.6) | できない | 20 (0.8) |
| 未回答 | | 未回答 | |
| 頭部MRI検査の適応が判断でき、脳梗塞を判定できる | 482 (19.9) | 患者の身体的苦痛のみならず、精神的ケアにも配慮できる | 281 (11.6) |
| 確実にできる、自信がある | 1029 (42.6) | 確実にできる、自信がある | 1169 (48.3) |
| だいたいできる、たぶんできる | 726 (30.0) | だいたいできる、たぶんできる | 773 (32.0) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 168 (6.9) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 173 (7.2) |
| できない | 13 (0.5) | できない | 22 (0.9) |
| 未回答 | | 未回答 | |

表1 基本的な臨床知識、技術、態度

| 対象者数 | 2418 (100.0) | 対象者数 | 2418 (100.0) |
|-------------------------|--------------|---|--------------|
| 手術の手洗いが適切にできる | | 患児の年齢や理解度に応じた説明ができる | |
| 確実にできる、自信がある | 1456 (60.2) | 確実にできる、自信がある | 320 (13.2) |
| だいたいできる、たぶんできる | 746 (30.9) | だいたいできる、たぶんできる | 1237 (51.2) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 166 (6.9) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 668 (27.6) |
| できない | 37 (1.5) | できない | 171 (7.1) |
| 未回答 | 13 (0.5) | 未回答 | 22 (0.9) |
| 静脈血採血が正しくできる | | 代表的な精神科疾患について、診断および治療ができる | |
| 確実にできる、自信がある | 1840 (76.1) | 確実にできる、自信がある | 121 (5.0) |
| だいたいできる、たぶんできる | 531 (22.0) | だいたいできる、たぶんできる | 379 (15.7) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 31 (1.3) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 1015 (42.0) |
| できない | 4 (0.2) | できない | 872 (36.1) |
| 未回答 | 12 (0.5) | 未回答 | 31 (1.3) |
| 動脈血採血が正しくできる | | 精神科領域の薬物治療に伴うことの多い障害について理解し、適切な検査・処置ができる | |
| 確実にできる、自信がある | 1714 (70.9) | 確実にできる、自信がある | 698 (28.9) |
| だいたいできる、たぶんできる | 602 (24.9) | だいたいできる、たぶんできる | 1238 (51.2) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 74 (3.1) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 404 (16.7) |
| できない | 15 (0.6) | できない | 57 (2.4) |
| 未回答 | 13 (0.5) | 未回答 | 21 (0.9) |
| 血液型クロスマッチを行い、結果の判定ができる | | 精神科コメディカルスタッフ(PSW等)の業務を理解し、連携してケアを行うことができる | |
| 確実にできる、自信がある | 568 (23.5) | 確実にできる、自信がある | 152 (6.3) |
| だいたいできる、たぶんできる | 784 (32.4) | だいたいできる、たぶんできる | 603 (24.9) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 700 (28.9) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 914 (37.8) |
| できない | 350 (14.5) | できない | 728 (30.1) |
| 未回答 | 16 (0.7) | 未回答 | 21 (0.9) |
| 輸液の種類と適応を挙げ、輸液の量を決定できる | | 地域の精神保健福祉に関する支援体制状況に関する知識を持ち、適切な連携をとることができる | |
| 確実にできる、自信がある | 666 (27.5) | 確実にできる、自信がある | 104 (4.3) |
| だいたいできる、たぶんできる | 1212 (50.1) | だいたいできる、たぶんできる | 502 (20.8) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 444 (18.4) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 1021 (42.2) |
| できない | 82 (3.4) | できない | 761 (31.5) |
| 未回答 | 14 (0.6) | 未回答 | 30 (1.2) |
| 腰椎穿刺を実施できる | | 守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 | |
| 確実にできる、自信がある | 836 (34.6) | 確実にできる、自信がある | 1261 (52.2) |
| だいたいできる、たぶんできる | 836 (34.6) | だいたいできる、たぶんできる | 1009 (41.7) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 364 (15.1) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 119 (4.9) |
| できない | 369 (15.3) | できない | 7 (0.3) |
| 未回答 | 13 (0.5) | 未回答 | 22 (0.9) |
| 導尿法を実施できる | | 患者の基本的権利について説明できる。 | |
| 確実にできる、自信がある | 1287 (53.2) | 確実にできる、自信がある | 698 (28.9) |
| だいたいできる、たぶんできる | 833 (34.4) | だいたいできる、たぶんできる | 1238 (51.2) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 202 (8.4) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 404 (16.7) |
| できない | 84 (3.5) | できない | 57 (2.4) |
| 未回答 | 12 (0.5) | 未回答 | 21 (0.9) |
| 抗生薬の作用・副作用を理解し、処方できる | | 自己決定できない患者での代理決定について判断できる | |
| 確実にできる、自信がある | 553 (22.9) | 確実にできる、自信がある | 443 (18.3) |
| だいたいできる、たぶんできる | 1407 (58.2) | だいたいできる、たぶんできる | 1120 (46.3) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 403 (16.7) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 728 (30.1) |
| できない | 38 (1.6) | できない | 103 (4.3) |
| 未回答 | 17 (0.7) | 未回答 | 24 (1.0) |
| 局所浸透麻酔とその副作用に対する処置が行える | | 診療計画(診断、治療、患者・家族への説明を含む)を作成できる。 | |
| 確実にできる、自信がある | 631 (26.1) | 確実にできる、自信がある | 659 (27.3) |
| だいたいできる、たぶんできる | 1089 (45.5) | だいたいできる、たぶんできる | 1294 (53.5) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 524 (21.7) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 400 (16.5) |
| できない | 145 (6.0) | できない | 40 (1.7) |
| 未回答 | 19 (0.8) | 未回答 | 25 (1.0) |
| 傷病の基本的処置として、デブリードマンができる | | 診療ガイドラインやクリティカルパスを理解し活用できる。 | |
| 確実にできる、自信がある | 457 (18.9) | 確実にできる、自信がある | 613 (25.4) |
| だいたいできる、たぶんできる | 716 (29.6) | だいたいできる、たぶんできる | 1346 (55.7) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 671 (27.8) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 392 (16.2) |
| できない | 561 (23.2) | できない | 46 (1.9) |
| 未回答 | 13 (0.5) | 未回答 | 21 (0.9) |
| 皮膚縫合法を実施できる | | | |
| 確実にできる、自信がある | 772 (31.9) | | |
| だいたいできる、たぶんできる | 902 (37.3) | | |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 506 (20.9) | | |
| できない | 221 (9.1) | | |
| 未回答 | 17 (0.7) | | |

表2 症状・病態の経験数

| 対象者数 | 2418 (100.0) | 対象者数 | 2418 (100.0) |
|-----------|--------------|----------------|--------------|
| 不眠 | | 四肢のしびれ | |
| 0例 | 124 (5.1) | 0例 | 114 (4.7) |
| 1~5例 | 286 (11.8) | 1~5例 | 594 (24.6) |
| 6~10例 | 195 (8.1) | 6~10例 | 594 (24.6) |
| 11例~ | 1756 (72.6) | 11例~ | 1069 (44.2) |
| 未回答 | 57 (2.4) | 未回答 | 47 (1.9) |
| 浮腫 | | 血尿 | |
| 0例 | 78 (3.2) | 0例 | 113 (4.7) |
| 1~5例 | 435 (18.0) | 1~5例 | 653 (27.0) |
| 6~10例 | 423 (17.5) | 6~10例 | 565 (23.4) |
| 11例~ | 1430 (59.1) | 11例~ | 1040 (43.0) |
| 未回答 | 52 (2.2) | 未回答 | 47 (1.9) |
| リンパ節腫脹 | | 排尿障害(尿失禁・排尿困難) | |
| 0例 | 131 (5.4) | 0例 | 142 (5.9) |
| 1~5例 | 682 (28.2) | 1~5例 | 636 (26.3) |
| 6~10例 | 539 (22.3) | 6~10例 | 594 (24.6) |
| 11例~ | 1008 (41.7) | 11例~ | 996 (41.2) |
| 未回答 | 58 (2.4) | 未回答 | 50 (2.1) |
| 発疹 | | 不安・抑うつ | |
| 0例 | 66 (2.7) | 0例 | 122 (5.0) |
| 1~5例 | 450 (18.6) | 1~5例 | 536 (22.2) |
| 6~10例 | 487 (20.1) | 6~10例 | 477 (19.7) |
| 11例~ | 1363 (56.4) | 11例~ | 1230 (50.9) |
| 未回答 | 52 (2.2) | 未回答 | 53 (2.2) |
| 発熱 | | 心肺停止 | |
| 0例 | 23 (1.0) | 0例 | 193 (8.0) |
| 1~5例 | 81 (3.3) | 1~5例 | 699 (28.9) |
| 6~10例 | 67 (2.8) | 6~10例 | 505 (20.9) |
| 11例~ | 2202 (91.1) | 11例~ | 973 (40.2) |
| 未回答 | 45 (1.9) | 未回答 | 48 (2.0) |
| 頭痛 | | ショック | |
| 0例 | 34 (1.4) | 0例 | 205 (8.5) |
| 1~5例 | 151 (6.2) | 1~5例 | 780 (32.3) |
| 6~10例 | 237 (9.8) | 6~10例 | 539 (22.3) |
| 11例~ | 1951 (80.7) | 11例~ | 846 (35.0) |
| 未回答 | 45 (1.9) | 未回答 | 48 (2.0) |
| めまい | | 意識障害 | |
| 0例 | 80 (3.3) | 0例 | 109 (4.5) |
| 1~5例 | 508 (21.0) | 1~5例 | 581 (24.0) |
| 6~10例 | 433 (17.9) | 6~10例 | 424 (17.5) |
| 11例~ | 1345 (55.6) | 11例~ | 1254 (51.9) |
| 未回答 | 52 (2.2) | 未回答 | 50 (2.1) |
| 視力障害、視野狭窄 | | 脳血管障害 | |
| 0例 | 419 (17.3) | 0例 | 231 (9.6) |
| 1~5例 | 1191 (49.3) | 1~5例 | 602 (24.9) |
| 6~10例 | 381 (15.8) | 6~10例 | 433 (17.9) |
| 11例~ | 370 (15.3) | 11例~ | 1104 (45.7) |
| 未回答 | 57 (2.4) | 未回答 | 48 (2.0) |
| 結膜の充血 | | 急性心不全 | |
| 0例 | 267 (11.0) | 0例 | 400 (16.5) |
| 1~5例 | 991 (41.0) | 1~5例 | 709 (29.3) |
| 6~10例 | 473 (19.6) | 6~10例 | 427 (17.7) |
| 11例~ | 633 (26.2) | 11例~ | 834 (34.5) |
| 未回答 | 54 (2.2) | 未回答 | 48 (2.0) |
| 胸痛 | | 急性冠症候群 | |
| 0例 | 78 (3.2) | 0例 | 570 (23.6) |
| 1~5例 | 524 (21.7) | 1~5例 | 608 (25.1) |
| 6~10例 | 370 (15.3) | 6~10例 | 370 (15.3) |
| 11例~ | 1397 (57.8) | 11例~ | 815 (33.7) |
| 未回答 | 49 (2.0) | 未回答 | 55 (2.3) |

表2 症状・病態の経験数

| 対象者数 | 2418 (100.0) | 対象者数 | 2418 (100.0) |
|-------------|--------------|---------|--------------|
| 動悸 | | 急性腹症 | |
| 0例 | 102 (4.2) | 0例 | 224 (9.3) |
| 1~5例 | 519 (21.5) | 1~5例 | 581 (24.0) |
| 6~10例 | 416 (17.2) | 6~10例 | 445 (18.4) |
| 11例~ | 1331 (55.0) | 11例~ | 1119 (46.3) |
| 未回答 | 50 (2.1) | 未回答 | 49 (2.0) |
| 呼吸困難 | | 急性消化管出血 | |
| 0例 | 70 (2.9) | 0例 | 375 (15.5) |
| 1~5例 | 404 (16.7) | 1~5例 | 781 (32.3) |
| 6~10例 | 353 (14.6) | 6~10例 | 504 (20.8) |
| 11例~ | 1547 (64.0) | 11例~ | 712 (29.4) |
| 未回答 | 44 (1.8) | 未回答 | 46 (1.9) |
| 咳・痰 | | 外傷 | |
| 0例 | 35 (1.4) | 0例 | 224 (9.3) |
| 1~5例 | 158 (6.5) | 1~5例 | 552 (22.8) |
| 6~10例 | 168 (6.9) | 6~10例 | 317 (13.1) |
| 11例~ | 2012 (83.2) | 11例~ | 1279 (52.9) |
| 未回答 | 45 (1.9) | 未回答 | 46 (1.9) |
| 嘔気・嘔吐 | | 急性中毒 | |
| 0例 | 31 (1.3) | 0例 | 499 (20.6) |
| 1~5例 | 134 (5.5) | 1~5例 | 981 (40.6) |
| 6~10例 | 147 (6.1) | 6~10例 | 398 (16.5) |
| 11例~ | 2060 (85.2) | 11例~ | 493 (20.4) |
| 未回答 | 46 (1.9) | 未回答 | 47 (1.9) |
| 腹痛 | | 誤飲、誤嚥 | |
| 0例 | 44 (1.8) | 0例 | 291 (12.0) |
| 1~5例 | 183 (7.6) | 1~5例 | 899 (37.2) |
| 6~10例 | 201 (8.3) | 6~10例 | 492 (20.3) |
| 11例~ | 1943 (80.4) | 11例~ | 685 (28.3) |
| 未回答 | 47 (1.9) | 未回答 | 51 (2.1) |
| 便通異常(下痢、便秘) | | 熱傷 | |
| 0例 | 37 (1.5) | 0例 | 674 (27.9) |
| 1~5例 | 86 (3.6) | 1~5例 | 957 (39.6) |
| 6~10例 | 122 (5.0) | 6~10例 | 322 (13.3) |
| 11例~ | 2126 (87.9) | 11例~ | 417 (17.2) |
| 未回答 | 47 (1.9) | 未回答 | 48 (2.0) |
| 腰痛 | | 自殺企図 | |
| 0例 | 80 (3.3) | 0例 | 611 (25.3) |
| 1~5例 | 337 (13.9) | 1~5例 | 980 (40.5) |
| 6~10例 | 406 (16.8) | 6~10例 | 358 (14.8) |
| 11例~ | 1545 (63.9) | 11例~ | 422 (17.5) |
| 未回答 | 50 (2.1) | 未回答 | 47 (1.9) |

表3 疾患の経験数

| 対象者数 | 2418 (100.0) | 対象者数 | 2418 (100.0) |
|---------------------------|--------------|--|--------------|
| 貧血(鉄欠乏性貧血、二次性貧血) | | 男性生殖器疾患(前立腺疾患、勃起障害、精巣腫瘍) | |
| 0例 | 52 (2.2) | 0例 | 949 (39.2) |
| 1~5例 | 378 (15.6) | 1~5例 | 859 (35.5) |
| 6~10例 | 367 (15.2) | 6~10例 | 252 (10.4) |
| 11例~ | 1571 (65.0) | 11例~ | 305 (12.6) |
| 未回答 | 50 (2.1) | 未回答 | 53 (2.2) |
| 脳・脊髄血管障害(脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血) | | 糖代謝異常(糖尿病、糖尿病の合併症、低血糖) | |
| 0例 | 223 (9.2) | 0例 | 43 (1.8) |
| 1~5例 | 615 (25.4) | 1~5例 | 290 (12.0) |
| 6~10例 | 424 (17.5) | 6~10例 | 329 (13.6) |
| 11例~ | 1098 (45.4) | 11例~ | 1679 (69.4) |
| 未回答 | 58 (2.4) | 未回答 | 77 (3.2) |
| 湿疹・皮膚炎群(接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎) | | 高脂血症 | |
| 0例 | 106 (4.4) | 0例 | 144 (6.0) |
| 1~5例 | 658 (27.2) | 1~5例 | 362 (15.0) |
| 6~10例 | 504 (20.8) | 6~10例 | 429 (17.7) |
| 11例~ | 1100 (45.5) | 11例~ | 1401 (57.9) |
| 未回答 | 50 (2.1) | 未回答 | 82 (3.4) |
| 蕁麻疹 | | 屈折異常(近視、遠視、乱視) | |
| 0例 | 105 (4.3) | 0例 | 1230 (50.9) |
| 1~5例 | 667 (27.6) | 1~5例 | 613 (25.4) |
| 6~10例 | 501 (20.7) | 6~10例 | 143 (5.9) |
| 11例~ | 1098 (45.4) | 11例~ | 350 (14.5) |
| 未回答 | 47 (1.9) | 未回答 | 82 (3.4) |
| 皮膚感染症 | | 角結膜炎 | |
| 0例 | 240 (9.9) | 0例 | 827 (34.2) |
| 1~5例 | 925 (38.3) | 1~5例 | 965 (39.9) |
| 6~10例 | 481 (19.9) | 6~10例 | 236 (9.8) |
| 11例~ | 718 (29.7) | 11例~ | 309 (12.8) |
| 未回答 | 54 (2.2) | 未回答 | 81 (3.3) |
| 骨折 | | 白内障 | |
| 0例 | 422 (17.5) | 0例 | 768 (31.8) |
| 1~5例 | 800 (33.1) | 1~5例 | 766 (31.7) |
| 6~10例 | 331 (13.7) | 6~10例 | 274 (11.3) |
| 11例~ | 818 (33.8) | 11例~ | 531 (22.0) |
| 未回答 | 47 (1.9) | 未回答 | 79 (3.3) |
| 関節の脱臼、亜脱臼、捻挫、靭帯損傷 | | 緑内障 | |
| 0例 | 633 (26.2) | 0例 | 1014 (41.9) |
| 1~5例 | 787 (32.5) | 1~5例 | 893 (36.9) |
| 6~10例 | 288 (11.9) | 6~10例 | 169 (7.0) |
| 11例~ | 659 (27.3) | 11例~ | 264 (10.9) |
| 未回答 | 51 (2.1) | 未回答 | 78 (3.2) |
| 骨粗鬆症 | | 中耳炎 | |
| 0例 | 357 (14.8) | 0例 | 724 (29.9) |
| 1~5例 | 807 (33.4) | 1~5例 | 821 (34.0) |
| 6~10例 | 489 (20.2) | 6~10例 | 262 (10.8) |
| 11例~ | 715 (29.6) | 11例~ | 532 (22.0) |
| 未回答 | 50 (2.1) | 未回答 | 79 (3.3) |
| 脊柱障害(腰椎椎間板ヘルニア) | | アレルギー性鼻炎 | |
| 0例 | 572 (23.7) | 0例 | 306 (12.7) |
| 1~5例 | 924 (38.2) | 1~5例 | 849 (35.1) |
| 6~10例 | 392 (16.2) | 6~10例 | 417 (17.2) |
| 11例~ | 479 (19.8) | 11例~ | 767 (31.7) |
| 未回答 | 51 (2.1) | 未回答 | 79 (3.3) |
| 心不全 | | 痲果(血管性痲果を含む) | |
| 0例 | 249 (10.3) | 0例 | 301 (12.4) |
| 1~5例 | 620 (25.6) | 1~5例 | 593 (24.5) |
| 6~10例 | 434 (17.9) | 6~10例 | 387 (16.0) |
| 11例~ | 1067 (44.1) | 11例~ | 1058 (43.8) |
| 未回答 | 48 (2.0) | 未回答 | 79 (3.3) |
| 狭心症、心筋梗塞 | | うつ病 | |
| 0例 | 299 (12.4) | 0例 | 368 (15.2) |
| 1~5例 | 609 (25.2) | 1~5例 | 877 (36.3) |
| 6~10例 | 397 (16.4) | 6~10例 | 439 (18.2) |
| 11例~ | 1064 (44.0) | 11例~ | 658 (27.2) |
| 未回答 | 49 (2.0) | 未回答 | 76 (3.1) |
| 不整脈(主要な頻脈性、徐脈性不整脈) | | 統合失調症(精神分裂病) | |
| 0例 | 117 (4.8) | 0例 | 730 (30.2) |
| 1~5例 | 625 (25.8) | 1~5例 | 997 (41.2) |
| 6~10例 | 483 (20.0) | 6~10例 | 294 (12.2) |
| 11例~ | 1144 (47.3) | 11例~ | 318 (13.2) |
| 未回答 | 49 (2.0) | 未回答 | 79 (3.3) |
| 動脈疾患(動脈硬化症、大動脈瘤) | | 身体表現性障害、ストレス関連障害 | |
| 0例 | 321 (13.3) | 0例 | 850 (35.2) |
| 1~5例 | 699 (28.9) | 1~5例 | 862 (35.6) |
| 6~10例 | 430 (17.8) | 6~10例 | 268 (11.1) |
| 11例~ | 916 (37.9) | 11例~ | 337 (13.9) |
| 未回答 | 52 (2.2) | 未回答 | 101 (4.2) |
| 高血圧症(本態性、二次性高血圧症) | | ウイルス感染症(インフルエンザ、麻疹、風疹、水痘、ヘルペス、流行性耳下腺炎) | |
| 0例 | 80 (3.3) | 0例 | 133 (5.5) |
| 1~5例 | 249 (10.3) | 1~5例 | 536 (22.2) |
| 6~10例 | 256 (10.6) | 6~10例 | 343 (14.2) |
| 11例~ | 1782 (73.7) | 11例~ | 1320 (54.6) |
| 未回答 | 51 (2.1) | 未回答 | 86 (3.6) |
| 呼吸不全 | | 細菌感染症(ブドウ球菌、MRSA、A群連鎖球菌、クラミジア) | |
| 0例 | 155 (6.4) | 0例 | 72 (3.0) |
| 1~5例 | 537 (22.2) | 1~5例 | 307 (12.7) |
| 6~10例 | 428 (17.7) | 6~10例 | 296 (12.2) |
| 11例~ | 1246 (51.5) | 11例~ | 1660 (68.7) |
| 未回答 | 52 (2.2) | 未回答 | 83 (3.4) |

表3 疾患の経験数

| 対象者数 | 2418 (100.0) | 対象者数 | 2418 (100.0) |
|--|--------------|--|--------------|
| 呼吸器感染症(急性上気道炎、気管支炎、肺炎) | | 結核 | |
| 0例 | 59 (2.4) | 0例 | 867 (35.9) |
| 1~5例 | 290 (12.0) | 1~5例 | 1128 (46.7) |
| 6~10例 | 272 (11.2) | 6~10例 | 208 (8.6) |
| 11例~ | 1745 (72.2) | 11例~ | 135 (5.6) |
| 未回答 | 52 (2.2) | 未回答 | 80 (3.3) |
| 閉塞性・拘束性肺疾患(気管支喘息、気管支拡張症) | | 慢性関節リウマチ | |
| 0例 | 124 (5.1) | 0例 | 512 (21.2) |
| 1~5例 | 515 (21.3) | 1~5例 | 1110 (45.9) |
| 6~10例 | 423 (17.5) | 6~10例 | 365 (15.1) |
| 11例~ | 1305 (54.0) | 11例~ | 353 (14.6) |
| 未回答 | 51 (2.1) | 未回答 | 78 (3.2) |
| 食道・胃・十二指腸疾患(食道静脈瘤、胃癌、消化性潰瘍、胃・十二指腸炎) | | アレルギー疾患 | |
| 0例 | 162 (6.7) | 0例 | 176 (7.3) |
| 1~5例 | 470 (19.4) | 1~5例 | 831 (34.4) |
| 6~10例 | 429 (17.7) | 6~10例 | 369 (15.3) |
| 11例~ | 1308 (54.1) | 11例~ | 943 (39.0) |
| 未回答 | 49 (2.0) | 未回答 | 99 (4.1) |
| 小腸・大腸疾患(イレウス、急性虫垂炎、痔核・痔漏) | | 熱傷 | |
| 0例 | 160 (6.6) | 0例 | 715 (29.6) |
| 1~5例 | 576 (23.8) | 1~5例 | 930 (38.5) |
| 6~10例 | 470 (19.4) | 6~10例 | 256 (10.6) |
| 11例~ | 1161 (48.0) | 11例~ | 436 (18.0) |
| 未回答 | 51 (2.1) | 未回答 | 81 (3.3) |
| 肝疾患(ウイルス性肝炎、急性・慢性肝炎、肝硬変、肝癌、アルコール性肝障害、薬物性肝障害) | | 小児けいれん性疾患 | |
| 0例 | 138 (5.7) | 0例 | 1036 (42.8) |
| 1~5例 | 569 (23.5) | 1~5例 | 678 (28.0) |
| 6~10例 | 501 (20.7) | 6~10例 | 219 (9.1) |
| 11例~ | 1163 (48.1) | 11例~ | 404 (16.7) |
| 未回答 | 47 (1.9) | 未回答 | 81 (3.3) |
| 横隔膜・腹壁・腹膜(腹膜炎、急性腹症、ヘルニア) | | 小児ウイルス感染症(麻疹、流行性耳下腺炎、水痘、突発性発疹、インフルエンザ) | |
| 0例 | 348 (14.4) | 0例 | 885 (36.6) |
| 1~5例 | 794 (32.8) | 1~5例 | 540 (22.3) |
| 6~10例 | 433 (17.9) | 6~10例 | 230 (9.5) |
| 11例~ | 788 (32.6) | 11例~ | 682 (28.2) |
| 未回答 | 55 (2.3) | 未回答 | 81 (3.3) |
| 腎不全(急性・慢性腎不全、透析) | | 小児喘息 | |
| 0例 | 173 (7.2) | 0例 | 892 (36.9) |
| 1~5例 | 792 (32.8) | 1~5例 | 533 (22.0) |
| 6~10例 | 560 (23.2) | 6~10例 | 247 (10.2) |
| 11例~ | 842 (34.8) | 11例~ | 669 (27.7) |
| 未回答 | 51 (2.1) | 未回答 | 77 (3.2) |
| 泌尿器科的腎・尿路疾患(尿路結石、尿路感染症) | | 高齢者の栄養摂取障害 | |
| 0例 | 197 (8.1) | 0例 | 350 (14.5) |
| 1~5例 | 740 (30.6) | 1~5例 | 602 (24.9) |
| 6~10例 | 487 (20.1) | 6~10例 | 430 (17.8) |
| 11例~ | 935 (38.7) | 11例~ | 952 (39.4) |
| 未回答 | 59 (2.4) | 未回答 | 84 (3.5) |
| 妊娠分娩(正常妊娠、流産、早産、正常分娩、産科出血、乳腺炎、産褥) | | 老年症候群(誤嚥、転倒、失禁、褥瘡) | |
| 0例 | 1371 (56.7) | 0例 | 286 (11.8) |
| 1~5例 | 492 (20.3) | 1~5例 | 485 (20.1) |
| 6~10例 | 138 (5.7) | 6~10例 | 349 (14.4) |
| 11例~ | 369 (15.3) | 11例~ | 1215 (50.2) |
| 未回答 | 48 (2.0) | 未回答 | 83 (3.4) |

表4 医療記録

| | |
|----------------|--------------|
| 対象者数 | 2418 (100.0) |
| 死亡診断書 | |
| 0通 | 417 (17.2) |
| 1～5通 | 946 (39.1) |
| 6～10通 | 436 (18.0) |
| 11通～ | 538 (22.2) |
| 未回答 | 81 (3.3) |
| 死体検案書 | |
| 0通 | 1693 (70.0) |
| 1・2通 | 418 (17.3) |
| 3・4通 | 108 (4.5) |
| 5通～ | 110 (4.5) |
| 未回答 | 89 (3.7) |
| CPCLレポート(剖検報告) | |
| 0例 | 1479 (61.2) |
| 1・2例 | 616 (25.5) |
| 3・4例 | 166 (6.9) |
| 5例～ | 68 (2.8) |
| 未回答 | 89 (3.7) |
| 紹介状 | |
| 0通 | 72 (3.0) |
| 1～5通 | 178 (7.4) |
| 6～10通 | 159 (6.6) |
| 11通～ | 1928 (79.7) |
| 未回答 | 81 (3.3) |

| | 基本的な臨床知識、技術、態度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------------|-------------|---------|----|-------------|----|---------|------------|---------|------|---------|---|----|
| | 大学付属病院 | | | 研修指定病院・一般病院 | | | 研修指定病院・精神病院 | | | 研修指定病院群主病院 | | | 特になし | | 合計 |
| | 研修医数 | % | | 研修医数 | % | | 研修医数 | % | | 研修医数 | % | | 研修医数 | % | |
| 患者の解剖モデルを聞きだすことができる | 378 | (21.5) | 確実に見える、自信がある | 145 | (24.3) | 2 | (18.2) | 9 | (23.1) | 2 | (9.5) | 536 | (22.1) | | |
| | 1237 | (70.2) | だいたいできる、たぶんできる | 407 | (68.3) | 7 | (63.6) | 29 | (74.4) | 15 | (71.4) | 1695 | (69.8) | | |
| | 108 | (6.1) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 33 | (5.5) | 2 | (18.2) | 1 | (2.6) | 2 | (9.5) | 146 | (6.0) | | |
| | 15 | (.9) | できない | 4 | (.7) | | | | | 1 | (4.8) | 20 | (.8) | | |
| | 24 | (1.4) | 未回答 | 7 | (1.2) | | | | | 1 | (4.8) | 32 | (1.3) | | |
| 合計 | 1762 | (100.0) | | 596 | (100.0) | 11 | (100.0) | 39 | (100.0) | 21 | (100.0) | 2429 | (100.0) | | |
| 患者の病歴を系統的に聴取できる | 449 | (25.5) | 確実に見える、自信がある | 171 | (28.7) | 1 | (9.1) | 13 | (33.3) | 4 | (19.0) | 638 | (26.3) | | |
| | 1216 | (69.0) | だいたいできる、たぶんできる | 396 | (66.4) | 9 | (81.8) | 24 | (61.5) | 13 | (61.9) | 1658 | (68.3) | | |
| | 81 | (4.6) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 24 | (4.0) | 1 | (9.1) | 2 | (5.1) | 2 | (9.5) | 110 | (4.5) | | |
| | 5 | (.3) | できない | 1 | (.2) | | | | | 1 | (4.8) | 7 | (.3) | | |
| | 11 | (.6) | 未回答 | 4 | (.7) | | | | | 1 | (4.8) | 16 | (.7) | | |
| 患者と非言語的コミュニケーションができる | 400 | (22.7) | 確実に見える、自信がある | 139 | (23.3) | 2 | (18.2) | 5 | (12.8) | 3 | (14.3) | 549 | (22.6) | | |
| | 1152 | (65.4) | だいたいできる、たぶんできる | 384 | (64.4) | 8 | (72.7) | 29 | (74.4) | 13 | (61.9) | 1586 | (65.3) | | |
| | 166 | (9.4) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 57 | (9.6) | 1 | (9.1) | 5 | (12.8) | 3 | (14.3) | 232 | (9.6) | | |
| | 24 | (1.4) | できない | 8 | (1.3) | | | | | 1 | (4.8) | 33 | (1.4) | | |
| | 20 | (1.1) | 未回答 | 8 | (1.3) | | | | | 1 | (4.8) | 29 | (1.2) | | |
| バイタルサインを取ることが | 914 | (51.9) | 確実に見える、自信がある | 358 | (60.1) | 2 | (18.2) | 22 | (56.4) | 5 | (23.8) | 1301 | (53.6) | | |
| できる | 775 | (44.0) | だいたいできる、たぶんできる | 226 | (37.9) | 8 | (72.7) | 16 | (41.0) | 12 | (57.1) | 1037 | (42.7) | | |
| | 58 | (3.3) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 9 | (1.5) | 1 | (9.1) | 1 | (2.6) | 3 | (14.3) | 72 | (3.0) | | |
| | 3 | (.2) | できない | | | | | | | | | 3 | (.1) | | |
| | 12 | (.7) | 未回答 | 3 | (.5) | | | | | 1 | (4.8) | 16 | (.7) | | |
| 皮膚の所見を記述できる | 160 | (9.1) | 確実に見える、自信がある | 40 | (6.7) | | | 3 | (7.7) | | | 203 | (8.4) | | |
| | 810 | (46.0) | だいたいできる、たぶんできる | 298 | (50.0) | 3 | (27.3) | 20 | (51.3) | 9 | (42.9) | 1140 | (46.9) | | |
| | 682 | (38.7) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 235 | (39.4) | 6 | (54.5) | 16 | (41.0) | 8 | (38.1) | 947 | (39.0) | | |
| | 95 | (5.4) | できない | 17 | (2.9) | 2 | (18.2) | | | 3 | (14.3) | 117 | (4.8) | | |
| | 15 | (.9) | 未回答 | 6 | (1.0) | | | | | 1 | (4.8) | 22 | (.9) | | |
| 眼底所見により、動脈硬化の有無を判定できる | 86 | (4.9) | 確実に見える、自信がある | 11 | (1.8) | 1 | (9.1) | | | | | 98 | (4.0) | | |
| | 130 | (7.4) | だいたいできる、たぶんできる | 45 | (7.6) | 1 | (9.1) | 3 | (7.7) | 2 | (9.5) | 181 | (7.5) | | |
| | 492 | (27.9) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 159 | (26.7) | 2 | (18.2) | 12 | (30.8) | 7 | (33.3) | 672 | (27.7) | | |
| | 1044 | (59.3) | できない | 377 | (63.3) | 7 | (63.6) | 24 | (61.5) | 11 | (52.4) | 1463 | (60.2) | | |
| | 10 | (.6) | 未回答 | 4 | (.7) | | | | | 1 | (4.8) | 15 | (.6) | | |

| | 大学付属病院 | | 研修指定病院・一般病院 | | 研修指定病院・精神病院 | | 研修指定病院群主病院 | | 特になし | |
|---------------------|--------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|------|--------|
| | 研修医数 | % | 研修医数 | % | 研修医数 | % | 研修医数 | % | 研修医数 | % |
| 鼓膜を観察し、異常の有無を判定できる | 87 | (4.9) | 24 | (4.0) | 1 | (2.6) | 8 | (20.5) | 2 | (9.5) |
| 確実にできる、自信がある | 267 | (15.2) | 156 | (26.2) | 6 | (54.5) | 16 | (41.0) | 4 | (19.0) |
| だいたいできる、たぶんできる | 587 | (33.3) | 237 | (39.8) | 5 | (45.5) | 14 | (35.9) | 4 | (19.0) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 811 | (46.0) | 175 | (29.4) | 3 | (7.7) | 3 | (7.7) | 10 | (47.6) |
| できない | 10 | (.6) | 4 | (.7) | 5 | (45.5) | 1 | (4.8) | 1 | (4.8) |
| 未回答 | 186 | (10.6) | 61 | (10.2) | 5 | (45.5) | 21 | (53.8) | 11 | (52.4) |
| 甲状腺の触診ができる | 832 | (47.2) | 309 | (51.8) | 5 | (45.5) | 12 | (30.8) | 6 | (28.6) |
| 確実にできる、自信がある | 620 | (35.2) | 202 | (33.9) | 1 | (9.1) | 3 | (7.7) | 2 | (9.5) |
| だいたいできる、たぶんできる | 114 | (6.5) | 20 | (3.4) | 3 | (27.3) | 16 | (41.0) | 5 | (23.8) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 10 | (.6) | 4 | (.7) | 4 | (36.4) | 15 | (38.5) | 9 | (42.9) |
| できない | 458 | (26.0) | 185 | (31.0) | 3 | (27.3) | 7 | (17.9) | 2 | (9.5) |
| 未回答 | 868 | (49.3) | 315 | (52.9) | 3 | (27.3) | 12 | (30.8) | 4 | (19.0) |
| 心尖拍動を触診できる | 352 | (20.0) | 80 | (13.4) | 3 | (27.3) | 1 | (9.1) | 3 | (14.3) |
| 確実にできる、自信がある | 74 | (4.2) | 11 | (1.8) | 3 | (27.3) | 19 | (48.7) | 10 | (47.6) |
| だいたいできる、たぶんできる | 10 | (.6) | 5 | (.8) | 6 | (54.5) | 12 | (30.8) | 5 | (23.8) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 252 | (14.3) | 96 | (16.1) | 2 | (18.2) | 8 | (20.5) | 2 | (9.5) |
| できない | 816 | (46.3) | 351 | (58.9) | 3 | (27.3) | 14 | (35.9) | 1 | (4.8) |
| 未回答 | 562 | (31.9) | 134 | (22.5) | 8 | (72.7) | 20 | (51.3) | 3 | (14.3) |
| 心雑音を聴取し、記載できる | 125 | (7.1) | 12 | (2.0) | 2 | (18.2) | 5 | (12.8) | 14 | (66.7) |
| 確実にできる、自信がある | 7 | (.4) | 3 | (.5) | 2 | (18.2) | 5 | (12.8) | 1 | (4.8) |
| だいたいできる、たぶんできる | 306 | (17.4) | 138 | (23.2) | 8 | (72.7) | 14 | (35.9) | 2 | (9.5) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 973 | (55.2) | 382 | (64.1) | 2 | (18.2) | 10 | (25.6) | 3 | (14.3) |
| できない | 411 | (23.3) | 67 | (11.2) | 2 | (18.2) | 26 | (66.7) | 13 | (61.9) |
| 未回答 | 64 | (3.6) | 5 | (.8) | 1 | (9.1) | 3 | (7.7) | 2 | (9.5) |
| ラ音を聴取し、記載できる | 8 | (.5) | 4 | (.7) | 2 | (18.2) | 3 | (7.7) | 1 | (4.8) |
| 確実にできる、自信がある | 489 | (27.8) | 183 | (30.7) | 2 | (18.2) | 10 | (25.6) | 4 | (19.0) |
| だいたいできる、たぶんできる | 921 | (52.3) | 352 | (59.1) | 8 | (72.7) | 26 | (66.7) | 13 | (61.9) |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | 291 | (16.5) | 53 | (8.9) | 1 | (9.1) | 3 | (7.7) | 2 | (9.5) |
| できない | 52 | (3.0) | 4 | (.7) | 1 | (9.1) | 1 | (4.8) | 1 | (4.8) |
| 未回答 | 9 | (.5) | 4 | (.7) | 1 | (9.1) | 1 | (4.8) | 1 | (4.8) |
| 筋性防衛の有無を判定できる | | | | | | | | | | |
| 確実にできる、自信がある | | | | | | | | | | |
| だいたいできる、たぶんできる | | | | | | | | | | |
| あまり自信がない、ひとりでは不安である | | | | | | | | | | |
| できない | | | | | | | | | | |
| 未回答 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 114 | (4.7) | 435 | (17.9) | 850 | (35.0) | 1015 | (41.8) | 15 | (.6) |
| | 251 | (10.3) | 1178 | (48.5) | 845 | (34.8) | 140 | (5.8) | 15 | (.6) |
| | 667 | (27.5) | 1211 | (49.9) | 444 | (18.3) | 90 | (3.7) | 17 | (.7) |
| | 719 | (29.6) | 141 | (5.8) | 11 | (.5) | 359 | (14.8) | 1199 | (49.4) |
| | 486 | (20.0) | 72 | (3.0) | 13 | (.5) | 688 | (28.3) | 1320 | (54.3) |
| | 350 | (14.4) | 57 | (2.3) | 14 | (.6) | 486 | (20.0) | 350 | (14.4) |
| | 57 | (2.3) | 14 | (.6) | 1320 | (54.3) | 350 | (14.4) | 57 | (2.3) |
| | 14 | (.6) | 486 | (20.0) | 350 | (14.4) | 57 | (2.3) | 14 | (.6) |

基本的な臨床知識、技術、態度

大学付属病院

研究指定病院-一般病院

研究指定病院-精神病院

特になし

合計

| 大学付属病院 | 研究指定病院-一般病院 | 研究指定病院-精神病院 | 特になし | 合計 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 研修医数 | 研修医数 | 研修医数 | 研修医数 | 研修医数 |
| % | % | % | % | % |
| 133 (7.5) | 48 (8.1) | 3 (7.7) | | 184 (7.6) |
| 365 (20.7) | 197 (33.1) | 11 (28.2) | 6 (28.6) | 580 (23.9) |
| 624 (35.4) | 231 (38.8) | 17 (43.6) | 7 (33.3) | 883 (36.4) |
| 632 (35.9) | 117 (19.6) | 8 (20.5) | 7 (33.3) | 770 (31.7) |
| 8 (5) | 3 (5) | | 1 (4.8) | 12 (5) |
| 86 (4.9) | 34 (5.7) | 2 (5.1) | | 122 (5.0) |
| 215 (12.2) | 131 (22.0) | 8 (20.5) | 5 (23.8) | 360 (14.8) |
| 694 (39.4) | 245 (41.1) | 15 (38.5) | 5 (23.8) | 965 (39.7) |
| 759 (43.1) | 182 (30.5) | 14 (35.9) | 10 (47.6) | 969 (39.9) |
| 8 (5) | 4 (7) | | 1 (4.8) | 13 (5) |
| 56 (3.2) | 18 (3.0) | 3 (7.7) | | 77 (3.2) |
| 115 (6.5) | 63 (10.6) | 8 (20.5) | 3 (14.3) | 189 (7.8) |
| 361 (20.5) | 153 (25.7) | 11 (28.2) | 3 (14.3) | 529 (21.8) |
| 1221 (69.3) | 359 (60.2) | 17 (43.6) | 14 (66.7) | 1621 (66.7) |
| 9 (5) | 3 (5) | | 1 (4.8) | 13 (5) |
| 172 (9.8) | 59 (9.9) | 2 (5.1) | | 233 (9.6) |
| 365 (20.7) | 197 (33.1) | 9 (23.1) | 6 (28.6) | 580 (23.9) |
| 740 (42.0) | 220 (36.9) | 18 (46.2) | 5 (23.8) | 989 (40.7) |
| 476 (27.0) | 116 (19.5) | 10 (25.6) | 9 (42.9) | 613 (25.2) |
| 9 (5) | 4 (7) | | 1 (4.8) | 14 (6) |
| 390 (22.1) | 185 (31.0) | 11 (28.2) | 4 (19.0) | 590 (24.3) |
| 859 (48.8) | 330 (55.4) | 25 (64.1) | 10 (47.6) | 1229 (50.6) |
| 383 (21.7) | 63 (10.6) | 3 (7.7) | 4 (19.0) | 458 (18.9) |
| 122 (6.9) | 15 (2.5) | | 2 (9.5) | 140 (5.8) |
| 8 (5) | 3 (5) | | 1 (4.8) | 12 (5) |
| 60 (3.4) | 19 (3.2) | 3 (7.7) | | 82 (3.4) |
| 283 (16.1) | 110 (18.5) | 9 (23.1) | 6 (28.6) | 412 (17.0) |
| 689 (39.1) | 261 (43.8) | 14 (35.9) | 4 (19.0) | 973 (40.1) |
| 722 (41.0) | 203 (34.1) | 13 (33.3) | 10 (47.6) | 950 (39.1) |
| 8 (5) | 3 (5) | | 1 (4.8) | 12 (5) |

直腸診で前立腺の異常を判断できる

確実に見える、自信がある

だいたい見える、たぶんできる

あまり自信がない、ひとりでは不安である

できない

未回答

妊娠の初期兆候を把握できる

確実に見える、自信がある

だいたい見える、たぶんできる

あまり自信がない、ひとりでは不安である

できない

未回答

双手診により女性付属器の腫脹を触知できる

確実に見える、自信がある

だいたい見える、たぶんできる

あまり自信がない、ひとりでは不安である

できない

未回答

関節可動域を検査できる

確実に見える、自信がある

だいたい見える、たぶんできる

あまり自信がない、ひとりでは不安である

できない

未回答

髄膜刺激所見をとることができ

確実に見える、自信がある

だいたい見える、たぶんできる

あまり自信がない、ひとりでは不安である

できない

未回答

小児の精神運動発達を異常を判断できる

確実に見える、自信がある

だいたい見える、たぶんできる

あまり自信がない、ひとりでは不安である

できない

未回答

| | 大学付属病院 | | 研修指定病院 一般病院 | | 研修指定病院 精神病院 | | 研修指定病院 群主病院 | | 特になし | |
|------------------------------|--------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------|--------|
| | 研修医数 | % | 研修医数 | % | 研修医数 | % | 研修医数 | % | 研修医数 | % |
| うつ病の診断基準を述べることができ | 125 | (7.1) | 30 | (5.0) | 3 | (27.3) | 5 | (12.8) | 1 | (4.8) |
| 確実にできる、自信がある | 216 | (12.3) | 102 | (17.1) | 7 | (63.6) | 5 | (12.8) | 3 | (14.3) |
| たいたいできる、たぶんできる | 476 | (27.0) | 177 | (29.7) | 1 | (9.1) | 13 | (33.3) | 3 | (14.3) |
| あまり自信がない、ひとりでできない | 935 | (53.1) | 283 | (47.5) | | | 16 | (41.0) | 13 | (61.9) |
| 未回答 | 10 | (.6) | 4 | (7) | | | | | 1 | (4.8) |
| 骨折、脱臼、捻挫の鑑別診断ができる | 126 | (7.2) | 55 | (9.2) | 1 | (9.1) | 1 | (2.6) | | |
| 確実にできる、自信がある | 308 | (17.5) | 209 | (35.1) | 1 | (9.1) | 14 | (35.9) | 4 | (19.0) |
| たいたいできる、たぶんできる | 685 | (38.9) | 205 | (34.4) | 6 | (54.5) | 14 | (35.9) | 6 | (28.6) |
| あまり自信がない、ひとりでできない | 630 | (35.8) | 123 | (20.6) | 3 | (27.3) | 10 | (25.6) | 10 | (47.6) |
| 未回答 | 13 | (.7) | 4 | (7) | | | | | 1 | (4.8) |
| 尿沈渣の鏡検で、赤血球、白血球、円柱を区別できる | 266 | (15.1) | 57 | (9.6) | | | 2 | (5.1) | 2 | (9.5) |
| 確実にできる、自信がある | 397 | (22.5) | 118 | (19.8) | 2 | (18.2) | 6 | (15.4) | 7 | (33.3) |
| たいたいできる、たぶんできる | 479 | (27.2) | 191 | (32.0) | 3 | (27.3) | 20 | (51.3) | 1 | (4.8) |
| あまり自信がない、ひとりでできない | 612 | (34.7) | 226 | (37.9) | 6 | (54.5) | 11 | (28.2) | 10 | (47.6) |
| 未回答 | 8 | (.5) | 4 | (7) | | | | | 1 | (4.8) |
| 便の潜血反応を実施し、結果を解釈することができる | 442 | (25.1) | 170 | (28.5) | | | 7 | (17.9) | 6 | (28.6) |
| 確実にできる、自信がある | 702 | (39.8) | 262 | (44.0) | 3 | (27.3) | 19 | (48.7) | 9 | (42.9) |
| たいたいできる、たぶんできる | 365 | (20.7) | 100 | (16.8) | 4 | (36.4) | 5 | (12.8) | 3 | (14.3) |
| あまり自信がない、ひとりでできない | 245 | (13.9) | 60 | (10.1) | 4 | (36.4) | 8 | (20.5) | 2 | (9.5) |
| 未回答 | 8 | (.5) | 4 | (7) | | | | | 1 | (4.8) |
| 血ガス分析の適応が判断でき、結果の解釈ができる | 617 | (35.0) | 227 | (38.1) | | | 15 | (38.5) | 4 | (19.0) |
| 確実にできる、自信がある | 919 | (52.2) | 339 | (56.9) | 2 | (18.2) | 21 | (53.8) | 13 | (61.9) |
| たいたいできる、たぶんできる | 182 | (10.3) | 26 | (4.4) | 9 | (81.8) | 2 | (5.1) | | |
| あまり自信がない、ひとりでできない | 36 | (2.0) | 1 | (2) | | | | | 3 | (14.3) |
| 未回答 | 8 | (.5) | 3 | (5) | | | 1 | (2.6) | 1 | (4.8) |
| 血算・白血球分画検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる | 598 | (33.9) | 235 | (39.4) | | | 17 | (43.6) | 6 | (28.6) |
| 確実にできる、自信がある | 947 | (53.7) | 314 | (52.7) | 10 | (90.9) | 22 | (56.4) | 11 | (52.4) |
| たいたいできる、たぶんできる | 175 | (9.9) | 39 | (6.5) | 1 | (9.1) | | | 1 | (4.8) |
| あまり自信がない、ひとりでできない | 33 | (1.9) | 5 | (.8) | | | | | 2 | (9.5) |
| 未回答 | 9 | (.5) | 3 | (.5) | | | | | 1 | (4.8) |
| | | | | | | | | | 13 | (5) |

基本的な臨床知識、技術、態度

大学付属病院

研修指定病院・一般病院

研修指定病院・精神病院

研修指定病院・群主病院

特になし

研修医数 % 研修医数 % 研修医数 % 研修医数 % 研修医数 %

565 (32.1) 209 (35.1) 16 (41.0) 5 (23.8) 795 (32.7)

1026 (58.2) 358 (60.1) 22 (56.4) 12 (57.1) 1427 (58.7)

144 (8.2) 25 (4.2) 2 (18.2) 1 (4.8) 173 (7.1)

20 (1.1) 1 (0.2) 9 (81.8) 2 (9.5) 23 (9)

7 (0.4) 3 (0.5) 2 (18.2) 1 (4.8) 11 (0.9)

473 (26.8) 173 (29.0) 13 (33.3) 4 (19.0) 663 (27.3)

1012 (57.4) 363 (60.9) 23 (59.0) 11 (52.4) 1414 (58.2)

243 (13.8) 56 (9.4) 3 (7.7) 3 (14.3) 311 (12.8)

25 (1.4) 1 (0.2) 2 (18.2) 2 (9.5) 28 (1.2)

9 (0.5) 3 (0.5) 2 (18.2) 1 (4.8) 13 (0.5)

554 (31.4) 223 (37.4) 15 (38.5) 5 (23.8) 799 (32.9)

1019 (57.8) 338 (56.7) 22 (56.4) 12 (57.1) 1398 (57.6)

162 (9.2) 30 (5.0) 2 (5.1) 1 (4.8) 197 (8.1)

19 (1.1) 1 (0.2) 7 (17.9) 2 (9.5) 22 (0.9)

8 (0.5) 4 (0.7) 16 (41.0) 1 (4.8) 13 (0.5)

263 (14.9) 95 (15.9) 7 (17.9) 1 (4.8) 366 (15.1)

894 (50.7) 327 (54.9) 2 (18.2) 10 (47.6) 1249 (51.4)

502 (28.5) 153 (25.7) 14 (35.9) 6 (28.6) 682 (28.1)

93 (5.3) 17 (2.9) 2 (5.1) 3 (14.3) 116 (4.8)

10 (0.6) 4 (0.7) 7 (17.9) 1 (4.8) 16 (0.7)

132 (7.5) 41 (6.9) 3 (7.7) 1 (4.8) 176 (7.2)

693 (39.3) 282 (47.3) 11 (28.2) 9 (42.9) 1000 (41.2)

775 (44.0) 248 (41.6) 24 (61.5) 7 (33.3) 1059 (43.6)

151 (8.6) 22 (3.7) 1 (2.6) 4 (19.0) 179 (7.4)

11 (0.6) 3 (0.5) 3 (7.7) 1 (4.8) 15 (0.6)

111 (6.3) 44 (7.4) 11 (28.2) 3 (14.3) 158 (6.5)

418 (23.7) 168 (28.2) 19 (48.7) 4 (19.0) 602 (24.8)

662 (37.6) 230 (38.6) 6 (15.4) 4 (19.0) 919 (37.8)

563 (32.0) 152 (25.5) 13 (61.9) 13 (61.9) 739 (30.4)

8 (0.5) 2 (0.3) 1 (4.8) 1 (4.8) 11 (0.5)

合計

血液生化学的検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる
 確実に行える、自信がある
 だいたい行える、たぶんできる
 あまり自信がない、ひとりで不安である
 できない
 未回答

血液凝固機構に関する検査を指示し、結果を判定できる
 確実に行える、自信がある
 だいたい行える、たぶんできる
 あまり自信がない、ひとりで不安である
 できない
 未回答

簡易検査(血糖、電解質、尿素窒素など)の適応が判断でき、結果の解釈ができる
 確実に行える、自信がある
 だいたい行える、たぶんできる
 あまり自信がない、ひとりで不安である
 できない
 未回答

血液免疫学的検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる
 確実に行える、自信がある
 だいたい行える、たぶんできる
 あまり自信がない、ひとりで不安である
 できない
 未回答

内分泌学的検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる
 確実に行える、自信がある
 だいたい行える、たぶんできる
 あまり自信がない、ひとりで不安である
 できない
 未回答

グラム染色を行い、結果の解釈ができる
 確実に行える、自信がある
 だいたい行える、たぶんできる
 あまり自信がない、ひとりで不安である
 できない
 未回答

| | 基本的な臨床知識、技術、態度 | | | | | | | | | | | | 合計 | | | |
|--------------------------|----------------|--------|---------------------|-------------|--------|---|-------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| | 大学付属病院 | | | 研修指定病院-一般病院 | | | 研修指定病院-精神病院 | | | 研修指定病院群主病院 | | | | 特になし | | |
| | 研修医数 | % | | 研修医数 | % | | 研修医数 | % | | 研修医数 | % | | | 研修医数 | % | |
| 髄液検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる | 211 | (12.0) | 確実に行える、自信がある | 113 | (19.0) | | 8 | (20.5) | 2 | (9.5) | 334 | (13.8) | | | | |
| | 624 | (35.4) | 行いたいことができる、たぶんできる | 296 | (49.7) | 5 | (45.5) | 24 | (61.5) | 9 | (42.9) | 958 | (39.4) | | | |
| | 604 | (34.3) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 152 | (25.5) | 3 | (27.3) | 6 | (15.4) | 6 | (28.6) | 771 | (31.7) | | | |
| | 313 | (17.8) | できない | 32 | (5.4) | 3 | (27.3) | 1 | (2.6) | 3 | (14.3) | 352 | (14.5) | | | |
| | 未回答 | | | 3 | (5) | | | | | 1 | (4.8) | 14 | (6) | | | |
| 心電図検査を自ら実施し、不整脈の鑑別診断ができる | 259 | (14.7) | 確実に行える、自信がある | 140 | (23.5) | | | 10 | (25.6) | 3 | (14.3) | 412 | (17.0) | | | |
| | 827 | (46.9) | 行いたいことができる、たぶんできる | 325 | (54.5) | 1 | (9.1) | 19 | (48.7) | 7 | (33.3) | 1179 | (48.5) | | | |
| | 577 | (32.7) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 120 | (20.1) | 9 | (81.8) | 9 | (23.1) | 6 | (28.6) | 721 | (29.7) | | | |
| | 89 | (5.1) | できない | 8 | (1.3) | 1 | (9.1) | 1 | (2.6) | 4 | (19.0) | 103 | (4.2) | | | |
| | 未回答 | | | 3 | (5) | | | | | 1 | (4.8) | 14 | (6) | | | |

| | 基本的な臨床知識、技術、態度 | | | | | | | | | | | | 合計 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------------|-------------|--------|---|-------------|----|--------|------------|--------|------|--------|------|---|--|
| | 大学付属病院 | | | 研修指定病院-一般病院 | | | 研修指定病院-精神病院 | | | 研修指定病院群主病院 | | | | 特になし | | |
| | 研修医数 | % | | 研修医数 | % | | 研修医数 | % | | 研修医数 | % | | | 研修医数 | % | |
| 肺機能検査で閉塞性換気障害の判定ができる | 407 | (23.1) | 確実に行える、自信がある | 175 | (29.4) | 1 | (9.1) | 15 | (38.5) | 4 | (19.0) | 602 | (24.8) | | | |
| | 788 | (44.7) | 行いたいことができる、たぶんできる | 312 | (52.3) | 1 | (9.1) | 18 | (46.2) | 8 | (38.1) | 1127 | (46.4) | | | |
| | 417 | (23.7) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 88 | (14.8) | 4 | (36.4) | 4 | (10.3) | 4 | (19.0) | 517 | (21.3) | | | |
| | 139 | (7.9) | できない | 17 | (2.9) | 5 | (45.5) | 2 | (5.1) | 4 | (19.0) | 167 | (6.9) | | | |
| | 未回答 | | | 4 | (7) | | | | | 1 | (4.8) | 16 | (7) | | | |
| 超音波検査を自ら実施し、胆管拡張の判定ができる | 178 | (10.1) | 確実に行える、自信がある | 107 | (18.0) | | | 9 | (23.1) | 2 | (9.5) | 296 | (12.2) | | | |
| | 410 | (23.3) | 行いたいことができる、たぶんできる | 257 | (43.1) | | | 14 | (35.9) | 7 | (33.3) | 688 | (28.3) | | | |
| | 590 | (33.5) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 162 | (27.2) | 3 | (27.3) | 13 | (33.3) | 4 | (19.0) | 772 | (31.8) | | | |
| | 575 | (32.6) | できない | 67 | (11.2) | 8 | (72.7) | 3 | (7.7) | 7 | (33.3) | 660 | (27.2) | | | |
| | 未回答 | | | 3 | (5) | | | | | 1 | (4.8) | 13 | (5) | | | |
| 胸部単純X線でシルエットサインを判定できる | 391 | (22.2) | 確実に行える、自信がある | 181 | (30.4) | | | 15 | (38.5) | 5 | (23.8) | 592 | (24.4) | | | |
| | 802 | (45.5) | 行いたいことができる、たぶんできる | 326 | (54.7) | 3 | (27.3) | 19 | (48.7) | 7 | (33.3) | 1157 | (47.6) | | | |
| | 467 | (26.5) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 79 | (13.3) | 8 | (72.7) | 5 | (12.8) | 6 | (28.6) | 565 | (23.3) | | | |
| | 91 | (5.2) | できない | 7 | (1.2) | | | | | 2 | (9.5) | 100 | (4.1) | | | |
| | 未回答 | | | 3 | (5) | | | | | 1 | (4.8) | 15 | (6) | | | |
| 腹部単純X線でイレウスを判定できる | 542 | (30.8) | 確実に行える、自信がある | 246 | (41.3) | 1 | (9.1) | 19 | (48.7) | 6 | (28.6) | 814 | (33.5) | | | |
| | 853 | (48.4) | 行いたいことができる、たぶんできる | 313 | (52.5) | 9 | (81.8) | 18 | (46.2) | 12 | (57.1) | 1205 | (49.6) | | | |
| | 310 | (17.6) | あまり自信がない、ひとりでは不安である | 32 | (5.4) | 1 | (9.1) | 2 | (5.1) | 1 | (4.8) | 346 | (14.2) | | | |
| | 48 | (2.7) | できない | 2 | (.3) | | | | | 1 | (4.8) | 51 | (2.1) | | | |
| | 未回答 | | | 3 | (5) | | | | | 1 | (4.8) | 13 | (5) | | | |

| | 基本的な臨床知識、技術、態度 | | | | | | | | | | 合計 |
|---------------------------|----------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|------|--------|----|
| | 大学付属病院 | | 研修指定病院・一般病院 | | 研修指定病院・精神病院 | | 研修指定病院群主病院 | | 特になし | | |
| | 研修医数 | % | 研修医数 | % | 研修医数 | % | 研修医数 | % | 研修医数 | % | |
| 胸部CTで肺癌による所見を見出すことができる | 246 | (14.0) | 119 | (20.0) | 6 | (15.4) | 2 | (9.5) | 373 | (15.4) | |
| | 743 | (42.2) | 319 | (53.5) | 2 | (18.2) | 10 | (47.6) | 1094 | (45.0) | |
| | 604 | (34.3) | 139 | (23.3) | 7 | (63.6) | 4 | (19.0) | 767 | (31.6) | |
| | 159 | (9.0) | 16 | (2.7) | 2 | (18.2) | 4 | (19.0) | 181 | (7.5) | |
| 頭部MRI検査の適応が判断でき、脳梗塞を判定できる | 10 | (.6) | 3 | (.5) | | | 1 | (4.8) | 14 | (.6) | |
| | 303 | (17.2) | 166 | (27.9) | 7 | (17.9) | 6 | (28.6) | 482 | (19.8) | |
| | 727 | (41.3) | 277 | (46.5) | 4 | (36.4) | 5 | (23.8) | 1033 | (42.5) | |
| | 583 | (33.1) | 129 | (21.6) | 7 | (63.6) | 3 | (14.3) | 733 | (30.2) | |
| 手術の手洗いが適切にできる | 140 | (7.9) | 21 | (3.5) | 1 | (2.6) | 6 | (28.6) | 168 | (6.9) | |
| | 9 | (.5) | 3 | (.5) | | | 1 | (4.8) | 13 | (.5) | |
| | 1043 | (59.2) | 378 | (63.4) | 2 | (18.2) | 9 | (42.9) | 1458 | (60.0) | |
| | 543 | (30.8) | 181 | (30.4) | 3 | (27.3) | 11 | (52.4) | 749 | (30.8) | |
| 静脈血採血が正しくできる | 137 | (7.8) | 28 | (4.7) | 4 | (36.4) | 1 | (2.6) | 170 | (7.0) | |
| | 30 | (1.7) | 6 | (1.0) | 2 | (18.2) | | | 39 | (1.6) | |
| | 9 | (.5) | 3 | (.5) | | | 1 | (4.8) | 13 | (.5) | |
| | 1354 | (76.8) | 442 | (74.2) | 6 | (54.5) | 31 | (79.5) | 1846 | (76.0) | |
| 動脈血採血が正しくできる | 377 | (21.4) | 142 | (23.8) | 5 | (45.5) | 7 | (17.9) | 536 | (22.1) | |
| | 21 | (1.2) | 9 | (1.5) | 1 | (2.6) | | | 31 | (1.3) | |
| | 2 | (.1) | | | | | 2 | (9.5) | 4 | (.2) | |
| | 8 | (.5) | 3 | (.5) | | | 1 | (4.8) | 12 | (.5) | |
| 血液型クロスマッチを行い、結果の判定ができる | 1226 | (69.6) | 447 | (75.0) | 4 | (36.4) | 29 | (74.4) | 1718 | (70.7) | |
| | 451 | (25.6) | 136 | (22.8) | 3 | (27.3) | 10 | (25.6) | 605 | (24.9) | |
| | 65 | (3.7) | 8 | (1.3) | 4 | (36.4) | 1 | (4.8) | 78 | (3.2) | |
| | 11 | (.6) | 2 | (.3) | | | 2 | (9.5) | 15 | (.6) | |
| 頭部CTで肺癌による所見を見出すことができる | 9 | (.5) | 3 | (.5) | | | 1 | (4.8) | 13 | (.5) | |
| | 463 | (26.3) | 97 | (16.3) | 1 | (9.1) | 7 | (17.9) | 569 | (23.4) | |
| | 569 | (32.3) | 195 | (32.7) | 3 | (27.3) | 10 | (47.6) | 787 | (32.4) | |
| | 478 | (27.1) | 205 | (34.4) | 5 | (45.5) | 3 | (14.3) | 705 | (29.0) | |
| 頭部MRI検査の適応が判断でき、脳梗塞を判定できる | 241 | (13.7) | 95 | (15.9) | 2 | (18.2) | 8 | (20.5) | 352 | (14.5) | |
| | 11 | (.6) | 4 | (.7) | | | 1 | (4.8) | 16 | (.7) | |

合計

基本的な臨床知識、技術、態度

| | 大学付属病院 | | 研修指定病院・一般病院 | | 研修指定病院・精神病院 | | 研修指定病院群主病院 | | 特になし | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------|---|
| | 研修医数 | % | 研修医数 | % | 研修医数 | % | 研修医数 | % | 研修医数 | % |
| 輸液の種類と適応を挙げ、 輸液の量を決定できる | 確実にできる、自信がある | 473 (26.8) | 176 (29.5) | 4 (36.4) | 12 (30.8) | 5 (23.8) | 666 (27.4) | | | |
| | だいたいできる、たぶんでき る | 853 (48.4) | 332 (55.7) | | 21 (53.8) | 6 (28.6) | 1216 (50.1) | | | |
| | あまり自信がない、ひとり は不安である | 358 (20.3) | 75 (12.6) | 5 (45.5) | 5 (12.8) | 6 (28.6) | 449 (18.5) | | | |
| | できない | 68 (3.9) | 10 (1.7) | 2 (18.2) | 1 (2.6) | 3 (14.3) | 84 (3.5) | | | |
| | 未回答 | 10 (0.6) | 3 (0.5) | | | 1 (4.8) | 14 (6) | | | |
| | 腰椎穿刺を実施できる | 確実にできる、自信がある | 552 (31.3) | 282 (44.0) | 1 (9.1) | 16 (41.0) | 6 (28.6) | 837 (34.5) | | |
| | | だいたいできる、たぶんでき る | 571 (32.4) | 239 (40.1) | 2 (18.2) | 19 (48.7) | 7 (33.3) | 838 (34.5) | | |
| | | あまり自信がない、ひとり は不安である | 292 (16.6) | 65 (10.9) | 2 (18.2) | 4 (10.3) | 3 (14.3) | 366 (15.1) | | |
| | | できない | 338 (19.2) | 27 (4.5) | 6 (54.5) | | 4 (19.0) | 375 (15.4) | | |
| | | 未回答 | 9 (0.5) | 3 (0.5) | | | 1 (4.8) | 13 (5) | | |
| 導尿法を実施できる | | 確実にできる、自信がある | 941 (53.4) | 322 (54.0) | 2 (18.2) | 19 (48.7) | 5 (23.8) | 1289 (53.1) | | |
| | | だいたいできる、たぶんでき る | 594 (33.7) | 212 (35.6) | 9 (81.8) | 16 (41.0) | 11 (52.4) | 842 (34.7) | | |
| | | あまり自信がない、ひとり は不安である | 149 (8.5) | 48 (8.1) | | 3 (7.7) | 2 (9.5) | 202 (8.3) | | |
| | | できない | 70 (4.0) | 11 (1.8) | | 1 (2.6) | 2 (9.5) | 84 (3.5) | | |
| | | 未回答 | 8 (0.5) | 3 (0.5) | | | 1 (4.8) | 12 (5) | | |
| | 抗菌薬の作用・副作用を理 解し、処方できる | 確実にできる、自信がある | 389 (22.1) | 149 (25.0) | | 13 (33.3) | 2 (9.5) | 553 (22.8) | | |
| | | だいたいできる、たぶんでき る | 1002 (56.9) | 372 (62.4) | 5 (45.5) | 20 (51.3) | 13 (61.9) | 1412 (58.1) | | |
| | | あまり自信がない、ひとり は不安である | 327 (18.6) | 67 (11.2) | 6 (54.5) | 6 (15.4) | 3 (14.3) | 409 (16.8) | | |
| | | できない | 32 (1.8) | 4 (0.7) | | | 2 (9.5) | 38 (1.6) | | |
| | | 未回答 | 12 (0.7) | 4 (0.7) | | | 1 (4.8) | 17 (7) | | |
| 局所浸潤麻酔とその副作用 に対する処置が行える | | 確実にできる、自信がある | 445 (25.3) | 176 (29.5) | | 9 (23.1) | 1 (4.8) | 631 (26.0) | | |
| | | だいたいできる、たぶんでき る | 761 (43.2) | 305 (51.2) | 2 (18.2) | 23 (59.0) | 10 (47.6) | 1101 (45.3) | | |
| | | あまり自信がない、ひとり は不安である | 424 (24.1) | 89 (14.9) | 5 (45.5) | 5 (12.8) | 6 (28.6) | 529 (21.8) | | |
| | | できない | 120 (6.8) | 20 (3.4) | 4 (36.4) | 2 (5.1) | 3 (14.3) | 149 (6.1) | | |
| | | 未回答 | 12 (0.7) | 6 (1.0) | | | 1 (4.8) | 19 (8) | | |
| | 傷病の基本的処置として、デ ブリードマンができる | 確実にできる、自信がある | 326 (18.5) | 126 (21.1) | | 4 (10.3) | 1 (4.8) | 457 (18.8) | | |
| | | だいたいできる、たぶんでき る | 487 (27.6) | 206 (34.6) | | 17 (43.6) | 6 (28.6) | 716 (29.5) | | |
| | | あまり自信がない、ひとり は不安である | 482 (27.4) | 173 (29.0) | 4 (36.4) | 12 (30.8) | 4 (19.0) | 675 (27.8) | | |
| | | できない | 458 (26.0) | 88 (14.8) | 7 (63.6) | 6 (15.4) | 9 (42.9) | 568 (23.4) | | |
| | | 未回答 | 9 (0.5) | 3 (0.5) | | | 1 (4.8) | 13 (5) | | |