

2006.

Kinoshita, A., Wanibuchi, H., Wei, M. and Fukushima, S.: Hormesis in carcinogenicity of non-genotoxic carcinogens. *J. Toxicol. Pathol.*, 19, 111-122, 2006.

Romanenko, A. M., Morimura, K., Kinoshita, A., Wanibuchi, H., Takahashi, S., Zamarin, W. K., Vinnichenko, W. K., Vozianov, A. F. and Fukushima S.: Upregulation of fibroblast growth factor receptor 3 and epidermal growth factor receptors, in association with Raf-1, in urothelial dysplasia and carcinoma in situ after the Chernobyl accident. *Cancer Sci.* 97, 1168-1174, 2006.

2. 学会発表

鰐淵英機：天然添加物の発がん性等に関する研究。平成 17 年度厚生労働科学研究（食品の安全性高度化推進研究事業）「天然添加物の発がん性等に関する研究」鰐淵班中間・事後評価委員会におけるヒアリング，1月26日，東京，2005

鰐淵英機：多段階発がんに及ぼす環境化学物質の影響-MeIQx 誘発肝発がんにおける遺伝子発現の解析-。平成 17 年度厚生労働省がん研究助成金「個体レベルにおける多段階発がんに関する研究」牛島第 1 回班会議，10月21日，東京，2005

福島昭治、鰐淵英機、魏 民：胎児・幼児期曝露による。平成 16 年度厚生労働科学研究費補助金（化学物質リスク研究事業）「中枢神経系に影響を与える内分泌かく乱化学物質の順位付けとヒトでのリスク予測と回避法の研究」舩江班第 1 回班会議，2月14日，大阪市，2005

鰐淵英機、木下アンナ、魏 民、福島昭治：有機砒素化合物、MMA、DMA、TMAO の発がん機序解析。シンポジウム講演，第 12 回ヒ素シンポジウム，11月5-6日，岩手，2005（講演要旨集 シンポジウム 2A-09, p. 90）

木下アンナ、鰐淵英機、魏 民、野田哲生、西村暹、福島昭治：Mmh/OGG1 ミュータントマウスにおける Dimethylarsinic acid の発がん性。第 21 回日本毒性病理学会，1月20-21日，東京，2005（第 21 回日本毒性病理学会講演要旨集 P-96, p. 99）

魏 民、鰐淵英機、串田昌彦、カンジンソック、プアタナチョックチャイラウィワン、福島昭治：プロポリスの Diethylnitrosamine 誘発ラット肝発癌に対する修飾作用。第 94 回日本病理学会，4月14-16日，横浜，2005（日本病理学会誌第 94 巻第 1 号 P3-I-46, p. 346）

山口貴嗣、鰐淵英機、魏 民、宮地夏子、カンジンソック、串田昌彦、福島昭治：臭素酸カリウムの低用量域における腎毒性-Big Blue rat での検討-。第 94 回日本病理学会，4月14-16日，横浜，2005（日本病理学会誌第 94 巻第 1 号 P2-I-109, p. 305）

鰐淵英機：分子生物学的手法を用いた非遺伝毒性発癌物質の発癌機序解明。シンポジウム講演，第 28 回日本学術会議トキシコロジー研究連絡委員会シンポジウム，9月6日，東京，2005

Fukushima, S., Wei, M., Kang, J.S.: The effect of phthalates on male reproductive toxicity associated with thioacetamide-induced liver damage. 平成 16 年度厚生労働科学研究費補助金（化学物質リスク研究事業）「フタル酸/アジピン酸エステル類の生殖器障害に関する調査研究-発達期ないし有病時曝露による影響評価-」渋谷班第 1 回班会議，3月2日，東京，2005

鰐淵英機、木下アンナ、魏 民、福島昭治：発がん性評価における前がん病変の意義。ワークショップ講演，第 94 回日本病理学会，4月14-16日，横浜，2005（日本病理学会誌第 94 巻第 1 号 WS-10-3, p. 172）

Wanibuchi, H., Wei, M., Kinoshita, A. and Fukushima, S.: Carcinogenicity of Dimethylarsenic Acid and its Underlying Mechanisms. APOCP General Assembly Satellite Meeting 'Modeling for Detection of Environmental Carcinogens and Modifying Agents in the Asian Pacific', November. 6-7, Chiang Mai Orchid Hotel, Thailand, 2006.

魏 民、鰐淵英機、木下アンナ、土井賢一郎、柚木孝之、大森雅子、福島昭治：ジメチルアルシン酸による誘発ラット膀胱がんの遺伝子発現解析。第 22 回日本病理学会，4 月 30 日-5 月 2 日，東京，2006（日本病理学会誌第 95 巻第 1 号 P1-H-3，p. 247）

土井賢一郎、魏 民、柚木孝之、萩原淳司、鰐淵英機、福島昭治：AOM-PhIP 誘発ラット大腸腺癌組織における、3 次元マイクロアレイ法を用いた遺伝子発現解析。第 95 回日本病理学会総会，4 月 30 日-5 月 2 日，東京，2006（日本病理学会誌第 95 巻第 1 号 P2-I-135，p. 339）

鰐淵英機：ヒ素による発がん発がん機序。平成 17 年度お茶の水女子大学「化学・生物総合管理の再教育講座」化学物質総合評価学持論 1，6 月 21 日，東京，2006

鰐淵英機：ラット肝発がんにおける誘発した GST-P 陽性細胞巢のプロテオーム解析。第 33 回日本トキシコロジー学会学術年会，7 月 3-5 日，名古屋，2006（第 33 回日本トキシコロジー学会学術年会プログラムランチョン 1，p. 72）

木下アンナ、魏 民、福島昭治、鰐淵英機：ラット肝中期発癌モデル（伊東法）におけるバレリアンによる肝発癌抑制作用の検討。第 13 回日本がん予防学会，7 月 6-7 日，京都，2006（第 13 回日本がん予防学会プログラム・抄録集 p-30，p. 37）

柚木孝之、魏 民、木下アンナ、土井賢一郎、大森雅子、福島昭治、鰐淵英機：イソロイシン、ロイシンの膀胱発癌修飾作用の検討。第 65 回日本癌学会学術総会，9 月 28-30 日，横浜，2006（第 65 回日本癌学会学術総会プログラム P-001，p. 66）

大森雅子、魏 民、木下アンナ、柚木孝之、土井賢一郎、加藤あゆみ、増村健一、能美健彦、福島昭治、鰐淵英機：gpt delta ラット肝における 1,4-ジオキサンの発がん性および変異原性。第 65 回

日本癌学会学術総会，9 月 28-30 日，横浜，2006（第 65 回日本癌学会学術総会プログラム P-006，p. 66）

木下アンナ、魏 民、土井賢一郎、柚木孝之、福島昭治、鰐淵英機：ラット肝発がんにおいて誘発した GST-P 陽性細胞巢のプロテオーム解析。第 65 回日本癌学会学術総会，9 月 28-30 日，横浜，2006（第 65 回日本癌学会学術総会プログラム P-044，p. 67）

加藤あゆみ、木下アンナ、魏 民、土井賢一郎、柚木孝之、大森雅子、福島昭治、鰐淵英機：マウス肝発がんにおけるバイオマーカーの検索。第 65 回日本癌学会学術総会，9 月 28-30 日，横浜，2006（第 65 回日本癌学会学術総会プログラム P-045，p. 68）

土井賢一郎、田中雅彰、魏 民、木下アンナ、柚木孝之、渡辺恭良、福島昭治、鰐淵英機：ラット水浸疲労モデルの病理学的解析：疲労が生体に及ぼす影響、ならびに胃発がんを促進する可能性について。第 65 回日本癌学会学術総会，9 月 28-30 日，横浜，2006（第 65 回日本癌学会学術総会プログラム 0-396，p. 105）

魏 民、柚木孝之、木下アンナ、土井賢一郎、福島昭治、鰐淵英機：BBN 誘発ラット膀胱発癌におけるジメチルアルシン酸による発癌促進作用に対するアスコルビン酸の修飾効果。第 65 回日本癌学会学術総会，9 月 28-30 日，横浜，2006（第 65 回日本癌学会学術総会プログラム 0-774，p. 176）

<その他>

H. 知的所有権の取得状況

特許取得

なし

実用新案登録

なし

その他

なし

Table 1. Summary of body weight data (g, Mean \pm S.D.)
Summed data from week 0 to week 104

| SEX | GROUP | TEST MATERIAL | DOSE (%) | NO. OF ANIMALS | WEEK 0 | WEEK 1 | WEEK 2 |
|--------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Male | 1 | Propolis | 0 | 50 | 148.7 \pm 8.1 | 148.6 \pm 7.8 | 177.6 \pm 8.5 |
| Male | 2 | Propolis | 0.5 | 50 | 148.4 \pm 8.1 | 148.4 \pm 8.1 | 177.8 \pm 10.2 |
| Male | 3 | Propolis | 2.5 | 50 | 148.8 \pm 8.3 | 148.8 \pm 8.3 | 174.1 \pm 8.9 |
| Female | 4 | Propolis | 0 | 50 | 128.2 \pm 7.2 | 128.2 \pm 7.2 | 142.3 \pm 8.5 |
| Female | 5 | Propolis | 0.5 | 50 | 129.0 \pm 6.2 | 129.0 \pm 6.3 | 141.6 \pm 6.9 |
| Female | 6 | Propolis | 2.5 | 50 | 127.4 \pm 5.8 | 128.0 \pm 6.8 | 138.0 \pm 6.0 |

Table 1. Summary of body weight data (g, Mean \pm S.D.)
Summed data from week 0 to week 104

| SEX | GROUP | TEST MATERIAL | DOSE (%) | WEEK 3 | WEEK 4 | WEEK 5 | WEEK 6 |
|--------|-------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Male | 1 | Propolis | 0 | 226.2 \pm 11.4 | 266.1 \pm 15.4 | 292.1 \pm 16.9 | 321.8 \pm 20.1 |
| Male | 2 | Propolis | 0.5 | 225.4 \pm 14.2 | 264.7 \pm 18.3 | 291.3 \pm 22.0 | 319.6 \pm 25.6 |
| Male | 3 | Propolis | 2.5 | 221.4 \pm 13.0 | 257.8 \pm 17.0 | 281.0 \pm 18.7 | 308.3 \pm 22.9 |
| Female | 4 | Propolis | 0 | 163.8 \pm 10.5 | 178.4 \pm 11.8 | 189.3 \pm 13.3 | 201.1 \pm 15.4 |
| Female | 5 | Propolis | 0.5 | 163.3 \pm 7.5 | 179.1 \pm 9.0 | 190.8 \pm 8.9 | 202.4 \pm 10.5 |
| Female | 6 | Propolis | 2.5 | 158.3 \pm 7.2 | 173.3 \pm 9.5 | 182.3 \pm 10.4 | 190.5 \pm 12.3 |

Table 1. Summary of body weight data (g, Mean \pm S.D.)
Summed data from week 0 to week 104

| SEX | GROUP | TEST MATERIAL | DOSE (%) | WEEK 7 | WEEK 8 | WEEK 9 | WEEK 10 |
|--------|-------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Male | 1 | Propolis | 0 | 339.0 \pm 22.0 | 354.4 \pm 22.6 | 374.7 \pm 26.5 | 391.0 \pm 28.4 |
| Male | 2 | Propolis | 0.5 | 336.3 \pm 28.1 | 351.0 \pm 28.8 | 369.4 \pm 32.0 | 385.2 \pm 34.8 |
| Male | 3 | Propolis | 2.5 | 326.9 \pm 27.9 | 336.6 \pm 28.6 | 355.7 \pm 33.6 | 369.4 \pm 35.3 |
| Female | 4 | Propolis | 0 | 208.0 \pm 15.6 | 214.4 \pm 17.1 | 220.4 \pm 16.5 | 226.5 \pm 16.4 |
| Female | 5 | Propolis | 0.5 | 208.2 \pm 10.2 | 217.1 \pm 11.5 | 222.5 \pm 11.2 | 228.4 \pm 12.1 |
| Female | 6 | Propolis | 2.5 | 196.1 \pm 12.6 | 203.1 \pm 13.9 | 206.5 \pm 14.1 | 211.0 \pm 14.9 |

Table 1. Summary of body weight data (g, Mean \pm S.D.)
Summed data from week 0 to week 104

| SEX | GROUP | TEST MATERIAL | DOSE (%) | WEEK 11 | WEEK 12 | WEEK 13 | WEEK 17 |
|--------|-------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Male | 1 | Propolis | 0 | 402.9 \pm 29.2 | 410.7 \pm 31.6 | 419.2 \pm 31.5 | 447.3 \pm 35.9 |
| Male | 2 | Propolis | 0.5 | 395.7 \pm 35.4 | 404.4 \pm 36.5 | 411.7 \pm 37.5 | 438.0 \pm 40.0 |
| Male | 3 | Propolis | 2.5 | 378.5 \pm 36.4 | 386.5 \pm 38.1 | 394.1 \pm 40.2 | 418.2 \pm 45.1 |
| Female | 4 | Propolis | 0 | 229.9 \pm 17.1 | 231.8 \pm 17.6 | 236.6 \pm 18.1 | 245.3 \pm 19.5 |
| Female | 5 | Propolis | 0.5 | 231.6 \pm 12.2 | 233.9 \pm 13.1 | 237.5 \pm 12.9 | 246.0 \pm 14.3 |
| Female | 6 | Propolis | 2.5 | 214.2 \pm 15.0 | 215.5 \pm 15.2 | 219.1 \pm 15.8 | 225.8 \pm 16.7 |

Table 1. Summary of body weight data (g, Mean \pm S.D.)
Summed data from week 0 to week 104

| SEX | GROUP | TEST MATERIAL | DOSE (%) | WEEK 21 | WEEK 25 | WEEK 29 | WEEK 33 |
|--------|-------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Male | 1 | Propolis | 0 | 465.1 \pm 38.8 | 489.6 \pm 41.9 | 499.1 \pm 42.4 | 497.1 \pm 43.2 |
| Male | 2 | Propolis | 0.5 | 455.8 \pm 41.0 | 475.8 \pm 42.2 | 485.3 \pm 43.4 | 479.0 \pm 41.8 |
| Male | 3 | Propolis | 2.5 | 435.9 \pm 48.1 | 455.2 \pm 50.8 | 458.3 \pm 55.9 | 463.2 \pm 57.7 |
| Female | 4 | Propolis | 0 | 252.7 \pm 21.6 | 262.8 \pm 24.0 | 266.6 \pm 24.3 | 271.3 \pm 23.6 |
| Female | 5 | Propolis | 0.5 | 251.8 \pm 15.5 | 260.0 \pm 16.4 | 263.9 \pm 18.5 | 270.7 \pm 21.0 |
| Female | 6 | Propolis | 2.5 | 228.8 \pm 16.9 | 236.7 \pm 18.9 | 240.7 \pm 18.3 | 243.7 \pm 19.3 |

Table 1. Summary of body weight data (g, Mean \pm S.D.)
Summed data from week 0 to week 104

| SEX | GROUP | TEST MATERIAL | DOSE (%) | WEEK 37 | WEEK 41 | WEEK 45 | WEEK 49 |
|--------|-------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Male | 1 | Propolis | 0 | 501.8 \pm 47.4 | 509.1 \pm 53.9 | 519.1 \pm 54.8 | 531.5 \pm 55.1 |
| Male | 2 | Propolis | 0.5 | 484.2 \pm 46.5 | 502.2 \pm 48.2 | 488.7 \pm 65.9 | 517.0 \pm 52.1 |
| Male | 3 | Propolis | 2.5 | 482.5 \pm 56.1 | 487.0 \pm 58.9 | 495.9 \pm 62.4 | 504.4 \pm 65.1 |
| Female | 4 | Propolis | 0 | 279.0 \pm 28.8 | 288.9 \pm 34.7 | 300.5 \pm 39.4 | 310.3 \pm 42.7 |
| Female | 5 | Propolis | 0.5 | 277.4 \pm 22.5 | 288.4 \pm 27.8 | 295.8 \pm 34.9 | 304.7 \pm 40.5 |
| Female | 6 | Propolis | 2.5 | 242.5 \pm 24.2 | 250.7 \pm 21.4 | 256.6 \pm 24.6 | 263.2 \pm 29.4 |

Table 1. Summary of body weight data (g, Mean \pm S.D.)
Summed data from week 0 to week 104

| SEX | GROUP | TEST MATERIAL | DOSE (%) | WEEK 53 | WEEK 57 | WEEK 61 | WEEK 65 |
|--------|-------|---------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Male | 1 | Propolis | 0 | 537.9 \pm 61.5 (49) | 540.2 \pm 71.8 (49) | 553.6 \pm 80.4 (49) | 571.4 \pm 58.7 (48) |
| Male | 2 | Propolis | 0.5 | 530.1 \pm 49.9 (50) | 535.2 \pm 48.4 (49) | 551.7 \pm 52.9 (49) | 562.6 \pm 55.0 (48) |
| Male | 3 | Propolis | 2.5 | 512.3 \pm 69.5 (50) | 516.6 \pm 73.4 (50) | 527.1 \pm 72.6 (49) | 535.6 \pm 73.8 (49) |
| Female | 4 | Propolis | 0 | 322.4 \pm 46.4 (50) | 328.4 \pm 50.4 (50) | 338.6 \pm 51.7 (49) | 349.2 \pm 53.8 (49) |
| Female | 5 | Propolis | 0.5 | 313.8 \pm 47.2 (50) | 324.4 \pm 50.7 (50) | 339.7 \pm 53.1 (50) | 350.8 \pm 57.5 (50) |
| Female | 6 | Propolis | 2.5 | 269.0 \pm 31.0 (50) | 273.3 \pm 32.9 (50) | 280.7 \pm 36.7 (50) | 288.4 \pm 37.2 (50) |

Table 1. Summary of body weight data (g, Mean \pm S.D.)
Summed data from week 0 to week 104

| SEX | GROUP | TEST MATERIAL | DOSE (%) | WEEK 70 | WEEK 74 | WEEK 77 | WEEK 82 |
|--------|-------|---------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Male | 1 | Propolis | 0 | 575.3 \pm 70.2 (47) | 584.1 \pm 63.1 (45) | 584.4 \pm 69.0 (45) | 600.7 \pm 66.9 (43) |
| Male | 2 | Propolis | 0.5 | 572.1 \pm 54.5 (48) | 576.2 \pm 55.4 (48) | 582.2 \pm 55.1 (48) | 592.5 \pm 57.8 (47) |
| Male | 3 | Propolis | 2.5 | 539.4 \pm 74.0 (48) | 535.5 \pm 86.4 (48) | 540.1 \pm 92.4 (47) | 558.2 \pm 86.1 (44) |
| Female | 4 | Propolis | 0 | 362.9 \pm 59.7 (48) | 370.2 \pm 62.2 (48) | 381.6 \pm 61.9 (45) | 387.0 \pm 69.8 (43) |
| Female | 5 | Propolis | 0.5 | 364.0 \pm 56.3 (50) | 370.6 \pm 58.4 (50) | 375.2 \pm 59.4 (49) | 385.2 \pm 64.4 (48) |
| Female | 6 | Propolis | 2.5 | 298.2 \pm 43.9 (50) | 303.8 \pm 46.6 (50) | 307.2 \pm 49.4 (50) | 315.8 \pm 50.9 (50) |

Table 1. Summary of body weight data (g, Mean \pm S.D.)
Summed data from week 0 to week 104

| SEX | GROUP | TEST MATERIAL | DOSE (%) | WEEK 85 | WEEK 89 | WEEK 93 | WEEK 97 |
|--------|-------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Male | 1 | Propolis | 0 | 603.4 \pm 71.1 | 615.0 \pm 69.0 | 606.9 \pm 67.2 | 599.4 \pm 68.9 |
| Male | 2 | Propolis | 0.5 | 594.0 \pm 64.2 | 595.1 \pm 66.8 | 604.0 \pm 61.6 | 600.3 \pm 65.7 |
| Male | 3 | Propolis | 2.5 | 560.9 \pm 86.0 | 569.6 \pm 84.9 | 562.0 \pm 88.2 | 569.7 \pm 89.2 |
| Female | 4 | Propolis | 0 | 397.2 \pm 70.4 | 401.0 \pm 68.9 | 402.0 \pm 77.7 | 402.3 \pm 88.9 |
| Female | 5 | Propolis | 0.5 | 388.7 \pm 72.4 | 390.1 \pm 79.4 | 402.0 \pm 69.1 | 398.7 \pm 75.1 |
| Female | 6 | Propolis | 2.5 | 317.5 \pm 52.2 | 325.3 \pm 60.6 | 321.9 \pm 57.3 | 324.7 \pm 59.1 |

Table 1. Summary of body weight data (g, Mean \pm S.D.)
Summed data from week 0 to week 104

| SEX | GROUP | TEST MATERIAL | DOSE (%) | WEEK 101 | WEEK 104 |
|--------|-------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|
| Male | 1 | Propolis | 0 | 582.2 \pm 83.9 (42) | 578.3 \pm 90.2 (40) |
| Male | 2 | Propolis | 0.5 | 598.0 \pm 68.8 (46) | 597.3 \pm 67.3 (46) |
| Male | 3 | Propolis | 2.5 | 568.9 \pm 91.6 (42) | 566.3 \pm 91.1 (41) |
| Female | 4 | Propolis | 0 | 410.3 \pm 84.3 (33) | 409.5 \pm 77.3 (32) |
| Female | 5 | Propolis | 0.5 | 401.4 \pm 77.0 (39) | 402.9 \pm 79.0 (37) |
| Female | 6 | Propolis | 2.5 | 322.8 \pm 65.0 (42) | 325.0 \pm 69.4 ^a (41) |

^aSignificant at $P < 0.0001$ v.s. G4 (female control group)

Table 2. Summary of food consumption data (g/animal/day, mean)
 Summed data from week 1 to week 10

| SEX | GROUP | TEST MATERIAL | DOSE(%) | NO. OF ANIMALS | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | WEEK 5 | WEEK 6 | WEEK 7 | WEEK 8 | WEEK 9 | WEEK 10 | WEEK 11 |
|--------|-------|---------------|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Male | 1 | Propolis | 0 | 50 | 31.10 | 20.87 | 21.45 | 21.45 | 22.72 | 23.26 | 22.48 | 24.53 | 20.61 | 21.05 | 20.46 |
| Male | 2 | Propolis | 0.5 | 50 | 31.44 | 18.34 | 21.07 | 21.84 | 21.84 | 22.88 | 21.12 | 23.62 | 21.09 | 21.16 | 20.94 |
| Male | 3 | Propolis | 2.5 | 50 | 26.62 | 18.79 | 21.24 | 21.24 | 24.04 | 24.84 | 21.95 | 24.86 | 21.15 | 21.63 | 20.81 |
| Female | 4 | Propolis | 0 | 50 | 27.92 | 15.88 | 23.55 | 23.66 | 23.66 | 24.48 | 23.42 | 23.37 | 20.31 | 22.05 | 24.74 |
| Female | 5 | Propolis | 0.5 | 50 | 24.99 | 14.12 | 15.78 | 15.78 | 17.97 | 17.39 | 16.96 | 18.98 | 15.95 | 17.21 | 18.06 |
| Female | 6 | Propolis | 2.5 | 50 | 12.91 | 13.61 | 14.87 | 15.27 | 15.27 | 15.78 | 14.82 | 15.08 | 14.14 | 14.74 | 14.12 |

Table 2. Summary of food consumption data (g/animal/day, mean)
 Summed data from week 1 to week 101

| SEX | GROUP | TEST MATERIAL | DOSE (%) | NO. OF ANIMALS | WEEK 12 | WEEK 13 | WEEK 17 | WEEK 21 | WEEK 25 | WEEK 29 | WEEK 33 | WEEK 37 | WEEK 41 | WEEK 45 |
|--------|-------|---------------|----------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Male | 1 | Propolis | 0 | 50 | 22.22 | 20.46 | 21.17 | 21.09 | 22.12 | 21.57 | 22.59 | 23.86 | 25.50 | 24.11 |
| Male | 2 | Propolis | 0.5 | 50 | 21.18 | 20.64 | 20.82 | 19.18 | 22.28 | 20.21 | 21.71 | 25.11 | 22.37 | 24.98 |
| Male | 3 | Propolis | 2.5 | 50 | 21.38 | 21.19 | 23.83 | 20.99 | 23.55 | 22.76 | 20.98 | 27.09 | 26.93 | 27.24 |
| Female | 4 | Propolis | 0 | 50 | 24.76 | 19.88 | 22.32 | 17.73 | 18.75 | 12.65 | 14.65 | 15.51 | 16.58 | 16.25 |
| Female | 5 | Propolis | 0.5 | 50 | 15.05 | 15.91 | 16.04 | 15.72 | 21.63 | 16.08 | 16.44 | 20.68 | 22.49 | 19.37 |
| Female | 6 | Propolis | 2.5 | 50 | 14.18 | 15.64 | 13.98 | 14.87 | 16.78 | 14.14 | 15.98 | 17.63 | 15.03 | 17.01 |

Table 2. Summary of food consumption data (g/animal/day, mean)
Summed data from week 1 to week 101

| SEX | GROUP | TEST MATERIAL | DOSE (%) | NO. OF ANIMALS | WEEK 49 | WEEK 53 | WEEK 57 | WEEK 61 | WEEK 65 | WEEK 70 | WEEK 74 | WEEK 77 | WEEK 82 | WEEK 85 |
|--------|-------|---------------|----------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Male | 1 | Propolis | 0 | 50 | 23.97 | 23.59 | 25.92 | 26.98 | 26.59 | 25.40 | 23.82 | 24.85 | 25.29 | 27.49 |
| Male | 2 | Propolis | 0.5 | 50 | 23.70 | 23.98 | 26.58 | 24.24 | 26.33 | 25.63 | 24.48 | 25.19 | 23.98 | 25.14 |
| Male | 3 | Propolis | 2.5 | 50 | 22.86 | 24.65 | 25.07 | 24.34 | 25.46 | 24.32 | 25.29 | 26.35 | 23.34 | 29.16 |
| Female | 4 | Propolis | 0 | 50 | 17.76 | 15.92 | 14.95 | 17.22 | 14.77 | 16.20 | 15.99 | 14.74 | 13.52 | 15.16 |
| Female | 5 | Propolis | 0.5 | 50 | 22.32 | 22.19 | 18.62 | 16.32 | 21.02 | 17.26 | 19.00 | 18.32 | 17.60 | 21.01 |
| Female | 6 | Propolis | 2.5 | 50 | 18.80 | 18.94 | 14.78 | 15.66 | 14.41 | 13.77 | 18.33 | 19.95 | 15.16 | 19.65 |

Table 2. Summary of food consumption data (g/animal/day, mean)
Summed data from week 1 to week 101

| SEX | GROUP | TEST MATERIAL | DOSE (%) | NO. OF ANIMALS | WEEK 89 | WEEK 93 | WEEK 97 | WEEK 101 |
|--------|-------|---------------|----------|----------------|---------|---------|---------|----------|
| Male | 1 | Propolis | 0 | 50 | 25.42 | 23.90 | 24.61 | 23.18 |
| Male | 2 | Propolis | 0.5 | 50 | 25.11 | 22.85 | 23.71 | 23.64 |
| Male | 3 | Propolis | 2.5 | 50 | 24.70 | 26.01 | 28.46 | 28.35 |
| Female | 4 | Propolis | 0 | 50 | 14.49 | 13.45 | 12.47 | 14.31 |
| Female | 5 | Propolis | 0.5 | 50 | 22.61 | 17.77 | 19.35 | 17.34 |
| Female | 6 | Propolis | 2.5 | 50 | 16.54 | 16.14 | 16.36 | 20.61 |

Table 3. Summary of water consumption data (ml/animal/day, mean)
Summed data from week 1 to week 101

| SEX | GROUP | TEST MATERIAL | DOSE (%) | NO. OF ANIMALS | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | WEEK 5 | WEEK 6 | WEEK 7 | WEEK 8 | WEEK 9 |
|--------|-------|---------------|----------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Male | 1 | Propolis | 0 | 50 | 49.82 | 28.01 | 31.92 | 42.11 | 32.43 | 34.86 | 34.81 | 34.76 | 32.11 |
| Male | 2 | Propolis | 0.5 | 50 | 48.18 | 27.38 | 30.22 | 47.14 | 31.43 | 32.78 | 32.79 | 32.65 | 29.78 |
| Male | 3 | Propolis | 2.5 | 50 | 49.76 | 27.64 | 31.54 | 45.46 | 31.58 | 33.21 | 32.99 | 32.80 | 29.62 |
| Female | 4 | Propolis | 0 | 50 | 43.95 | 23.02 | 24.46 | 44.25 | 25.11 | 26.29 | 26.16 | 26.05 | 23.67 |
| Female | 5 | Propolis | 0.5 | 50 | 44.41 | 22.16 | 24.94 | 39.50 | 24.42 | 26.24 | 26.75 | 26.55 | 24.49 |
| Female | 6 | Propolis | 2.5 | 50 | 36.45 | 22.66 | 23.32 | 41.33 | 21.82 | 24.27 | 24.55 | 23.26 | 21.14 |

Table 3. Summary of water consumption data (ml/animal/day, mean)
Summed data from week 1 to week 101

| SEX | GROUP | TEST MATERIAL | DOSE (%) | NO. OF ANIMALS | WEEK 10 | WEEK 11 | WEEK 12 | WEEK 13 | WEEK 17 | WEEK 21 | WEEK 25 | WEEK 29 | WEEK 33 | WEEK 37 |
|--------|-------|---------------|----------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Male | 1 | Propolis | 0 | 50 | 32.34 | 31.81 | 33.28 | 31.75 | 33.46 | 29.98 | 30.83 | 34.01 | 35.07 | 34.19 |
| Male | 2 | Propolis | 0.5 | 50 | 30.88 | 29.79 | 30.96 | 29.96 | 31.12 | 28.36 | 30.69 | 31.43 | 33.50 | 32.98 |
| Male | 3 | Propolis | 2.5 | 50 | 31.22 | 30.51 | 31.32 | 30.15 | 31.66 | 28.33 | 31.58 | 33.21 | 32.75 | 32.44 |
| Female | 4 | Propolis | 0 | 50 | 24.41 | 23.33 | 25.05 | 23.55 | 25.49 | 23.57 | 24.19 | 25.39 | 26.36 | 25.92 |
| Female | 5 | Propolis | 0.5 | 50 | 25.46 | 24.58 | 24.80 | 24.31 | 26.31 | 22.95 | 27.21 | 28.21 | 26.74 | 25.51 |
| Female | 6 | Propolis | 2.5 | 50 | 22.64 | 22.35 | 23.71 | 21.99 | 24.52 | 21.92 | 24.12 | 24.79 | 25.59 | 28.91 |

Table 3. Summary of water consumption data (ml/animal/day, mean)
Summed data from week 1 to week 101

| SEX | GROUP | TEST MATERIAL | DOSE (%) | NO. OF ANIMALS | WEEK 41 | WEEK 45 | WEEK 49 | WEEK 53 | WEEK 57 | WEEK 61 | WEEK 65 | WEEK 70 | WEEK 74 | WEEK 77 |
|--------|-------|---------------|----------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Male | 1 | Propolis | 0 | 50 | 35.01 | 32.81 | 32.09 | 31.61 | 30.09 | 30.35 | 29.11 | 29.16 | 27.46 | 27.95 |
| Male | 2 | Propolis | 0.5 | 50 | 31.68 | 31.44 | 30.55 | 28.84 | 26.79 | 26.76 | 26.65 | 27.01 | 26.33 | 25.98 |
| Male | 3 | Propolis | 2.5 | 50 | 32.75 | 31.21 | 29.03 | 29.22 | 26.44 | 28.95 | 27.72 | 27.38 | 27.01 | 26.94 |
| Female | 4 | Propolis | 0 | 50 | 27.28 | 26.38 | 26.47 | 26.30 | 23.52 | 25.65 | 25.14 | 27.46 | 25.82 | 23.79 |
| Female | 5 | Propolis | 0.5 | 50 | 29.03 | 27.26 | 28.12 | 27.29 | 26.19 | 26.84 | 27.19 | 28.49 | 26.69 | 26.59 |
| Female | 6 | Propolis | 2.5 | 50 | 26.50 | 25.69 | 26.18 | 25.96 | 24.32 | 25.21 | 24.31 | 26.92 | 25.39 | 25.82 |

Table 3. Summary of water consumption data (ml/animal/day, mean)
Summed data from week 1 to week 101

| SEX | GROUP | TEST MATERIAL | DOSE (%) | NO. OF ANIMALS | WEEK 82 | WEEK 85 | WEEK 89 | WEEK 93 | WEEK 97 | WEEK 101 |
|--------|-------|---------------|----------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Male | 1 | Propolis | 0 | 50 | 26.21 | 29.61 | 28.94 | 27.79 | 27.89 | 27.62 |
| Male | 2 | Propolis | 0.5 | 50 | 24.45 | 26.86 | 26.92 | 27.04 | 27.22 | 26.56 |
| Male | 3 | Propolis | 2.5 | 50 | 23.59 | 26.46 | 25.24 | 25.66 | 24.24 | 25.32 |
| Female | 4 | Propolis | 0 | 50 | 22.21 | 24.50 | 23.65 | 22.75 | 20.61 | 20.16 |
| Female | 5 | Propolis | 0.5 | 50 | 27.22 | 28.52 | 29.35 | 27.56 | 24.26 | 21.31 |
| Female | 6 | Propolis | 2.5 | 50 | 25.49 | 26.89 | 26.98 | 26.41 | 24.29 | 23.85 |