

引用文献

- 1) 福井 進、和田 清、伊豫雅臣：薬物依存の世帯調査。平成4年度厚生科学研究費補助金（麻薬等総合対策研究事業）「薬物依存の社会的、精神医学的特徴に関する研究（主任研究者：福井 進）」平成4年度研究報告書、pp. 9-23, 1993.
- 2) 福井 進、和田 清、伊豫雅臣：薬物依存の世帯調査。平成5年度厚生科学研究費補助金（麻薬等総合対策研究事業）「薬物依存の社会的、精神医学的特徴に関する研究（主任研究者：福井 進）」平成5年度研究報告書、pp. 5-26, 1994.
- 3) 福井 進、和田 清、伊豫雅臣：薬物依存の世帯調査。平成6年度厚生科学研究費補助金（麻薬等総合対策研究事業）「薬物依存の社会的、精神医学的特徴に関する研究（主任研究者：福井 進）」平成6年度研究報告書、pp. 5-34, 1995.
- 4) 福井 進、和田 清、伊豫雅臣、浦田重治郎、尾崎 茂：薬物乱用・依存の世帯調査。平成7年度厚生科学研究費補助金（麻薬等対策総合研究事業）「薬物依存・中毒者の疫学調査及び精神医療サービスに関する研究（主任研究者：寺元 弘）」平成7年度研究報告書第1分冊、pp. 5-35, 1996.
- 5) 福井 進、和田 清、菊池周一、尾崎 茂、浦田重治郎：薬物乱用・依存の世帯調査。平成9年度厚生科学研究費補助金（麻薬等対策総合研究事業）「薬物依存・中毒者の疫学調査及び精神医療サービスに関する研究（主任研究者：寺元 弘）」平成9年度研究報告書第1分冊、pp. 7-48, 1998.
- 6) 和田 清、勝野眞吾、尾崎米厚、中野良吾：中学生における「シンナー遊び」・喫煙・飲酒についての調査研究。平成8年度厚生科学研究費補助金（麻薬等対策総合研究事業）研究報告書「薬物依存・中毒者の疫学調査及び精神医療サービスに関する研究班」（主任研究者：寺元 弘）第1分冊薬物乱用・依存の多面的疫学調査研究（2）。pp. 21-60. 1996.
- 7) Wada, K., Price, R.K., Fukui, S.: Reflecting Adult Drinking Culture: Prevalence of Alcohol Use and Drinking Situations among Japanese Junior High School Students in Japan. *Journal of Studies on Alcohol* 59: 381-386, 1998.
- 8) 和田 清、中野良吾、尾崎米厚、勝野眞吾：薬物乱用に関する全国中学生意識・実態調査。平成10年度厚生科学研究費補助金（医薬安全総合研究事業）「薬物乱用・依存等の疫学的研究及び中毒性精神病患者等に対する適切な医療のあり方についての研究（主任研究者：和田 清）研究報告書。pp. 19-83, 1999.
- 9) 和田 清：薬物依存の最近の傾向と対策。日本医事新報 第3920号：25-32, 1999.
- 10) 和田 清：中学生における飲酒—飲酒文化の反映—。日本アルコール・薬物医学会雑誌 34 :36-48, 1999.
- 11) 和田 清、菊池安希子、尾崎 茂、菊池周一：薬物使用に関する全国住民調査。平成11年度厚生科学研究費補助金（医薬安全総合研究事業）「薬物乱用・依存等の疫学的研究及び中毒性精神病患者等に対する適切な医療のあり方についての研究（主任研究者：和田 清）研究報告書。pp. 17-70, 2000.3.
- 12) Wada K.: Lifetime Prevalence of Alcohol Drinking, Cigarette Smoking, and Solvent Inhalation among Junior High School Students in Japan: Tradition and Urbanization. *Jpn. J. Alcohol & Drug Dependence* 36 (2): 124-141, 2001.
- 13) 和田 清、菊池安希子、尾崎米厚、勝野眞吾：薬物乱用に関する全国中学生意識・実態調査。平成12年度厚生科学研究費補助金（医薬安全総合研究事業）「薬物乱用・依存等の疫学的研究及び中毒性精神病患者等に対する適切な医療のあり方についての研究（主任研究者：和田 清）研究報告書。pp. 15-76, 2001.
- 14) 和田 清：薬物乱用の現状と歴史。神経精神薬理 19: 913-923, 1997.
- 15) 和田 清、菊池安希子、尾崎 茂：薬物使用に関する全国住民調査。平成13年度厚生科学研究費補助金（医薬安全総合研究事業）「薬物乱用・依存等の実態把握に関する研究及び社会経済的損失に関する研究（主任研究者：和田 清）研究報告書。pp. 15-77, 2002.3.
- 16) 和田 清、畢 穎、鈴木紀美子、尾崎米厚、勝野眞吾：薬物乱用に関する全国中学生意識・実態調査（2002年）。平成14年度厚生労働

- 科学研究費補助金(医薬安全総合研究事業)「薬物乱用・依存等の実態把握に関する研究及び社会経済的損失に関する研究(主任研究者:和田 清) 研究報告書. pp.19-86, 2003.
- 17) SAMHSA: Results from the National Survey on Drug Use and Health (SAMHSA)
- 18) EMCDDA
- 19) Drug Demand Reduction Bureau, Office of the Narcotics Control Board, Thailand: Preliminary Report of Project, Estimation of Population Related with Substance Abuse, Status of Drug and Substance Use: 2001, National Household Survey. pp.3, 2002.
- 20) 和田 清、高橋伸彰、尾崎 茂: 薬物使用に関する全国住民調査. 平成15年度厚生労働科学研究費補助金(医薬安全総合研究事業)「薬物乱用・依存の実態とその社会的影響・対策に関する研究(主任研究者:和田 清) 研究報告書. pp.17-87, 2004.3.

表5 対象の性・年齢・学歴 (%)

		男		女		全体	
年齢	15-19 歳	90	(6.0)	96	(6.1)	186	(6.1)
	20-24 歳	77	(5.2)	76	(4.9)	153	(5.0)
	25-29 歳	77	(5.2)	104	(6.6)	181	(5.9)
	30-34 歳	112	(7.5)	130	(8.3)	242	(7.9)
	35-39 歳	110	(7.4)	144	(9.2)	254	(8.3)
	40-44 歳	114	(7.6)	112	(7.2)	226	(7.4)
	45-49 歳	111	(7.4)	127	(8.1)	238	(7.8)
	50-54 歳	143	(9.6)	142	(9.1)	285	(9.3)
	55-59 歳	159	(10.7)	183	(11.7)	342	(11.2)
	60-64 歳	166	(11.1)	150	(9.6)	316	(10.3)
	65-69 歳	144	(9.7)	139	(8.9)	283	(9.3)
70 歳以上	189	(12.7)	162	(10.4)	351	(11.5)	
学歴	小学校 (尋常小学校も含む)	22	(1.5)	24	(1.5)	46	(1.5)
	中学校 (尋常高等小学校も含む)	225	(15.1)	216	(13.8)	441	(14.4)
	専門学校 (中卒後)	44	(2.9)	64	(4.1)	108	(3.5)
	専門学校 (高校中退後、ないし高卒後)	115	(7.7)	154	(9.8)	269	(8.8)
	高等学校 (旧制中学校・高女も含む)	628	(42.1)	727	(46.5)	1355	(44.3)
	短大・大学以上 (旧制高等学校も含む)	437	(29.3)	364	(23.3)	801	(26.2)
	その他	11	(.7)	5	(.3)	16	(.5)
	無回答	10	(.7)	11	(.7)	21	(.7)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)	

表6 対象の職業・身分 (%)

		男		女		全体	
中学生	8	(.5)	13	(.8)	21	(.7)	
高校生	64	(4.3)	62	(4.0)	126	(4.1)	
予備校生	3	(.2)	1	(.1)	4	(.1)	
専門学校、各種学校生徒	7	(.5)	15	(1.0)	22	(.7)	
短大生、大学生、大学院生	35	(2.3)	23	(1.5)	58	(1.9)	
農林漁業自営者	65	(4.4)	23	(1.5)	88	(2.9)	
商店主	57	(3.8)	30	(1.9)	87	(2.8)	
工場主	29	(1.9)	17	(1.1)	46	(1.5)	
土木建設業種	38	(2.5)	6	(.4)	44	(1.4)	
医療関係業種	9	(.6)	10	(.6)	19	(.6)	
サービス業事業主	56	(3.8)	42	(2.7)	98	(3.2)	
その他の事業主	34	(2.3)	9	(.6)	43	(1.4)	
販売従業者	97	(6.5)	90	(5.8)	187	(6.1)	
保安従業者	28	(1.9)	2	(.1)	30	(1.0)	
運輸従業者	70	(4.7)	3	(.2)	73	(2.4)	
通信従事者	3	(.2)	1	(.1)	4	(.1)	
サービス業従事者	21	(1.4)	94	(6.0)	115	(3.8)	
技能職従事者	18	(1.2)	22	(1.4)	40	(1.3)	
土木建築業従事者	76	(5.1)	1	(.1)	77	(2.5)	
工場労働者、工業作業員	128	(8.6)	53	(3.4)	181	(5.9)	
その他の労務従事者	25	(1.7)	34	(2.2)	59	(1.9)	
専務従事者	129	(8.6)	175	(11.2)	304	(9.9)	
管理的職業	61	(4.1)	1	(.1)	62	(2.0)	
医療職従事者	21	(1.4)	53	(3.4)	74	(2.4)	
その他の専門、技術職従事者	104	(7.0)	42	(2.7)	146	(4.8)	
専業主婦	0	(0)	579	(37.0)	579	(18.9)	
無職	286	(19.2)	131	(8.4)	417	(13.6)	
その他	9	(.6)	21	(1.3)	30	(1.0)	
無回答	11	(.7)	12	(.8)	23	(.8)	
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)	

表7 これまでの飲酒経験の有無 (%)

		男		女		全体	
飲酒経験	なし	68	(4.6)	139	(8.9)	207	(6.8)
	あり	1423	(95.4)	1424	(91.0)	2847	(93.1)
	無回答	1	(.1)	2	(.1)	3	(.1)
合計		1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表7-2 これまでの飲酒経験率 (%) (未補正)

		男 (n=1,491)		女 (n=1,563)		全体 (n=3,054)	
年齢	15-19歳	51	(56.7)	65	(67.7)	116	(62.4)
	20-24歳	77	(100.0)	76	(100.0)	153	(100.0)
	25-29歳	75	(97.4)	103	(99.0)	178	(98.3)
	30-34歳	111	(99.1)	126	(96.9)	237	(97.9)
	35-39歳	106	(96.4)	139	(96.5)	245	(96.5)
	40-44歳	113	(99.1)	112	(100.0)	225	(99.6)
	45-49歳	110	(99.1)	123	(96.9)	233	(97.9)
	50-54歳	139	(97.2)	137	(96.5)	276	(96.8)
	55-59歳	158	(99.4)	171	(94.0)	329	(96.5)
	60-64歳	161	(97.6)	137	(91.9)	298	(94.9)
	65-69歳	144	(100.0)	124	(89.2)	268	(94.7)
70歳以上	178	(94.2)	111	(68.5)	289	(82.3)	
合計		1,423	(95.4)	1,424	(91.1)	3,054	(93.2)

表7-3 これまでの飲酒経験率 (%) (未補正)

男		なし		あり		無回答		合計	
		度数	(行%)	度数	(行%)	度数	(行%)	度数	(行%)
年代別	10歳代	39	(43.3)	51	(56.7)	0	(.0)	90	(100.0)
	20歳代	2	(1.3)	152	(98.7)	0	(.0)	154	(100.0)
	30歳代	5	(2.3)	217	(97.7)	0	(.0)	222	(100.0)
	40歳代	2	(.9)	223	(99.1)	0	(.0)	225	(100.0)
	50歳代	5	(1.7)	297	(98.3)	0	(.0)	302	(100.0)
	60歳代	4	(1.3)	305	(98.4)	1	(.3)	310	(100.0)
	70歳代以上	11	(5.8)	178	(94.2)	0	(.0)	189	(100.0)
表用全体	全体	68	(4.6)	1423	(95.4)	1	(.1)	1492	(100.0)
女		なし		あり		無回答		合計	
		度数	(行%)	度数	(行%)	度数	(行%)	度数	(行%)
年代別	10歳代	31	(32.3)	65	(67.7)	0	(.0)	96	(100.0)
	20歳代	1	(.6)	179	(99.4)	0	(.0)	180	(100.0)
	30歳代	9	(3.3)	265	(96.7)	0	(.0)	274	(100.0)
	40歳代	4	(1.7)	235	(98.3)	0	(.0)	239	(100.0)
	50歳代	16	(4.9)	308	(94.8)	1	(.3)	325	(100.0)
	60歳代	27	(9.3)	261	(90.3)	1	(.3)	289	(100.0)
	70歳代以上	51	(31.5)	111	(68.5)	0	(.0)	162	(100.0)
表用全体	全体	139	(8.9)	1424	(91.0)	2	(.1)	1565	(100.0)
全体		なし		あり		無回答		合計	
		度数	(行%)	度数	(行%)	度数	(行%)	度数	(行%)
年代別	10歳代	70	(37.6)	116	(62.4)	0	(.0)	186	(100.0)
	20歳代	3	(.9)	331	(99.1)	0	(.0)	334	(100.0)
	30歳代	14	(2.8)	482	(97.2)	0	(.0)	496	(100.0)
	40歳代	6	(1.3)	458	(98.7)	0	(.0)	464	(100.0)
	50歳代	21	(3.3)	605	(96.5)	1	(.2)	627	(100.0)
	60歳代	31	(5.2)	566	(94.5)	2	(.3)	599	(100.0)
	70歳代以上	62	(17.7)	289	(82.3)	0	(.0)	351	(100.0)
表用全体	全体	207	(6.8)	2847	(93.1)	3	(.1)	3057	(100.0)

表8 これまでに飲酒した機会（生涯飲酒経験者のみ）（複数回答）（%）

	男		女		全体	
冠婚葬祭	1028	(72.2)	966	(67.8)	1994	(70.0)
仕事・商売上の必要	738	(51.9)	390	(27.4)	1128	(39.6)
上司とのつきあい	635	(44.6)	311	(21.8)	946	(33.2)
友人・同僚と	1122	(78.8)	980	(68.8)	2102	(73.8)
その他つきあい	565	(39.7)	268	(18.8)	833	(29.3)
家の食事・団らん	1037	(72.9)	907	(63.7)	1944	(68.3)
外の食事・団らん	755	(53.1)	671	(47.1)	1426	(50.1)
仕事で嫌なこと	278	(19.5)	136	(9.6)	414	(14.5)
家で面白くないこと	172	(12.1)	109	(7.7)	281	(9.9)
寝る前	434	(30.5)	262	(18.4)	696	(24.4)
その他	29	(2.0)	18	(1.3)	47	(1.7)
飲酒機会ありだが機会不明	4	(.3)	13	(.9)	17	(.6)
合計	1423	(100.0)	1424	(100.0)	2847	(100.0)

表9 初めての飲酒経験年齢（初飲年齢）（飲酒経験者のみ）、（%）、[累積%]

	男		女		全体	
小学校以前	45	(3.2) [3.2]	39	(2.7) [2.7]	84	(3.0) [3.0]
小学校時代	228	(16.0) [19.2]	175	(12.3) [15.0]	403	(14.2) [17.1]
中学校時代	241	(16.9) [36.1]	142	(10.0) [25.0]	383	(13.5) [30.6]
中卒後～17歳	205	(14.4) [50.5]	129	(9.1) [34.1]	334	(11.7) [42.3]
18-19歳	393	(27.6) [78.1]	319	(22.4) [56.5]	712	(25.0) [67.3]
20歳以降	299	(21.0) [99.2]	588	(41.3) [97.8]	887	(31.2) [98.5]
初飲酒年齢不明	4	(.3) [99.4]	16	(1.1) [98.9]	20	(.7) [99.2]
無回答	8	(.6) [100]	16	(1.1) [100]	24	(.8) [100]
合計	1423	(100.0)	1424	(100.0)	2847	(100.0)

表10 それなりに飲酒するようになった時期（飲酒経験者のみ）、（%）、[累積%]

	男		女		全体	
それなりに 至ったことない	151	(10.6) [10.6]	332	(23.3) [23.3]	483	(17.0) [17.0]
小学校以前	0	(0) [10.6]	1	(.1) [23.4]	1	(.0) [17.0]
小学校時代	2	(.1) [10.8]	3	(.2) [23.6]	5	(.2) [17.2]
中学校時代	22	(1.5) [12.3]	13	(.9) [24.5]	35	(1.2) [18.4]
中卒後～17歳	85	(6.0) [18.3]	36	(2.5) [27.0]	121	(4.3) [22.7]
18-19歳	438	(30.8) [49.1]	201	(14.1) [41.2]	639	(22.4) [45.1]
20歳以降	685	(48.1) [97.2]	728	(51.1) [92.3]	1413	(49.6) [94.7]
飲酒開始時期不明	22	(1.5) [98.7]	59	(4.1) [96.4]	81	(2.8) [97.6]
無回答	18	(1.3) [100]	51	(3.6) [100]	69	(2.4) [100]
合計	1423	(100.0)	1424	(100.0)	2847	(100.0)

表11 過去1年での飲酒経験（飲酒1年経験率）（%）

	男		女		全体		
過去1年飲酒経験	なし	156	(10.5)	314	(20.1)	470	(15.4)
	あり	1327	(88.9)	1240	(79.2)	2567	(84.0)
	無回答	9	(.6)	11	(.7)	20	(.7)
合計		1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表11-2 過去1年での飲酒経験（飲酒1年経験率）（%）（未補正）

		男(n=1,483)		女(n=1,554)		全体(n=3,037)	
年齢	15-19歳	41	(45.6)	43	(44.8)	84	(45.2)
	20-24歳	75	(97.4)	73	(96.1)	148	(96.7)
	25-29歳	73	(94.8)	97	(93.3)	170	(93.9)
	30-34歳	107	(95.5)	114	(88.4)	221	(91.7)
	35-39歳	101	(91.8)	125	(87.4)	226	(89.3)
	40-44歳	104	(92.0)	100	(89.3)	204	(90.7)
	45-49歳	105	(94.6)	107	(84.3)	212	(89.1)
	50-54歳	130	(91.5)	120	(85.7)	250	(88.7)
	55-59歳	148	(93.7)	147	(81.7)	295	(87.3)
	60-64歳	148	(90.8)	123	(83.7)	271	(87.4)
65-69歳	139	(97.2)	108	(77.7)	247	(87.6)	
70歳以上	156	(83.4)	83	(51.6)	239	(68.7)	
合計		1,327	(89.5)	1,240	(79.8)	2,567	(84.5)

表11-3 過去1年での飲酒経験（飲酒1年経験率）（%）（未補正）

性別	過去1年飲酒経験あり						合計		
	なし		あり		無回答				
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	
男	10歳代	49	54.4	41	45.6			90	
	20歳代	6	3.9	148	96.1			154	
	30歳代	14	6.3	208	93.7			222	
	40歳代	15	6.7	209	92.9	1	0.4	225	
	50歳代	22	7.3	278	92.1	2	0.7	302	
	60歳代	19	6.1	287	92.6	4	1.3	310	
	70歳代以上	31	16.4	156	72.5	2	1.1	189	
	合計	156	10.5	1327	88.9	9	0.6	1492	
女	10歳代	53	55.2	43	44.8			96	
	20歳代	10	5.6	170	94.4			180	
	30歳代	33	12.0	239	87.2	2	0.7	274	
	40歳代	32	13.4	207	86.6			239	
	50歳代	53	16.3	267	82.2	5	1.5	325	
	60歳代	55	19.0	231	79.9	3	1.0	289	
	70歳代以上	78	48.1	83	51.2	1	0.6	162	
	合計	314	20.1	1240	79.2	11	0.7	1565	
全体	10歳代	102	54.8	84	45.2			186	
	20歳代	16	4.8	318	95.2			334	
	30歳代	47	9.5	447	90.1	2	0.4	496	
	40歳代	47	10.1	416	89.7	1	0.2	464	
	50歳代	75	12.0	545	86.9	7	1.1	627	
	60歳代	74	12.4	518	86.5	7	1.2	599	
	70歳代以上	109	31.1	239	68.1	3	0.9	351	
	合計	470	15.4	2567	84.0	20	0.7	3057	

表12 過去1年に飲酒した機会（過去1年飲酒経験者のみ）（複数回答）（%）

	男		女		全体	
(冠婚葬祭)	764	(57.6)	550	(44.4)	1314	(51.2)
(仕事・商売上の必要)	535	(40.3)	188	(15.2)	723	(28.2)
(上司とのつきあい)	431	(32.5)	135	(10.9)	566	(22.0)
(友人・同僚と)	956	(72.0)	678	(54.7)	1634	(63.7)
(その他つきあい)	419	(31.6)	153	(12.3)	572	(22.3)
(家の食事・団らん)	953	(71.8)	789	(63.6)	1742	(67.9)
(外の食事・団らん)	656	(49.4)	515	(41.5)	1171	(45.6)
(仕事で嫌なこと)	204	(15.4)	81	(6.5)	285	(11.1)
(家で面白くないこと)	136	(10.2)	75	(6.0)	211	(8.2)
(寝る前)	383	(28.9)	205	(16.5)	588	(22.9)
(その他)	17	(1.3)	13	(1.0)	30	(1.2)
(飲酒機会ありだが機会不明)	6	(.5)	2	(.2)	8	(.3)
合計	1327	(100.0)	1240	(100.0)	2567	(100.0)

表13 過去1年での飲酒頻度（過去1年飲酒経験者のみ）（%）

	男		女		全体	
1年間に数回（年5回以内）	198	(14.9)	500	(40.3)	698	(27.2)
2ヶ月に1回（年間約6-11回）	86	(6.5)	145	(11.7)	231	(9.0)
月に1-2回（年間約12-24回）	114	(8.6)	126	(10.2)	240	(9.3)
月に数回（年間約25-51回）	99	(7.5)	108	(8.7)	207	(8.1)
週に1-2回程度	146	(11.0)	126	(10.2)	272	(10.6)
週に3-6回程度	219	(16.5)	125	(10.1)	344	(13.4)
ほとんど毎日	454	(34.2)	97	(7.8)	551	(21.5)
飲んだが頻度不明	9	(.7)	11	(.9)	20	(.8)
無回答	2	(.2)	2	(.2)	4	(.2)
合計	1327	(100.0)	1240	(100.0)	2567	(100.0)

表14 禁酒に対する考え・実態（生涯飲酒経験者のみ）（%）

	男		女		全体	
禁酒は考えたことない	724	(50.9)	1009	(70.9)	1733	(60.9)
禁酒を考えたことはあるが実行したことはない	357	(25.1)	144	(10.1)	501	(17.6)
禁酒を試みたが現在禁酒に至っていない	147	(10.3)	40	(2.8)	187	(6.6)
禁酒中（初めての禁酒。1年未満。）	18	(1.3)	4	(.3)	22	(.8)
禁酒中（再挑戦の禁酒。1年未満。）	10	(.7)	7	(.5)	17	(.6)
禁酒中（1年以上）	55	(3.9)	44	(3.1)	99	(3.5)
無回答	112	(7.9)	176	(12.4)	288	(10.1)
合計	1423	(100.0)	1424	(100.0)	2847	(100.0)

表15 禁酒理由（生涯飲酒経験があり、かつ、禁酒を考えたことのある人）（複数回答）（%）

	男		女		全体	
健康上の不調は感じないが可能性が心配になったから	225	(38.3)	84	(35.1)	309	(37.4)
健康上の不調を感じたから	236	(40.2)	64	(26.8)	300	(36.3)
問題は起こしていないが自分の飲酒にその可能性を感じたから	20	(3.4)	12	(5.0)	32	(3.9)
飲酒で問題を起こしたから	10	(1.7)	3	(1.3)	13	(1.6)
その他	25	(4.3)	44	(18.4)	69	(8.4)
禁酒理由不明	88	(15.0)	37	(15.5)	125	(15.1)
無回答	18	(3.1)	6	(2.5)	24	(2.9)
合計	587	(100.0)	239	(100.0)	826	(100.0)

表16 これまでの喫煙経験（生涯喫煙経験）（%）

	男		女		全体	
喫煙経験						
なし	207	(13.9)	846	(54.1)	1053	(34.4)
あり	1264	(84.7)	697	(44.5)	1961	(64.1)
無回答	21	(1.4)	22	(1.4)	43	(1.4)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表16-2 これまでの喫煙経験率（喫煙生涯経験率）（%）（未補正）

		男 (n=1,471)		女 (n=1,543)		全体 (n=3,014)	
年齢	15-19歳	14	(15.6)	17	(17.7)	31	(16.7)
	20-24歳	61	(79.2)	39	(52.7)	100	(66.2)
	25-29歳	66	(85.7)	62	(60.2)	128	(71.1)
	30-34歳	95	(85.6)	77	(59.2)	172	(71.4)
	35-39歳	101	(92.7)	90	(62.5)	191	(75.5)
	40-44歳	103	(91.2)	73	(65.2)	176	(78.2)
	45-49歳	106	(95.5)	80	(63.5)	186	(78.5)
	50-54歳	131	(92.9)	78	(56.1)	209	(74.6)
	55-59歳	146	(93.6)	77	(42.3)	223	(66.0)
	60-64歳	155	(94.5)	47	(32.4)	202	(65.4)
	65-69歳	129	(91.5)	31	(23.5)	160	(58.6)
70歳以上	157	(86.7)	26	(16.3)	183	(53.7)	
合計		1,264	(85.9)	697	(45.2)	1,961	(65.1)

表16-3 これまでの喫煙経験率（喫煙生涯経験率）（%）（未補正）

		男 (n=1,471)		女 (n=1,543)		全体 (n=3,014)	
年齢	15-19歳	14	(15.6)	17	(17.7)	31	(16.7)
	20-29歳	127	(82.5)	101	(57.1)	228	(68.9)
	30-39歳	196	(89.1)	167	(60.9)	363	(73.5)
	40-49歳	209	(93.3)	153	(64.3)	362	(78.4)
	50-59歳	227	(93.3)	155	(48.3)	432	(69.9)
	60-69歳	284	(93.1)	78	(28.2)	362	(62.2)
	70歳以上	157	(86.7)	26	(16.3)	183	(53.7)
合計		1,264	(86.7)	697	(45.2)	1,961	(65.1)

表17 初めての喫煙時期（生涯喫煙経験者のみ）、（%）、[累積%]

	男			女			全体		
小学校以前	7	(.6)	[.6]	2	(.3)	[.3]	9	(.5)	[.5]
小学校時代	82	(6.5)	[7.0]	48	(6.9)	[7.2]	130	(6.6)	[7.1]
中学校時代	222	(17.6)	[24.6]	94	(13.5)	[20.7]	316	(16.1)	[23.2]
中卒後～17歳	229	(18.1)	[42.7]	81	(11.6)	[32.3]	310	(15.8)	[39.0]
18-19歳	394	(31.2)	[73.9]	157	(22.5)	[54.8]	551	(28.1)	[67.1]
20歳以降	322	(25.5)	[99.4]	307	(44.0)	[98.9]	629	(32.1)	[99.2]
初喫煙年齢不明	3	(.2)	[99.6]	5	(.7)	[99.6]	8	(.4)	[99.6]
無回答	5	(.4)	[100]	3	(.4)	[100]	8	(.4)	[100]
合計	1264	(100.0)		697	(100.0)		1961	(100.0)	

表18 それなりに喫煙するようになった時期（喫煙経験者のみ）、（%）、[累積%]

	男			女			全体		
それなりには至ったことない	121	(9.6)	[9.6]	218	(31.3)	[31.3]	339	(17.3)	[17.3]
小学校以前	0	(0)	[9.6]	0	(0)	[31.3]	0	(0)	[17.3]
小学校時代	1	(.1)	[9.7]	0	(0)	[31.3]	1	(.1)	[17.3]
中学校時代	58	(4.6)	[14.2]	18	(2.6)	[33.9]	76	(3.9)	[21.2]
中卒後～17歳	145	(11.5)	[25.7]	46	(6.6)	[40.5]	191	(9.7)	[31.0]
18-19歳	431	(34.1)	[59.8]	100	(14.3)	[54.8]	531	(27.1)	[58.0]
20歳以降	451	(35.7)	[95.5]	227	(32.6)	[87.4]	678	(34.6)	[92.6]
喫煙開始時期不明	39	(3.1)	[98.6]	61	(8.8)	[96.1]	100	(5.1)	[97.7]
無回答	18	(1.4)	[100]	27	(3.9)	[100]	45	(2.3)	[100]
合計	1264	(100.0)		697	(100.0)		1961	(100.0)	

表19 過去1年間の喫煙経験 (%)

		男		女		全体	
過去1年喫煙経験	なし	743	(49.8)	1185	(75.7)	1928	(63.1)
	あり	718	(48.1)	301	(19.2)	1019	(33.3)
	無回答	31	(2.1)	79	(5.0)	110	(3.6)
合計		1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表19-2 この1年間の喫煙経験率 (喫煙1年経験率) (%) (未補正)

		男 (n=1,461)		女 (n=1,486)		全体 (n=2,947)	
年齢	15-19歳	11	(12.4)	7	(7.5)	18	(9.9)
	20-24歳	43	(57.3)	28	(38.4)	71	(48.0)
	25-29歳	52	(67.5)	37	(35.9)	89	(49.4)
	30-34歳	61	(55.5)	35	(27.6)	96	(40.5)
	35-39歳	72	(65.5)	36	(25.7)	108	(43.2)
	40-44歳	62	(55.4)	31	(28.7)	93	(42.3)
	45-49歳	63	(57.8)	30	(24.4)	93	(40.1)
	50-54歳	79	(56.4)	32	(23.9)	111	(40.5)
	55-59歳	80	(51.3)	23	(13.5)	103	(31.6)
	60-64歳	89	(55.3)	24	(17.1)	113	(37.5)
	65-69歳	57	(40.1)	14	(11.0)	71	(26.4)
	70歳以上	49	(27.2)	4	(2.7)	53	(16.2)
合計		718	(49.1)	301	(20.3)	1,019	(34.6)

表19-3 この1年間の喫煙経験率 (喫煙1年経験率) (%) (未補正)

		男 (n=1,461)		女 (n=1,486)		全体 (n=2,947)	
年齢	15-19歳	11	(12.4)	7	(7.5)	18	(9.9)
	20-29歳	95	(62.5)	65	(36.9)	160	(48.8)
	30-39歳	133	(60.5)	71	(26.6)	204	(41.9)
	40-49歳	125	(56.6)	61	(26.4)	186	(41.2)
	50-59歳	159	(53.7)	55	(18.1)	214	(35.7)
	60-69歳	146	(48.2)	38	(14.2)	184	(32.3)
	70歳以上	49	(27.2)	4	(2.7)	53	(16.2)
合計		718	(49.1)	301	(20.3)	1,019	(34.6)

表20 過去1年の喫煙頻度 (過去1年喫煙経験者のみ) (%)

		男		女		全体	
1年間に数回 (年間5回以内)		37	(5.2)	41	(13.6)	78	(7.7)
2ヶ月に1回程度 (年6-11回)		7	(1.0)	3	(1.0)	10	(1.0)
月に1-2回程度 (年12-24回)		7	(1.0)	4	(1.3)	11	(1.1)
月に数回 (年25-51回)		8	(1.1)	4	(1.3)	12	(1.2)
週に1-2回程度		10	(1.4)	6	(2.0)	16	(1.6)
週に3-6回程度		13	(1.8)	6	(2.0)	19	(1.9)
ほとんど毎日 (1日1-10本)		122	(17.0)	126	(41.9)	248	(24.3)
ほとんど毎日 (1日11-20本)		318	(44.3)	92	(30.6)	410	(40.2)
ほとんど毎日 (1日21本以上)		186	(25.9)	18	(6.0)	204	(20.0)
ほとんど毎日 (パイプたばこ)		10	(1.4)	1	(.3)	11	(1.1)
合計		718	(100.0)	301	(100.0)	1019	(100.0)

表21 禁煙に対する考え方（生涯喫煙経験者のみ）（%）

	男	女	全体
禁煙を考えたことはない	285 (22.5)	314 (45.1)	599 (30.5)
禁煙を考えたことはあるが実行したことはない	214 (16.9)	89 (12.8)	303 (15.5)
禁煙を試みたが現在禁煙に至っていない	271 (21.4)	116 (16.6)	387 (19.7)
禁煙中（初めての禁煙。1年未満。）	30 (2.4)	12 (1.7)	42 (2.1)
禁煙中（再挑戦の禁煙。1年未満。）	32 (2.5)	9 (1.3)	41 (2.1)
禁煙中（1年以上）	406 (32.1)	113 (16.2)	519 (26.5)
無回答	26 (2.1)	44 (6.3)	70 (3.6)
合計	1264 (100.0)	697 (100.0)	1961 (100.0)

表22 禁煙理由（喫煙経験者で、禁煙を考えたことがある人のみ）（複数回答）（%）

	男	女	全体
健康上の不調は感じないが可能性が心配になった	367 (38.5)	137 (40.4)	504 (39.0)
健康上の不調	303 (31.8)	59 (17.4)	362 (28.0)
喫煙者が白い目で見られるようになった	36 (3.8)	22 (6.5)	58 (4.5)
人から勧められた	79 (8.3)	34 (10.0)	113 (8.7)
家族や他者の健康への影響を考えて	229 (24.0)	90 (26.5)	319 (24.7)
その他	94 (9.9)	48 (14.2)	142 (11.0)
禁煙理由不明	47 (4.9)	16 (4.7)	63 (4.9)
無回答	14 (1.5)	12 (3.5)	26 (2.0)
合計	953 (100.0)	339 (100.0)	1292 (100.0)

表23 家庭の常備薬（複数回答）（%）

	男	女	全体
とくになし	206 (13.8)	172 (11.0)	378 (12.4)
風邪薬	924 (61.9)	1030 (65.8)	1954 (63.9)
胃腸薬	829 (55.6)	885 (56.5)	1714 (56.1)
ビタミン剤	389 (26.1)	436 (27.9)	825 (27.0)
高血圧薬	226 (15.1)	199 (12.7)	425 (13.9)
糖尿病薬	67 (4.5)	45 (2.9)	112 (3.7)
精神安定薬	37 (2.5)	92 (5.9)	129 (4.2)
湿布薬	688 (46.1)	859 (54.9)	1547 (50.6)
強精強肝薬	8 (.5)	9 (.6)	17 (.6)
睡眠薬	46 (3.1)	68 (4.3)	114 (3.7)
鎮痛薬	401 (26.9)	698 (44.6)	1099 (36.0)
抗生物質	85 (5.7)	102 (6.5)	187 (6.1)
便秘薬	173 (11.6)	319 (20.4)	492 (16.1)
目薬	805 (54.0)	909 (58.1)	1714 (56.1)
鼻炎薬	272 (18.2)	330 (21.1)	602 (19.7)
セットの置き薬	432 (29.0)	379 (24.2)	811 (26.5)
その他	22 (1.5)	42 (2.7)	64 (2.1)
無回答	14 (.9)	11 (.7)	25 (.8)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表24 過去1年間に一回でも使用したことのある医薬品（複数回答）（%）

	男	女	全体
とくになし	134 (9.0)	126 (8.1)	260 (8.5)
風邪薬	957 (64.1)	985 (62.9)	1942 (63.5)
胃腸薬	605 (40.5)	608 (38.8)	1213 (39.7)
ビタミン剤	376 (25.2)	425 (27.2)	801 (26.2)
高血圧薬	239 (16.0)	202 (12.9)	441 (14.4)
糖尿病薬	75 (5.0)	39 (2.5)	114 (3.7)
湿布薬	513 (34.4)	690 (44.1)	1203 (39.4)
強精強肝薬	15 (1.0)	7 (.4)	22 (.7)
抗生物質	236 (15.8)	316 (20.2)	552 (18.1)
便秘薬	99 (6.6)	233 (14.9)	332 (10.9)
目薬	726 (48.7)	824 (52.7)	1550 (50.7)
鼻炎薬	261 (17.5)	286 (18.3)	547 (17.9)
セットの置き薬	199 (13.3)	143 (9.1)	342 (11.2)
その他	39 (2.6)	104 (6.6)	143 (4.7)
無回答	14 (.9)	16 (1.0)	30 (1.0)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表25 過去1年間での鎮痛薬使用頻度（%）

	男	女	全体
一度も飲んでいない	748 (50.1)	596 (38.1)	1344 (44.0)
1年間に数回（年5回以内）	534 (35.8)	541 (34.6)	1075 (35.2)
2ヶ月に1回（年約6-11回）	53 (3.6)	105 (6.7)	158 (5.2)
月に1-2回（年約12-24回）	49 (3.3)	129 (8.2)	178 (5.8)
月に数回（年約25-51回）	21 (1.4)	81 (5.2)	102 (3.3)
週に1-2回程度	10 (.7)	26 (1.7)	36 (1.2)
週に3-6回程度	8 (.5)	16 (1.0)	24 (.8)
ほとんど毎日	19 (1.3)	26 (1.7)	45 (1.5)
飲んだが頻度不明	37 (2.5)	29 (1.9)	66 (2.2)
無回答	13 (.9)	16 (1.0)	29 (.9)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表26 鎮痛薬の入手先（鎮痛薬を過去1年間に使用した人のみ）（複数回答）（%）

	男	女	全体
常備薬	155 (21.2)	199 (20.9)	354 (21.0)
医院・病院	22 (3.0)	43 (4.5)	65 (3.9)
薬局・薬店	391 (53.5)	463 (48.6)	854 (50.7)
家族	293 (40.1)	498 (52.3)	791 (47.0)
友人・知人	7 (1.0)	7 (.7)	14 (.8)
愛人・恋人	4 (.5)	1 (.1)	5 (.3)
その他	3 (.4)	3 (.3)	6 (.4)
飲んだが入手先不明	31 (4.2)	21 (2.2)	52 (3.1)
無回答	6 (.8)	5 (.5)	11 (.7)
合計	731 (100.0)	953 (100.0)	1684 (100.0)

表27 鎮痛薬の使用理由（鎮痛薬を過去1年間使用した人のみ）（複数回答）（%）

	男	女	全体
頭痛	379 (51.8)	633 (66.4)	1012 (60.1)
歯痛	224 (30.6)	157 (16.5)	381 (22.6)
腰痛	98 (13.4)	108 (11.3)	206 (12.2)
生理痛	0 (.0)	267 (28.0)	267 (15.9)
胃痛	84 (11.5)	96 (10.1)	180 (10.7)
肩こり	38 (5.2)	91 (9.5)	129 (7.7)
その他の痛み	63 (8.6)	52 (5.5)	115 (6.8)
遊び・快感目的	2 (.3)	1 (.1)	3 (.2)
その他	15 (2.1)	32 (3.4)	47 (2.8)
使用目的不明	46 (6.3)	36 (3.8)	82 (4.9)
合計	731 (100.0)	953 (100.0)	1684 (100.0)

表28 鎮痛薬使用の実情・心情（%）

	男	女	全体
必要がないので考えたことがない	646 (43.3)	489 (31.2)	1135 (37.1)
必要なときは心配せずに使っている	434 (29.1)	465 (29.7)	899 (29.4)
心配もあるがどちらかといえば使う	181 (12.1)	354 (22.6)	535 (17.5)
心配だからどちらかというとならない	46 (3.1)	108 (6.9)	154 (5.0)
心配だからとにかく使わない	12 (.8)	12 (.8)	24 (.8)
不明	141 (9.5)	105 (6.7)	246 (8.0)
無回答	32 (2.1)	32 (2.0)	64 (2.1)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表29 この1年間での精神安定薬（抗不安薬）の使用頻度（%）

	男	女	全体
一度も飲んでいない	1386 (92.9)	1391 (88.9)	2777 (90.8)
1年間に数回（年5回以内）	37 (2.5)	55 (3.5)	92 (3.0)
2ヶ月に1回（年約6-11回）	1 (.1)	10 (.6)	11 (.4)
月に1-2回（年約12-24回）	3 (.2)	9 (.6)	12 (.4)
月に数回（年約25-51回）	9 (.6)	6 (.4)	15 (.5)
週に1-2回	4 (.3)	14 (.9)	18 (.6)
週に3-6回	7 (.5)	14 (.9)	21 (.7)
ほとんど毎日	30 (2.0)	39 (2.5)	69 (2.3)
飲んだが頻度不明	4 (.3)	12 (.8)	16 (.5)
無回答	11 (.7)	15 (1.0)	26 (.9)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表30 精神安定薬の入手先（過去1年間に精神安定薬を使った人）（複数回答）（%）

	男	女	全体
常備薬	5 (5.3)	1 (.6)	6 (2.4)
医院・病院	2 (2.1)	8 (5.0)	10 (3.9)
薬局・薬店	70 (73.7)	136 (85.5)	206 (81.1)
家族	12 (12.6)	8 (5.0)	20 (7.9)
友人・知人	0 (0)	0 (0)	0 (0)
愛人・恋人	0 (0)	0 (0)	0 (0)
その他	0 (0)	0 (0)	0 (0)
飲んだが入手先不明	11 (11.6)	10 (6.3)	21 (8.3)
無回答	1 (1.1)	0 (0)	1 (.4)
合計	95 (100.0)	159 (100.0)	254 (100.0)

表31 精神安定薬の使用理由（過去1年間に精神安定薬を使った人）（複数回答）（%）

	男	女	全体
不眠改善	37 (38.9)	94 (59.1)	131 (51.6)
不安解消	20 (21.1)	41 (25.8)	61 (24.0)
ストレス軽減	16 (16.8)	33 (20.8)	49 (19.3)
高血圧の治療	15 (15.8)	15 (9.4)	30 (11.8)
遊び・快感目的	0 (0)	0 (0)	0 (0)
その他	9 (9.5)	9 (5.7)	18 (7.1)
使用目的不明	19 (20.0)	13 (8.2)	32 (12.6)
合計	95 (100.0)	159 (100.0)	254 (100.0)

表32 精神安定薬使用の実情・心情（%）

	男	女	全体
必要がないので考えたことがない	1317 (88.3)	1288 (82.3)	2605 (85.2)
必要なときは心配せずに使っている	65 (4.4)	92 (5.9)	157 (5.1)
心配もあるがどちらかというを使う	49 (3.3)	97 (6.2)	146 (4.8)
心配だからどちらかというを使わない	14 (.9)	32 (2.0)	46 (1.5)
心配だからとにかく使わない	8 (.5)	16 (1.0)	24 (.8)
不明	17 (1.1)	13 (.8)	30 (1.0)
無回答	22 (1.5)	27 (1.7)	49 (1.6)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表33 1年間での睡眠薬の使用頻度（%）

	男	女	全体
一度も飲んでいない	1410 (94.5)	1422 (90.9)	2832 (92.6)
1年間に数回（年5回以内）	25 (1.7)	40 (2.6)	65 (2.1)
2ヶ月に1回（年約6-11回）	2 (.1)	10 (.6)	12 (.4)
月に1-2回（年約12-24回）	8 (.5)	8 (.5)	16 (.5)
月に数回（年約25-51回）	3 (.2)	12 (.8)	15 (.5)
週に1-2回	6 (.4)	15 (1.0)	21 (.7)
週に3-6回	4 (.3)	10 (.6)	14 (.5)
ほとんど毎日	15 (1.0)	26 (1.7)	41 (1.3)
飲んだが頻度不明	2 (.1)	2 (.1)	4 (.1)
無回答	17 (1.1)	20 (1.3)	37 (1.2)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表34 睡眠薬の入手先（過去1年に睡眠薬を使用した人）（複数回答）（%）

	男	女	全体
常備薬	2 (3.1)	1 (.8)	3 (1.6)
医院・病院	1 (1.5)	11 (8.9)	12 (6.4)
薬局・薬店	55 (84.6)	106 (86.2)	161 (85.6)
家族	10 (15.4)	6 (4.9)	16 (8.5)
友人・知人	0 (0)	3 (2.4)	3 (1.6)
愛人・恋人	0 (0)	0 (0)	0 (0)
その他	0 (0)	1 (.8)	1 (.5)
入手先不明	0 (0)	0 (0)	0 (0)
無回答	1 (1.5)	1 (.8)	2 (1.1)
合計	65 (100.0)	123 (100.0)	188 (100.0)

表35 睡眠薬の使用理由（過去1年に睡眠薬使用した人）（複数回答）（%）

	男		女		全体	
不眠改善	53	(81.5)	103	(83.7)	156	(83.0)
不安解消	6	(9.2)	13	(10.6)	19	(10.1)
ストレス軽減	5	(7.7)	9	(7.3)	14	(7.4)
高血圧の治療	5	(7.7)	10	(8.1)	15	(8.0)
遊び・快感目的	0	(0)	0	(0)	0	(0)
その他	5	(7.7)	8	(6.5)	13	(6.9)
使用目的不明	3	(4.6)	1	(.8)	4	(2.1)
合計	65	(100.0)	123	(100.0)	188	(100.0)

表36 睡眠薬使用の実情・心情（%）

	男		女		全体	
必要がないので考えたことがない	1320	(88.5)	1290	(82.4)	2610	(85.4)
必要なときは心配せずに使っている	63	(4.2)	78	(5.0)	141	(4.6)
心配もあるがどちらかといえば使う	54	(3.6)	97	(6.2)	151	(4.9)
心配だからどちらかというとならない	15	(1.0)	45	(2.9)	60	(2.0)
心配だからとにかく使わない	14	(.9)	24	(1.5)	38	(1.2)
不明	3	(.2)	3	(.2)	6	(.2)
無回答	23	(1.5)	28	(1.8)	51	(1.7)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表37 聞いたことのある薬物名（複数回答）（%）

	男		女		全体	
有機溶剤	425	(28.5)	156	(10.0)	581	(19.0)
シンナー	1201	(80.5)	1257	(80.3)	2458	(80.4)
トルエン	732	(49.1)	512	(32.7)	1244	(40.7)
大麻	1354	(90.8)	1390	(88.8)	2744	(89.8)
マリファナ	1169	(78.4)	1181	(75.5)	2350	(76.9)
ハシッシ	325	(21.8)	186	(11.9)	511	(16.7)
覚せい剤	1281	(85.9)	1349	(86.2)	2630	(86.0)
ヒロポン	882	(59.1)	691	(44.2)	1573	(51.5)
シャブ	1024	(68.6)	981	(62.7)	2005	(65.6)
スピード	603	(40.4)	516	(33.0)	1119	(36.6)
エス	222	(14.9)	239	(15.3)	461	(15.1)
麻薬	1252	(83.9)	1302	(83.2)	2554	(83.5)
モルヒネ	1216	(81.5)	1253	(80.1)	2469	(80.8)
ヘロイン	1089	(73.0)	1040	(66.5)	2129	(69.6)
コカイン	1217	(81.6)	1237	(79.0)	2454	(80.3)
クラック	330	(22.1)	155	(9.9)	485	(15.9)
LSD	759	(50.9)	550	(35.1)	1309	(42.8)
アシッド	84	(5.6)	48	(3.1)	132	(4.3)
MDMA	250	(16.8)	139	(8.9)	389	(12.7)
エックス	89	(6.0)	66	(4.2)	155	(5.1)
エクスタシー	427	(28.6)	341	(21.8)	768	(25.1)
マジック・マッシュルーム	480	(32.2)	414	(26.5)	894	(29.2)
すべて知らない	56	(3.8)	56	(3.6)	112	(3.7)
無回答	51	(3.4)	62	(4.0)	113	(3.7)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

左端のカッコは同じものであることを意味している。

表37-2 聞いたことのある薬物名（複数回答）（%）

	10歳代		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳代以上		無回答		全体	
	度数	(列%)	度数	(列%)	度数	(列%)	度数	(列%)	度数	(列%)	度数	(列%)	度数	(列%)	度数	(列%)	度数	(列%)
有機溶剤	40	21.5	62	18.6	106	21.4	131	28.2	126	20.1	91	15.2	25	7.1	0	0	581	19
シンナー	166	89.2	302	90.4	436	87.9	403	86.9	501	79.9	425	71	225	64.1	0	0	2458	80.4
トルエン	28	15.1	114	34.1	289	58.3	288	62.1	254	40.5	206	34.4	65	18.5	0	0	1244	40.7
大麻	169	90.9	319	95.5	473	95.4	441	95	557	88.8	517	86.3	268	76.4	0	0	2744	89.8
マリファナ	148	79.6	293	87.7	430	86.7	409	88.1	480	76.6	417	69.6	173	49.3	0	0	2350	76.9
ハシッシ	8	4.3	45	13.5	116	23.4	130	28	131	20.9	62	10.4	19	5.4	0	0	511	16.7
覚せい剤	173	93	319	95.5	458	92.3	429	92.5	544	86.8	486	81.1	221	63	0	0	2630	86
ヒロポン	34	18.3	117	35	213	42.9	281	60.6	340	54.2	393	65.6	195	55.6	0	0	1573	51.5
シャブ	104	55.9	258	77.2	397	80	369	79.5	408	65.1	339	56.6	130	37	0	0	2005	65.6
スピード	115	61.8	229	68.6	313	63.1	243	52.4	150	23.9	60	10	9	2.6	0	0	1119	36.6
エス	77	41.4	129	38.6	144	29	64	13.8	30	4.8	14	2.3	3	0.9	0	0	461	15.1
麻薬	162	87.1	301	90.1	449	90.5	421	90.7	521	83.1	472	78.8	228	65	0	0	2554	83.5
モルヒネ	114	61.3	276	82.6	428	86.3	418	90.1	522	83.3	474	79.1	237	67.5	0	0	2469	80.8
ヘロイン	104	55.9	230	68.9	399	80.4	384	82.8	447	71.3	388	64.8	177	50.4	0	0	2129	69.6
コカイン	149	80.1	296	88.6	448	90.3	417	89.9	507	80.9	452	75.5	185	52.7	0	0	2454	80.3
クラック	19	10.2	51	15.3	123	24.8	124	26.7	107	17.1	53	8.8	8	2.3	0	0	485	15.9
LSD	67	36	162	48.5	270	54.4	282	60.8	301	48	181	30.2	46	13.1	0	0	1309	42.8
アシッド	12	6.5	33	9.9	52	10.5	19	4.1	13	2.1	1	0.2	2	0.6	0	0	132	4.3
MDMA	42	22.6	70	21	95	19.2	67	14.4	60	9.6	40	6.7	15	4.3	0	0	389	12.7
エクスタシー	22	11.8	29	8.7	55	11.1	29	6.3	14	2.2	5	0.8	1	0.3	0	0	155	5.1
エクススタシー	51	27.4	147	44	219	44.2	161	34.7	120	19.1	53	8.8	17	4.8	0	0	768	25.1
マジック・マッシュルーム	102	54.8	193	57.8	283	57.1	176	37.9	82	13.1	45	7.5	13	3.7	0	0	894	29.2
すべて知らない	3	1.6	7	2.1	12	2.4	12	2.6	24	3.8	26	4.3	28	8	0	0	112	3.7
無回答	3	1.6	3	0.9	7	1.4	8	1.7	31	4.9	29	4.8	32	9.1	0	0	113	3.7
合計	186	100	334	100	496	100	464	100	627	100	599	100	351	100	0	0	3057	100

表38 薬物乱用を繰り返すと依存状態になることを知っているか？（%）

	男		女		全体	
知っている	1437	(96.3)	1480	(94.6)	2917	(95.4)
知らない	46	(3.1)	74	(4.7)	120	(3.9)
無回答	9	(.6)	11	(.7)	20	(.7)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表39 「シンナー遊び」で死亡すること（急性中毒死）があることを知っているか？（%）

	男		女		全体	
知っている	1273	(85.3)	1263	(80.7)	2536	(83.0)
知らない	210	(14.1)	288	(18.4)	498	(16.3)
無回答	9	(.6)	14	(.9)	23	(.8)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表40 「シンナー遊び」で幻視・幻聴・妄想などの精神病状態になることがあることを知っているか？（%）

	男		女		全体	
知っている	1301	(87.2)	1371	(87.6)	2672	(87.4)
知らない	173	(11.6)	179	(11.4)	352	(11.5)
無回答	18	(1.2)	15	(1.0)	33	(1.1)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表41 「シンナー遊び」でフラッシュバック現象があることを知っているか？（%）

	男		女		全体	
知っている	1025	(68.7)	1001	(64.0)	2026	(66.3)
知らない	447	(30.0)	543	(34.7)	990	(32.4)
無回答	20	(1.3)	21	(1.3)	41	(1.3)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表42 「シンナー遊び」で無動機症候群になることがあることを知っているか？ (%)

	男		女		全体	
知っている	1018	(68.2)	1053	(67.3)	2071	(67.7)
知らない	452	(30.3)	493	(31.5)	945	(30.9)
無回答	22	(1.5)	19	(1.2)	41	(1.3)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表43 「シンナー遊び」をする人数の印象 (%)

	男		女		全体	
以前より増えている	239	(16.0)	345	(22.0)	584	(19.1)
変わらない	159	(10.7)	128	(8.2)	287	(9.4)
以前より減っている	168	(11.3)	112	(7.2)	280	(9.2)
わからない	881	(59.0)	952	(60.8)	1833	(60.0)
無回答	45	(3.0)	28	(1.8)	73	(2.4)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表44 身近な人で「シンナー遊び」をこれまでに行ったことのある人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
知らない	1203	(80.6)	1328	(84.9)	2531	(82.8)
知っている	266	(17.8)	219	(14.0)	485	(15.9)
無回答	23	(1.5)	18	(1.2)	41	(1.3)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表45 身近な人で「シンナー遊び」をこれまでに行ったことのある人を知っているか？

(年齢群別) (%)

	「シンナー遊び」をした人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19 歳	169 (6.7)	17 (3.5)	0 (0)	186	(6.1)
20-24 歳	132 (5.2)	21 (4.3)	0 (0)	153	(5.0)
25-29 歳	142 (5.6)	38 (7.8)	1 (2.4)	181	(5.9)
30-34 歳	165 (6.5)	72 (14.8)	5 (12.2)	242	(7.9)
35-39 歳	168 (6.6)	81 (16.7)	5 (12.2)	254	(8.3)
40-44 歳	166 (6.6)	60 (12.4)	0 (0)	226	(7.4)
45-49 歳	184 (7.3)	54 (11.1)	0 (0)	238	(7.8)
50-54 歳	239 (9.4)	41 (8.5)	5 (12.2)	285	(9.3)
55-59 歳	303 (12.0)	35 (7.2)	4 (9.8)	342	(11.2)
60-64 歳	280 (11.1)	27 (5.6)	9 (22.0)	316	(10.3)
65-69 歳	260 (10.3)	21 (4.3)	2 (4.9)	283	(9.3)
70 歳以上	323 (12.8)	18 (3.7)	10 (24.4)	351	(11.5)
合計	2531 (100.0)	485 (100.0)	41 (100.0)	3057	(100.0)

表46 身近な人で、「シンナー遊び」をこれまでにに行ったことのある人を何人知っているか？
 (「シンナー遊び」をこれまでにに行ったことのある人を知っている者のみ) (%)

	男	女	全体
1人	53 (19.9)	78 (35.6)	131 (27.0)
2人	54 (20.3)	40 (18.3)	94 (19.4)
3人	51 (19.2)	34 (15.5)	85 (17.5)
4人	8 (3.0)	4 (1.8)	12 (2.5)
5人	24 (9.0)	15 (6.8)	39 (8.0)
6人	8 (3.0)	10 (4.6)	18 (3.7)
7人	3 (1.1)	1 (.5)	4 (.8)
8人	1 (.4)	3 (1.4)	4 (.8)
10人	29 (10.9)	15 (6.8)	44 (9.1)
15人	0 (0)	3 (1.4)	3 (.6)
20人	13 (4.9)	4 (1.8)	17 (3.5)
28人	0 (0)	1 (.5)	1 (.2)
30人	7 (2.6)	2 (.9)	9 (1.9)
50人	2 (.8)	0 (0)	2 (.4)
100人	3 (1.1)	1 (.5)	4 (.8)
無回答	10 (3.8)	8 (3.7)	18 (3.7)
合計	266 (100.0)	219 (100.0)	485 (100.0)
平均±SD	6.65±12.53 n=256	4.29±8.18 n=211	5.58±10.84 n=467

表47 身近な人で、この1年間に「シンナー遊び」を行ったことのある人を知っているか？ (%)

	男	女	全体
知らない	1419 (95.1)	1516 (96.9)	2935 (96.0)
知っている	48 (3.2)	24 (1.5)	72 (2.4)
無回答	25 (1.7)	25 (1.6)	50 (1.6)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表48 身近な人で、この1年間に「シンナー遊び」を行ったことのある人を知っているか？

	過去1年「シンナー遊び」をした人 (年齢群別) (%)					
	合計			合計		
	知らない	知っている	無回答	度数	列	%
15-19歳	176 (6.0)	9 (12.5)	1 (2.0)	186	(6.1)	
20-24歳	150 (5.1)	3 (4.2)	0 (0)	153	(5.0)	
25-29歳	176 (6.0)	4 (5.6)	1 (2.0)	181	(5.9)	
30-34歳	232 (7.9)	6 (8.3)	4 (8.0)	242	(7.9)	
35-39歳	243 (8.3)	6 (8.3)	5 (10.0)	254	(8.3)	
40-44歳	217 (7.4)	9 (12.5)	0 (0)	226	(7.4)	
45-49歳	231 (7.9)	5 (6.9)	2 (4.0)	238	(7.8)	
50-54歳	276 (9.4)	2 (2.8)	7 (14.0)	285	(9.3)	
55-59歳	329 (11.2)	6 (8.3)	7 (14.0)	342	(11.2)	
60-64歳	297 (10.1)	10 (13.9)	9 (18.0)	316	(10.3)	
65-69歳	271 (9.2)	6 (8.3)	6 (12.0)	283	(9.3)	
70歳以上	337 (11.5)	6 (8.3)	8 (16.0)	351	(11.5)	
合計	2935 (100.0)	72 (100.0)	50 (100.0)	3057	(100.0)	

表49 身近な人で、この1年間に「シンナー遊び」を行ったことのある人を何人知っているか？

(過去1年使用者を知っている人のみ) (%)

	男	女	全体
1人	9 (18.8)	9 (37.5)	18 (25.0)
2人	9 (18.8)	6 (25.0)	15 (20.8)
3人	7 (14.6)	3 (12.5)	10 (13.9)
5人	5 (10.4)	3 (12.5)	8 (11.1)
6人	1 (2.1)	1 (4.2)	2 (2.8)
10人	5 (10.4)	0 (0)	5 (6.9)
16人	1 (2.1)	0 (0)	1 (1.4)
20人	5 (10.4)	1 (4.2)	6 (8.3)
30人	1 (2.1)	0 (0)	1 (1.4)
無回答	5 (10.4)	1 (4.2)	6 (8.3)
合計	48 (100.0)	24 (100.0)	72 (100.0)
平均±SD	6.40±7.18 n=43	3.09±4.00 n=23	5.24±6.42 n=66

表50 これまでに「シンナー遊び」に誘われたことがあるか？ (生涯被誘惑経験) (%)

	男	女	全体
ない	1426 (95.6)	1510 (96.5)	2936 (96.0)
1年より前にのみあった	48 (3.2)	37 (2.4)	85 (2.8)
1年より前にも、この1年間にもあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)
この1年間にのみあった	1 (.1)	0 (0)	1 (.0)
無回答	17 (1.1)	18 (1.2)	35 (1.1)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表51 「シンナー遊び」被誘惑経験 (年齢群別) (%)

	「シンナー遊び」に誘われた経験				合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	度数	列%
15-19 歳	182 (6.2)	3 (3.5)	1 (100.0)	0 (0)	186	(6.1)
20-24 歳	146 (5.0)	7 (8.2)	0 (0)	0 (0)	153	(5.0)
25-29 歳	176 (6.0)	4 (4.7)	0 (0)	1 (2.9)	181	(5.9)
30-34 歳	219 (7.5)	19 (22.4)	0 (0)	4 (11.4)	242	(7.9)
35-39 歳	228 (7.8)	23 (27.1)	0 (0)	3 (8.6)	254	(8.3)
40-44 歳	213 (7.3)	12 (14.1)	0 (0)	1 (2.9)	226	(7.4)
45-49 歳	229 (7.8)	9 (10.6)	0 (0)	0 (0)	238	(7.8)
50-54 歳	275 (9.4)	6 (7.1)	0 (0)	4 (11.4)	285	(9.3)
55-59 歳	340 (11.6)	0 (0)	0 (0)	2 (5.7)	342	(11.2)
60-64 歳	307 (10.5)	0 (0)	0 (0)	9 (25.7)	316	(10.3)
65-69 歳	278 (9.5)	1 (1.2)	0 (0)	4 (11.4)	283	(9.3)
70歳以上	343 (11.7)	1 (1.2)	0 (0)	7 (20.0)	351	(11.5)
合計	2936 (100.0)	85 (100.0)	1 (100.0)	35 (100.0)	3057	(100.0)

表52 「シンナー遊び」被誘惑経験 (年齢群別) (%)

	「シンナー遊び」に誘われた経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	行 %
15-19歳	182 (97.8)	3 (1.6)	1 (.5)	0 (0)	0 (0)	186 (100.0)		
20-24歳	146 (95.4)	7 (4.6)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	153 (100.0)		
25-29歳	176 (97.2)	4 (2.2)	0 (0)	1 (.6)	181 (100.0)			
30-34歳	219 (90.5)	19 (7.9)	0 (0)	4 (1.7)	242 (100.0)			
35-39歳	228 (89.8)	23 (9.1)	0 (0)	3 (1.2)	254 (100.0)			
40-44歳	213 (94.2)	12 (5.3)	0 (0)	1 (.4)	226 (100.0)			
45-49歳	229 (96.2)	9 (3.8)	0 (0)	0 (0)	238 (100.0)			
50-54歳	275 (96.5)	6 (2.1)	0 (0)	4 (1.4)	285 (100.0)			
55-59歳	340 (99.4)	0 (0)	0 (0)	2 (.6)	342 (100.0)			
60-64歳	307 (97.2)	0 (0)	0 (0)	9 (2.8)	316 (100.0)			
65-69歳	278 (98.2)	1 (.4)	0 (0)	4 (1.4)	283 (100.0)			
70歳以上	343 (97.7)	1 (.3)	0 (0)	7 (2.0)	351 (100.0)			
合計	2936 (96.0)	85 (2.8)	1 (.5)	35 (1.1)	3057 (100.0)			

表53 これまでに「シンナー遊び」を1回でも行ったことのある経験 (生涯経験) (%)

	男	女	全体
ない	1454 (97.5)	1534 (98.0)	2988 (97.7)
1年より前にのみあった	23 (1.5)	17 (1.1)	40 (1.3)
1年より前にも、この1年間にもあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)
この1年間にのみあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)
無回答	15 (1.0)	14 (.9)	29 (.9)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表54 これまでに「シンナー遊び」を1回でも行ったことのある経験 (年齢群別) (%)

	「シンナー遊び」経験				合計	
	ない	1年より前にのみあった		無回答	度数	列 %
15-19歳	185 (6.2)	1 (2.5)	0 (0)	186 (6.1)		
20-24歳	152 (5.1)	1 (2.5)	0 (0)	153 (5.0)		
25-29歳	178 (6.0)	2 (5.0)	1 (3.4)	181 (5.9)		
30-34歳	230 (7.7)	8 (20.0)	4 (13.8)	242 (7.9)		
35-39歳	236 (7.9)	15 (37.5)	3 (10.3)	254 (8.3)		
40-44歳	223 (7.5)	3 (7.5)	0 (0)	226 (7.4)		
45-49歳	232 (7.8)	6 (15.0)	0 (0)	238 (7.8)		
50-54歳	278 (9.3)	3 (7.5)	4 (13.8)	285 (9.3)		
55-59歳	339 (11.3)	1 (2.5)	2 (6.9)	342 (11.2)		
60-64歳	309 (10.3)	0 (0)	7 (24.1)	316 (10.3)		
65-69歳	279 (9.3)	0 (0)	4 (13.8)	283 (9.3)		
70歳以上	347 (11.6)	0 (0)	4 (13.8)	351 (11.5)		
合計	2988 (100.0)	40 (100.0)	29 (100.0)	3057 (100.0)		

表55 これまでに「シンナー遊び」を1回でも行ったことのある経験（年齢群別）（%）

	「シンナー遊び」経験						合計	
	ない		1年より前にのみあった		無回答		度数	行 %
15-19歳	185	(99.5)	1	(.5)	0	(0)	186	(100.0)
20-24歳	152	(99.3)	1	(.7)	0	(0)	153	(100.0)
25-29歳	178	(98.3)	2	(1.1)	1	(.6)	181	(100.0)
30-34歳	230	(95.0)	8	(3.3)	4	(1.7)	242	(100.0)
35-39歳	236	(92.9)	15	(5.9)	3	(1.2)	254	(100.0)
40-44歳	223	(98.7)	3	(1.3)	0	(0)	226	(100.0)
45-49歳	232	(97.5)	6	(2.5)	0	(0)	238	(100.0)
50-54歳	278	(97.5)	3	(1.1)	4	(1.4)	285	(100.0)
55-59歳	339	(99.1)	1	(.3)	2	(.6)	342	(100.0)
60-64歳	309	(97.8)	0	(0)	7	(2.2)	316	(100.0)
65-69歳	279	(98.6)	0	(0)	4	(1.4)	283	(100.0)
70歳以上	347	(98.9)	0	(0)	4	(1.1)	351	(100.0)
合計	2988	(97.7)	40	(1.3)	29	(.9)	3057	(100.0)

表56 大麻を吸っている人の人数の印象（%）

	男		女		全体	
以前より増えている	437	(29.3)	537	(34.3)	974	(31.9)
変わらない	124	(8.3)	76	(4.9)	200	(6.5)
以前より減っている	16	(1.1)	14	(.9)	30	(1.0)
わからない	891	(59.7)	918	(58.7)	1809	(59.2)
無回答	24	(1.6)	20	(1.3)	44	(1.4)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表57 大麻の吸引により精神病状態・フラッシュバック・無動機症候群になることがあることを知っているか？（%）

	男		女		全体	
知っている	1052	(70.5)	1131	(72.3)	2183	(71.4)
知らない	421	(28.2)	418	(26.7)	839	(27.4)
無回答	19	(1.3)	16	(1.0)	35	(1.1)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表58 大麻をこれまでに吸ったことのある人を知っているか？（%）

	男		女		全体	
知らない	1394	(93.4)	1497	(95.7)	2891	(94.6)
知っている	82	(5.5)	56	(3.6)	138	(4.5)
無回答	16	(1.1)	12	(.8)	28	(.9)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)