

分散分析表：SU在院日数

	自由度	平方和	平均平方	F値	p値
病院	3	1451.702	483.901	4.553	.0059
誤差	64	6802.578	106.290		

コンポーネント間の分散の推定値 (II型) : 23.615

FisherのPLSD：SU在院日数

効果：病院

有意水準：5%

	平均値の差	棄却値	p値
A病院, B病院	.566	9.257	.9032
A病院, その他	-4.545	7.606	.2369
A病院, 陽和会病院	6.416	7.408	.0884
B病院, その他	-5.111	8.150	.2148
B病院, 陽和会病院	5.850	7.965	.1472
その他, 陽和会病院	10.962	5.966	.0005

S

基本統計量：SU在院日数


効果：病院

	例数	平均値	標準偏差	標準誤差
A病院	11	28.455	10.930	3.296
B病院	9	27.889	10.787	3.596
その他	22	33.000	11.605	2.474
陽和会病院	26	22.038	8.600	1.687

棒グラフ (群別)

群分け変数：病院

エラーバー：±1 標準誤差



分散分析表：待機日数

	自由度	平方和	平均平方	F値	p値
病院	3	782.688	260.896	6.477	.0007
誤差	64	2578.077	40.282		

コンポーネント間の分散の推定値 (II型) : 13.797

基本統計量：待機日数

効果：病院

	例数	平均値	標準偏差	標準誤差
A病院	11	9.364	4.411	1.330
B病院	9	9.778	4.324	1.441
その他	22	15.136	9.141	1.949
陽和会病院	26	7.154	4.379	.859

FisherのPLSD：待機日数

効果：病院


有意水準：5%

	平均値の差	棄却値	p値	
A病院, B病院	-.414	5.699	.8850	
A病院, その他	-5.773	4.682	.0165	S
A病院, 陽和会病院	2.210	4.561	.3367	
B病院, その他	-5.359	5.017	.0367	S
B病院, 陽和会病院	2.624	4.904	.2891	
その他, 陽和会病院	7.983	3.673	<.0001	S

棒グラフ (群別)

群分け変数：病院

エラーバー：±1 標準誤差



分散分析表：入院時NIH-SS

	自由度	平方和	平均平方	F値	p値
病院	3	418.170	139.390	2.192	.0975
誤差	64	4069.301	63.583		

コンポーネント間の分散の推定値 (II型) : 4.741

FisherのPLSD：入院時NIH-SS

効果：病院

有意水準：5%

	平均値の差	棄却値	p値	
A病院, B病院	-.848	7.160	.8136	
A病院, その他	5.909	5.882	.0490	S
A病院, 陽和会病院	2.895	5.730	.3166	
B病院, その他	6.758	6.303	.0360	S
B病院, 陽和会病院	3.744	6.161	.2292	
その他, 陽和会病院	-3.014	4.615	.1966	

基本統計量：入院時NIH-SS


効果：病院

	例数	平均値	標準偏差	標準誤差
A病院	11	11.818	13.549	4.085
B病院	9	12.667	10.025	3.342
その他	22	5.909	4.331	.923
陽和会病院	26	8.923	6.437	1.262

棒グラフ (群別)

群分け変数：病院

エラーバー：±1 標準誤差



分散分析表：退院時NIH-SS

	自由度	平方和	平均平方	F値	p値
病院	3	95.121	31.707	.674	.5708
誤差	64	3008.643	47.010		

コンポーネント間の分散の推定値 (II型) : .

FisherのPLSD：退院時NIH-SS

効果：病院

有意水準：5%

	平均値の差	棄却値	p値
A病院, B病院	-1.091	6.156	.7245
A病院, その他	1.591	5.058	.5320
A病院, 陽和会病院	-1.052	4.927	.6710
B病院, その他	2.682	5.420	.3266
B病院, 陽和会病院	.038	5.297	.9885
その他, 陽和会病院	-2.643	3.968	.1880

基本統計量：退院時NIH-SS


効果：病院

	例数	平均値	標準偏差	標準誤差
A病院	11	5.909	5.224	1.575
B病院	9	7.000	7.762	2.587
その他	22	4.318	2.918	.622
陽和会病院	26	6.962	9.110	1.787

棒グラフ (群別)

群分け変数：病院

エラーバー：±1 標準誤差



分散分析表：入院時mFIM

	自由度	平方和	平均平方	F値	p値
病院	3	977.699	325.900	1.033	.3838
誤差	64	20182.580	315.353		

コンポーネント間の分散の推定値 (II型) : .66

FisherのPLSD：入院時mFIM

効果：病院

有意水準：5%

	平均値の差	棄却値	p値
A病院, B病院	-3.859	15.945	.6304
A病院, その他	7.136	13.100	.2806
A病院, 陽和会病院	5.133	12.760	.4246
B病院, その他	10.995	14.037	.1226
B病院, 陽和会病院	8.991	13.720	.1951
その他, 陽和会病院	-2.003	10.277	.6982

基本統計量：入院時mFIM


効果：病院

	例数	平均値	標準偏差	標準誤差
A病院	11	31.364	19.185	5.784
B病院	9	35.222	27.248	9.083
その他	22	24.227	14.372	3.064
陽和会病院	26	26.231	15.779	3.095

棒グラフ (群別)

群分け変数：病院

エラーバー：±1 標準誤差



分散分析表：退院時mFIM

	自由度	平方和	平均平方	F値	p値
病院	3	977.756	325.919	.504	.6810
誤差	64	41396.876	646.826		

コンポーネント間の分散の推定値 (II型) : .

FisherのPLSD：退院時mFIM

効果：病院

有意水準：5%

	平均値の差	棄却値	p値
A病院, B病院	8.990	22.836	.4345
A病院, その他	3.364	18.762	.7214
A病院, 陽和会病院	9.661	18.275	.2949
B病院, その他	-5.626	20.104	.5781
B病院, 陽和会病院	.671	19.650	.9458
その他, 陽和会病院	6.297	14.718	.3959

基本統計量：退院時mFIM


効果：病院

	例数	平均値	標準偏差	標準誤差
A病院	11	55.545	24.574	7.409
B病院	9	46.556	29.125	9.708
その他	22	52.182	25.038	5.338
陽和会病院	26	45.885	24.825	4.869

棒グラフ (群別)

群分け変数：病院

エラーバー：±1 標準誤差



分散分析表：入院時cFIM

	自由度	平方和	平均平方	F値	p値
病院	3	102.648	34.216	.356	.7850
誤差	64	6153.161	96.143		

コンポーネント間の分散の推定値 (II型) : .

FisherのPLSD：入院時cFIM

効果：病院

有意水準：5%

	平均値の差	棄却値	p値
A病院, B病院	2.273	8.804	.6078
A病院, その他	3.045	7.233	.4034
A病院, 陽和会病院	3.542	7.046	.3190
B病院, その他	.773	7.751	.8428
B病院, 陽和会病院	1.269	7.576	.7389
その他, 陽和会病院	.497	5.674	.8618

基本統計量：入院時cFIM


効果：病院

	例数	平均値	標準偏差	標準誤差
A病院	11	22.273	12.531	3.778
B病院	9	20.000	10.700	3.567
その他	22	19.227	8.106	1.728
陽和会病院	26	18.731	9.565	1.876

棒グラフ (群別)

群分け変数：病院

エラーバー：±1 標準誤差



分散分析表：退院時cFIM

	自由度	平方和	平均平方	F値	p値
病院	3	203.858	67.953	.823	.4858
誤差	64	5282.260	82.535		

コンポーネント間の分散の推定値 (II型) : .

FisherのPLSD：退院時cFIM

効果：病院

有意水準：5%

	平均値の差	棄却値	p値
A病院, B病院	4.929	8.157	.2318
A病院, その他	.636	6.702	.8502
A病院, 陽和会病院	3.280	6.528	.3193
B病院, その他	-4.293	7.181	.2368
B病院, 陽和会病院	-1.650	7.019	.6403
その他, 陽和会病院	2.643	5.257	.3190

基本統計量：退院時cFIM


効果：病院

	例数	平均値	標準偏差	標準誤差
A病院	11	26.818	9.042	2.726
B病院	9	21.889	11.073	3.691
その他	22	26.182	7.195	1.534
陽和会病院	26	23.538	9.791	1.920

棒グラフ (群別)

群分け変数：病院

エラーバー：± 1 標準誤差



分散分析表：入院時tFIM

	自由度	平方和	平均平方	F値	p値
病院	3	1473.718	491.239	.768	.5159
誤差	64	40912.517	639.258		

コンポーネント間の分散の推定値 (II型) : .

FisherのPLSD：入院時tFIM

効果：病院

有意水準：5%

	平均値の差	棄却値	p値
A病院, B病院	-1.586	22.702	.8895
A病院, その他	10.182	18.652	.2796
A病院, 陽和会病院	8.675	18.167	.3437
B病院, その他	11.768	19.986	.2438
B病院, 陽和会病院	10.261	19.534	.2980
その他, 陽和会病院	-1.507	14.632	.8376

基本統計量：入院時tFIM


効果：病院

	例数	平均値	標準偏差	標準誤差
A病院	11	53.636	30.415	9.170
B病院	9	55.222	34.438	11.479
その他	22	43.455	19.123	4.077
陽和会病院	26	44.962	24.079	4.722

棒グラフ (群別)

群分け変数：病院

エラーバー：±1標準誤差



分散分析表：退院時tFIM

	自由度	平方和	平均平方	F値	p値
病院	3	2005.486	668.495	.656	.5822
誤差	64	65226.205	1019.159		

コンポーネント間の分散の推定値 (II型) : .

FisherのPLSD：退院時tFIM

効果：病院

有意水準：5%

	平均値の差	棄却値	p値
A病院, B病院	13.919	28.665	.3357
A病院, その他	4.000	23.551	.7355
A病院, 陽和会病院	12.941	22.939	.2640
B病院, その他	-9.919	25.235	.4352
B病院, 陽和会病院	-.979	24.665	.9371
その他, 陽和会病院	8.941	18.475	.3373

基本統計量：退院時tFIM


効果：病院

	例数	平均値	標準偏差	標準誤差
A病院	11	82.364	31.976	9.641
B病院	9	68.444	38.517	12.839
その他	22	78.364	27.818	5.931
陽和会病院	26	69.423	32.792	6.431

棒グラフ (群別)

群分け変数：病院

エラーバー：±1 標準誤差



資料2 陽和会病院における受け入れ症例

分散分析表：年令

	自由度	平方和	平均平方	F値	p値
病院	2	832.699	416.350	3.489	.0367
誤差	62	7399.147	119.341		

コンポーネント間の分散の推定値 (II型) : 13.721

FisherのPLSD：年令

効果：病院

有意水準：5%

	平均値の差	棄却値	p値
M病院, その他	-1.766	6.591	.5941
M病院, 杏林	-8.337	6.591	.0140
その他, 杏林	-6.571	6.739	.0558

基本統計量：年令


効果：病院

	例数	平均値	標準偏差	標準誤差
M病院	23	69.043	12.389	2.583
その他	21	70.810	10.741	2.344
杏林	21	77.381	9.260	2.021

棒グラフ (群別)

群分け変数：病院

エラーバー：±1 標準誤差



分散分析表：待機

	自由度	平方和	平均平方	F値	p値
病院	2	1169.408	584.704	3.189	.0480
誤差	62	11366.530	183.331		

コンポーネント間の分散の推定値 (II型) : 18.542

FisherのPLSD：待機

効果：病院

有意水準：5%

	平均値の差	棄却値	p値
M病院, その他	-6.308	8.169	.1278
M病院, 杏林	4.168	8.169	.3118
その他, 杏林	10.476	8.353	.0148

S

基本統計量：待機


効果：病院

	例数	平均値	標準偏差	標準誤差
M病院	23	26.739	17.504	3.650
その他	21	33.048	12.898	2.814
杏林	21	22.571	8.060	1.759

棒グラフ (群別)

群分け変数：病院

エラーバー：±1 標準誤差



分散分析表：在院日数

	自由度	平方和	平均平方	F値	p値
病院	2	9985.928	4992.964	1.956	.1519
誤差	51	130193.331	2552.810		

コンポーネント間の分散の推定値 (II型) : 136.547

11 ケースは、欠測値のため除外されました。

FisherのPLSD：在院日数

効果：病院

有意水準：5%

	平均値の差	棄却値	p値
M病院, その他	-32.932	33.660	.0550
M病院, 杏林	-17.678	33.093	.2886
その他, 杏林	15.254	35.331	.3901

11 ケースは、欠測値のため除外されました。

基本統計量：在院日数

効果：病院


	例数	平均値	標準偏差	標準誤差
M病院	21	58.381	50.285	10.973
その他	16	91.312	47.710	11.927
杏林	17	76.059	53.314	12.931

11 ケースは、欠測値のため除外されました。

棒グラフ (群別)

群分け変数：病院

エラーバー：± 1 標準誤差



分散分析表：入院時mFIM

	自由度	平方和	平均平方	F値	p値
病院	2	21287.420	10643.710	27.875	<.0001
誤差	62	23673.718	381.834		

コンポーネント間の分散の推定値 (II型) : 474.074

基本統計量：入院時mFIM

効果：病院

	例数	平均値	標準偏差	標準誤差
M病院	23	70.043	19.880	4.145
その他	21	54.238	22.904	4.998
杏林	21	26.381	14.978	3.269

FisherのPLSD：入院時mFIM

効果：病院


有意水準：5%

	平均値の差	棄却値	p値	
M病院, その他	15.805	11.790	.0094	S
M病院, 杏林	43.663	11.790	<.0001	S
その他, 杏林	27.857	12.055	<.0001	S

棒グラフ (群別)

群分け変数：病院

エラーバー：±1 標準誤差



分散分析表：入院時cFIM

	自由度	平方和	平均平方	F値	p値
病院	2	654.088	327.044	4.551	.0143
誤差	62	4455.358	71.861		

コンポーネント間の分散の推定値 (II型) : 11.789

基本統計量：入院時cFIM

効果：病院

	例数	平均値	標準偏差	標準誤差
M病院	23	26.522	7.856	1.638
その他	21	20.619	7.965	1.738
杏林	21	19.333	9.562	2.087

FisherのPLSD：入院時cFIM

効果：病院


有意水準：5%

	平均値の差	棄却値	p値	
M病院, その他	5.903	5.115	.0244	S
M病院, 杏林	7.188	5.115	.0066	S
その他, 杏林	1.286	5.229	.6248	

棒グラフ (群別)

群分け変数：病院

エラーバー：±1 標準誤差



分散分析表：入院時tFIM

	自由度	平方和	平均平方	F値	p値
病院	2	28478.506	14239.253	20.070	<.0001
誤差	62	43988.509	709.492		

コンポーネント間の分散の推定値 (II型) : 625.042

基本統計量：入院時tFIM

効果：病院


	例数	平均値	標準偏差	標準誤差
M病院	23	96.565	26.637	5.554
その他	21	74.857	29.381	6.411
杏林	21	45.714	23.574	5.144

FisherのPLSD：入院時tFIM

効果：病院

有意水準：5%

	平均値の差	棄却値	p値	
M病院, その他	21.708	16.071	.0089	S
M病院, 杏林	50.851	16.071	<.0001	S
その他, 杏林	29.143	16.432	.0008	S



分散分析表：退院時mFIM

	自由度	平方和	平均平方	F値	p値
病院	2	10639.500	5319.750	12.653	<.0001
誤差	52	21862.427	420.431		

コンポーネント間の分散の推定値 (II型) : 269.732

10 ケースは、欠測値のため除外されました。

FisherのPLSD：退院時mFIM

効果：病院

有意水準：5%

	平均値の差	棄却値	p値	
M病院, その他	13.996	14.211	.0534	
M病院, 杏林	32.501	13.028	<.0001	S
その他, 杏林	18.505	13.910	.0101	S

10 ケースは、欠測値のため除外されました。

基本統計量：退院時mFIM

効果：病院


	例数	平均値	標準偏差	標準誤差
M病院	19	82.263	13.004	2.983
その他	15	68.267	22.115	5.710
杏林	21	49.762	24.466	5.339

10 ケースは、欠測値のため除外されました。

棒グラフ (群別)

群分け変数：病院

エラーバー：±1 標準誤差



分散分析表：退院時cFIM

	自由度	平方和	平均平方	F値	p値
病院	2	493.094	246.547	3.378	.0417
誤差	52	3794.833	72.978		

コンポーネント間の分散の推定値 (II型) : 9.556
 10 ケースは、欠測値のため除外されました。

FisherのPLSD：退院時cFIM

効果：病院

有意水準：5%

	平均値の差	棄却値	p値	
M病院, その他	7.119	5.921	.0194	S
M病院, 杏林	5.434	5.428	.0498	S
その他, 杏林	-1.686	5.795	.5619	

10 ケースは、欠測値のため除外されました。

基本統計量：退院時cFIM

効果：病院


	例数	平均値	標準偏差	標準誤差
M病院	19	30.053	6.276	1.440
その他	15	22.933	9.453	2.441
杏林	21	24.619	9.578	2.090

10 ケースは、欠測値のため除外されました。

棒グラフ (群別)

群分け変数：病院

エラーバー：±1 標準誤差



分散分析表：退院時tFIM

	自由度	平方和	平均平方	F値	p値
病院	2	14370.251	7185.126	9.686	.0003
誤差	52	38575.458	741.836		

コンポーネント間の分散の推定値 (II型) : 354.736

10 ケースは、欠測値のため除外されました。

FisherのPLSD：退院時tFIM

効果：病院

有意水準：5%

	平均値の差	棄却値	p値	
M病院, その他	21.116	18.877	.0291	S
M病院, 杏林	37.935	17.305	<.0001	S
その他, 杏林	16.819	18.477	.0735	

10 ケースは、欠測値のため除外されました。

基本統計量：退院時tFIM

効果：病院


	例数	平均値	標準偏差	標準誤差
M病院	19	112.316	18.022	4.134
その他	15	91.200	28.870	7.454
杏林	21	74.381	32.451	7.081

10 ケースは、欠測値のため除外されました。

棒グラフ (群別)

群分け変数：病院

エラーバー：±1 標準誤差



資料3-1：連携パスシステムの流れ

